

I. Ур. с разделяющимися переменными
 $f(y) \cdot dy = g(x) \cdot dx \rightarrow \int f(y) dy = \int g(x) dx$

- $y' = f(ax + by + c) \Rightarrow$ замена $y(x) = \frac{z(x) - ax - c}{b}$,
 $y'(x) = \frac{z'(x) - a}{b}, z(x) = ax + by(x) + c$

II. Однородные уравнения

$$M(x, y)dx + N(x, y)dy = 0$$

M и N – однород. одной и той же степени, т.е.

$$M(kx, ky) = k^n \cdot M(x, y), \text{ то же для } N$$

Замена $y(x) = t(x) \cdot x, y' = t'x + t, t(x) = \frac{y(x)}{x}$

- $y' = f\left(\frac{a_1x + b_1y + c_1}{a_2x + b_2y + c_2}\right) \leftarrow l_1 \leftarrow l_2 \Rightarrow (x_0, y_0) = l_1 \cap l_2,$

Замена $x = u + x_0, y = v + y_0$

- $y(x) = z^m(x), z = y^{-m}$

III. Линейные ур. I порядка

$$y' + a(x)y = b(x)$$

I Однородное $y' + a(x)y = 0 \rightarrow$ (реш.) $y_1 = y = c \dots \forall c$

II Метод вариации постоянной.

Реш. в виде $y = c(x)y_1(x)$

$$\begin{aligned} y' + a(x)y &= c'y_1 + cy'_1 + acy_1 = b \rightarrow \\ c'y_1 &= b \rightarrow c = \int b(x)dx/y_1(x) \end{aligned}$$

- Ур. Бернулли $y' + a(x)y = b(x)y^\alpha \rightarrow$

$$y^{-\alpha}y' + a(x)y^{1-\alpha} = b(x)$$

$$z(x) = y^{1-\alpha}, z'(x) = y^{-\alpha}y'(1-\alpha) \quad (\text{не забудь } y=0)$$

• Интегрируемые комбинации

$$ydy = \frac{1}{2}dy^2 \quad \frac{1}{y}dy = d\ln|y| \quad xdy + ydx = d(xy)$$

- Ур. Рикатти $y' + a(x)y + b(x)y^2 = c(x)$

Если $y_1(x)$ – частное реш., замена $y(x) = y_1(x) + z(x)$

Частное решение можно искать в виде

$$y_1 = cx^\alpha, ce^{\alpha x}, ax^2 + bx + c, ax + b$$

IV. Ур. в полных дифференциалах

$$M(x, y)dx + N(x, y)dy = 0 \text{ – УПД, если } \frac{\partial M}{\partial y} \equiv \frac{\partial N}{\partial x}$$

$$\exists F : \begin{cases} \frac{\partial F}{\partial x} = M(x, y) \rightarrow F(x, y) = \int M(x, y)dx + c(y) \\ \frac{\partial F}{\partial y} = N(x, y) \rightarrow \left(\int M(x, y)dx + c(y) \right)'_y = N(x, y) \end{cases}$$

Отсюда найдём $c(y) = \int c'_y dy = \dots + c_1 \quad \forall c_1$

$$dF = 0 \Leftrightarrow (\text{ответ}) F = C \quad \forall C$$

(константа c_1 входит в C)

- Интегрирующий множитель (!!! не рекомендуется !!!)
 $\frac{\partial M}{\partial y} \neq \frac{\partial N}{\partial x}$. Ищем $m(x, y) : M m dx + N m dy = 0$ – УПД.
 $m = m(x), m(y), x^a y^b$

- Выделение полного дифференциала
 $d(xy), d(\frac{x}{y}), d(\ln|x|)$



Ур. I порядка, не разреш. отн. производной

$$F(x, y, y') = 0$$

1 Разрешить отн. производной. Возможен метод решения относительно $x(y)$, а не $y(x)$:)

2 $F(x, y, y')$ разрешено отн. y : $y = f(x, y')$

$$\text{Пусть } p = y' = \frac{dy}{dx} \rightarrow pdx = dy = \frac{\partial f}{\partial x}dx + \frac{\partial f}{\partial p}dp \rightarrow$$

$M(x, p)dx + N(x, p)dp = 0$, обычное уравнение. Можно найти явное $p = p(x)$, а можно $x = x(p)$ – тогда ответ

$$\begin{cases} x = x(p) \\ y = f(x(p), p) \end{cases}$$

3 $F(x, y, y') : x = f(y, y')$

$$\text{Анал.: } p = y', \frac{dy}{p} = dx = d f(y, p) = \frac{\partial f}{\partial y}dy + \frac{\partial f}{\partial p}dp \rightarrow \dots$$

4 Нахождение особых решений

0. Решить исходное уравнение

1. p -дискриминантные кривые: $\begin{cases} F(x, y, p) = 0 \\ \partial F / \partial p = 0 \\ (p = y') \end{cases}$

Избавляемся от p в системе, ее решения –
 $y = y_1(x, c)$

2. y_1 является решением исх. ур.?

3. y_1 – особое? $\forall x_0 \exists$ реш. $y_2(x) : \begin{cases} y_1(x_0) = y_2(x_0) \\ y'_1(x_0) = y'_2(x_0) \end{cases}$

То есть в любой своей точке особое решение должно касаться другого решения системы.



Ур. допускающие пониж. порядка производной

- $y^{(n)} = f(x) \rightarrow y^{(n-1)} = \int f(x)dx \rightarrow \dots$

- $\cancel{F} : F(x, y^{(k)}, \dots, y^{(n)}) = 0 \Rightarrow$ замена $y_{(x)}^{(k)} = z(x)$

- $\cancel{F} : F(y, y^{(1)}, \dots, y^{(n)}) = 0$

Замена $y' = p(y(x)), y'' = p'_y \cdot y'_x = p'p$
(*не забудь $p'_y = \frac{dp}{dy}$ – $dy = 0$*)

- Однородное по $y, y', \dots, y^{(n)}$ \Rightarrow замена $y' = yz(x)$
 y сократятся если ур. однородное

- Выделение интегрируемых комбинаций

$$\frac{y^{(n)}}{y^{(n-1)}} = (\ln |y^{(n-1)}|)'$$

Использовался задачник Филиппова

Семинарист – Елена Александровна Павельева ♡

<https://github.com/maximelianos/difurry>

→ обозначает переходы между формулами

I'. Линейные однор. н-ого порядка с const coeff

$$\text{I} \quad y^{(n)} + a_{n-1}y^{(n-1)} \dots a_0y^{(0)} = 0$$

$$\text{II} \quad y^{(n)} + a_{n-1}y^{(n-1)} \dots a_0y^{(0)} = f(x)$$

(I) Характеристич. уравнение: $\exists y = e^{\lambda x}$, находим λ

корень λ	функции ФСР
\mathbb{R} кратности k	$y_1(x) = e^{\lambda x}, \dots, y_k(x) = x^{k-1}e^{\lambda x}$
\mathbb{C} кратности k	$y_1(x) = e^{ax} \cos bx \dots$
$(k$ пар $\lambda = a \pm ib)$	$y_k(x) = x^{k-1}e^{ax} \cos bx,$ $y_{k+1}(x) = e^{ax} \sin bx \dots$ $y_{2k}(x) = x^{k-1}e^{ax} \sin bx$

$$y_{\text{одн}}(x) = c_1y_1(x) + \dots + c_ny_n(x) \quad \forall c_1, \dots, c_n$$

(II) Неодн. уравнение. $y_{\text{общ}}(x) = y_{\text{однор}} + y_{\text{частное}}(x)$

1. Первый специальный вид: $f(x) = P_k(x)e^{\gamma x} \Rightarrow y_{\text{ч}}(x) = x^s R_k(x)e^{\gamma x}$

s – кратность γ в решениях хар. уравнения

R_k – неизвестный многочлен k -ой степени

2. Второй: $f(x) = (P_k(x) \cos \beta x + R_m(x) \sin \beta x) \cdot e^{\alpha x} \Rightarrow y_{\text{ч}}(x) = x^s (Q_n(x) \cos \beta x + T_n(x) \sin \beta x) \cdot e^{\alpha x}$

$n = \max(k, m)$, s – кратность $\gamma = \alpha + i\beta$

(либо $\alpha - i\beta$, их кратности равны)

$f(x)$ – сумма 1 и 2 спец. видов $\Rightarrow y_{\text{ч}}(x) = \sum y_{\text{спец}}$

Общий вид пр. части. **Метод вар. постоянных**

Возможно a_0, \dots, a_{n-1} – функции от x , т.е. не const!

$$\text{I} \quad y_{\text{одн}}(x) = c_1y_1(x) + \dots + c_ny_n(x) \quad \forall c_1, \dots, c_n$$

$$\text{II} \quad \exists y(x) = c_1(x)y_1(x) + \dots + c_n(x)y_n(x) \rightarrow$$

(находим функции c_1, c_2, \dots, c_n – интегрируем)

$$\begin{cases} c'_1y_1 + \dots + c'_ny_n = 0 \\ c'_1y'_1 + \dots + c'_ny'_n = 0 \\ \dots \\ c'_1y_1^{(n-2)} + \dots + c'_ny_n^{(n-2)} = 0 \\ c'_1y_1^{(n-1)} + \dots + c'_ny_n^{(n-1)} = f(x) \end{cases}$$

• Ур. Эйлера

$$x^n y^{(n)} + a_{n-1}x^{n-1}y^{(n-1)} + \dots + a_1xy' + a_0y = f(x)$$

Замена: $x = \begin{cases} e^t, & x > 0 \\ -e^t, & x < 0 \end{cases}, \quad t = \ln(x), \quad y(x) = Y(t(x)).$

$$\text{Тогда } y' = Y'_t \cdot \frac{1}{x} \Rightarrow \underline{xy'} = Y'$$

$$y'' = \left(Y' \cdot \frac{1}{x} \right)' = Y'' \frac{1}{x^2} - Y' \frac{1}{x^2} \Rightarrow \underline{x^2 y''} = Y'' - Y'$$

Получили новое уравнение $Y(t)$. Правая часть спец. вида \Rightarrow рассматриваем $x > 0$ и $x < 0$, решаем отн. t . Иначе вар. постоянных.

III'. Линейные однор. ур. с переменными coeff

$$a_n(x)y^{(n)} + \dots + a_1(x)y' + a_0(x)y = f(x)$$

$y_1(x)$ – решение, возможно, вида $e^{\alpha x}$ или многочлен (его степень надо найти). Другое решение $y(x)$ найти по

формуле **Остроградского-Лиувилля**

$$\begin{vmatrix} y_1(x) & y(x) \\ y'_1(x) & y'(x) \end{vmatrix} = ce^{-\int \frac{a_{n-1}(x)}{a_n(x)} dx} \quad \forall c$$

III'. Линейные системы

(I) $\bar{Y}' = A\bar{Y}$ – однородные

$$\exists \bar{Y} = \bar{\alpha}e^{\lambda t} \rightarrow \bar{Y}' = \bar{\alpha}\lambda e^{\lambda t} \Rightarrow$$

$$(A - \lambda E)\bar{\alpha} = 0 \Rightarrow |A - \lambda E| = 0$$

Находим собств. значения λ и с. векторы $\bar{\alpha}$.

1) Нельзя оставлять \mathbb{C} собств. значения! Делать так:

(Аналогично обычным однородным линейным ур.,

только кратные с.з. имеют разные с.в.)

$$\lambda = \alpha \pm i\beta \Rightarrow \bar{Y} = \bar{\alpha} \cdot (\cos \beta t + i \sin \beta t) e^{\alpha t} = \bar{\alpha}_1 + i\bar{\alpha}_2 \Rightarrow$$

$$\bar{Y}_{\text{одн}} = c_1\bar{\alpha}_1 + c_2\bar{\alpha}_2 \quad \forall c_1, c_2$$

2) Если кол-во с. векторов меньше кратности с. значения:

Допустим кратность λ равна 3

$$\bar{Y} = (\bar{\alpha}t^2 + \bar{\beta}t + \bar{\gamma})e^{\lambda t} \rightarrow \bar{Y}' = (\bar{\alpha}2t + \bar{\beta})e^{\lambda t} + (\bar{\alpha}t^2 + \bar{\beta}t + \bar{\gamma})\lambda e^{\lambda t} = (\lambda\bar{\alpha}t^2 + (2\bar{\alpha} + \bar{\lambda}\bar{\beta})t + (\bar{\beta} + \bar{\lambda}\bar{\gamma}))e^{\lambda t}, \quad A\bar{Y} = (A\bar{\alpha}t^2 + A\bar{\beta}t + A\bar{\gamma})e^{\lambda t}$$

$$\exists B = A - \lambda E. \quad \bar{Y}' = A\bar{Y} \Rightarrow \begin{cases} B\bar{\alpha} = \bar{0} \\ B\bar{\beta} = 2\bar{\alpha} \rightarrow B^3\bar{\gamma} = \bar{0} \rightarrow \dots \\ B\bar{\gamma} = \bar{\beta} \end{cases}$$

Так находим все решения – наборы $\{\bar{\alpha}, \bar{\beta}, \bar{\gamma}\}$.

Общее решение однородного уравнения

$$\bar{Y}_{\text{одн}} = c_1\bar{\alpha}_1 e^{\lambda_1 t} + \dots + c_n\bar{\alpha}_n e^{\lambda_n t} \quad \forall c_1, \dots, c_n$$

(II) $\bar{Y}' = A\bar{Y} + \bar{F}$ – неоднородные

1. Первый спец. вид. Если $\bar{F} = \bar{P}_m(t) \cdot e^{\gamma t} = \begin{pmatrix} P_{m1}(t) \\ \dots \\ P_{mn}(t) \end{pmatrix} e^{\gamma t}$,

$$m = \max(m_1, \dots, m_n) \Rightarrow \bar{Y}_{\text{ч}} = \bar{Q}_{m+s}(t) e^{\gamma t} \quad (s = \text{кратность } \gamma)$$

2. Второй спец. вид. $\bar{F} = (\bar{P}_m(t) \cos \beta t + \bar{Q}_l(t) \sin \beta t) \cdot e^{\alpha t} \Rightarrow \bar{Y}_{\text{ч}} = (\bar{R}_{k+s}(t) \cos \beta t + \bar{T}_{k+l}(t) \sin \beta t) \cdot e^{\alpha t}$

$$k = \max(m, l) \quad (s = \text{кратность } \gamma)$$

\bar{F} – сумма специальных видов $\Rightarrow \bar{Y}_{\text{ч}} = \sum y_{\text{спец}}$