

Глава 1

Зависимость решения задачи Коши от исходных данных и параметров

1.1. Непрерывная зависимость решения задачи Коши от исходных данных

Рассмотрим задачу Коши для дифференциального уравнения первого порядка, разрешенного относительно производной

y'(t) = f(t, y(t)), t ∈ [t_0 - T, t_0 + T], y(t_0) = y_0. (1.1) (1.2)

Пусть функция f(t, y) определена и непрерывна в прямоугольнике Q = {(t, y) : |t - t_0| ≤ T, A ≤ y ≤ B}.

Определение 1.1.1. Решением задачи Коши (1.1), (1.2) на отрезке [t_0 - T, t_0 + T] называется функция y(t) такая, что y(t) непрерывно дифференцируема на [t_0 - T, t_0 + T], A ≤ y(t) ≤ B для t ∈ [t_0 - T, t_0 + T], y(t) удовлетворяет (1.1), (1.2).

Решение задачи Коши (1.1), (1.2) зависит от функции f(t, y) и начальных состояний y_0, которые можно называть исходными данными задачи Коши (1.1), (1.2). Как зависит решение этой задачи от изменения исходных данных, то есть функции f(t, y) и начального состояния y_0? Покажем, что небольшие изменения исходных данных приводят к небольшим изменениям решения задачи Коши. Таким образом, можно говорить о непрерывной зависимости решения задачи Коши от исходных данных.

1.1.1. Непрерывная зависимость от исходных данных

Теорема 1.1.1. Пусть функции f_1(t, y) и f_2(t, y) непрерывны в прямоугольнике Q и f_1(t, y) удовлетворяет в Q условию Липшица по y, то есть существует константа L > 0 такая, что

|f_1(t, y) - f_1(t, y-)| ≤ L|y - y-|, ∀(t, y), (t, y-) ∈ Q.

Тогда, если функции y_1(t) и y_2(t) на отрезке [t_0 - T, t_0 + T] являются решениями задач Коши

{ y_1'(t) = f_1(t, y_1(t)), y_1(t_0) = y_{01}, { y_2'(t) = f_2(t, y_2(t)), y_2(t_0) = y_{02},

то имеют место неравенства

max_{t ∈ [t_0 - T, t_0 + T]} |y_1(t) - y_2(t)| ≤ (|y_{01} - y_{02}| + T max_{(t,y) ∈ Q} |f_1(t, y) - f_2(t, y)|) exp{LT}. (1.3)

Доказательство. Из леммы об эквивалентности задачи Коши интегральному уравнению следует, что функции y_1(t) и y_2(t) являются решениями интегральных уравнений

y_1(t) = y_{01} + ∫_{t_0}^t f_1(τ, y_1(τ))dτ, t ∈ [t_0 - T, t_0 + T], y_2(t) = y_{02} + ∫_{t_0}^t f_2(τ, y_2(τ))dτ, t ∈ [t_0 - T, t_0 + T].

Вычитая второе уравнение из первого и оценивая по модулю, имеем

|y_1(t) - y_2(t)| ≤ |y_{01} - y_{02}| + ∫_{t_0}^t |f_1(τ, y_1(τ)) - f_2(τ, y_2(τ))|dτ.

Вычитая и прибавляя под знаком интеграла f_1(τ, y_2(τ)), получим

|y_1(t) - y_2(t)| ≤ |y_{01} - y_{02}| + ∫_{t_0}^t |f_1(τ, y_1(τ)) - f_1(τ, y_2(τ))dτ| + ∫_{t_0}^t |f_1(τ, y_2(τ)) - f_2(τ, y_2(τ))|dτ, t ∈ [t_0 - T, t_0 + T]. (1.4)

Учитывая то, что функция f_1(t, y) удовлетворяет условию Липшица, а также оценку

∫_{t_0}^t |f_1(τ, y_2(τ)) - f_2(τ, y_2(τ))dτ| ≤ T max_{(t,y) ∈ Q} |f_1(t, y) - f_2(t, y)|,

справедливую для всех t ∈ [t_0 - T, t_0 + T], неравенство (1.4) можно переписать так:

|y_1(t) - y_2(t)| ≤ (|y_{01} - y_{02}| + T max_{(t,y) ∈ Q} |f_1(t, y) - f_2(t, y)|) + L ∫_{t_0}^t |y_1(τ) - y_2(τ)|dτ, t ∈ [t_0 - T, t_0 + T].

Применив к функции |y_1(t) - y_2(t)| лемму Гронолла-Беллмана ??, при t ∈ [t_0 - T, t_0 + T] получим неравенство

|y_1(t) - y_2(t)| ≤ (|y_{01} - y_{02}| + T max_{(t,y) ∈ Q} |f_1(t, y) - f_2(t, y)|) exp{L|t - t_0|}, из которого следует оценка (1.3). Теорема 1.1.1 доказана. □

1.1.2. Теорема сражения

Рассмотрим теперь вопрос о том, при каких условиях решение одной задачи Коши будет больше или равно решению другой задачи Коши. Теоремы такого типа часто называют теоремами сражения.

Рассмотрим прямоугольник

Q_+ = {(t, y) : t_0 ≤ t ≤ t_0 + T, A ≤ y ≤ B},

далее мы используем следующее простое утверждение из математического анализа, представляющее собой формулу конечных приращений в интегральном виде.

Лемма 1.1.1. Пусть функция f(t, y) непрерывна в Q_+ и имеет в Q_+ непрерывную частную производную f_y(t, y). Тогда для любых t, y_1, (t, y_2) ∈ Q_+ справедливо равенство

f(t, y_1) - f(t, y_2) = ∫_{y_2}^{y_1} f_y(t, y_2 + θ(y_1 - y_2))dθ (y_1 - y_2). (1.5)

Докажем теперь теорему о сражении решений двух задач Коши, которую также часто называют неравенством Чалемкина.

Теорема 1.1.2. (Теорема сражения) Пусть функции f_1(t, y), f_2(t, y) непрерывны в Q_+ и f_1(t, y) имеет в Q_+ непрерывную частную производную ∂f_1/∂y(t, y). Тогда, если функции y_1(t), y_2(t) на отрезке [t_0, t_0 + T] являются решениями задач Коши

{ y_1'(t) = f_1(t, y_1(t)), y_1(t_0) = y_{01}, { y_2'(t) = f_2(t, y_2(t)), y_2(t_0) = y_{02},

причем f_1(t, y) ≥ f_2(t, y), (t, y) ∈ Q_+, y_{01} ≥ y_{02},

то справедливо неравенство

y_1(t) ≥ y_2(t), t ∈ [t_0, t_0 + T].

Доказательство. Так как функции y_1(t) и y_2(t) на отрезке [t_0, t_0 + T] являются решениями соответствующих уравнений, то они непрерывно дифференцируемы на отрезке [t_0, t_0 + T]. A ≤ y_1(t) ≤ B, i = 1, 2, и справедливо равенство

y_1'(t) - y_2'(t) = f_1(t, y_1(t)) - f_2(t, y_2(t)), t ∈ [t_0, t_0 + T]. (1.6)

Преобразуем правую часть этого равенства, используя формулу конечных приращений (1.5),

f_1(t, y_1(t)) - f_2(t, y_2(t)) = f_1(t, y_1(t)) - f_1(t, y_2(t)) + f_1(t, y_2(t)) - f_2(t, y_2(t)) = ∫_{y_2}^{y_1} ∂f_1/∂y(t, y_2(t) + θ(y_1(t) - y_2(t)))dθ (y_1(t) - y_2(t)) + f_1(t, y_2(t)) - f_2(t, y_2(t)).

Введем обозначения

v(t) = y_1(t) - y_2(t),

p(t) = ∫_0^1 ∂f_1/∂y(t, y_2(t) + θ(y_1(t) - y_2(t)))dθ, h(t) = f_1(t, y_2(t)) - f_2(t, y_2(t)).

Тогда f_1(t, y_1(t)) - f_2(t, y_2(t)) = p(t)v(t) + h(t), и равенство (1.6) можно переписать так:

v'(t) = p(t)v(t) + h(t), t ∈ [t_0, t_0 + T].

Решение этого линейного дифференциального уравнения первого порядка с начальным условием v(t_0) = y_{01} - y_{02} имеет вид

v(t) = (y_{01} - y_{02}) exp{ ∫_{t_0}^t p(ξ)dξ } + ∫_{t_0}^t exp{ ∫_{t_0}^t p(ξ)dξ } h(τ)dτ, t ∈ [t_0, t_0 + T].

Так как из условий теоремы следует, что

y_{01} - y_{02} ≥ 0, h(t) ≥ 0, t ∈ [t_0, t_0 + T],

то

v(t) = y_1(t) - y_2(t) ≥ 0, t ∈ [t_0, t_0 + T],

и теорема 1.1.2 доказана. □

1.2. Зависимость решения задачи Коши от параметра

В этом параграфе мы рассмотрим задачу Коши для дифференциального уравнения первого порядка, разрешенного относительно производной, в которой правая часть уравнения и начальное условие зависят от параметра μ, и выясним при каких условиях решение этой задачи Коши будет непрерывно и дифференцируемо по параметру.

Обозначим

Q_μ = {(t, y, μ) : |t - t_0| ≤ T, A ≤ y ≤ B, μ_1 ≤ μ ≤ μ_2}.

Пусть функция f(t, y, μ) определена на множестве Q_μ, а функция y_0(μ) определена на отрезке [μ_1, μ_2].

Рассмотрим задачу Коши

y'(t) = f(t, y(t), μ), t ∈ [t_0 - T, t_0 + T], y(t_0) = y_0(μ). (1.7) (1.8)

Так как при различных значениях параметра μ мы будем получать решения задачи Коши (1.7), (1.8), то, очевидно, что решение этой задачи зависит не только от переменных t, но и от параметра μ. В связи с этим далее решение задачи Коши (1.7), (1.8) мы будем обозначать y(t, μ). При каких условиях решение задачи Коши y(t, μ) будет непрерывно по параметру μ?

1.2.1. Непрерывная зависимость решения задачи Коши от параметра

Теорема 1.2.1. Пусть функция f(t, y, μ) непрерывна в Q_μ и удовлетворяет в Q_μ условию Липшица по y, то есть

|f(t, y_1, μ) - f(t, y_2, μ)| ≤ L|y_1 - y_2|, ∀(t, y_1, μ), (t, y_2, μ) ∈ Q_μ.

а функция y_0(μ) непрерывна на отрезке [μ_1, μ_2].

Тогда, если y(t, μ) - решение задачи Коши (1.7), (1.8) на отрезке [t_0 - T, t_0 + T] для всех μ ∈ [μ_1, μ_2], то функция y(t, μ) непрерывна по μ при t ∈ [t_0 - T, t_0 + T], μ ∈ [μ_1, μ_2].

Доказательство. По условию решение задачи Коши y(t, μ) существует для всех t ∈ [t_0 - T, t_0 + T], μ ∈ [μ_1, μ_2] и A ≤ y(t, μ) ≤ B для всех t ∈ [t_0 - T, t_0 + T], μ ∈ [μ_1, μ_2]. Пусть μ_0 и μ + Δμ две произвольные точки отрезка [μ_1, μ_2]. Рассмотрим решения задачи Коши y(t, μ_0) и y(t, μ + Δμ), соответствующие этим значениям параметров. Введем обозначения

y_1(t) = y(t, μ_0), y_2(t) = y(t, μ + Δμ), f_1(t, y) = f(t, y, μ_0), f_2(t, y) = f(t, y, μ + Δμ), y_{01} = y_0(μ_0), y_{02} = y_0(μ + Δμ).

Для функций y_1(t) и y_2(t) выполнены условия теоремы 1.1.1 о непрерывной зависимости решения задачи Коши от исходных данных. Применяя эту теорему, получим

max_{t ∈ [t_0 - T, t_0 + T]} |y(t, μ_0) - y(t, μ + Δμ)| = max_{t ∈ [t_0 - T, t_0 + T]} |y_1(t) - y_2(t)| ≤ (|y_{01} - y_{02}| + T max_{(t,y) ∈ Q} |f_1(t, y) - f_2(t, y)|) exp{LT} = (|y_0(μ_0) - y_0(μ + Δμ)| + T max_{(t,y) ∈ Q} |f(t, y, μ_0) - f(t, y, μ + Δμ)|) exp{LT}. (1.9)

где Q = {(t, y) : |t - t_0| ≤ T, A ≤ y ≤ B}.

Положим, что из неравенства (1.9) следует непрерывность функции y(t, μ) в точке μ_0. Пусть ε - произвольное положительное число. Покажем, что найдется δ(ε) такое, что для всех t ∈ [t_0 - T, t_0 + T]

|y(t, μ_0 + Δμ) - y(t, μ_0)| ≤ ε (1.10)

при |Δμ| ≤ δ(ε).

Так как непрерывная на отрезке [μ_1, μ_2] функция y_0(μ) равномерно непрерывна на этом отрезке, то существует δ_1(ε) такое, что

|y_0(μ_0 + Δμ) - y_0(μ_0)| ≤ ε / 2 exp{LT} (1.11)

при |Δμ| ≤ δ_1(ε).

Так как непрерывная на ограниченном замкнутом множестве Q_μ функция f(t, y, μ) равномерно непрерывна на этом множестве, то существует δ_2(ε) такое, что для любых t ∈ [t_0 - T, t_0 + T] и y ∈ [A, B]

|f(t, y, μ_0 + Δμ) - f(t, y, μ_0)| ≤ ε / 2T exp{LT} (1.12)

при |Δμ| ≤ δ_2(ε).

Из неравенств (1.9), (1.11) и (1.12) следует, что при |Δμ| ≤ δ(ε) = min{δ_1(ε), δ_2(ε)} справедливо неравенство (1.10), которое означают непрерывность функции y(t, μ) по μ. Теорема 1.2.1 доказана. □

Замечание 1.2.1. В теореме 1.2.1 фактически доказана равномерная на множестве [t_0 - T, t_0 + T] × [μ_1, μ_2] непрерывность решения задачи Коши по параметру μ. Отсюда нетрудно показать, что функция y(t, μ) непрерывна по совокупности переменных (t, μ) на множестве [t_0 - T, t_0 + T] × [μ_1, μ_2].

1.2.2. Дифференцируемость решения задачи Коши по параметру

Покажем теперь, что при определенных условиях, решение y(t, μ) задачи Коши (1.7), (1.8) будет дифференцируемо по параметру μ.

Теорема 1.2.2. Пусть функция f(t, y, μ) непрерывна в Q_μ и имеет в Q_μ непрерывные частные производные f_y(t, y, μ), f_μ(t, y, μ), а функция y_0(μ) непрерывно дифференцируема на отрезке [μ_1, μ_2].

Тогда, если y(t, μ) - решение задачи Коши (1.7), (1.8) на отрезке [t_0 - T, t_0 + T] для всех μ ∈ [μ_1, μ_2], то функция y(t, μ) имеет при t ∈ [t_0 - T, t_0 + T], μ ∈ [μ_1, μ_2] производную по μ.

Доказательство. По условию решение задачи Коши y(t, μ) существует для всех t ∈ [t_0 - T, t_0 + T], μ ∈ [μ_1, μ_2] и A ≤ y(t, μ) ≤ B для всех t ∈ [t_0 - T, t_0 + T], μ ∈ [μ_1, μ_2]. Пусть μ и μ + Δμ две произвольные точки отрезка [μ_1, μ_2]. Рассмотрим соответствующие этим параметрам решения задачи Коши y(t, μ) и y(t, μ + Δμ). Определим функцию

v(t, μ, Δμ) = y(t, μ + Δμ) - y(t, μ), t ∈ [t_0 - T, t_0 + T].

Так как функции y(t, μ + Δμ), y(t, μ) являются решениями уравнения (1.7) на отрезке [t_0 - T, t_0 + T] при соответствующих значениях параметров, то

v'(t, μ, Δμ) = f(t, y(t, μ + Δμ), μ + Δμ) - f(t, y(t, μ), μ), (1.13)

Преобразуем выражение, стоящее в правой части этого равенства

f(t, y(t, μ + Δμ), μ + Δμ) - f(t, y(t, μ), μ) = f(t, y(t, μ + Δμ), μ + Δμ) - f(t, y(t, μ), μ + Δμ) + f(t, y(t, μ), μ + Δμ) - f(t, y(t, μ), μ).

Применяя формулу конечных приращений (1.5), получим

f(t, y(t, μ + Δμ), μ + Δμ) - f(t, y(t, μ), μ + Δμ) = ∫_0^1 f_y(t, y(t, μ) + θ(y(t, μ + Δμ) - y(t, μ)), μ + Δμ)dθ · y(t, μ + Δμ) - y(t, μ).

Введем функции

p(t, μ, Δμ) = ∫_0^1 f_y(t, y(t, μ) + θ(y(t, μ + Δμ) - y(t, μ)), μ + Δμ)dθ, q(t, μ, Δμ) = f(t, y(t, μ), μ + Δμ) - f(t, y(t, μ), μ).

Учитывая сделанные обозначения, имеем

f(t, y(t, μ + Δμ), μ + Δμ) - f(t, y(t, μ), μ) = Δμ · p(t, μ, Δμ)v(t, μ, Δμ) + q(t, μ, Δμ).

Положив это равенство в правую часть (1.13), получим, что функция v(t, μ, Δμ) является решением линейного дифференциального уравнения первого порядка на отрезке [t_0 - T, t_0 + T]:

v'(t, μ, Δμ) = p(t, μ, Δμ)v(t, μ, Δμ) + q(t, μ, Δμ). (1.14)

Из определения v(t, μ, Δμ) следует, что она удовлетворяет начальному условию

v(t_0, μ, Δμ) = y_0(μ + Δμ) - y_0(μ). (1.15)

Решение задачи Коши (1.14), (1.15) имеет вид

v(t, μ, Δμ) = y_0(μ + Δμ) - y_0(μ) exp{ ∫_{t_0}^t p(ξ, μ, Δμ)dξ } + ∫_{t_0}^t q(τ, μ, Δμ) exp{ ∫_{t_0}^t p(ξ, μ, Δμ)dξ } dτ, t ∈ [t_0 - T, t_0 + T]. (1.16)

Для доказательства существования производной ∂y/∂μ(t, μ) достаточно доказать, что функция v(t, μ, Δμ) имеет предел при Δμ → 0. Покажем, что существует предел правой части формулы (1.16) при Δμ → 0.

Так как функция y_0(μ) непрерывно дифференцируема, то

lim_{Δμ → 0} y_0(μ + Δμ) - y_0(μ) = dy_0/dμ(μ).

Найдем предел функции p(t, μ, Δμ) при Δμ → 0. Из непрерывности в Q_μ частной производной f_y(t, y, μ) и определения функции p(t, μ, Δμ) следует, что

lim_{Δμ → 0} p(t, μ, Δμ) = ∂f/∂y(t, y(t, μ), μ)

равномерно по (t, μ) ∈ [t_0 - T, t_0 + T] × [μ_1, μ_2]. Из существования частной производной f_y(t, y, μ) имеем

lim_{Δμ → 0} q(t, μ, Δμ) = ∂f/∂μ(t, y(t, μ), μ)

равномерно по (t, μ) ∈ [t_0 - T, t_0 + T] × [μ_1, μ_2]. Следовательно, предел правой части формулы (1.16) существует, и переходя в этой формуле к пределу при Δμ → 0, получим

∂y/∂μ(t, μ) = lim_{Δμ → 0} v(t, μ, Δμ) = dy_0/dμ(μ) exp{ ∫_{t_0}^t f_y(ξ, y(ξ, μ), μ)dξ } + ∫_{t_0}^t f_μ(τ, y(τ, μ), μ) exp{ ∫_{t_0}^t f_y(ξ, y(ξ, μ), μ)dξ } dτ. (1.17)

Теорема 1.2.2 доказана. □

Введем обозначение z(t, μ) = ∂y/∂μ(t, μ), а через z'(t, μ) обозначим производную z(t, μ) по переменной t. Из формулы (1.17) следует, что функция z(t, μ) является решением задачи Коши на отрезке [t_0 - T, t_0 + T]:

z'(t, μ) = f_y(t, y(t, μ), μ)z(t, μ) + f_μ(t, y(t, μ), μ), (1.18)

z(t_0, μ) = y_0'(μ). (1.19)

1.2.3. Метод малого параметра

Во многих случаях не удается явно выписать решение задачи Коши

y'(t) = f(t, y(t), μ), y(t_0) = y_0(μ). (1.20)

для всех μ ∈ [μ_1, μ_2], хотя при некотором μ = μ_0 ∈ (μ_1, μ_2) оно находится относительно легко (например, когда функция f(t, y, μ_0) линейно зависит от y). Обозначим это решение через u_0(t). Тогда u_0(t) = y(t, μ_0) является решением задачи Коши

u_0'(t) = f(t, u_0(t), μ_0), u_0(t_0) = y_0(μ_0). (1.21)

Будем предполагать, что решение u_0(t) задачи (1.21) каким-либо способом уже найдено, и поставим задачу нахождения приближенного вида решения y(t, μ) задачи (1.20) при всех μ, достаточно близких к μ_0 при выполнении условий теоремы 1.2.2. В силу этой теоремы при каждом t ∈ [t_0 - T, t_0 + T] решение y(t, μ) непрерывно дифференцируемо по параметру μ в окрестности μ_0. Поэтому справедлива формула Тейлора (с центром в μ_0) с остаточными членами в форме Пеано:

y(t, μ) = y(t, μ_0) + ∂y(t, μ_0)/∂μ(μ - μ_0) + o(μ - μ_0).

Важно отметить, что для вычисления производной u_1(t) = ∂y(t, μ_0)/∂μ не нужно знать решение y(t, μ) при каких-либо значениях параметра, отличных от μ = μ_0, поскольку согласно (1.18), (1.19) функция u_1(t) является решением задачи Коши

u_1'(t) = a(t)u_1(t) + b(t), u_1(t_0) = y_0'(μ_0) (1.22)

для линейного дифференциального уравнения с известными непрерывными коэффициентами

a(t) = f_y(t, u_0(t), μ_0), b(t) = f_μ(t, u_0(t), μ_0).

В результате приходим к асимптотическому при μ → 0 пред- ставлению искомого решения y(t, μ) задачи (1.20):

y(t, μ) = u_0(t) + u_1(t)(μ - μ_0) + o(μ - μ_0), t ∈ [t_0 - T, t_0 + T]. (1.23)

где функция u_0(t) и u_1(t) находится из задач (1.21) и (1.22). Поэтому с точностью до слагаемых o(μ - μ_0) справедливо приближенное представление y(t, μ) ≈ u_0(t) + u_1(t)(μ - μ_0).

Основная выше процедура представляет собой простейший вариант метода малого параметра, использующего с помощью разложения (1.23) выделить основные качественные и количественные закономерности поведения решения y(t, μ) при малых μ - μ_0 на основе известного решения y(t, μ_0) в предположении существования непрерывных производных первого порядка f_y(t, y, μ) и f_μ(t, y, μ). Если f(t, y, μ) имеет производные по y и f_y(t, y, μ) и f_μ(t, y, μ), то разложение (1.23) можно уточнить и получить приближение с более высоким порядком малости остаточного члена.

Пример 1.2.1. Получить асимптотическое при μ → 0 разложение решения задачи Коши

y'(t) = y(t) + 3μy^2(t) + μ^2t, y(0) = exp{2μ}.

Имеем t_0 = 0, μ_0 = 0, y_0(μ) = exp{2μ}, y_0'(μ) = 2 exp{2μ}.

f(t, y, μ) = y + 3μy^2 + μ^2t, f_y(t, y, μ) = 1 + 12μy^2, f_μ(t, y, μ) = 3y^2 + 2μt, f(t, y, 0) = y, f_y(t, y, 0) = 1, f_μ(t, y, 0) = 3y^2, y_0(0) = 1, y_0'(0) = 2.

Согласно (1.21) при μ = 0 функция u_0(t) = y(t, 0) является решением задачи Коши

u_0'(t) = u_0(t), u_0(0) = 1,

решение которой легко найти: u_0(t) = exp{t}. Поэтому

f_y(t, u_0(t), 0) = 1, f_μ(t, u_0(t), 0) = 3 exp{4t}.

Задача Коши (1.22) для u_1(t) принимает вид

u_1'(t) = u_1(t) + 3 exp{4t}, u_1(0) = 0

и имеет решение u_1(t) = 2 exp{t} + exp{4t}. Тогда в силу (1.23) имеем место разложение при μ → 0:

y(t, μ) = exp{t} + (2 exp{t} + exp{4t})μ + o(μ).

Глава 2

Теория устойчивости

2.1. Основные понятия

В теории устойчивости изучается вопрос о зависимости решения задачи Коши для дифференциального уравнения или системы от заданных при t = t_0 начальных данных на бесконечном промежутке изменения независимой переменной t ∈ [t_0; +∞). Далее без ограничения общности полагаем t_0 = 0.

чно по Лапунку и существует $\delta_0 > 0$ такое, что для любых начальных данных $\bar{y}_0$, удовлетворяющих условию $\|\bar{y}_0\| < \delta_0$, существует предел

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \|\bar{y}(t; \bar{y}_0)\| = 0. \quad (2.6)$$

Проблему устойчивости решения $\bar{y}(t; \bar{y}_0)$ задачи Коши (2.1), (2.2) можно свести к аналогичной проблеме для нулевого решения. Перейдем от системы (2.1) к новой системе, введя новые неизвестные

$$\bar{x}(t) = \bar{y}(t) - \bar{y}(t; \bar{y}_0).$$

Так как $\bar{y}(t)$ – решение (2.1), то для $\bar{x}(t)$ имеем

$$\begin{aligned} \frac{\bar{x}(t)}{dt} &= \frac{\bar{y}(t)}{dt} - \frac{\bar{y}(t; \bar{y}_0)}{dt} = \bar{f}(t; \bar{y}(t)) - \bar{f}(t; \bar{y}(t; \bar{y}_0)) = \\ &= \bar{f}(t; \bar{x}(t) + \bar{y}(t; \bar{y}_0)) - \bar{f}(t; \bar{y}(t; \bar{y}_0)). \end{aligned}$$

Таким образом, вектор функции $\bar{x}(t)$ является решением системы

$$\frac{\bar{x}(t)}{dt} = \bar{f}(t; \bar{x}(t) + \bar{y}(t; \bar{y}_0)) - \bar{f}(t; \bar{y}(t; \bar{y}_0)).$$

Решение $\bar{x}(t; \bar{\theta})$ этой системы с нулевым начальным условием $\bar{x}(0) = \bar{\theta}$ равно нулю: $\bar{x}(t; \bar{\theta}) = \bar{\theta}$, $t \geq 0$. Это тривиальное решение соответствует решению $\bar{y}(t; \bar{y}_0)$ исходной системы. Принимая во внимание вышеизложенное, при анализе устойчивости, как правило, ограничиваясь исследованием устойчивости нулевого решения.

2.2. Устойчивость нулевого решения линейной системы с постоянными коэффициентами

В данном параграфе рассматривается линейная однородная система обыкновенных дифференциальных уравнений с постоянными вещественными коэффициентами

$$\frac{d\bar{y}}{dt} = A\bar{y},$$

где $A = (a_{ij})$, $a_{ij} \in \mathbb{R}$, $i, j = 1, \dots, n$. В зависимости от свойств матрицы A будут доказаны теоремы об устойчивости, асимптотической устойчивости и неустойчивости нулевого решения этой системы.

2.2.1. Вспомогательные утверждения

Лемма 2.2.1. Пусть $B(t) = (b_{ij}(t))$ – фундаментальная матрица, элементы которойMajorируются одной и той же функцией $b(t)$:

$$|b_{ij}(t)| \leq b(t), \quad i, j = 1, \dots, n.$$

Если вектор-функция $\bar{x}(t) = (x_1(t), \dots, x_n(t))^T$, $\bar{y}(t) = (y_1(t), \dots, y_n(t))^T$ связаны соотношением $\bar{y}(t) = B(t)\bar{x}(t)$, то справедлива оценка

$$\|\bar{y}(t)\| \leq nb(t)\|\bar{x}(t)\|.$$

Доказательство. Так как $b_{ij}(t) = \sum_{k=1}^n b_{kij}(t)x_k(t)$ то, оценивая модули компонент и применяя неравенство Коши-Бунковского, имеем

$$\begin{aligned} |b_{ij}(t)| &= \left| \sum_{k=1}^n b_{kij}(t) \cdot |x_k(t)| \right| \leq b(t) \sum_{k=1}^n |x_k(t)| \leq \\ &\leq b(t) \left(\sum_{k=1}^n 1^2 \right)^{1/2} \cdot \left(\sum_{k=1}^n x_k^2(t) \right)^{1/2} = b(t) \sqrt{n} \|\bar{x}(t)\|. \end{aligned}$$

Возвоя в квадрат обе части полученного неравенства и суммируя по $j = 1, \dots, n$, приходим к утверждению леммы 2.2.1. $\square$

Лемма 2.2.2. Для любой непрерывной при $t \geq 0$ вектор-функции $\bar{y}(t) = (y_1(t), \dots, y_n(t))^T$ справедливо неравенство

$$\left| \int_0^t \bar{y}(\xi) d\xi \right| \leq \sqrt{n} \int_0^t \|\bar{y}(\xi)\| d\xi.$$

Доказательство. По определению интеграла от вектор-функции имеем

$$\int_0^t \bar{y}(\xi) d\xi = (I_1(t), \dots, I_n(t))^T, \quad I_j(t) = \int_0^t y_j(\xi) d\xi, \quad j = 1, \dots, n.$$

При $t \geq 0$ справедливы покомпонентные неравенства

$$|I_j(t)| = \left| \int_0^t y_j(\xi) d\xi \right| \leq \int_0^t |y_j(\xi)| d\xi \leq \int_0^t \|\bar{y}(\xi)\| d\xi.$$

Возвоя в квадрат обе части полученного неравенства и суммируя по $j = 1, \dots, n$, приходим к утверждению леммы 2.2.2 $\square$

Лемма 2.2.3. Пусть $Y(t) = (y_{ij}(t))$ – фундаментальная матрица линейной однородной системы $\frac{d\bar{y}}{dt} = A\bar{y}$ с постоянными коэффициентами $a_{ij} \in \mathbb{R}$, $i, j = 1, \dots, n$, $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ – собственные значения матрицы A с учетом кратности, $\mu = \max_{k=1, \dots, n} \operatorname{Re} \lambda_k$.

Тогда для матрицанта $Z(t, \tau) = Y(t)Y^{-1}(\tau)$ справедливы соотношения

- $Z(t, \tau) = Z(t - \tau, 0)$;
- для любого $\gamma > 0$ найдется $C_\gamma > 0$ такое, что справедливо неравенство
$$|Z_{ij}(t, \tau)| \leq C_\gamma \exp\{(p + \gamma)(t - \tau)\}, \quad \forall t \geq \tau.$$

Доказательство. Матрицант является решением матричной задачи Коши

$$\frac{dZ(t, \tau)}{dt} = AZ(t, \tau), \quad Z(\tau, \tau) = E.$$

Обозначим $s = t - \tau$, τ – фиксировано, и введем функцию

$$\bar{Z}(s) = Z(\tau + s, \tau).$$

Но тогда в силу единственности решения матричной задачи Коши справедливо равенство $\bar{Z}(s) = Z(s, 0)$. Возвращаясь к переменной t , получаем $Z(t, \tau) = Z(t - \tau, 0)$.

Оценим компоненты матрицы $Z(s, 0) = Y(s)Y^{-1}(0)$. Так как столбцы фундаментальной матрицы состоят из вектор-функций фундаментальной системы решений, то компоненты матрицанта $Z(s, 0)$ имеют вид (см. теорему ??):

$$Z_{ij}(s, 0) = q_{ij}(s) \exp\{\lambda_k s\}, \quad (2.7)$$

где λ_k – одно из собственных значений, а $q_{ij}(s)$ – многочлен степени $\deg q_{ij}(s) \leq n - 1$. Для любого $\gamma > 0$ найдутся постоянные $C_{ij} > 0$ такие, что выполнены неравенства

$$|q_{ij}(s)| \leq C_{ij} \exp\{\gamma s\}, \quad \forall s \geq 0.$$

Так как $p = \max_{k=1, \dots, n} \operatorname{Re} \lambda_k$, то

$$|\exp\{\lambda_k s\}| = \exp\{\operatorname{Re} \lambda_k s\} \leq \exp\{p s\}.$$

Учитывая эти неравенства, из (2.7) получаем

$$|Z_{ij}(s, 0)| \leq |q_{ij}(s)| \cdot |\exp\{\lambda_k s\}| \leq C_\gamma \exp\{(p + \gamma)s\}, \quad C_\gamma = \max_{i, j=1, \dots, n} C_{ij}.$$

Полагая $s = t - \tau$, убеждаемся в справедливости второго утверждения леммы 2.2.3. $\square$

2.2.2. Теорема об асимптотической устойчивости нулевого решения линейной системы с постоянными коэффициентами

Рассмотрим линейную однородную систему с постоянными вещественными коэффициентами:

$$\frac{d\bar{y}}{dt} = A\bar{y}, \quad \bar{y}(0) = \bar{y}_0. \quad (2.8)$$

где $A = (a_{ij})$, $a_{ij} \in \mathbb{R}$, $i, j = 1, \dots, n$. Пусть $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ – собственные значения матрицы A с учетом их кратности.

Теорема 2.2.1. Пусть вещественные части всех собственных значений матрицы A отрицательны:

$$\operatorname{Re} \lambda_k < 0, \quad \forall k = 1, \dots, n.$$

Тогда нулевое решение $\bar{y}(t; \bar{\theta}) = \bar{\theta}$ системы (2.8) является асимптотически устойчивым.

Доказательство. Пусть $\bar{y}(t) = \bar{y}(t; \bar{y}_0)$ – решение задачи Коши

$$\frac{d\bar{y}}{dt} = A\bar{y}, \quad \bar{y}(0) = \bar{y}_0.$$

Тогда, используя определение матрицанта, решение этой задачи можно представить в виде

$$\bar{y}(t) = Z(t, 0)\bar{y}_0.$$

Обозначим $p = \max_{k=1, \dots, n} \operatorname{Re} \lambda_k < 0$. Выберем и зафиксируем настолько малое $\gamma > 0$, чтобы

$$\alpha = p + \gamma < 0.$$

Тогда согласно части 2 леммы 2.2.3 найдется константа C_γ такая, что справедлива оценка

$$|Z_{ij}(t, 0)| \leq C_\gamma \exp\{\alpha t\}, \quad t \geq 0.$$

В силу леммы 2.2.1 $c B(t) = Z(t, 0)$, $b(t) = C_\gamma \exp\{\alpha t\}$ и $\bar{x}(t) = \bar{y}_0$ из (2.9) следует оценка

$$\|\bar{y}(t)\| \leq nC_\gamma \exp\{\alpha t\}\|\bar{y}_0\|.$$

Если положить $\delta(\varepsilon) = \frac{\varepsilon}{nC_\gamma}$, то из неравенства $\|\bar{y}_0\| < \delta(\varepsilon)$ будет вытекать неравенство $\|\bar{y}(t)\| < \varepsilon$ для всех $t \geq 0$. Асимптотическая устойчивость следует из предельного соотношения $\exp\{\alpha t\} \rightarrow 0$ при $t \rightarrow +\infty$. $\square$

2.2.3. Теорема об устойчивости нулевого решения линейной системы с постоянными коэффициентами

Теорема 2.2.2. Пусть вещественные части всех собственных значений матрицы A неположительны,

$$\operatorname{Re} \lambda_k \leq 0, \quad \forall k = 1, \dots, n$$

и существуют собственные значения с нулевой вещественной частью, причём размерность касательного нулевого подпространства, отвечающего $\operatorname{Re} \lambda = 0$, совпадает с его кратностью.

Тогда нулевое решение $\bar{y}(t; \bar{\theta}) = \bar{\theta}$ системы (2.8) является устойчивым по Лапунку, но не асимптотически.

Доказательство. Уточним зависимость матрицанта

$$Z(t, 0) = Y(t)Y^{-1}(0)$$

от переменной $t \geq 0$ в рассматриваемом случае. Для всех элементов $Y_{ij}(t)$ фундаментальной матрицы, отвечающих собственным значениям с отрицательной вещественной частью, аналогично теореме 2.2.1, справедлива оценка

$$|Y_{ij}(t)| \leq C_{ij} \exp\{\alpha t\}, \quad \forall t \geq 0,$$

где C_{ij} – постоянные, $\alpha < 0$. Следовательно,

$$|Y_{ij}(t)| \leq C_{ij}, \quad \forall t \geq 0.$$

По условию теоремы, элементы $Y_{ik}(t)$ фундаментальной матрицы, отвечающие собственным значениям $\lambda = i\omega$ с нулевой вещественной частью, являются компонентами вектор-функций из фундаментальной системы решенй вида

$$\bar{y}(t) = \bar{h}_i \exp\{i\omega t\},$$

где $\bar{h}_i = (h_{i1}, \dots, h_{in})^T$ – собственный вектор (присоединенный вектор для таких собственных значений отсутствуют). Очевидно, что и в этом случае элементы фундаментальной матрицы также ограничены:

$$|Y_{ik}(t)| = |h_{ik}| \cdot |\exp\{i\omega t\}| \leq C_{ik}, \quad \forall t \geq 0.$$

Таким образом, все элементы фундаментальной матрицы $Y(t)$ ограничены. Умножив $Y(t)$ на постоянную матрицу $Y^{-1}(0)$ оставляем коэффициенты произведения матриц ограниченными. Следовательно,

$$|Z_{ij}(t, 0)| \leq C_{ij}, \quad \forall t \geq 0.$$

Тогда из представления решения (2.9) в силу леммы 2.2.1 с матрицей $B(t) = Z(t, 0)$, функцией $b(t) = C = \max_{i, j=1, \dots, n} C_{ij}$ и $\bar{x}(t) = \bar{y}_0$ имеет место оценка

$$\|\bar{y}(t)\| \leq nC\|\bar{y}_0\|.$$

Из этой оценки следует устойчивость нулевого решения.

Докажем отсутствие асимптотической устойчивости. Пусть $\bar{h} \in \mathbb{C}^n$ – какой-либо собственный вектор, соответствующий собственному значению $\lambda = i\omega$, $q > 0$. Без ограничения общности можем считать, что $\|\bar{h}\| = 1$. Вектор-функция

$$\bar{y}(t) = 0.5\delta_0 \operatorname{Re} \bar{h} \exp\{iq t\}, \quad \delta_0 > 0,$$

является решением системы (2.8) как вещественная часть комплексного решения $\bar{h} \exp\{iq t\}$. В начальный момент $t = 0$ имеем

$$\bar{y}(0) = 0.5\delta_0 \operatorname{Re} \bar{h}, \quad \|\bar{y}(0)\| \leq 0.5\delta_0 \|\bar{h}\| = 0.5\delta_0.$$

Для любого $\delta_0 > 0$ из δ_0 -окрестности нулевого решения стартует построенное выше решение $\bar{y}(t)$, но $\bar{y}(t) \not\rightarrow \bar{\theta}$ при $t \rightarrow +\infty$, поскольку, например, $\bar{y}(t_k) = 0.5\delta_0 \operatorname{Re} \bar{h} \neq \bar{\theta}$ при $t_k = 2\pi k/q$, $k \in \mathbb{N}$. Более простой случай $q = 0$ рассматривается аналогично. $\square$

2.2.4. Теорема об неустойчивости нулевого решения линейной системы с постоянными коэффициентами

Теорема 2.2.3. Пусть выполнено хотя бы одно из условий:

- матрица A имеет собственное значение с положительной вещественной частью;
- матрица A имеет собственное значение λ_n такое, что

$$\operatorname{Re} \lambda_n = 0,$$

причем размерность собственного подпространства, отвечающего λ_n , меньше кратности этого собственного значения.

Тогда нулевое решение $\bar{y}(t; \bar{\theta}) = \bar{\theta}$ неустойчиво по Лапунку.

Доказательство. Пусть τ матрица A иметса собственное значение $\lambda = p + iq$, где $p > 0$, $q > 0$. Обозначим через $\bar{h} = \bar{h}_R + i\bar{h}_I$ соответствующий собственный вектор, где $\bar{h}_R, \bar{h}_I$ – линейно независимые векторы из $\mathbb{R}^n$. Без ограничения общности можем считать, что $\|\bar{h}\| = 1$. Вектор-функция

$$\begin{aligned} \bar{y}(t) &= 0.5\delta \operatorname{Re} \bar{h} \exp\{(p + iq)t\} = \\ &= 0.5\delta \exp\{pt\} [\bar{h}_R \cos qt - \bar{h}_I \sin qt], \quad \delta > 0, \end{aligned} \quad (2.10)$$

является решение системы (2.8) как вещественная часть комплексного решения $\bar{h} \exp\{(p + iq)t\}$. В начальный момент $t = 0$ имеем

$$\bar{y}(0) = 0.5\delta \bar{h}_R, \quad \|\bar{y}(0)\| \leq 0.5\delta \|\bar{h}\| = 0.5\delta.$$

Для любого $\delta > 0$ из δ -окрестности нулевого решения стартует построенное в (2.10) решение $\bar{y}(t)$, для которого при $t = t_k = 2\pi k/q$, $k \in \mathbb{N}$, $k \rightarrow +\infty$ имеем

$$\bar{y}(t_k) = 0.5\delta \bar{h}_R \exp\{2\pi kp/q\}, \quad \|\bar{y}(t_k)\| = 0.5\delta \|\bar{h}_R\| \exp\{2\pi kp/q\} \rightarrow +\infty.$$

Более простой случай $q = 0$ рассматривается аналогично. Если у матрицы A имеется собственное значение $\lambda = iq$, $q > 0$, кратность которого превосходит размерность собственного подпространства, то для любого $\delta > 0$ существует решение системы (2.8) вида

$$\begin{aligned} \bar{y}(t) &= 0.5\delta \operatorname{Re} (\bar{g} + i\bar{h}) \exp\{iq t\} = \\ &= 0.5\delta (\bar{g}_R + i\bar{h}_R) \cos qt - (\bar{g}_I + i\bar{h}_I) \sin qt, \quad \delta > 0, \\ \bar{y}(0) &= 0.5\delta \bar{h}_R, \quad \|\bar{y}(0)\| \leq 0.5\delta, \end{aligned}$$

где $\bar{h} = \bar{h}_R + i\bar{h}_I$ – собственный вектор, $\bar{g} = \bar{g}_R + i\bar{g}_I$ – присоединенный вектор, $\|\bar{g}\| = 1$. Построенное решение $\bar{y}(t)$ стартует при $t = 0$ из δ -окрестности нулевого решения, а при $t = t_k = 2\pi k/q$, $k \in \mathbb{N}$, $k \rightarrow +\infty$ имеем:

$$\bar{y}(t_k) = 0.5\delta (\bar{g}_R + t_k \bar{h}_R), \quad \|\bar{y}(t_k)\| \sim k \|\bar{h}_R\| \rightarrow +\infty.$$

Более простой случай $q = 0$ рассматривается аналогично. $\square$

2.3. Исследование на устойчивость по первому приближению (первый метод Лапунова)

Рассмотрим автономную систему

$$\frac{d\bar{y}(t)}{dt} = \bar{f}(\bar{y}(t)), \quad (2.11)$$

где $\bar{f}(\bar{y}) = (f_1(\bar{y}), f_2(\bar{y}), \dots, f_n(\bar{y}))^T$. Предполагается, что

$$\bar{f}(\bar{\theta}) = \bar{\theta}.$$

Тогда система (2.11) имеет нулевое решение $\bar{y}(t) = \bar{\theta}$. Это решение далее исследуется на устойчивость.

В данном параграфе и ниже в параграфе 2.4 будем считать, что все решения, вышедшие при $t = 0$ из некоторой окрестности нулевого решения, определены при любых $t \geq 0$. Этот факт заведомо имеет место в случае, когда компоненты $f_j(\bar{y})$ правой части (2.11) удовлетворяют условию Липшица на всем пространстве $\mathbb{R}^n$ (см. теорему ??). Возможны также и другие менее ограничительные случаи.

Пусть функции $f_j(\bar{y})$ дважды непрерывно дифференцируемы в некоторой окрестности начала координат. Тогда имеет место представление

$$\bar{f}(\bar{y}) = A\bar{y} + \bar{R}(\bar{y}), \quad (2.12)$$

где

$$A = \left(\frac{\partial f_i}{\partial y_j}(0), \dots, 0 \right), \quad i, j = 1, \dots, n, \quad \bar{R}(\bar{y}) = \bar{o}(\|\bar{y}\|).$$

Напомним, что условие $\bar{R}(\bar{y}) = \bar{o}(\|\bar{y}\|)$ означает, что

$$\forall \sigma > 0 \quad \exists \rho > 0: \|\bar{y}\| < \rho \Rightarrow \|\bar{R}(\bar{y})\| < \sigma \|\bar{y}\|. \quad (2.13)$$

Лемма 2.3.1. Пусть выполнено условие (2.12) и все собственные значения матрицы A имеют отрицательные вещественные части:

$$\operatorname{Re} \lambda_k < 0, \quad \forall k = 1, \dots, n.$$

Тогда найдется константы $\delta_0 > 0$ и $\rho_0 \geq \delta_0 > 0$ такие, что любое решение $\bar{y}(t; \bar{y}_0)$ задачи Коши

$$\frac{d\bar{y}(t)}{dt} = A\bar{y}(t) + \bar{R}(\bar{y}(t)), \quad \bar{y}(0) = \bar{y}_0, \quad (2.14)$$

где $\|\bar{y}_0\| < \delta_0$, удовлетворяет неравенству

$$\|\bar{y}(t; \bar{y}_0)\| < \rho_0$$

для всех $t \geq 0$.

Доказательство. Сначала убедимся в том, что решение $\bar{y}(t; \bar{y}_0)$ задачи Коши (2.14) удовлетворяет векторному интегральному уравнению

$$\bar{y}(t; \bar{y}_0) = Z(t, 0)\bar{y}_0 + \int_0^t Z(t, \tau) \bar{R}(\bar{y}(\tau; \bar{y}_0)) d\tau. \quad (2.15)$$

Действительно, обозначая

$$\bar{F}(t) = \bar{R}(\bar{y}(t; \bar{y}_0)), \quad (2.16)$$

мы видим, что $\bar{y}(t; \bar{y}_0)$ является решением задачи Коши для линейной неоднородной системы с правой частью $\bar{F}(t)$

$$\frac{d\bar{y}(t)}{dt} = A\bar{y}(t) + \bar{F}(t), \quad \bar{y}(0) = \bar{y}_0.$$

По формуле (??), установленной в следствии ?? к теореме ??, решение этой задачи Коши имеет вид

$$\bar{y}(t) = Z(t, 0)\bar{y}_0 + \int_0^t Z(t, \tau) \bar{F}(\tau) d\tau.$$

Учитывая формулу (2.16), приходим к (2.15).

Оценим слагаемые в правой части (2.15). В силу лемм 2.2.1, 2.2.3 аналогично доказательству теоремы 2.2.1 об асимптотической устойчивости нулевого решения линейной системы заключаем, что найдутся не зависящие от $\bar{y}_0$ константы $\alpha < 0$ и $M_1 > 0$ такие, что справедливо неравенство

$$\|Z(t, 0)\bar{y}_0\| \leq M_1 \exp\{\alpha t\}\|\bar{y}_0\|.$$

Аналогично оценивается подынтегральное выражение в (2.15):

$$\|Z(t, \tau) \bar{R}(\bar{y}(\tau; \bar{y}_0))\| \leq M_2 \exp\{\alpha(t - \tau)\} \|\bar{R}(\bar{y}(\tau; \bar{y}_0))\|.$$

Применяя лемму 2.2.2 для оценки нормы интеграла от вектор-функции, приходим к неравенству

$$\|\bar{y}(t; \bar{y}_0)\| \leq M \exp\{\alpha t\}\|\bar{y}_0\| + M \int_0^t \exp\{\alpha(t - \tau)\} \|\bar{R}(\bar{y}(\tau; \bar{y}_0))\| d\tau, \quad (2.17)$$




Рис. 2.4. К доказательству теоремы 2.4.1.

то в силу (2.21) получаем (см. рис. 2.4)

$$V(\bar{y}(t_1)) \geq \varepsilon_2.$$

Принимая во внимание неравенство (2.23), имеем

$$V(\bar{y}(t_1)) - V(\bar{y}(0)) \geq \varepsilon_2 - \frac{\varepsilon_2}{2} = \frac{\varepsilon_2}{2} > 0. \quad (2.24)$$

С другой стороны, в силу (2.20)

$$\frac{dV(\bar{y}(t))}{dt} = \sum_{j=1}^n \frac{\partial V(\bar{y}(t))}{\partial y_j} \frac{dy_j(t)}{dt} = \sum_{j=1}^n \frac{\partial V(\bar{y}(t))}{\partial y_j} f_j(t, \bar{y}(t)) \leq 0, \quad t \in [0, t_1].$$

Следовательно, функция $V(\bar{y}(t))$ не возрастает на отрезке $[0, t_1]$, что противоречит (2.24).

Таким образом, по произвольному $\varepsilon_1 > 0$ найдено $\delta = \delta(\varepsilon_1)$ такое, что из неравенства $\|\bar{y}_0\| < \delta$ вытекает оценка $\|\bar{y}(t); \bar{y}_0\| < \varepsilon_1$ для всех $t \geq 0$, означающая устойчивость нулевого решения. $\square$

Пример 2.4.3. Исследовать устойчивость решения (0, 0) системы

$$\begin{cases} dy_1/dt = -y_1 y_2^2, \\ dy_2/dt = y_1^2 y_2. \end{cases}$$

Имеем $f_1(y_1, y_2) = -y_1 y_2^2$, $f_2(y_1, y_2) = y_1^2 y_2$.

$$A = \left(\frac{\partial f_i(0,0)}{\partial y_j} \right) = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Первый метод Ляпунова неприменим, так как матрица A имеет собственные значения $\lambda_1 = \lambda_2 = 0$.

Положительная определенная функция $V(y_1, y_2) = y_1^2 + y_2^2$ является функцией Ляпунова рассматриваемой системы, поскольку

$$\frac{\partial V(y_1, y_2)}{\partial y_1} f_1(y_1, y_2) + \frac{\partial V(y_1, y_2)}{\partial y_2} f_2(y_1, y_2) = 4y_1^3(-y_1 y_2^2) + 4y_2^3(y_1^2 y_2) = 0.$$

Следовательно, упомянутое решение (0, 0) системы (2.20). Согласно теореме 2.4.1 нулевое решение устойчиво по Ляпунову.

2.4.4. Теорема об асимптотической устойчивости

Теорема 2.4.2. Пусть на множестве Ω существует функция Ляпунова $V(\bar{y})$ системы (2.19), удовлетворяющая неравенству

$$\sum_{j=1}^n \frac{\partial V(\bar{y})}{\partial y_j} f_j(t, \bar{y}) \leq -W(\bar{y}), \quad \forall \bar{y} \in \Omega, \quad t \geq 0, \quad (2.25)$$

где $W(\bar{y})$ — некоторая непрерывная положительно определенная на Ω функция.

Тогда нулевое решение $\bar{y}(t; \bar{y}_0) = \bar{\theta}$ системы (2.19) является асимптотически устойчивым.

Доказательство. Устойчивость по Ляпунову нулевого решения следует из теоремы 2.4.1. Остается доказать, что для решения $\bar{y}(t) = \bar{y}(t; \bar{y}_0)$ задачи Коши (2.19) выполняется

$$\bar{y}(t) \rightarrow \bar{\theta} \quad \text{при} \quad t \rightarrow +\infty,$$

если только $\bar{y}_0$ находится в некоторой окрестности нулевого решения.

Из доказательства теоремы 2.4.1 вытекает ограниченность траектории $\bar{y}(t)$, поскольку она принадлежит ε_1 -окрестности нулевого решения. Поэтому и функция $V(\bar{y}(t))$, являясь скалярной функцией аргумента $\bar{y}$, ограничена снизу и не возрастает благодаря неравенству

$$\frac{dV(\bar{y}(t))}{dt} = \sum_{j=1}^n \frac{\partial V(\bar{y}(t))}{\partial y_j} f_j(t, \bar{y}(t)) \leq -W(\bar{y}(t)) \leq 0,$$

которое следует из (2.25). Тогда существует предел

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} V(\bar{y}(t)) = \alpha \geq 0.$$

Убедимся, что $\alpha = 0$. Действительно, если $\alpha > 0$, то в силу невозрастания $V(\bar{y}(t))$ из неравенства $V(\bar{y}(t)) \geq \alpha$ согласно л. 2 леммы 2.4.1 вытекает равенство $V(\bar{y}(t)) \equiv \alpha_3 > 0$ для всех $t \geq 0$, где $\alpha_3 = \varepsilon_3(\alpha)$. Применяя лемму 2.4.1 к [1] для положительно определенной функции $V(\bar{y})$, убеждаемся в справедливости неравенства $V(\bar{y}(t)) \geq \beta$ для всех $t \geq 0$, где $\beta = \beta(\alpha_3) > 0$. Тогда при $t \rightarrow +\infty$ в силу (2.25) и формулы конечных приращений Лягранжа имеем

$$V(\bar{y}(t)) - V(\bar{y}(0)) = \frac{dV(\bar{y}(t))}{dt} t \leq -W(\bar{y}(t)) \leq -\beta t \rightarrow -\infty,$$

что противоречит положительной определенности $V(\bar{y})$. Таким образом $V(\bar{y}(t)) \rightarrow \alpha = 0$ и, в силу следствия из леммы 2.4.1, окончательно убеждаемся, что $\bar{y}(t) \rightarrow \bar{\theta}$ при $t \rightarrow +\infty$. $\square$

Пример 2.4.4. Исследовать устойчивость решения (0, 0) системы

$$\begin{cases} dy_1/dt = -y_2 - y_1^2, \\ dy_2/dt = y_1 - y_2^2. \end{cases}$$

Имеем $f_1(y_1, y_2) = -y_2 - y_1^2$, $f_2(y_1, y_2) = y_1 - y_2^2$.

Первый метод Ляпунова неприменим, так как матрица A имеет собственные значения $\lambda_{1,2} = \pm i$. Для $V(y_1, y_2) = (y_1^2 + y_2^2)/2$ имеем

$$\frac{\partial V(y_1, y_2)}{\partial y_1} f_1(y_1, y_2) + \frac{\partial V(y_1, y_2)}{\partial y_2} f_2(y_1, y_2) = y_1 \cdot (-y_2 - y_1^2) + y_2 \cdot (y_1 - y_2^2) = -(y_1^2 + y_2^2) = -y(y_1^2 + y_2^2).$$

Следовательно, функция $V(y_1, y_2)$ является функцией Ляпунова, которая удовлетворяет условию (2.25) с непрерывной положительно определенной функцией $W(y_1, y_2) = y_1^2 + y_2^2$. Поэтому, согласно теореме 2.4.2, нулевое решение асимптотически устойчиво по Ляпунову.

2.4.5. Теорема Четаева о неустойчивости

Теорема 2.4.3. Пусть в некотором шаре $\Omega_\varepsilon = \{\bar{y} \in \mathbb{R}^n : \|\bar{y}\| \leq \varepsilon\}$ радиуса $\varepsilon > 0$ найдется область $D \subset \Omega_\varepsilon$ с границей $\Gamma_0 \cup \Gamma_\varepsilon$, $\bar{\theta} \in \Gamma_0$, $\|\bar{y}\| = \varepsilon$ при $\bar{y} \in \Gamma_\varepsilon$. Пусть на замыкании $D \cup \Gamma_0 \cup \Gamma_\varepsilon$ этой области определена непрерывно дифференцируемая функция $U(\bar{y})$, обладающая свойствами:

1. $U(\bar{y}) = 0$ на $\bar{y} \in \Gamma_0$, $U(\bar{y}) > 0$ на $\bar{y} \in D$;

2. для любого $\alpha > 0$ найдется $\beta = \beta(\alpha) > 0$ такое, что из условий $\bar{y} \in D$ и $U(\bar{y}) \geq \alpha$ вытекает неравенство

$$\sum_{j=1}^n \frac{\partial U(\bar{y})}{\partial y_j} f_j(t, \bar{y}) \geq \beta, \quad t \geq 0.$$

Тогда нулевое решение $\bar{y}(t; \bar{\theta}) = \bar{\theta}$ задачи (2.19) неустойчиво по Ляпунову.

Доказательство. Предположим противное, то есть нулевое решение устойчиво по Ляпунову. Согласно определению устойчивости по Ляпунову для взятого из условия теоремы $\varepsilon > 0$ существует $\delta > 0$ такое, что для любого решения $\bar{y}(t) = \bar{y}(t; \bar{y}_0)$ задачи Коши (2.19), для которого при $t = 0$ выполняется неравенство $\|\bar{y}_0\| < \delta$, для всех $t \geq 0$ справедливо неравенство $\|\bar{y}(t)\| < \varepsilon$, то есть

$$\bar{y}(t) \in \Omega_\varepsilon. \quad (2.26)$$

Так как $\bar{\theta} \in \Gamma_0$, то можем выбрать $\bar{y}_0 \in D$, и тогда $U(\bar{y}_0) = u_0 > 0$. Рассмотрим скалярную функцию $U(\bar{y}(t))$. Имеем

$$\frac{dU(\bar{y}(t))}{dt} = \sum_{j=1}^n \frac{\partial U(\bar{y}(t))}{\partial y_j} f_j(t, \bar{y}(t)). \quad (2.27)$$

Поэтому при $t = 0$ справедливо неравенство $\frac{dU(\bar{y}_0)}{dt} > 0$.




Рис. 2.5. К доказательству теоремы Четаева.

Пока стартовавшая при $t = 0$ из области D траектория $\bar{y}(t)$ остается в этой области ($\bar{y}(t) \in D$), справедливо неравенство

$$\frac{dU(\bar{y}(t))}{dt} > 0.$$

Тогда функция $U(\bar{y}(t))$ возрастает и, следовательно,

$$U(\bar{y}(t)) > U(\bar{y}_0) = u_0 > 0. \quad (2.28)$$

Рассматриваемая траектория не может выйти из области D ни через границу Γ_0 (в силу условия $U|_{\Gamma_0} = 0$), ни через границу Γ_ε (в силу (2.26)). Поэтому

$$\bar{y}(t) \in D, \quad t \geq 0, \quad (2.29)$$

и неравенство (2.28) выполнено для всех $t > 0$. Тогда в силу непрерывности функции $U(\bar{y}(t))$ траектория не может выйти за пределы замкнутого ограниченного множества D_0 (см. рис. 2.5), где

$$D_0 = \{\bar{y} \in D \cup \Gamma_0 \cup \Gamma_\varepsilon : U(\bar{y}) \geq u_0\}.$$

Согласно условию теоремы и в силу (2.27), (2.28) и (2.29) для $\alpha = u_0$ найдется $\beta_0 > 0$ такое, что во всех точках траектории $\bar{y}(t)$ справедливо неравенство

$$\frac{dU(\bar{y}(t))}{dt} \geq \beta_0.$$

Почленно интегрируя на отрезке $[0, t]$ и переходя к пределу при $t \rightarrow +\infty$, имеем

$$U(\bar{y}(t)) \geq U(\bar{y}_0) + \beta_0 t \rightarrow +\infty, \quad \bar{y}(t) \in D_0,$$

что противоречит ограниченности непрерывной функции $U(\bar{y})$ на замкнутом ограниченном множестве D_0 . Поэтому исходное предположение неверно. Неустойчивость по Ляпунову нулевого решения доказана. $\square$

Пример 2.4.5. Исследовать устойчивость решения (0, 0) системы

$$\begin{cases} dy_1/dt = y_1 y_2^2, \\ dy_2/dt = y_1^2 y_2. \end{cases}$$

Имеем $f_1(y_1, y_2) = y_1 y_2^2$, $f_2(y_1, y_2) = y_1^2 y_2$.

$$A = \left(\frac{\partial f_i(0,0)}{\partial y_j} \right) = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Первый метод Ляпунова неприменим, так как матрица A имеет собственные значения $\lambda_{1,2} = 0$.

Рассмотрим функцию $U(y_1, y_2) = y_1 y_2$. Пусть D — совокупность двух секторов, отсекаемых от единичного круга первой и третьей координатными четвертями, граница Γ_0 состоит из дуг окружностей $O\Gamma_1$ и $O\Gamma_2$ радиуса ε . Имеем

$$\frac{\partial U(y_1, y_2)}{\partial y_1} f_1(y_1, y_2) + \frac{\partial U(y_1, y_2)}{\partial y_2} f_2(y_1, y_2) = y_2 \cdot y_1 y_2^2 + y_1 \cdot y_1^2 y_2 = y_1 y_2 (y_1^2 + y_2^2) = y_1 y_2 (y_1^2 - y_2^2)^2 + 2(y_1 y_2)^3 \geq 2\alpha^3$$

при условии $y_1 y_2 \geq \alpha > 0$. Таким образом, выполняем условия теоремы 2.4.3 с $\beta(\alpha) = 2\alpha^3$, и нулевое решение неустойчиво по Ляпунову.

2.4.6. Устойчивость точек покоя

Точка $\bar{y}_0 \in \mathbb{R}^n$ называется точкой покоя (положением равновесия) автономной системы

$$\frac{dy_i}{dt} = \bar{f}_i(\bar{y}(t)), \quad (2.30)$$

если $\bar{f}(\bar{y}_0) = \bar{\theta}$. Таким образом, координаты точек покоя находятся из системы уравнений

$$\begin{cases} f_1(y_1, \dots, y_n) = 0, \\ \dots, f_n(y_1, \dots, y_n) = 0. \end{cases}$$

Если $\bar{y}_0$ — точка покоя, то функция $\bar{y}(t) = \bar{y}_0$ является не зависящим от переменной t решением системы (2.30). Траектория такого решения представляет собой прямую линию в пространстве $(t, y_1, \dots, y_n)$, а в фазовом пространстве переменных $(y_1, \dots, y_n)$ — одну точку. Будем называть точку покоя $\bar{y}_0$ устойчивой, асимптотически устойчивой или неустойчивой по Ляпунову, если соответствующее решение $\bar{y}(t) = \bar{y}_0$ устойчиво, асимптотически устойчиво или неустойчиво по Ляпунову.

Для исследования устойчивости точек покоя можно свести задачу переменных $\bar{y}(t) = \bar{y}(t; \bar{y}_0)$ и перейти к исследованию устойчивости нулевого решения системы

$$\frac{d\bar{y}}{dt} = \bar{F}(\bar{y}(t)), \quad \bar{F}(\bar{y}) = \bar{f}(\bar{y} + \bar{y}_0).$$

Для применения теоремы 2.3.1 вычислим элементы матрицы производных $A = (a_{ij})$:

$$a_{ij} = \frac{\partial \bar{F}_i}{\partial y_j}(0, \dots, 0) = \frac{\partial f_i}{\partial y_j}(\bar{y}_0).$$

В результате приходим к утверждению об устойчивости по первому приближению произвольной (не обязательно нулевой) точки покоя.

Теорема 2.4.4. Пусть $\bar{y}_0$ — точка покоя системы (2.30), функции $f_j(\bar{y})$ дважды непрерывно дифференцируемы в некоторой окрестности $\bar{y}_0$, $j = 1, \dots, n$.

Если все собственные значения матрицы $A = (\partial f_i(\bar{y}_0)/\partial y_j)$ имеют отрицательные вещественные части:

$$\operatorname{Re} \lambda_k < 0, \quad \forall k = 1, \dots, n,$$

то точка покоя $\bar{y}_0$ асимптотически устойчива по Ляпунову.

Если же найдется хотя бы одно собственное значение матрицы $A = (\partial f_i(\bar{y}_0)/\partial y_j)$ с положительной вещественной частью:

$$\exists \lambda \in \{\lambda_1, \dots, \lambda_n\} : \operatorname{Re} \lambda > 0,$$

то точка покоя $\bar{y}_0$ неустойчива по Ляпунову.

2.5. Классификация точек покоя

Доказанные выше теоремы 2.2.1–2.2.3 позволяют исследовать на устойчивости точки покоя линейной системы с постоянными коэффициентами и ответить на вопрос, что происходит со стартовавшей из окрестности точки покоя траекторией: остается ли она в этой окрестности при $t \rightarrow +\infty$, либо покидает ее за конечное время. Вместе с тем часто бывает необходимо уточнить характерный вид траекторий в окрестности точки покоя, но возможности, име в. В данном параграфе мы приведем классификацию точек покоя линейной системы на плоскости ($n = 2$).

2.5.1. Классификация точек покоя линейной системы

Рассмотрим линейную систему с постоянными вещественными коэффициентами относительно вектор-функции $\bar{y}(t) = (y_1(t), y_2(t))^T$

$$\frac{d\bar{y}}{dt} = A\bar{y}, \quad A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}. \quad (2.31)$$

Нас будут интересовать фазовые (то есть в плоскости (y_1, y_2)) траектории системы (2.31). Заметим, что фазовые траектории этой системы являются интервалами кривых обыкновенного дифференциального уравнения, полученного после исключения переменной t из (2.31)

$$\frac{dy_1}{dy_2} = \frac{a_{11}y_1 + a_{12}y_2}{a_{21}y_1 + a_{22}y_2}. \quad (2.32)$$

Точка покоя (0, 0) является особым для уравнения (2.32), поскольку в ней нарушены условия существования решения и единственности решения задачи Коши. Поэтому через точку (0, 0) может проходить как несколько фазовых кривых, так и ни одной. Таким образом, точка покоя (0, 0) исходной системы (2.31) является особым точкой уравнения (2.32) в фазовых переменных.

Классификацию точек покоя будем проводить в зависимости от собственных значений и собственных векторов матрицы A . В рассматриваемом случае $n = 2$ имеется два собственных значения λ_1 , λ_2 . Если $\lambda_1 \neq \lambda_2$, то соответствующие собственные векторы

$$\bar{h}_1 = \begin{pmatrix} h_{11} \\ h_{21} \end{pmatrix}, \quad \bar{h}_2 = \begin{pmatrix} h_{12} \\ h_{22} \end{pmatrix}$$




Рис. 2.6. Узел: а – устойчивый, б – неустойчивый.

линейно независимы и составляют базис в $\mathbb{C}^2$. Если $\lambda_1 = \lambda_2$, то возможно существование как двух, так и одного линейно независимого собственного вектора; в последнем случае существует один присоединенный вектор, линейно независимый с собственным. Рассмотрим типичные случаи в случае невырожденной матрицы A ($\det A \neq 0$).

2.5.2. Узел ($\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}$, $\lambda_1 \neq \lambda_2$, $\lambda_1 \cdot \lambda_2 > 0$)

Общее решение системы (2.31) имеет вид

$$\bar{y}(t) = \begin{pmatrix} y_1(t) \\ y_2(t) \end{pmatrix} = C_1 \begin{pmatrix} h_{11} \\ h_{21} \end{pmatrix} \exp\{\lambda_1 t\} + C_2 \begin{pmatrix} h_{12} \\ h_{22} \end{pmatrix} \exp\{\lambda_2 t\},$$

$$\forall C_1, C_2 \in \mathbb{R}. \quad (2.33)$$

Рассмотрим сначала случай, когда собственные значения отрицательны: $\lambda_2 < \lambda_1 < 0$. Тогда нулевая точка покоя асимптотически устойчива по Ляпунову и называется устойчивым узлом. Фазовые кривые при $t \rightarrow +\infty$ стремятся к устойчивому узлу: $\bar{y}(t) \rightarrow \bar{\theta}$. Выясним, по какому направлению фазовые траектории входят в узел. Для этого вычислим производную

$$\frac{dy_1}{dy_2} = \frac{C_1 h_{11} \lambda_1 e^{\lambda_1 t} + C_2 h_{12} \lambda_2 e^{\lambda_2 t}}{C_1 h_{21} \lambda_1 e^{\lambda_1 t} + C_2 h_{22} \lambda_2 e^{\lambda_2 t}} = \frac{C_1 h_{11} \lambda_1 + C_2 h_{12} \lambda_2 e^{(\lambda_2 - \lambda_1)t}}{C_1 h_{21} \lambda_1 + C_2 h_{22} \lambda_2 e^{(\lambda_2 - \lambda_1)t}}. \quad (2.34)$$

Так как $\lambda_2 - \lambda_1 < 0$, то при $C_1 \neq 0$ имеем $\frac{dy_1}{dy_2} \rightarrow \frac{h_{11}}{h_{21}}$ при $t \rightarrow +\infty$, то есть касательный вектор фазовой траектории в пределе коллинеарен собственному вектору $\bar{h}_1$. Если же $C_1 = 0$, то

$$\bar{y}(t) = C_2 \begin{pmatrix} h_{12} \\ h_{22} \end{pmatrix} e^{\lambda_2 t}.$$

Значит, фазовая траектория лежит на прямой, задаваемой собственным вектором $\bar{h}_2$, и приближается к точке покоя при $t \rightarrow +\infty$.

Выясним направление фазовых траекторий при $t \rightarrow -\infty$. В этом случае фазовые траектории, отличные от точки покоя, стремятся к бесконечно удаленной точке. В силу (2.33) при $C_2 \neq 0$ имеем

$$\frac{dy_1}{dy_2} = \frac{C_1 h_{11} \lambda_1 e^{(\lambda_1 - \lambda_2)t} + C_2 h_{12} \lambda_2}{C_1 h_{21} \lambda_1 e^{(\lambda_1 - \lambda_2)t} + C_2 h_{22} \lambda_2} \rightarrow \frac{h_{12}}{h_{22}} \quad t \rightarrow -\infty, \quad (\lambda_1 - \lambda_2 > 0),$$

то есть траектории в окрестности бесконечно удаленной точки стремятся параллельно вектору $\bar{h}_2$. Если же $C_2 = 0$, то

$$\bar{y}(t) = C_1 \begin{pmatrix} h_{11} \\ h_{21} \end{pmatrix} e^{\lambda_1 t},$$

и фазовая траектория лежит на прямой, задаваемой собственным вектором $\bar{h}_1$. Проведенные выкладки иллюстрируются на рис. 2.6, изображены фазовые траектории в случае устойчивого узла, стрелки на траекториях указывают направление движения при увеличении t .

Для положительных собственных значений $0 < \lambda_1 < \lambda_2$ точка покоя называется неустойчивым узлом, расположение и вид траекторий остается тем же, что и для отрицательных собственных значений, но направление движения по траекториям меняется на противоположное.

Полнеем теперь следующее правило узла: фазовые траектории входят в узел, касаясь собственного вектора с наименьшим по модулю собственным значением.

2.5.3. Дикриктический узел

$$(\lambda_1 = \lambda_2 \neq 0, \dim \ker(A - \lambda_1 E) = 2)$$

имеет ровно n попарно различных собственных значений с ненулевой вещественной частью. Устойчивость по Ляпунову грубой точки всегда однозначно определяется с помощью первого метода Ляпунова согласно теореме 2.4.4. Оказывается, что и качественное поведение фазовых траекторий системы (2.35) достаточно полно описывается с помощью линейной системы

$$\frac{d\vec{y}(t)}{dt} = A\vec{y}(t) \quad (2.37)$$

в малой окрестности каждой грубой точки покоя.

На плоскости ($n = 2$) грубой точкой покоя соответствует линейная система вида (2.37), имеющая нулевым точкой покоя только одного из следующих типов узлов, седло или фокус. Будем называть грубой точкой покоя нелинейной системы узлом, седлом или фокусом, если этот тип имеет нулевой точкой покоя соответствующий линейной системы (2.37) с матрицей (2.36).

Пример 2.5.1. *Определять тип точек покоя системы*

$$\begin{cases} dy_1/dt = y_1 - 1, \\ dy_2/dt = y_1 - y_2^2. \end{cases}$$

Точки покоя определяются из алгебраической системы

$$\begin{cases} y_1 - 1 = 0, \\ y_1^2 - y_2^2 = 0, \end{cases}$$

имеющей два решения: $(1, \pm 1)^T$. Так как для данной системы

$$f_1(y_1, y_2) = y_1^2 - y_2^2, \quad f_2(y_1, y_2) = y_1^2 - y_2^2,$$

то

$$\frac{\partial f_1}{\partial y_1} = 1, \quad \frac{\partial f_1}{\partial y_2} = 0, \quad \frac{\partial f_2}{\partial y_1} = 2y_1, \quad \frac{\partial f_2}{\partial y_2} = -2y_2.$$

Для точки покоя $(1, 1)^T$ матрица $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}$ имеет собственные значения $\lambda_1 = 1$, $\lambda_2 = -2$. Тогда $(1, 1)^T$ – седло.

Для точки покоя $(1, -1)^T$ матрица $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ имеет собственные значения $\lambda_1 = 1$, $\lambda_2 = 2$. Тогда $(1, -1)^T$ – неустойчивый узел.

Глава 3

Краевые задачи для дифференциального уравнения второго порядка

3.1. Постановка краевых задач

В предыдущих параграфах много внимания было уделено исследованию задачи Коши для обыкновенных дифференциальных уравнений. В задаче Коши для уравнения n -го порядка, разрешенного относительно старшей производной, в качестве дополнительных условий для выделения единственного решения задаются значения функций и ее производных до $(n - 1)$ -го порядка в некоторой точке. Возможны и другие постановки задач, в которых дополнительные условия задаются при двух значениях независимой переменной. Приведем два примера.

Рассмотрим движение материальной точки единичной массы вдоль прямой l . Движение определяется известной силой F , зависящей от времени t , положения точки $y(t)$ и ее скорости $y'(t)$. В соответствии с законам Ньютона, получим дифференциальное уравнение второго порядка для неизвестной функции $y(t)$

$$y''(t) = F(t, y(t), y'(t)), \quad t_0 \leq t \leq t_1. \quad (3.1)$$

Если мы знаем положение точки в начальный момент времени и конечный момент времени, то

$$y(t_0) = y_0, \quad y(t_1) = y_1. \quad (3.2)$$

Таким образом, нам нужно решить следующую задачу: найти функцию $y(t)$, удовлетворяющую обыкновенному дифференциальному уравнению (3.1) и краевым условиям (3.2).

Другим примером краевой задачи может служить задача, описывающая распределение температуры $u(x)$ в тонком стержне

$$\frac{d}{dx} \left(k(x) \frac{du}{dx} \right) - q(x)u = -f(x), \quad 0 \leq x \leq l, \quad (3.3)$$

$$u(0) = u_0, \quad u'(l) = 0. \quad (3.4)$$

Краевое условие $u(0) = u_0$ соответствует тому, что на левом конце стержня известна температура, а краевое условие $u'(l) = 0$ означает, что правый конец стержня теплоизолирован. Функции $k(x)$, $q(x)$ и $f(x)$ заданы. Нужно найти распределение температуры в стержне $u(x)$, то есть решить краевую задачу (3.3)–(3.4).

В общем случае, краевой задачей для дифференциального уравнения n -го порядка, разрешенного относительно старшей производной, рассматриваемого на отрезке $[0, l]$, называется задача, в которой значения неизвестной функции $y(x)$, ее производных или их линейная комбинация задаются как в точке $x = 0$, так и в точке $x = l$.

Мы ограничимся исследованием краевых задач для линейной дифференциальной уравнения второго порядка. Выходя за пределы отрезка $[0, l]$, называется задачей, в которой решение не всегда существует, а если существует, то может быть неединственно. Действительно, рассмотрим уравнение

$$y''(x) + y(x) = 0, \quad 0 \leq x \leq \pi \quad (3.5)$$

с краевыми условиями

$$y(0) = 0, \quad y(\pi) = y_1. \quad (3.6)$$

Общее решение уравнения (3.5) имеет вид $c_1 \sin x + c_2 \cos x$. Из краевых условия $y(0) = 0$ получим, что $y(x) = c_1 \sin x$. Если $y_1 \neq 0$, то решение задачи (3.5)–(3.6) не существует. Если же $y_1 = 0$, то решением задачи (3.5)–(3.6) является функция $y(x) = c_1 \sin x$, где c_1 – произвольная постоянная, то есть решение краевой задачи неединственно. Отметим, что решение задачи Коши для уравнения (3.5) с начальными условиями $y(x_0) = y_0$, $y'(x_0) = y_1$ существует и единственно при любых фиксированных y_0 , y_1 и $x_0 \in [0, \pi]$.

3.1.1. Преобразование уравнения

Рассмотрим краевую задачу для линейного обыкновенного дифференциального уравнения второго порядка

$$a_0(x)y''(x) + a_1(x)y'(x) + a_2(x)y(x) = f_1(x), \quad 0 \leq x \leq l, \quad (3.7)$$

$$\alpha_1 y'(0) + \beta_1 y(0) = u_0, \quad \alpha_2 y'(l) + \beta_2 y(l) = u_1, \quad (3.8)$$

где функции $a_0(x)$, $i = 0, 1, 2$, $f_1(x)$ и постоянные $\alpha_1, \beta_1, \alpha_2, \beta_2$ заданы. Требуется найти функцию $y(x) \in C^2[0, l]$, удовлетворяющую (3.7)–(3.8). Далее предполагаем, что функции $a_0(x)$, $i = 0, 1, 2$, $f_1(x)$ непрерывны на отрезке, $a_0(x) \neq 0$, а постоянные $\alpha_1, \beta_1, \alpha_2, \beta_2$ таковы, что $\alpha_i^2 + \beta_i^2 > 0$, $i = 1, 2$.

Преобразуем уравнение (3.7). Сначала почленно разделим его на $a_0(x)$, а затем умножим на $p(x) = \exp \left(\int_0^x \frac{a_1(s)}{a_0(s)} ds \right)$. Выделяя полную производную, получаем

$$\frac{d}{dx} \left(p(x) \frac{dy}{dx} \right) - q(x)y = f_2(x), \quad 0 \leq x \leq l, \quad (3.9)$$

где $p(x)$ – непрерывно дифференцируема на $[0, l]$, $p(x) > 0$, а функции

$$q(x) = -\frac{p(x)a_2(x)}{a_0(x)}, \quad f_2(x) = \frac{p(x)f_1(x)}{a_0(x)}$$

являются непрерывными на $[0, l]$.

3.1.2. Редукция к однородным краевым условиям

Рассмотрим краевые условия (3.8). Если $u_0 = u_1 = 0$, то краевые условия называются однородными, в противном случае – неоднородными. Покажем, что задачу (3.9)–(3.8) можно свести к задаче с однородными краевыми условиями. Пусть $y(x)$ – решение задачи (3.9)–(3.8). Рассмотрим функцию $z(x) = y(x) - v(x)$, где $v(x)$ – известная дважды непрерывно дифференцируемая функция, удовлетворяющая краевым условиям (3.8). Исходя из (3.9)–(3.8) получим $z(x) = z(x) + v(x)$, получим для функции $z(x)$ краевую задачу с однородными краевыми условиями

$$\frac{d}{dx} \left(p(x) \frac{dz}{dx} \right) - q(x)z = f(x), \quad 0 \leq x \leq l,$$

$$\alpha_1 z'(0) + \beta_1 z(0) = 0, \quad \alpha_2 z'(l) + \beta_2 z(l) = 0,$$

где

$$f(x) = f_2(x) - \frac{d}{dx} \left(p(x) \frac{dv}{dx} \right) + q(x)v.$$

Функцию $v(x)$, удовлетворяющую неоднородным краевым условиям (3.8), можно выбрать различным способом, одним из самых простых является ее поиск в виде многочлена.

Мы покажем, что краевую задачу можно свести к краевой задаче с однородными краевыми условиями

$$\frac{d}{dx} \left(p(x) \frac{dy}{dx} \right) - q(x)y = f(x), \quad 0 \leq x \leq l, \quad (3.10)$$

$$\alpha_1 y'(0) + \beta_1 y(0) = 0, \quad \alpha_2 y'(l) + \beta_2 y(l) = 0. \quad (3.11)$$

Далее эту задачу будем считать основной краевой задачей. Краевая задача (3.10)–(3.11) называется *однородной*, если $f(x) = 0$ и *неоднородной* в противном случае.

3.1.3. Тожество Лагранжа и его следствие

Выведем некоторые соотношения, которые будут нам полезны в дальнейшем. Введем дифференциальный оператор

$$Ly = \frac{d}{dx} \left(p(x) \frac{dy}{dx} \right) - q(x)y.$$

Пусть функции $y(x) \in C^2[0, l]$ и $z(x) \in C^2[0, l]$, тогда можно вычислить Ly и Lz , а также выражение

$$z(x)Ly - y(x)Lz = z(x) \left(\frac{d}{dx} \left(p(x) \frac{dy}{dx} \right) \right) - y(x) \frac{d}{dx} \left(p(x) \frac{dz}{dx} \right).$$

Так как

$$z(x) \frac{d}{dx} \left(p(x) \frac{dy}{dx} \right) - y(x) \frac{d}{dx} \left(p(x) \frac{dz}{dx} \right) = \frac{d}{dx} \left[z(x) \left(\frac{dy}{dx} - y \frac{dz}{dx} \right) \right],$$

то

$$z(x)Ly - y(x)Lz = \frac{d}{dx} \left[p(x) \left(z(x) \frac{dy}{dx} - y(x) \frac{dz}{dx} \right) \right], \quad 0 \leq x \leq l. \quad (3.12)$$

Это равенство называется тождеством Лагранжа.

Получим одно важное следствие из тождества Лагранжа. Пусть $y(x) = 0$, то есть $Ly = Lz = 0$. Записывая для функций $y_1(x), y_2(x)$ тождество Лагранжа (3.12), получим

$$\frac{d}{dx} \left[p(x) \left(y_1(x) \frac{dy_2}{dx} - y_2(x) \frac{dy_1}{dx} \right) \right] = 0, \quad 0 \leq x \leq l. \quad (3.13)$$

Следовательно, для определителя Вронского

$$W[y_1, y_2](x) = y_1(x)y_2'(x) - y_2(x)y_1'(x),$$

справедлива формула $p(x)W[y_1, y_2](x) = c$, $0 \leq x \leq l$, где c – постоянная, или

$$W[y_1, y_2](x) = \frac{c}{p(x)}, \quad 0 \leq x \leq l. \quad (3.14)$$

3.1.4. Формула Грина и ее следствие

Интегрируя тождество Лагранжа (3.12) от 0 до l , получим

$$\int_0^l (z(x)Ly - y(x)Lz) dx = p(x) (z(x)y'(x) - y(x)z'(x)) \Big|_{x=0}^{x=l} \quad (3.15)$$

Эта формула называется формулой Грина.

Покажем, что, если функции $y_1(x)$ и $y_2(x)$ удовлетворяют одним и тем же краевым условиям (3.11), то справедливо равенство

$$\int_0^l (z(x)Ly - y(x)Lz) dx = 0. \quad (3.16)$$

Действительно, из формулы Грина следует, что достаточно доказать равенство

$$p(l)(z(l)y'(l) - y(l)z'(l)) - p(0)(z(0)y'(0) - y(0)z'(0)) = 0.$$

Покажем, что

$$z(0)y'(0) - y(0)z'(0) = 0. \quad (3.17)$$

Если $\alpha_1 = 0$, то $\beta_1 \neq 0$, $y(0) = 0$, $z(0) = 0$, и (3.17) выполняется. При $\alpha_1 \neq 0$ запишем граничные условия

$$\alpha_1 y'(0) + \beta_1 y(0) = 0, \quad \alpha_1 z'(0) + \beta_1 z(0) = 0,$$

умножим первое равенство на $z(0)$, второе – на $y(0)$. Вычитая почленно полученные равенства, имеем

$$\alpha_1 z(0)y'(0) - y(0)z'(0) = 0,$$

откуда вытекает (3.17). Аналогично доказывается, что

$$z(l)y'(l) - y(l)z'(l) = 0.$$

Тем самым равенство (3.16) доказано.

3.2. Функция Грина. Существование решения краевой задачи

Рассмотрим краевую задачу

$$Ly \equiv \frac{d}{dx} \left(p(x) \frac{dy}{dx} \right) - q(x)y = f(x), \quad 0 \leq x \leq l, \quad (3.18)$$

$$\alpha_1 y'(0) + \beta_1 y(0) = 0, \quad (3.19)$$

$$\alpha_2 y'(l) + \beta_2 y(l) = 0, \quad (3.20)$$

где $p(x)$, $q(x)$, $f(x)$ – известные функции, а $\alpha_1, \beta_1, \alpha_2, \beta_2$ – известные постоянные такие, что $p(x) \in C^1[0, l]$, $p(x) > 0$, $x \in [0, l]$, $q(x)$, $f(x) \in C[0, l]$, $\alpha_i^2 + \beta_i^2 > 0$, $i = 1, 2$.

Определение 3.2.1. *Функция $y(x)$ называется решением краевой задачи (3.18)–(3.20), если $y(x) \in C^2[0, l]$ и удовлетворяет (3.18)–(3.20).*

3.2.1. Функция Грина

Введем функцию Грина, которая далее будет использоваться для решения краевой задачи (3.18)–(3.20).

Определение 3.2.2. *Функция $G(x, \xi)$ называется функцией Грина краевой задачи (3.18)–(3.20), если она определена в квадрате $[0, l] \times [0, l]$ и удовлетворяет следующим условиям:*

1) Для любого $\xi \in (0, l)$ функция $G(x, \xi)$ дважды непрерывно дифференцирума по переменной x на множестве $[0, \xi] \cup [\xi, l]$ и удовлетворяет однородному уравнению

$$\frac{d}{dx} \left(p(x) \frac{dG(x, \xi)}{dx} \right) - q(x)G(x, \xi) = 0, \quad 0 \leq x \leq l, \quad x \neq \xi.$$

2) Функция $G(x, \xi)$ удовлетворяет однородным краевым условиям по переменной x :

$$\alpha_1 G_x(x, \xi) + \beta_1 G(x, \xi) = 0, \quad \alpha_2 G_x(l, \xi) + \beta_2 G(l, \xi) = 0, \quad \forall \xi \in (0, l).$$

3) Функция $G(x, \xi)$ непрерывна в квадрате $[0, l] \times [0, l]$, а частная производная $G_x(x, \xi)$ при $x = \xi$ имеет конечные предельные значения

$$G_x(\xi + 0, \xi) = \lim_{x \rightarrow \xi + 0} G_x(x, \xi), \quad G_x(\xi - 0, \xi) = \lim_{x \rightarrow \xi - 0} G_x(x, \xi),$$

скажким соотношением

$$G_x(\xi + 0, \xi) - G_x(\xi - 0, \xi) = \frac{1}{p(\xi)}, \quad \forall \xi \in (0, l).$$

3.2.2. Существование и единственность функции Грина

Теорема 3.2.1. *Если однородная краевая задача*

$$Lv = 0, \quad \alpha_1 v'(0) + \beta_1 v(0) = 0, \quad \alpha_2 v'(l) + \beta_2 v(l) = 0 \quad (3.21)$$

имеет только нулевое решение, то функция Грина краевой задачи (3.18)–(3.20) существует и единственна.

Доказательство. Определим функцию $y_1(x)$ как решение задачи Коши

$$Ly_1 = 0, \quad 0 \leq x \leq l, \quad y_1(0) = -\alpha_1, \quad y_1'(0) = \beta_1,$$

а функцию $y_2(x)$ как решение задачи Коши

$$Ly_2 = 0, \quad 0 \leq x \leq l, \quad y_2(l) = -\alpha_2, \quad y_2'(l) = \beta_2.$$

Очевидно, что функции $y_1(x)$ удовлетворяют краевому условию (3.19), а $y_2(x)$ краевому условию (3.20):

$$\alpha_1 y_1'(0) + \beta_1 y_1(0) = 0, \quad \alpha_2 y_2'(l) + \beta_2 y_2(l) = 0. \quad (3.22)$$

Функции $y_1(x)$ и $y_2(x)$ линейно независимы, так как в противном случае однородная краевая задача имела бы ненулевое решение.

Будем искать функцию Грина в следующем виде:

$$G(x, \xi) = \begin{cases} c_1(x)y_1(x), & 0 \leq x \leq \xi, \\ c_2(y)y_2(y), & \xi \leq x \leq l, \end{cases}$$

где $c_1(\xi)$ и $c_2(\xi)$ неизвестные функции. Из этого представления следует, что функция $G(x, \xi)$ удовлетворяет условиям 1) и 2) определена функциями Грина. Выберем $c_1(\xi)$ и $c_2(\xi)$ так, чтобы выполнялось и условие 3). Из непрерывности $G(x, \xi)$ в точке $x = \xi$ следует, что

$$c_1(\xi)y_1(\xi) = c_2(\xi)y_2(\xi).$$

Из условия разрыва производной $G_x(x, \xi)$ в точке $x = \xi$ имеем

$$c_2(\xi)y_2'(\xi) - c_1(\xi)y_1'(\xi) = \frac{1}{p(\xi)}.$$

Таким образом, мы получили систему двух уравнений относительно неизвестных функций $c_1(\xi)$ и $c_2(\xi)$. Решив эту систему, найдем, что

$$c_1(\xi) = \frac{y_2(\xi)}{W(\xi)y_1(\xi)}, \quad c_2(\xi) = \frac{y_1(\xi)}{W(\xi)y_2(\xi)},$$

где $W(\xi) = y_1(\xi)y_2'(\xi) - y_2(\xi)y_1'(\xi)$ – определитель Вронского. Как следует из формулы (3.14), $W(\xi)p(\xi) = y_0$ – известная постоянная. В результате получим окончательную формулу для функции Грина

$$G(x, \xi) = \begin{cases} \frac{y_1(x)y_2(\xi)}{y_0}, & 0 \leq x \leq \xi, \\ \frac{y_1(\xi)y_2(x)}{y_0}, & \xi \leq x \leq l. \end{cases} \quad (3.23)$$

Мы доказали существование функции Грина. Докажем теперь ее единственность. Предположим, что существуют две функции Грина: $G_1(x, \xi)$ и $\tilde{G}(x, \xi)$. Пусть ξ_* – произвольная фиксированная точка из интервала $(0, l)$. Рассмотрим функцию $z(x) = G(x, \xi_*) - \tilde{G}(x, \xi_*)$. Эта функция непрерывна на отрезке $[0, l]$ и имеет на нем непрерывную производную $z'(x)$, поскольку $G_x(x, \xi_*)$ и $\tilde{G}_x(x, \xi_*)$ имеют в точке $x = \xi$ один и тот же разрыв. Записывая далее из уравнения $Lz = 0$, $x \neq \xi_*$ выражение

$$z''(x) = \frac{q(x)z(x) - p'(x)z'(x)}{p(x)},$$

убеждаемся в непрерывности второй производной при $x = \xi_*$ благодаря равенству ее предельных значений при $x \rightarrow \xi_* \pm 0$. Тогда функция $z(x)$ является решением уравнения также и при $x = \xi_*$,

$$Lz = 0, \quad 0 \leq x \leq l,$$

и удовлетворяет условиям (3.19), (3.20). По условию теоремы однородная краевая задача на отрезке $[0, l]$ имеет только тривиальное решение. Поэтому $z(x) = 0$, а значит $G(x, \xi) = \tilde{G}(x, \xi)$, и теорема 3.2.1 доказана. $\square$

Пример 3.2.1. *Построить функцию Грина для краевой задачи*

$$y''(x) + a^2 y(x) = f(x), \quad 0 \leq x \leq l,$$

$$y'(0) = 0, \quad y(l) = 0,$$

где $a = \pi n l^{-1}$, $n = 1, 2, \dots$

Возьмем $y_1(x) = \sin ax$, а $y_2(x) = \sin a(x - l)$. Очевидно, что

$$y_1'(x) + a^2 y_1(x) = 0, \quad i = 1, 2, \quad y_1(0) = y_2(l) = 0.$$

Постоянная

$$y_0 = p(x)W(x) = y_1(x)y_2'(x) - y_2(x)y_1'(x) = a \sin al.$$

Из формулы (3.23) следует, что для данной краевой задачи функция Грина равна

$$G_a(x, \xi) = \begin{cases} \frac{\sin ax \sin a(\xi - l)}{a \sin al}, & 0 \leq x \leq \xi, \\ \frac{\sin a\xi \sin a(x - l)}{a \sin al}, & \xi \leq x \leq l. \end{cases} \quad (3.24)$$

3.2.3. Нахождение решения неоднородной краевой задачи с помощью функции Грина

Докажем теорему существования и единственности решения краевой задачи (3.18

поверхности P . Тогда этот вектор ортогонален к вектору нормали $\vec{n} = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}(\vec{x}(t)), \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n}(\vec{x}(t)), -1 \right)$.

Так как $\langle \vec{\tau}, \vec{n} \rangle_{\mathbb{R}^{n+1}} = 0$, то

$$a_1(\vec{x}, u) \frac{\partial f}{\partial x_1}(\vec{x}) + \dots + a_n(\vec{x}, u) \frac{\partial f}{\partial x_n}(\vec{x}) - b(\vec{x}, u) = 0, \quad \forall (\vec{x}, u) \in \Gamma. \quad (4.19)$$

Полученное равенство показывает, что $u = f(\vec{x})$ удовлетворяет квазилинейному уравнению в частных производных (4.12) в каждой точке множества Γ . Поскольку по условию через каждую точку поверхности проходит некоторая характеристика, то (4.12) выполнено по всем точкам D_Φ .

Обратно, пусть $u = f(\vec{x})$ – решение квазилинейного уравнения в частных производных (4.12) в D_Φ . Покажем, что через любую точку $M_0(x_1^0, \dots, x_n^0, u^0) \in P$ проходит лежащая в P характеристика с начальными данными $\vec{\tau}(x_1^0, \dots, x_n^0, u^0)$. Рассмотрим задачу Коши с начальными данными $(x_1^0, \dots, x_n^0, u^0)$,

$$\begin{cases} \frac{dx_1}{dt} = a_1(\vec{x}, f(\vec{x})), & x_1(t_0) = x_1^0, \\ \vdots \\ \frac{dx_n}{dt} = a_n(\vec{x}, f(\vec{x})), & x_n(t_0) = x_n^0, \end{cases} \quad (4.20)$$

которая имеет единственное решение $\vec{x}(t) = (x_1(t), \dots, x_n(t))$. По этому решению построим кривую

$$\Gamma = \{ (x_1 = x_1(t), \dots, x_n = x_n(t), u(t) = f(x_1(t), \dots, x_n(t))) \}.$$

По построению $\Gamma \subset P$. Убедимся, что Γ – характеристика, то есть удовлетворяет системе (4.13). Перенос в уравнений этой системы выполняем в силу (4.20). Осталось проверить последнее равенство в (4.13). Учитывая то, что $x_i(t)$, $i = 1, \dots, n$, являются решениями системы (4.20), а $u = f(\vec{x})$ является решением квазилинейного уравнения (4.12), имеем

$$\frac{du}{dt} = \sum_{j=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_j}(\vec{x}(t)) \cdot \frac{dx_j}{dt} = \sum_{j=1}^n \frac{\partial f(\vec{x}(t))}{\partial x_j} a_j(\vec{x}(t), u(t)) = b(\vec{x}(t), u(t)).$$

Следовательно, кривая Γ – характеристика. Итак, показано, что через любую точку поверхности P проходит принадлежащая этой поверхности характеристика Γ . $\square$

4.2.5. Задача Коши для квазилинейного уравнения в частных производных

Рассмотрим в случае $n = 2$, который имеет наиболее наглядную геометрическую интерпретацию, квазилинейное уравнение в частных производных

$$a_1(x, y, u) \frac{\partial u}{\partial x} + a_2(x, y, u) \frac{\partial u}{\partial y} = b(x, y, u), \quad (4.22)$$

где $b(x, y, u)$, $a_j(x, y, u) \in C^1(D)$, $j = 1, 2$, D – область из $\mathbb{R}^2$,

$$a_j^2(x, y, u) + a_2^2(x, y, u) \neq 0, \quad \forall (x, y, u) \in D.$$

Задача Коши для квазилинейного уравнения в частных производных (4.22) состоит в нахождении поверхности $u = f(x, y)$, заданной решением квазилинейного уравнения в частных производных (4.22) и проходящей через заданную линию

$$\ell = \{ (x, y, u) = (\psi_1(s), \psi_2(s), \psi_3(s)), s \in [s_1, s_2] \} \subset D,$$

то есть

$$\psi_3(s) = f(\psi_1(s), \psi_2(s)), \quad \forall s \in [s_1, s_2]. \quad (4.23)$$

$$\det \begin{pmatrix} a_1(s) & \psi_1'(s) \\ a_2(s) & \psi_2'(s) \end{pmatrix} \neq 0, \quad \forall s \in [s_1, s_2], \quad (4.24)$$

где $a_j(s) = a_j(\psi_1(s), \psi_2(s), \psi_3(s))$, $j = 1, 2$.

Тогда в некоторой окрестности каждой точки линии ℓ существует единственное решение задачи Коши (4.22), (4.23).

Доказательство. Рассмотрим систему характеристик для квазилинейного уравнения в частных производных (4.22):

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = a_1(x, y, u), \\ \frac{dy}{dt} = a_2(x, y, u), \\ \frac{du}{dt} = b(x, y, u). \end{cases} \quad (4.25)$$




Рис. 4.2. К доказательству теоремы 4.2.4.

Задача Коши для системы (4.25) с начальными при $t = 0$ данными на кривой ℓ

$$x|_{t=0} = \psi_1(s), \quad y|_{t=0} = \psi_2(s), \quad u|_{t=0} = \psi_3(s) \quad (4.26)$$

имеет единственное решение

$$x = \varphi_1(t, s), \quad y = \varphi_2(t, s), \quad u = \varphi_3(t, s). \quad (4.27)$$

В силу (4.26), (4.27) имеем

$$\varphi_1(0, s) = \psi_1(s), \quad \varphi_2(0, s) = \psi_2(s), \quad \varphi_3(0, s) = \psi_3(s), \quad \forall s \in [s_1, s_2]. \quad (4.28)$$

Формула (4.27) задает параметрическое представление некоторой поверхности P . Линия ℓ лежит на этой поверхности по построению в силу (4.26) (см. рис. 4.2).

Покажем, что в окрестности каждой точки линии ℓ эта состоящая из характеристик поверхность может быть задана в виде $u = f(x, y)$, и тогда, по теореме 4.2.3, $f(x, y)$ – решение уравнения в частных производных (4.22). Для этого достаточно в вытекающей из (4.27) системы функциональных уравнений

$$x = \varphi_1(t, s), \quad y = \varphi_2(t, s), \quad (4.29)$$

выразить параметры (t, s) как непрерывно дифференцируемые функции от (x, y) . Имеем в виду применение теоремы о неявных функциях, нашедшим значения частных производных на линии ℓ , то есть при $t = 0$. В силу (4.25) имеем

$$\frac{\partial \varphi_1}{\partial t}(0, s) = \frac{dx}{dt}|_{t=0} = a_1(s), \quad \frac{\partial \varphi_2}{\partial t}(0, s) = \frac{dy}{dt}|_{t=0} = a_2(s).$$

Из равенств (4.26) находим, что

$$\frac{\partial \varphi_1}{\partial s}(0, s) = \varphi_1'(s), \quad \frac{\partial \varphi_2}{\partial s}(0, s) = \varphi_2'(s).$$

Тогда для якобиана в силу условия (4.24) справедливо соотношение

$$\det \begin{pmatrix} \frac{\partial \varphi_1}{\partial t} & \frac{\partial \varphi_1}{\partial s} \\ \frac{\partial \varphi_2}{\partial t} & \frac{\partial \varphi_2}{\partial s} \end{pmatrix}(0, s) = \det \begin{pmatrix} a_1(s) & \varphi_1'(s) \\ a_2(s) & \varphi_2'(s) \end{pmatrix} \neq 0, \quad \forall s \in [s_1, s_2].$$

Следовательно, по теореме о неявных функциях в окрестности точки $(x_0, y_0) = (\varphi_1(0, s_0), \varphi_2(0, s_0))$ существуют непрерывным образом определенные непрерывно дифференцируемые функции

$$t = t(x, y), \quad s = s(x, y),$$

обращающие уравнения (4.29) в тождества. После подстановки в третье уравнение в (4.27) приходим к искомого представлению

$$u = \varphi_3(t(x, y), s(x, y)) = f(x, y).$$

Единственность вытекает из того, что удовлетворяющая квазилинейному уравнению в частных производных поверхность, согласно теореме 4.2.3, состоит из характеристик (то есть выполняется соотношение (4.27)), а nearby кривой ℓ единственности решений обеспечивается теоремой о неявных функциях. $\square$

Условие (4.24) имеет следующий геометрический смысл. Так как вектор $\vec{\tau} = (a_1, a_2, b)$ касается характеристики, а вектор $(\psi_1', \psi_2', \psi_3')$ касается кривой ℓ , на которой заданы начальные данные для задачи Коши, то условие (4.24) есть условие некасательности проекции (a_1, a_2) и (ψ_1', ψ_2') рассматриваемых векторов на плоскость (x, y) . Другими словами, проекции линии ℓ и пересекающих ее характеристик не должны касаться друг друга (см. рис. 4.2).

Глава 5

Основы вариационного исчисления

5.1. Основные понятия вариационного исчисления

Рассмотрим множество M , являющееся некоторым подмножеством множества непрерывных на отрезке функций $C[x_0, x_1]$.

Определение 5.1.1. Функционалом называется отображение множества M в множество действительных чисел.

Приведем некоторые примеры.

Пусть множество M совпадает со всем множеством $C[x_0, x_1]$. Определим функционал $\Phi[y(x)]$ следующим образом: $\Phi[y(x)] = y(x_0) + 2y(x_1)$. Другим примером функционала, определенного на этом множестве, является

$$\Phi[y(x)] = \int_{x_0}^{x_1} y(x) dx.$$

Приведем еще один пример. Пусть множество M представляет собой множество непрерывно дифференцируемых на отрезке $[x_0, x_1]$ функций таких, что $y(x_0) = y_0$, $y(x_1) = y_1$, где y_0, y_1 – заданные постоянные. Определим на этом множестве функционал

$$\Phi[y(x)] = \int_{x_0}^{x_1} (y(x) + 2(y'(x))^2) dx.$$

5.1.1. Вариация функционала

Определение 5.1.2. Допустимой вариацией функции $y_0(x) \in M$ называется любая функция $\delta y(x)$ такая, что $y_0(x) + \delta y(x) \in M$.

Далее для простоты будем считать, что множество M обладает тем свойством, что если $\delta y(x)$ – допустимая вариация функции $y_0(x)$, то $\delta y(x)$ также является допустимой вариацией функции $y_0(x)$ для любого $t \in \mathbb{R}$.

Определение 5.1.3. Вариацией $\delta \Phi[y_0(x), \delta y(x)]$ функционала $\Phi[y(x)]$ на функции $y_0(x) \in M$ называется

$$\frac{d}{dt} \Phi[y_0(x) + t\delta y(x)]|_{t=0}.$$

Приведем примеры, показывающие, что вариация функционала может существовать, а может и не существовать. Пусть $M = C[x_0, x_1]$. Рассмотрим

$$\Phi[y(x)] = \int_{x_0}^{x_1} (y(x))^2 dx.$$

Тогда

$$\begin{aligned} \delta \Phi[y_0(x), \delta y(x)] &= \frac{d}{dt} \Phi[y_0(x) + t\delta y(x)]|_{t=0} = \\ &= \frac{d}{dt} \int_{x_0}^{x_1} (y_0(x) + t\delta y(x))^2 dx|_{t=0} = 2 \int_{x_0}^{x_1} y_0(x) \delta y(x) dx, \end{aligned}$$

и вариация функционала $\delta \Phi[y_0(x), \delta y(x)]$ существует для любой $y_0(x)$. Если же мы на том же самом множестве рассмотрим функционал

$$\Phi[y(x)] = \int_{x_0}^{x_1} |y(x)| dx$$

и возьмем $y_0(x) = 0$, а $\delta y(x) = 1$, то

$$\delta \Phi[y_0(x), \delta y(x)] = \frac{d}{dt} \Phi[y_0(x) + t\delta y(x)]|_{t=0} = \frac{d}{dt} (x - x_0) \Big|_{t=0},$$

и вариация функционала не существует.

5.1.2. Экстремум функционала

Определение 5.1.4. Функционал $\Phi[y(x)]$ достигает на функции $y_0(x) \in M$ глобального минимума (максимума) на множестве M , если существует $\varepsilon > 0$ такое, что для любой $y(x) \in M$ и удовлетворяющей неравенству $\|y(x) - y_0(x)\| < \varepsilon$, справедливо $\Phi[y_0(x)] \leq \Phi[y(x)]$ ($\Phi[y_0(x)] \geq \Phi[y(x)]$).

Пусть на множестве M введена некоторая норма функции $y(x)$, например

$$\|y(x)\| = \max_{x_0 \leq x \leq x_1} |y(x)|.$$

Определение 5.1.5. Функционал $\Phi[y(x)]$ достигает на функции $y_0(x) \in M$ локального минимума (максимума) на множестве M , если существует $\varepsilon > 0$ такое, что для любой $y(x) \in M$ и удовлетворяющей неравенству $\|y(x) - y_0(x)\| < \varepsilon$, справедливо $\Phi[y_0(x)] \leq \Phi[y(x)]$ ($\Phi[y_0(x)] \geq \Phi[y(x)]$).

Максимумы и минимумы функционала называются экстремумами функционала. Задачи отыскания экстремумов функционалов и функций, на которых они достигаются, называются задачами вариационного исчисления.

Докажем теорему о необходимом условии экстремума функционала.

Теорема 5.1.1. Если функционал $\Phi[y(x)]$ достигает на функции $y_0(x) \in M$ локального максимума или минимума на множестве M , и вариация функционала на $y_0(x)$ существует, то вариация функционала $\delta \Phi[y_0(x), \delta y(x)]$ равна нулю для любой допустимой вариации $\delta y(x)$.

Доказательство. Пусть функционал $\Phi[y(x)]$ достигает на функции $y_0(x)$ локального экстремума. Рассмотрим $\Phi[y_0(x) + t\delta y(x)]$, где $\delta y(x)$ произвольная вариация $y_0(x)$. При фиксированных $y_0(x)$ и $\delta y(x)$ функционал $\Phi[y_0(x) + t\delta y(x)]$ является функцией переменной t :

$$\varphi(t) = \Phi[y_0(x) + t\delta y(x)].$$

Так как функционал $\Phi[y(x)]$ достигает на функции $y_0(x)$ локального экстремума, то у функции $\varphi(t)$ точка $t = 0$ является точкой локального экстремума. Следовательно, если производная $\varphi'(0)$ существует, то $\varphi'(0) = 0$. Существование производной $\varphi'(0)$ следует из существования вариации функционала $\Phi[y(x)]$ на $y_0(x)$:

$$\frac{d}{dt} \varphi(t) \Big|_{t=0} = \frac{d}{dt} \Phi[y_0(x) + t\delta y(x)]|_{t=0}.$$

Следовательно,

$$\delta \Phi[y_0(x), \delta y(x)] = \frac{d}{dt} \Phi[y_0(x) + t\delta y(x)]|_{t=0} = 0$$

для любой $\delta y(x)$. Теорема 5.1.1 доказана. $\square$



Рис. 5.1. К доказательству леммы 5.1.1.

5.1.3. Основная лемма вариационного исчисления

Докажем лемму, которую в связи с ее важностью при исследовании задач вариационного исчисления, называют основной леммой вариационного исчисления.

Напомним, что $C^n[x_0, x_1]$, $n \in \mathbb{N}$ обозначает множество n раз непрерывно дифференцируемых на отрезке $[x_0, x_1]$ функций. Пусть $C_0^n[x_0, x_1]$ – множество функций $y(x) \in C^n[x_0, x_1]$ таких, что

$$y^{(m)}(x_0) = y^{(m)}(x_1) = 0, \quad m = 0, 1, \dots, n - 1.$$

Лемма 5.1.1. Пусть $f(x)$ – непрерывная на отрезке $[x_0, x_1]$ функция такая, что

$$\int_{x_0}^{x_1} f(x) y(x) dx = 0$$

для любой $y(x) \in C_0^n[x_0, x_1]$. Тогда $f(x) \equiv 0$ на отрезке $[x_0, x_1]$.

Доказательство. Предположим, что функция $f(x)$ отлична от нуля на отрезке $[x_0, x_1]$. Тогда существует точка $x_2 \in (x_0, x_1)$ такая, что $f(x_2) \neq 0$. Пусть для определенности $f(x_2) > 0$. В силу непрерывности $f(x)$ существует $\varepsilon > 0$ такое, что

$$f(x) \geq \frac{f(x_2)}{2} > 0, \quad \forall x \in [x_2 - \varepsilon, x_2 + \varepsilon] \subset (x_0, x_1).$$

Рассмотрим функцию $y_2(x)$ следующего вида (см. рис. 5.1):

$$y_2(x) = \begin{cases} f(x - x_2 - \varepsilon)^{n+1} (x_2 + \varepsilon - x)^{n+1}, & x \in [x_2 - \varepsilon, x_2 + \varepsilon]; \\ 0, & x \notin [x_2 - \varepsilon, x_2 + \varepsilon]. \end{cases}$$

Функция $y_2(x) \in C_0^n[x_0, x_1]$ и $y_2(x) > 0$ при $x \in (x_2 - \varepsilon, x_2 + \varepsilon)$. Следовательно,

$$\int_{x_0}^{x_1} f(x) y_2(x) dx = \int_{x_2 - \varepsilon}^{x_2 + \varepsilon} f(x) y_2(x) dx > 0,$$

что противоречит условию леммы. Лемма 5.1.1 доказана. $\square$

5.2. Уравнение Эйлера

Рассмотрим множество M непрерывно дифференцируемых на $[x_0, x_1]$ функций $y(x)$ таких, что $y(x_0) = y_0$, $y(x_1) = y_1$. Определим на этом множестве функционал

$$\Phi[y(x)] = \int_{x_0}^{x_1} F(x, y(x), y'(x)) dx, \quad (5.1)$$

где $F(x, y, p)$ – заданная функция трех переменных.

Получим необходимое условие экстремума функционала на множестве M .

Теорема 5.2.1. Предположим, что при $x \in [x_0, x_1]$, $(y, p) \in \mathbb{R}^2$ у функции $F(x, y, p)$ существует непрерывные вторые частные производные. Если функционал (5.1) достигает локального экстремума на функции $y_0(x) \in M$, имеющей непрерывно второму производную на отрезке $[x_0, x_1]$, то функция $y_0(x)$ является решением дифференциального уравнения

$$F_p(x, y(x), y'(x)) - \frac{d}{dx} F_p(x, y(x), y'(x)) = 0, \quad x_0 \leq x \leq x_1. \quad (5.2)$$

Доказательство. Найдем вариацию функционала (5.1) на $y_0(x)$. Из определения множества M следует, что допустимой вариацией $\delta y(x)$ функции $y_0(x)$ является любая непрерывно дифференцируемая на отрезке $[x_0, x_1]$ функция, обращающаяся в ноль на концах этого отрезка (см. рис. 5.2). То есть $\delta y(x) \in C_0^1[x_0, x_1]$.

Используя определение вариации функционала, получим

$$\delta \Phi[y_0(x), \delta y(x)] = \frac{d}{dt} \Phi[y_0(x) + t\delta y(x)]|_{t=0} =$$




Рис. 5.2. К доказательству теоремы 5.2.1.

$$\begin{aligned} &= \frac{d}{dt} \int_{x_0}^{x_1} F(x, y_0(x) + t\delta y(x), y_0'(x) + t(\delta y'(x)) dx|_{t=0} = \\ &= \int_{x_0}^{x_1} \left\{ F_p(x, y_0(x) + t\delta y(x), y_0'(x) + t(\delta y'(x)) \delta y(x) + \right. \\ &\quad \left. + F_p(x, y_0(x) + t\delta y(x), y_0'(x) + t(\delta y'(x)) (\delta y'(x)) dx|_{t=0} = \right. \\ &= \int_{x_0}^{x_1} \left\{ F_p(x, y_0(x), y_0'(x)) \delta y(x) + F_p(x, y_0(x), y_0'(x)) (\delta y'(x)) dx \right. \end{aligned}$$

Из теоремы о необходимом условии экстремума следует, что вариация функционала на $y_0(x)$ должна равняться нулю, то есть

$$\int_{x_0}^{x_1} F_p(x, y_0(x), y_0'(x)) \delta y(x) dx + \int_{x_0}^{x_1} F_p(x, y_0(x), y_0'(x)) (\delta y'(x)) dx = 0.$$

Интегрируя по частым второй интеграл и учитывая то, что

$$\delta y(x_0) = \delta y(x_1) = 0,$$

получим

$$\int_{x_0}^{x_1} \left\{ F_p(x, y_0(x), y_0'(x)) - \frac{d}{dx} F_p(x, y_0(x), y_0'(x)) \right\} \delta y(x) dx = 0.$$

Это равенство выполнено для любой функции $\delta y(x) \in C_0^1[x_0, x_1]$. Применяя основную лемму вариационного исчисления, имеем

$$F_p(x, y_0(x), y_0'(x)) - \frac{d}{dx} F_p(x, y_0(x), y_0'(x)) = 0, \quad x_0 \leq x \leq x_1.$$

Следовательно, функция $y_0(x)$ является решением уравнения (5.2) и теорема 5.2.1 доказана. $\square$

Уравнение (5.2) называется уравнением Эйлера для функционала (5.1). Так как функция $y_0(x)$, на которой достигается экстремум функционала (5.1), принадлежит множеству M , то она является решением следующей краевой задачи

$$\begin{aligned} F_p(x, y(x), y'(x)) - \frac{d}{dx} F_p(x, y(x), y'(x)) &= 0, \quad x_0 \leq x \leq x_1, \\ y(x_0) &= y_0, \quad y(x_1) = y_1. \end{aligned}$$

Рассмотрим пример применения доказанной теоремы.

Во многих приложениях, например, при обработке изображений, требуется приблизить некоторую функцию $f(x)$ более гладкой функцией $y(x)$. Это означает, что производная $y'(x)$ не должна иметь слишком больших значений. Для решения подобных задач может быть применено вариационное исчисление. Пусть $f(x)$ такова, что $f(x_0) = f(x_1) = 0$. Рассмотрим задачу нахождения минимума следующего функционала

$$\int_{x_0}^{x_1} (y(x) - f(x))^2 dx + \alpha \int_{x_0}^{x_1} (y'(x))^2 dx, \quad (5.3)$$

где α – положительный параметр. Минимизация первого интеграла обеспечивает близость функции $y(x)$ к исходной $f(x)$, а минимизация второго интеграла приводит к тому, что значения производной $y'(x)$ не будут слишком большими.

Для решения задачи минимизации функционала (5.3) на множестве функций $y(x)$ таких, что $y(x) \in C^1[x_0, x_1]$, $y(x_0) = y(x_1) = 0$, запишем уравнение Эйлера для функционала (5.3). Так как в этом случае

$$F(x, y, p) = (y - f(x))^2 + \alpha p^2, \quad F_p(x, y, p) = 2(y - f(x)), \quad F_p(x, y, p) = 2\alpha p,$$

то уравнение Эйлера имеет вид

$$2(y(x) - f(x)) - \frac{d}{dx} (2\alpha y'(x)) = 0.$$

Преобразуя

Доказательство. Пусть экстремум функционала (5.11) достигается на функции $\bar{u}(x, y) \in M$, имеющей непрерывные вторые частные производные в $\bar{D}$. Из необходимого условия экстремума следует, что вариация функционала (5.11) на этой функции равна нулю

$$\delta\Phi[\bar{u}(x, y), \delta u(x, y)] = \frac{d}{dt}\Phi[\bar{u}(x, y) + t\delta u(x, y)]\Big|_{t=0} = 0,$$

то есть

$$\frac{d}{dt}\iint_D F(x, y, u(x, y, t), w_x(x, y, t), w_y(x, y, t))dxdy\Big|_{t=0} = 0,$$

где $w(x, y, t) = \bar{u}(x, y) + t\delta u(x, y)$. Дифференцируя по t под знаком интеграла и полагая t равным нулю, получим

$$\iint_D F_u(x, y, \bar{u}, \bar{u}_x, \bar{u}_y)\delta u(x, y)dxdy + \\ + \iint_D \left\{ F_p(x, y, \bar{u}, \bar{u}_x, \bar{u}_y)(\delta u)_x(x, y) + \right. \\ \left. + F_q(x, y, \bar{u}, \bar{u}_x, \bar{u}_y)(\delta u)_y(x, y) \right\}dxdy = 0. \quad (5.13)$$

Преобразуем это равенство. Очевидно, что

$$F_p(x, y, \bar{u}, \bar{u}_x, \bar{u}_y)(\delta u)_x(x, y) = \frac{\partial}{\partial x}(F_p\delta u) - \frac{\partial F_p}{\partial x} \cdot \delta u, \\ F_q(x, y, \bar{u}, \bar{u}_x, \bar{u}_y)(\delta u)_y(x, y) = \frac{\partial}{\partial y}(F_q\delta u) - \frac{\partial F_q}{\partial y} \cdot \delta u.$$

Следовательно,

$$\iint_D \left\{ F_p(x, y, \bar{u}, \bar{u}_x, \bar{u}_y)(\delta u)_x(x, y) + F_q(x, y, \bar{u}, \bar{u}_x, \bar{u}_y)(\delta u)_y(x, y) \right\}dxdy = \\ = \iint_D \left(\frac{\partial}{\partial x}(F_p\delta u) + \frac{\partial}{\partial y}(F_q\delta u) \right)dxdy - \iint_D \left(\frac{\partial F_p}{\partial x} + \frac{\partial F_q}{\partial y} \right)\delta u dxdy.$$

Применяя формулу Грина к интегралу

$$\iint_D \left(\frac{\partial}{\partial x}(F_p\delta u) + \frac{\partial}{\partial y}(F_q\delta u) \right)dxdy$$

и учитывая то, что $\delta u(x, y) = 0$, $(x, y) \in L$, получим

$$\iint_D \left(\frac{\partial}{\partial x}(F_p\delta u) + \frac{\partial}{\partial y}(F_q\delta u) \right)dxdy = \oint_L (F_p\delta u dy - F_q\delta u dx) = 0.$$

Следовательно,

$$\iint_D \left\{ F_p(x, y, \bar{u}, \bar{u}_x, \bar{u}_y)(\delta u)_x(x, y) + F_q(x, y, \bar{u}, \bar{u}_x, \bar{u}_y)(\delta u)_y(x, y) \right\}dxdy = \\ = - \iint_D \left(\frac{\partial F_p}{\partial x} + \frac{\partial F_q}{\partial y} \right)\delta u dxdy,$$

и равенство (5.13) принимает вид

$$\iint_D \left\{ F_u - \frac{\partial}{\partial x}F_p - \frac{\partial}{\partial y}F_q \right\}\delta u(x, y) dxdy = 0,$$

где F_u , F_p , F_q вычисляются в точке $(x, y, \bar{u}(x, y), \bar{u}_x(x, y), \bar{u}_y(x, y))$. Так как полученное равенство выполнено для любой допустимой вариации $\delta u(x, y)$, то, применяя лемму 5.3.1, получаем, что функция $\bar{u}(x, y)$ является решением уравнения (5.12). Теорема 5.3.2 доказана. $\square$

Следовательно, если функция $\bar{u}(x, y)$ такова, что $\bar{u} \in M$, имеет в $\bar{D}$ непрерывные вторые частные производные и на ней достигается экстремум функционала (5.12), то эта функция является решением следующей задачи:

$$F_u - \frac{\partial F_p}{\partial x} - \frac{\partial F_q}{\partial y} = 0, \quad (x, y) \in D, \\ u(x, y) = \varphi(x, y), \quad (x, y) \in L.$$

Приведем еще один пример вариационной задачи, связанной со слаживанием функции двух переменных. Пусть нам нужно приблизить функцию двух переменных $f(x, y)$, заданную в некоторой области D более гладкой функцией $u(x, y)$. Предположим, что функция $f(x, y)$ на границе L области D обращается в ноль. Для решения задачи рассмотрим задачу минимизации функционала

$$\iint_D \left\{ (u(x, y) - f(x, y))^2 + \alpha ((u_x(x, y))^2 + (u_y(x, y))^2) \right\}dxdy$$

Замечая для этого функционала уравнение (5.12), получим, что, если минимум достигается на функции $\bar{u}(x, y)$, имеющей непрерывные вторые частные производные в $\bar{D}$ и обращающейся в ноль на L , то эта функция является решением уравнения в частных производных

$$u_{xx}(x, y) + u_{yy}(x, y) - \alpha^{-1}u(x, y) = -\alpha^{-1}f(x, y), \quad (x, y) \in D.$$

5.4. Вариационная задача на условный экстремум

Рассмотрим два функционала

$$\Phi[y(x)] = \int_{x_0}^{x_1} F(x, y(x), y'(x))dx \quad (5.14)$$

и

$$\Psi[y(x)] = \int_{x_0}^{x_1} G(x, y(x), y'(x))dx, \quad (5.15)$$

где $F(x, y, p)$, $G(x, y, p)$ – заданные дважды непрерывно дифференцируемые функции своих аргументов.

Рассмотрим следующую экстремальную задачу. Пусть требуется найти функцию $\bar{y}(x)$, на которой достигается экстремум функционала (5.14) на множестве функций

$$M_\Phi = \{y(x) \in C^1[x_0, x_1] : y(x_0) = y_0, y(x_1) = y_1, \Psi[y(x)] = \ell\}.$$

Таким образом, нам нужно найти экстремум функционала (5.14) на множестве функций определяемом тем условием, что функционал (5.15) принимает на этом множестве постоянное значение. Вариационные задачи такого типа называются задачами на условный экстремум. Найдем вариацию функционала (5.15) на множестве функций

$$M = \{y(x) \in C^1[x_0, x_1] : y(x_0) = y_0, y(x_1) = y_1\}.$$

Пусть $\delta y(x)$ – допустимая вариация функции на M , то есть

$$\delta y(x) \in C^1[x_0, x_1], \quad \delta y(x_0) = \delta y(x_1) = 0.$$

Тогда вариация функционала $\Psi[y(x)]$ на функции $\bar{y}(x) \in M$ равна

$$\delta\Psi[\bar{y}(x), \delta y(x)] = \frac{d}{dt}\Psi[\bar{y}(x) + t\delta y(x)]\Big|_{t=0}.$$

Дифференцируя по t и полагая $t = 0$, получаем

$$\delta\Psi[\bar{y}(x), \delta y(x)] = \\ = \int_{x_0}^{x_1} \left\{ G_y(x, \bar{y}(x), \bar{y}'(x))\delta y(x) + G_p(x, \bar{y}(x), \bar{y}'(x))(\delta y)'(x) \right\}dx. \quad (5.17)$$

Сформулируем условие, необходимое для того, чтобы на функции $\bar{y}(x)$ достигался экстремум функционала (5.14) на множестве M_Φ .

Теорема 5.4.1. Пусть на функции $\bar{y}(x) \in M_\Phi$, $\bar{y}(x) \in C^2[x_0, x_1]$, достигается экстремум функционала (5.14) на множестве M_Φ . Если существует функция

$$\delta y_0(x) \in C^1[x_0, x_1], \quad \delta y_0(x_0) = \delta y_0(x_1) = 0$$

такая, что вариация $\delta\Psi[\bar{y}(x), \delta y_0(x)] \neq 0$, то найдется число λ такое, что $\bar{y}(x)$ удовлетворяет уравнению

$$L_y(x, y(x), y'(x)) - \frac{d}{dx}L_p(x, y(x), y'(x)) = 0, \quad x_0 \leq x \leq x_1, \quad (5.18)$$

где

$$L(x, y, p) = F(x, y, p) + \lambda G(x, y, p). \quad (5.19)$$

Доказательство. Возьмем произвольную функцию $\delta y(x)$ такую, что $\delta y(x) \in C^1[x_0, x_1]$, $\delta y(x_0) = \delta y(x_1) = 0$. Рассмотрим функции

$$\varphi(t, \tau) = \Phi[\bar{y}(x) + t\delta y(x) + \tau\delta y_0(x)], \\ \psi(t, \tau) = \Psi[\bar{y}(x) + t\delta y(x) + \tau\delta y_0(x)],$$

где t, τ – произвольные действительные числа.

Из определения функций $\varphi(t, \tau)$ и $\psi(t, \tau)$ следует, что

$$\varphi(0, 0) = \Phi[\bar{y}(x)], \quad \psi(0, 0) = \Psi[\bar{y}(x)], \\ \varphi_t(0, 0) = \delta\Phi[\bar{y}(x), \delta y(x)], \quad \varphi_\tau(0, 0) = \delta\Phi[\bar{y}(x), \delta y_0(x)],$$

$$\psi_t(0, 0) = \delta\Psi[\bar{y}(x), \delta y(x)], \quad \psi_\tau(0, 0) = \delta\Psi[\bar{y}(x), \delta y_0(x)].$$

Покажем, что для любых $\delta y(x) \in C_0^1[x_0, x_1]$ якобиан

$$\frac{D(\varphi, \psi)}{D(t, \tau)}\Big|_{t=\tau=0} = \det \begin{pmatrix} \delta\Phi[\bar{y}(x), \delta y(x)], & \delta\Phi[\bar{y}(x), \delta y_0(x)] \\ \delta\Psi[\bar{y}(x), \delta y(x)], & \delta\Psi[\bar{y}(x), \delta y_0(x)] \end{pmatrix} = 0. \quad (5.20)$$

Предположим, что это не так и существует $\delta\bar{y}(x)$ такая, что для нее якобиан

$$\det \begin{pmatrix} \delta\Phi[\bar{y}(x), \delta\bar{y}(x)], & \delta\Phi[\bar{y}(x), \delta y_0(x)] \\ \delta\Psi[\bar{y}(x), \delta\bar{y}(x)], & \delta\Psi[\bar{y}(x), \delta y_0(x)] \end{pmatrix} \neq 0.$$

Тогда из теоремы о неявных функциях следует, что при $\delta y(x) = \delta\bar{y}(x)$ система

$$\varphi(t, \tau) = \alpha, \quad \psi(t, \tau) = \varepsilon$$

однозначно разрешима для (u, v) , находящихся в достаточно малой окрестности (u_0, v_0) , где $u_0 = \varphi(0, 0)$, $v_0 = \psi(0, 0)$.

Пусть, для определенности, $\bar{y}(x)$ – функция, на которой достигается локальный минимум задачи на условный экстремум. Рассмотрим систему

$$\varphi(t, \tau) = \varphi(0, 0) - \varepsilon = \Phi[\bar{y}(x)] - \varepsilon, \\ \psi(t, \tau) = \psi(0, 0) = \Psi[\bar{y}(x)] = \ell,$$

где ε – достаточно малое положительное число. Так как

$$(\varphi(0, 0) - \varepsilon, \psi(0, 0))$$

находится в достаточно малой окрестности точки (u_0, v_0) , то по теореме о неявной функции система имеет единственное решение $t_\varepsilon, \tau_\varepsilon$. Это означает, что

$$\varphi(t_\varepsilon, \tau_\varepsilon) = \Phi[\bar{y}(x) + t_\varepsilon\delta\bar{y}(x) + \tau_\varepsilon\delta y_0(x)] = \Phi[\bar{y}(x)] - \varepsilon, \\ \psi(t_\varepsilon, \tau_\varepsilon) = \Psi[\bar{y}(x) + t_\varepsilon\delta\bar{y}(x) + \tau_\varepsilon\delta y_0(x)] = \ell.$$

Следовательно, на функции $\bar{y}(x) + t_\varepsilon\delta\bar{y}(x) + \tau_\varepsilon\delta y_0(x)$, принадлежащей множеству M_Φ , функционал (5.14) принимает значение меньшее, чем на $\bar{y}(x)$. Это противоречит тому, что на функции $\bar{y}(x)$ достигается локальный минимум. Из полученного противоречия следует справедливость равенства (5.20).

Раскрывая определитель, исходящий в равенство (5.20), получаем

$$\delta\Phi[\bar{y}(x), \delta y(x)]\delta\Psi[\bar{y}(x), \delta y_0(x)] - \delta\Phi[\bar{y}(x), \delta y_0(x)]\delta\Psi[\bar{y}(x), \delta y(x)] = 0$$

для всех $\delta y(x) \in C_0^1[x_0, x_1]$. По условию теоремы $\delta\Psi[\bar{y}(x), \delta y_0(x)] \neq 0$. Поделив на $\delta\Psi[\bar{y}(x), \delta y_0(x)]$ и обозначив через

$$\lambda = -\frac{\delta\Phi[\bar{y}(x), \delta y_0(x)]}{\delta\Psi[\bar{y}(x), \delta y_0(x)]},$$

получим

$$\delta\Phi[\bar{y}(x), \delta y(x)] + \lambda\delta\Psi[\bar{y}(x), \delta y(x)] = 0.$$

Учитывая формулы для $\delta\Phi[\bar{y}(x), \delta y(x)]$ и $\delta\Psi[\bar{y}(x), \delta y(x)]$, это равенство можно переписать так:

$$\int_{x_0}^{x_1} \left\{ F_y(x, \bar{y}(x), \bar{y}'(x)) + \lambda G_y(x, \bar{y}(x), \bar{y}'(x)) \right\}\delta y(x)dx + \\ + \int_{x_0}^{x_1} \left\{ F_p(x, \bar{y}(x), \bar{y}'(x)) + \lambda G_p(x, \bar{y}(x), \bar{y}'(x)) \right\}\delta y'(x)dx = 0.$$

Интегрируя по частям второй интеграл и учитывая определение (5.19) функции $L(x, y, p)$, имеем $\square$

$$\int_{x_0}^{x_1} \left\{ L_y(x, \bar{y}(x), \bar{y}'(x)) - \frac{d}{dx}L_p(x, \bar{y}(x), \bar{y}'(x)) \right\}\delta y(x)dx = 0, \\ \forall \delta y(x) \in C_0^1[x_0, x_1].$$

Применяя основную лемму вариационного исчисления, получим, что функция $\bar{y}(x)$ удовлетворяет уравнению (5.18). Теорема 5.4.1 доказана. $\square$

Из теоремы 5.4.1 следует, что для определения функции, которая может являться решением задачи на условный экстремум, нужно решить уравнение (5.18). Это дифференциальное уравнение второго порядка, и его решение зависит, вообще говоря, от двух произвольных постоянных и вспомогательного параметра λ . Эти постоянные и параметр могут быть найдены из краевых условий $y(x_0) = y_0$, $y(x_1) = y_1$, а также условия $\Psi[y(x)] = \ell$.

5.5. Вариационное свойство собственных функций и собственных значений задачи Штурма-Лиувилля

Рассмотрим задачу Штурма-Лиувилля. Требуется найти значения λ_n при которых краевая задача

$$\frac{d}{dx} \left(k(x) \frac{dy}{dx} \right) - q(x)y = -\lambda y, \quad 0 \leq x \leq l, \quad (5.21)$$

$$y(0) = 0, \quad y(l) = 0 \quad (5.22)$$

имеет ненулевое решение. Эти значения λ_n называются собственными значениями, а соответствующие им решения $y_n(x)$ – собственными функциями задачи Штурма-Лиувилля. Собственные функции определены с точностью до произвольного постоянного множителя. Чтобы устранить эту неоднозначность, введем следующее условие:

$$\int_0^l (y_n(x))^2 dx = 1. \quad (5.23)$$

Рассмотрим функционал

$$\Phi[y(x)] = \int_0^l (k(x)(y'(x))^2 + q(x)(y(x))^2) dx. \quad (5.24)$$

Покажем, что, если $y_n(x)$ – собственная функция задачи Штурма-Лиувилля (5.21), (5.22), соответствующая собственному значению λ_n , то

$$\Phi[y_n(x)] = \lambda_n. \quad (5.25)$$

Действительно, так как

$$\int_0^l k(x)(y_n'(x))^2 dx = \int_0^l k(x)y_n'(x)y_n'(x) dx = \\ = k(x)y_n'(x)y_n(x)\Big|_{x=0}^{x=l} - \int_0^l (k(x)y_n'(x))' y_n(x) dx = - \int_0^l (k(x)y_n'(x))' y_n(x) dx,$$

то

$$\Phi[y_n(x)] = \int_0^l (k(x)(y_n'(x))^2 + q(x)(y_n(x))^2) dx = \\ = - \int_0^l ((k(x)y_n'(x))' - q(x)y_n(x)) y_n(x) dx = \lambda_n \int_0^l (y_n(x))^2 dx = \lambda_n.$$

Рассмотрим задачу минимизации функционала (5.24) на множестве функций, удовлетворяющих условиям (5.22) и (5.23). Запишем условие (5.23) в виде

$$\Psi[y(x)] = 1, \quad \Psi[y(x)] = \int_0^l (y(x))^2 dx.$$

Пусть минимум достигается на функции $\bar{y}(x) \in C^2[0, l]$. Из необходимого условия для решения задачи на условный экстремум получим, что $\bar{y}(x)$ является решением уравнения

$$L_y - \frac{d}{dx}L_p = 0, \quad 0 \leq x \leq l, \quad (5.26)$$

где $L(x, y, p) = k(x)p^2 + q(x)y^2 - \lambda y^2$. Перепишем уравнение (5.26), учитывая вид функции $L(x, y, p)$:

$$2q(x)y(x) - 2\lambda y(x) - 2(k(x)y'(x))' = 0, \quad 0 \leq x \leq l.$$

Таким образом, функция $\bar{y}(x)$ является решением уравнения (5.21) и удовлетворяет условиям (5.22). Кроме того, она не равна тождественно нулю, поскольку удовлетворяет условию (5.23). Следовательно, $\bar{y}(x)$ является собственной функцией задачи Штурма-Лиувилля (5.21), (5.22). Обозначим ее $y_1(x)$, λ_1 – соответствующее ей собственное значение. Из (5.25) следует, что $\Phi[y_1(x)] = \lambda_1$.

Таким образом, мы показали, что решение задачи на условный экстремум (5.24), (5.23) является собственной функцией задачи Штурма-Лиувилля, а соответствующее собственное значение представляет собой величину функционала (5.24) на этой собственной функции.