Номер 69.3(а)

Найти длину дуги пространственной кривой:

$$x = e^{-t} \cos t, y = e^{-t} \sin t, z = e^{-t}, 0 < t < +\infty$$

Решение

Данная кривая выглядит, как изображено на Рис. 1

Рис. 1. График дуги пространственной кривой с разных точек обзора

Длина дуги OA вычисляется по формуле:

$$L = \int_{OA} dS$$

Найдем дифференциал дуги:

$$\begin{aligned} dS &= \sqrt{e^{-2t}(\cos t + \sin t)^2 + e^{-2t}(\cos t - \sin t)^2 + e^{-2t}} = \\ &= e^{-t} \sqrt{\cos^2 t + 2 \sin t \cos t + \sin^2 t + \cos^2 t - 2 \sin t \cos t + \sin^2 t + 1} = e^{-t} \sqrt{3} \end{aligned}$$

Значит, длина дуги равна:

$$L = \int_0^{+\infty} e^{-t} \sqrt{3} dt = \sqrt{3}$$

Номер 69.3(б)

Найти длину дуги пространственной кривой:

$$(x - y)^2 = a(x + y), x^2 - y^2 = \frac{9}{8}z^2$$

от точки $O(0; 0; 0)$ до точки $A(x_0; y_0; z_0)$

Решение

Данная кривая выглядит, как изображено на Рис. 2 (график построен при $a = 1$)

Рис. 2. График дуги пространственной кривой с разных точек обзора

Сделаем замену:

$$\begin{aligned}x - y &= s \\x + y &= t \\z &= \frac{2\sqrt{2}}{3}\sqrt{st}\end{aligned}$$

Откуда:

$$\begin{aligned}x &= \frac{s^2 + as}{2a} \\y &= \frac{s^2 - as}{2a} \\z &= \frac{2\sqrt{2}}{3\sqrt{a}}s\sqrt{s}\end{aligned}$$

Длина дуги равна:

$$\begin{aligned}L &= \int_0^{t_0} \sqrt{\frac{(2s+a)^2}{4a^2} + \frac{(2s-a)^2}{4a^2} + \frac{2}{a}sd} ds = \int_0^{t_0} \sqrt{2\frac{s^2}{a^2} + \frac{1}{2} + \frac{2}{a}sd} ds = \int_0^{t_0} \sqrt{2\left(\frac{s}{a} + \frac{1}{2}\right)^2} ds = \\&= \sqrt{2} \int_0^{t_0} \left(\frac{s}{a} + \frac{1}{2}\right) ds = \frac{3z_0}{4\sqrt{2}} \sqrt[3]{\frac{3z_0}{a}} + \frac{3}{2\sqrt{2}} \sqrt[3]{az_0^2}\end{aligned}$$

Номер 69.3(в)

Найти длину дуги пространственной кривой:

$$x^2 + y^2 + z^2 = a^2, \sqrt{x^2 + y^2} \cosh(\operatorname{arctg} \frac{y}{x}) = a$$

от точки $A(a; 0; 0)$ до точки $B(x; y; z)$

Решение

Данная кривая выглядит, как изображено на Рис. 3 (график построен при $a = 1$)

Рис. 3. График дуги пространственной кривой с разных точек обзора

Воспользуемся сферической заменой координат:

$$x = a \cos \varphi \cos \psi$$

$$y = a \sin \varphi \cos \psi$$

$$z = a \sin \psi$$

Значит:

$$\psi = \arccos\left(\frac{1}{\cosh \varphi}\right)$$

Откуда:

$$x = \frac{a \cos \varphi}{\cosh \varphi}$$

$$y = \frac{a \sin \varphi}{\cosh \varphi}$$

$$z = a \sqrt{1 - \frac{1}{\cosh^2 \varphi}} = a \tanh \varphi$$

$$\frac{dx}{d\varphi} = a \frac{-\sin \varphi \cosh \varphi - \cos \varphi \sinh \varphi}{\cosh^2 \varphi}$$

$$\frac{dy}{d\varphi} = a \frac{\cos \varphi \cosh \varphi - \sin \varphi \sinh \varphi}{\cosh^2 \varphi}$$

$$\frac{dz}{d\varphi} = a \frac{a}{\cosh^2 \varphi}$$

Длина дуги равна:

$$\begin{aligned} L &= \int_0^{\arctan \frac{y_0}{x_0}} \frac{\sqrt{\sin^2 \varphi \cosh^2 \varphi + \cos^2 \varphi \sinh^2 \varphi + \cos^2 \varphi \cosh^2 \varphi + \sin^2 \varphi \sinh^2 \varphi + 1}}{\cosh^2 \varphi} d\varphi = \\ &= \sqrt{2}a \int_0^{\arctan \frac{y_0}{x_0}} \frac{d\varphi}{\cosh^2 \varphi} = \sqrt{2}a \tanh(\arctan \frac{y_0}{x_0}) \end{aligned}$$

Номер 69.6(а)

Вычислить криволинейный интеграл, взятый вдоль пространственной кривой, пробегаемой против хода часовой стрелки, если смотреть со стороны положительных x :

$$\int_C (y-x)dx + (z-x)dy + (x-y)dz,$$

где C - окружность:

$$\{x^2 + y^2 + z^2 = a^2, y = x \tan \alpha, 0 < \alpha < \pi\};$$

Решение

Кривая выглядит, как представлено на Рис. 4 (построена при $a = 1$, $\alpha = \frac{\pi}{6}$)

Рис. 4. График дуги пространственной кривой с разных точек обзора

Используем сферическую замену координат:

$$x = a \cos \varphi \cos \psi$$

$$y = a \sin \varphi \cos \psi$$

$$z = a \sin \psi$$

Тогда

$$\varphi = \alpha, \varphi = \alpha + \pi$$

Значит, исходный интеграл равен:

$$\begin{aligned} I &= \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (a \sin \alpha \cos \psi - a \sin \psi)(-a \cos \alpha \sin \psi) + (a \sin \psi - a \cos \alpha \cos \psi)(-a \sin \alpha \sin \psi) + \\ &+ (a \cos \alpha \cos \psi - a \sin \alpha \cos \psi)a \cos \psi d\psi + \int_{\frac{\pi}{2}}^{-\frac{\pi}{2}} (a \sin \alpha \cos \psi + a \sin \psi)(-a \cos \alpha \sin \psi) + \\ &+ (a \sin \psi + a \cos \alpha \cos \psi)a \sin \alpha \sin \psi - (a \cos \alpha \cos \psi - a \sin \alpha \cos \psi)a \cos \psi d\psi = \\ &= 2a^2 \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (\cos \alpha - \sin \alpha) d\psi = 2a^2 \pi (\cos \alpha - \sin \alpha) \end{aligned}$$

Номер 69.6(б)

Вычислить криволинейный интеграл, взятый вдоль пространственной кривой, пробегаемой против хода часовой стрелки, если смотреть со стороны положительных x :

$$\int_C y^2 dx + z^2 dy + x^2 dz,$$

где C - часть кривой Вивиани:

$$\{x^2 + y^2 + z^2 = a^2, x^2 + y^2 = ax, z \geq 0\};$$

Решение

Кривая выглядит, как представлено на Рис. 5 (построена при $a = 1, \alpha = \frac{\pi}{6}$)

Рис. 5. График дуги пространственной кривой с разных точек обзора

Используем сферическую замену координат:

$$x = a \cos \varphi \cos \psi$$

$$y = a \sin \varphi \cos \psi$$

$$z = a \sin \psi$$

Тогда исходный интеграл равен:

$$\begin{aligned}
 I &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} a^2 \sin^2 \varphi \cos^2 \varphi a 2 \cos \varphi (-\sin \varphi) + a^2 \sin^2 \varphi a \cos 2\varphi + a^2 \cos^4 \varphi a \cos \varphi d\varphi + \\
 &+ \int_{-\frac{\pi}{2}}^0 a^2 \sin^2 \varphi \cos^2 \varphi a 2 \cos \varphi (-\sin \varphi) + a^2 \sin^2 \varphi a \cos 2\varphi - a^2 \cos^4 \varphi a \cos \varphi d\varphi = \\
 &= -\frac{2a^3}{4} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \sin^3 2\varphi + a^3 \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 \varphi \cos 2\varphi d\varphi = \frac{a^3}{2} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (1 - \cos^2 2\varphi) d(\cos 2\varphi) + \\
 &+ \frac{a^3}{2} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos 2\varphi d\varphi - \frac{a^3}{2} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 2\varphi d\varphi = -\frac{\pi a^3}{4}
 \end{aligned}$$

Номер 71.1(а)

Найти площадь поверхности тела, ограниченного цилиндрами:

$$x^2 + z^2 = a^2, y^2 + z^2 = a^2$$

Решение

Поверхность выглядит, как изображено на Рис. 6 (фиксировано значение $a = 1$). Воспользуемся заменой координат:

$$\begin{aligned} x &= a \cos \varphi \\ y &= y \\ z &= a \sin \varphi \end{aligned}$$

Искомая площадь равна:

$$\begin{aligned} S &= 4a \int_0^a \int_{-\arcsin \sqrt{1-\frac{y^2}{a^2}}}^{\arcsin \sqrt{1-\frac{y^2}{a^2}}} y d\varphi dy = 8a \int_0^a y \arcsin \sqrt{1-\frac{y^2}{a^2}} dy = \left[1 - \frac{y^2}{a^2} = t, dt = -2\frac{y}{a^2} dy \right] = \\ &= 4a^3 \int_0^1 \arcsin \sqrt{t} dt = \left[\sqrt{t} = u, dt = 2udu \right] = 8a^3 \int_0^1 \arcsin u du = 8a^3 \int_0^1 4d(u \arcsin u + \sqrt{1-u^2}) = \\ &= 4a^3 \pi - 8a^3 \int_0^1 u \arcsin u du - 2a^3 \pi = 2\pi a^3 \end{aligned}$$

Номер 71.1(б)

Найти площадь части сферы

$$x^2 + y^2 + z^2 = a^2,$$

заключенной внутри цилиндра

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, 0 < b \leq a$$

Решение

Данная поверхность выглядит, как представлено на Рис. 7 ($a = 2, b = 1$)

Сделаем сферическую замену координат:

$$\begin{aligned} x &= a \cos \varphi \cos \psi \\ y &= a \sin \varphi \cos \psi \\ z &= a \sin \psi \end{aligned}$$

Площадь равна:

Рис. 6. Общий график - трехмерный

Рис. 7. Общий график - трехмерный

$$\begin{aligned}
S &= 8 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \int_0^{\arccos \frac{1}{\cos^2 \varphi + \frac{a^2}{b^2} \sin^2 \varphi}} a^2 \cos \psi d\psi d\varphi = 8a^2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{1 - \frac{1}{\cos^2 \varphi + \frac{a^2}{b^2} \sin^2 \varphi}} d\varphi = \\
&= 8a^2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sqrt{a^2 - b^2} \sin \varphi d\varphi}{\sqrt{a^2 - (a^2 - b^2) \cos^2 \varphi}} = [t = \cos \varphi] = 8a^2 \sqrt{a^2 - b^2} \int_0^1 \frac{dt}{\sqrt{a^2 - (a^2 - b^2)t^2}} = \\
&= 8a^2 \arcsin \left(\frac{\sqrt{a^2 - b^2}}{a} t \right) \Big|_0^1 = 8a^2 \arcsin \left(\frac{\sqrt{a^2 - b^2}}{a} \right)
\end{aligned}$$

Номер 71.1(в)

Найти площадь части поверхности

$$x^2 + y^2 + z^2 = a^2,$$

расположенной вне цилиндров

$$x^2 + y^2 = \pm ax$$

(задача Вивиани)

Решение

Данная кривая выглядит, как изображено на

Рис. 8

Сделаем сферическую замену координат:

$$x = a \cos \varphi \cos \psi$$

$$y = a \sin \varphi \cos \psi$$

$$z = a \sin \psi$$

$$EG - F^2 = a^4 \cos^2 \psi$$

Ограничение на φ :

$$|\cos \varphi| \leq \cos \psi$$

Поэтому искомая площадь равна:

$$S = 8 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \int_0^{\varphi} a^2 \cos \psi d\psi d\varphi = 8a^2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin \varphi = 8a^2 (-\cos \varphi) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = 8a^2$$

Рис. 8. Общий график - трехмерный

Номер 71.1(д)

Найти площадь части геликоида

$$x = r \cos \varphi, y = r \sin \varphi, z = h\varphi, 0 < r < a, 0 < \varphi < 2\pi$$

Решение

На Рис. 9 построена данная поверхность при $h = 1, a = 2\pi$

$$E = \cos^2 \varphi + \sin^2 \varphi = 1$$

$$G = r^2 \sin^2 \varphi + r^2 \cos^2 \varphi + h^2 = r^2 + h^2$$

$$F = -r \cos \varphi \sin \varphi + r \cos \varphi \sin \varphi = 0$$

$$EG - F^2 = r^2 + h^2$$

Значит, площадь равна:

$$S = \int_0^a \int_0^{2\pi} \sqrt{r^2 + h^2} d\varphi dr = 2\pi \int_0^a dr =$$

$$= \left[t = \ln\left(\frac{a}{h} + \sqrt{\frac{a^2}{h^2} + 1}\right) \right] = 2\pi h^2 \int_0^{\ln\left(\frac{a + \sqrt{a^2 + h^2}}{h}\right)} \cosh^2 t dt = \pi h^2 \ln\left(\frac{a + \sqrt{a^2 + h^2}}{h}\right) + \pi h^2 \frac{a}{h} \sqrt{1 + \frac{a^2}{h^2}} =$$

$$= \pi h^2 \ln\left(\frac{a + \sqrt{a^2 + h^2}}{h}\right) + \pi a \sqrt{a^2 + h^2}$$

Номер 71.1(е)

Найти площадь части поверхности тора

$$x = (b + a \cos \psi) \cos \varphi, y = (b + a \cos \psi) \sin \varphi, z = a \sin \psi, 0 < a \leq b,$$

ограниченной двумя параллелями ψ_1, ψ_2 и двумя меридианами φ_1, φ_2 . Чему равна площадь поверхности всего тора?

Решение

На Рис. 10 изображена данная поверхность при $a = 1, b = 2$

$$E = (b + a \cos \psi)^2$$

$$G = a^2$$

$$F = -(b + a \cos \psi) \sin \varphi (b - a \cos \psi) \cos \varphi +$$

$$+(b + a \cos \psi) \cos \varphi (b - a \cos \psi) \sin \varphi = 0$$

Рис. 9. Общий график - трехмерный

Рис. 10. Общий график - трехмерный

Значит, площадь равна:

$$S = a \int_{\varphi_1}^{\varphi_2} \int_{\psi_1}^{\psi_2} (b + a \cos \psi) d\psi d\varphi = a(\varphi_2 - \varphi_1)(b(\psi_2 - \psi_1) + a(\sin \psi_2 - \sin \psi_1))$$

Получаем, что площадь полного тора равна $4\pi^2 ab$.

Номер 71.2

Вычислить поверхностный интеграл

$$\iint_S \frac{dS}{x + \sqrt{y^2 + z^2}},$$

где S - поверхность, полученная при вращении дуги параболы

$$x = a \cos^4 t, y = a \sin^4 t$$

относительно оси Ox

Решение

На Рис. 11 изображена данная поверхность при $a = 1$

Значит, площадь равна:

$$S = a \int_{\varphi_1}^{\varphi_2} \int_{\psi_1}^{\psi_2} (b + a \cos \psi) d\psi d\varphi =$$

$$= a(\varphi_2 - \varphi_1)(b(\psi_2 - \psi_1) + a(\sin \psi_2 - \sin \psi_1))$$

Получаем, что площадь полного тора равна $4\pi^2 ab$.

Рис. 11. Общий график - трехмерный

Номер 71.3(г)

Вычислить следующий поверхностный интеграл первого рода:

$$\iint_S z^2 dS,$$

где S - часть поверхности конуса:

$$x = r \cos \varphi \sin \alpha, y = r \sin \varphi \sin \alpha, z = r \cos \alpha,$$

$$0 \leq r \leq a, 0 \leq \varphi \leq 2\pi, 0 < \alpha < \frac{\pi}{2} - \text{постоянная}$$

Решение

На Рис. 12 изображена данная поверхность при $a = 2\pi$, $\alpha = \frac{\pi}{6}$

При вращении относительно оси Ox кривой:

$$\begin{aligned}x &= a \cos^4 t \\y &= a \sin^4 t \\y^2 + z^2 &= a^2 \sin^8 t\end{aligned}$$

,
получаем поверхность:

$$\begin{aligned}x &= a \cos^4 t \\y &= a \sin^4 t \cos \varphi \\z &= a \sin^4 t \sin \varphi\end{aligned}$$

Отсюда получаем:

$$E = 16a^2 \cos^6 t \sin^2 t + 16a^2 \sin^6 t \cos^2 t \cos^2 \varphi + 16a^2 \sin^6 t \cos^2 t \sin^2 \varphi$$

$$G = a^2 \sin^8 t$$

$$F = 0$$

Тогда данный интеграл равен:

$$\begin{aligned}\iint_S \frac{dS}{x + \sqrt{y^2 + z^2}} &= \int_0^{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{4a^2 \sqrt{\cos^6 t \sin^{10} t + \cos^2 t \sin^{14} t}}{a \cos^4 t + a \sin^4 t} dt = 2\pi \int_0^{2\pi} \frac{4a |\cos t| |\sin t|^5}{\sqrt{\cos^4 t + \sin^4 t}} dt = \\&= 32\pi a \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos t \sin^5 t}{\sqrt{\cos^4 t + \sin^4 t}} dt = [u = \sin t] = 32\pi a \int_0^1 \frac{u^5 du}{\sqrt{(1-u^2)^2 + u^4}} = [v = u^2] = \\&= 16\pi a \int_0^1 \frac{v^3 dv}{\sqrt{2v^2 - 2v + 1}} = 16\pi a \int_0^1 \frac{v^2 dv}{2(v - \frac{1}{2})^2 + \frac{1}{2}} = \left[w = v - \frac{1}{2} \right] = 16\pi a \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} \frac{(w + \frac{1}{2})^2 dw}{\sqrt{2w^2 + \frac{1}{2}}} = \\&= 8\pi a \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} \frac{(2w^2 + \frac{1}{2}) dw}{\sqrt{2w^2 + \frac{1}{2}}} + 16\pi a \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} \frac{w dw}{\sqrt{2w^2 + \frac{1}{2}}} = 16\sqrt{2}\pi a \left(\frac{1}{8} \ln(1 + \sqrt{2}) + \frac{1}{4\sqrt{2}} \right) = 2\sqrt{2}\pi a \ln(1 + \sqrt{2}) + 4\pi a\end{aligned}$$

Рис. 12. Общий график - трехмерный

Номер 72.4(а)

Вычислить поверхностный интеграл второго рода:

$$\iint_S \frac{dydz}{x} + \frac{dzdx}{y} + \frac{dxdy}{z},$$

где поверхность S представляет собой часть эллипсоида:

$$x = a \cos u \cos v, y = b \sin u \cos v, z = c \sin v, u \in \left[\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{3} \right], v \in \left[\frac{\pi}{6}; \frac{\pi}{4} \right],$$

ориентированного внешней нормалью.

Решение

На Рис. 13 изображена данная поверхность при $a = 1, b = 2, c = 3$

$$A = \begin{vmatrix} b \cos u \cos v & 0 \\ -b \sin u \sin v & c \cos v \end{vmatrix} = bc \cos u \cos^2 v$$

$$B = \begin{vmatrix} 0 & -a \sin u \cos v \\ c \cos v & -a \cos u \sin v \end{vmatrix} = ac \sin u \cos^2 v$$

$$C = \begin{vmatrix} -a \sin u \cos v & b \cos u \cos v \\ -a \cos u \sin v & -b \sin u \sin v \end{vmatrix} = ab \sin v \cos v$$

Нормаль:

$$\vec{n} = \frac{(A, B, C)}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$$

Значит:

$$\begin{aligned} \iint_S \frac{dydz}{x} + \frac{dzdx}{y} + \frac{dxdy}{z} &= \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{4}} \left(\frac{bc \cos u \cos^2 v}{a \cos u \cos v} + \frac{ac \sin u \cos^2 v}{b \sin u \cos v} + \frac{ab \sin v \cos v}{c \sin v} \right) dv du = \\ &= \frac{b^2 c^2 + a^2 c^2 + a^2 b^2}{abc} \left(\frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{1}{2} \right) \frac{\pi}{12} \end{aligned}$$

Рис. 13. Общий график - трехмерный

Номер 73.4(а)

Вычислить криволинейный интеграл второго рода:

$$\oint_C (y^2 - z^2)dx + (z^2 - x^2)dy + (x^2 - y^2)dz,$$

где C - кривая пересечения параболоида $\{x^2 + y^2 + z = 3\}$ с плоскостью $\{x + y + z = 2\}$, ориентированная положительно.

Решение

На Рис. 14 построены заданная кривая (а) и соответствующая поверхность (б), к которым применяется формула Стокса.

Рис. 14. Графики кривой и поверхности

Нормаль к плоскости $z = 2 - x - y$ имеет следующие направляющие косинусы:

$$\cos \alpha = \cos \beta = \cos \gamma = -\frac{1}{\sqrt{3}}$$

Поэтому:

$$\begin{aligned} \oint_C (y^2 - z^2)dx + (z^2 - x^2)dy + (x^2 - y^2)dz &= \iint_S \left(-\frac{1}{\sqrt{3}}(-2y - 2z) - \frac{1}{\sqrt{3}}(-2x - 2z) - \frac{1}{\sqrt{3}}(-2x - 2y) \right) dS = \\ &= \iint_{x^2 - x + y^2 - y \leq 1} (2y + 2(2x - y) + 2x + 2(2x - y) + 2x + 2y) dx dy = 12\pi \end{aligned}$$

Номер 73.4(б)

Вычислить криволинейный интеграл второго рода:

$$\oint_{AmB} (x^2 - yz)dx + (y^2 - xz)dy + (z^2 - xy)dz,$$

где AmB - отрезок винтовой линии

$$x = a \cos \varphi, y = a \sin \varphi, z = \frac{h}{2\pi} \varphi, \varphi \in [0; 2\pi]$$

Решение

На Рис. 15 ($a = 1, h = 2$) изображены заданная кривая (а) и соответствующая поверхность (б), к которым применяется формула Стокса.

а) Кривая

б) Поверхность

Рис. 15. Графики кривой и поверхности

Поскольку

$$\oint_{AmB} + \oint_{BA} = \iint_S \begin{vmatrix} \cos \alpha & \cos \beta & \cos \gamma \\ x^2 - yz & y^2 - xz & z^2 - xy \end{vmatrix} dS = 0$$

Значит, искомый интеграл равен интегралу

$$\oint_{AB} = \int_0^h a^2 dz = a^2 h$$

Номер 73.4(в)

Вычислить криволинейный интеграл второго рода:

$$\oint_C (y+z)dx + (z+x)dy + (x+y)dz,$$

где C есть эллипс

$$x = a \sin^2 t, y = 2a \sin t \cos t, z = a \cos^2 t, 0 \leq t \leq \pi,$$

пробегаемый в направлении возрастания параметра t .

Решение

На Рис. 16 ($a = 1$) изображены заданная кривая (а) и соответствующая поверхность (б), к которым применяется формула Стокса.

Рис. 16. Графики кривой и поверхности

$$\oint_C (y+z)dx + (z+x)dy + (x+y)dz = \iint_S \begin{vmatrix} \cos \alpha & \cos \beta & \cos \gamma \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ y+z & z+x & x+y \end{vmatrix} dS = 0$$

Номер 73.4(г)

Вычислить криволинейный интеграл второго рода:

$$\oint_C (y^2 + z^2)dx + (z^2 + x^2)dy + (x^2 + y^2)dz,$$

где C есть кривая

$$\{x^2 + y^2 + z^2 = 2Rx, x^2 + y^2 = 2rx, 0 < r < R, z > 0\},$$

пробегаемая так, что ограниченная ею на внешней стороне сферы $\{x^2 + y^2 + z^2 = 2Rx\}$ наименьшая область, остается слева.

Решение

На Рис. 17 ($r = 1, R = 2$) построены заданная кривая (а) и соответствующая поверхность (б), к которым применяется формула Стокса.

а) Кривая

б) Поверхность

Рис. 17. Графики кривой и поверхности

$$I = 2 \iint_S (y-z)dydz + (z-x)dzdx + (x-y)dxdy = 2 \iint_S ((y-z) \cos \alpha + (z-x) \cos \beta + (x-y) \cos \gamma) dS$$

На множестве S выполнены равенства:

$$z = \sqrt{2Rx - x^2 - y^2}, z'_x = \frac{R-x}{z}, z'_y = -\frac{y}{z}$$

Так как вектор n и орт k оси Oz образуют острый угол, то в формулах для вычисления $\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma$ перед радикалом в знаменателе следует взять знак "+". Учитывая, что $dS = \sqrt{1 + z'^2_x + z'^2_y}$, получим:

$$\begin{aligned}
I &= 2 \iint_D ((y - z(x, y))(-z'_x(x, y)) + (z(x, y) - x)(-z'_y(x, y)) + (x - y)) dx dy = \\
&= \iint_D \left(\frac{(y - z(x, y))(x - R) + (z(x, y) - x)y}{z(x, y)} + x - y \right) dx dy = 2R \iint_D \left(1 - \frac{y}{z(x, y)} \right) dx dy,
\end{aligned}$$

где $D = \{x^2 + y^2 \leq 2rx\}$. Так как

$$\iint_D \frac{y}{z(x, y)} dx dy = \int_0^r dx \int_{-\sqrt{2rx-x^2}}^{\sqrt{2rx-x^2}} \frac{y dy}{\sqrt{2Rx - x^2 - y^2}} = 0,$$

то окончательно имеем:

$$I = 2R \iint_D dx dy = 2\pi Rr^2$$

Номер 73.4(д)

Вычислить криволинейный интеграл второго рода:

$$\oint_C (y^2 - z^2) dx + (z^2 - x^2) dy + (x^2 - y^2) dz,$$

где C - сечение поверхности куба $\{0 \leq x \leq a, 0 \leq y \leq a, 0 \leq z \leq a\}$ плоскостью $\{x + y + z = \frac{3}{2}a\}$, пробегаемое против хода часовой стрелки, если смотреть со стороны положительной стороны оси Ox .

Решение

На Рис. 18 ($a = 1$) построены заданная кривая (а) и соответствующая поверхность (б), к которым применяется формула Стокса.

Рис. 19. График кривой с разных точек обзора

При изменении t от 0 до π подвижная точка $M = (x, y, z)$ пробегает часть заданной кривой от точки $M_0 = (a, a, a)$ до точки $M_1 = (-a, a, -a)$, а при изменении t от 0 до 2π точка M пробегает ту же самую часть кривой в противоположном направлении - от точки M_1 до точки M_0 . Таким образом, точки замкнутой кривой взаимно накладываются, и эта кривая не ограничивает никакой поверхности. Поэтому $I = 0$.

Номер 73.4(ж)

Вычислить криволинейный интеграл второго рода:

$$\oint_C 2xydx + z^2dy + x^2dz,$$

где C - эллипс $\{2x^2 + 2y^2 = z^2, x + z = a\}$, положительно ориентированный на верхней стороне плоскости.

Решение

На Рис. 20 ($a = 1$) построены заданная кривая (а) и соответствующая поверхность (б), к которым применяется формула Стокса.

Рис. 20. Графики кривой и поверхности

Нормаль к поверхности:

$$\vec{n} = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, \frac{1}{\sqrt{2}} \right)$$

Значит:

$$\begin{aligned} \oint_C 2xydx + z^2dy + x^2dz &= \iint_S \left(\frac{1}{\sqrt{2}}(-2z) - \frac{1}{\sqrt{2}}(-2x) \right) dS = \sqrt{2}a \iint_S dS = 2a \iint_{(x+a)^2 + 2y^2 \leq 2a^2} dx dy = \\ &= \left[x = -a + \sqrt{2}t \cos \varphi, y = r \sin \varphi, J = r\sqrt{2} \right] = 2\sqrt{2}a \int_0^{2\pi} \int_0^a r dr d\varphi = 2\pi\sqrt{2}a^3 \end{aligned}$$

Номер 73.4(з)

Вычислить криволинейный интеграл второго рода:

$$\oint_L zdx + 2xdy - ydz,$$

где L - кривая $\{x^2 + y^2 = 2ax, az = xy, z \geq 0\}$, от точки $A(0, 0, 0)$ до точки $B(2a, 0, 0)$, $a > 0$.

Решение

На Рис. 21 ($a = 1$) изображены заданная кривая (а) и соответствующая поверхность (б), к которым применяется формула Стокса.

а) Кривая

б) Поверхность

Рис. 21. Графики кривой и поверхности

Нормаль к поверхности:

$$\vec{n} = \left(\frac{y}{a}, \frac{x}{a}, -1 \right)$$

Значит:

$$\begin{aligned} \oint_L z dx + 2x dy - y dz + \oint_{BA} &= \iint_S (-\cos \alpha + \cos \beta + 2 \cos \gamma) dS = \iint_{x^2+y^2 \leq 2ax} \left(-\frac{y}{a} + \frac{x}{a} - 2 \right) dx dy = \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \int_0^{2a \cos \varphi} \left(-\frac{r}{a} \sin \varphi + 1 + r \cos \varphi - 2 \right) r dr d\varphi = \frac{1}{6} a^2 (3\pi(a-1) - 4) \end{aligned}$$

Номер 74.2(б)

Найти объем тела, ограниченного поверхностью:

$$x = u \cos v, y = u \sin v, z = -u + a \cos v, (u \geq 0, a > 0)$$

и плоскостями $x = 0$ и $z = 0$.

Решение

На Рис. 22 ($a = 1$) построена заданная поверхность.

Рис. 22. График поверхности с разных точек обзора

Для вычисления объема применим формулу Остроградского:

$$V = \frac{1}{3} \iint_S (x \cos \alpha + y \cos \beta + z \cos \gamma) dS = \frac{1}{3} \left(\iint_{l_1} \text{imits}_{S_1} + \iint_{l_1} \text{imits}_{S_2} \right)$$

$$S_1 : z = \frac{ax - (x^2 + y^2)}{\sqrt{x^2 + y^2}}$$

Нормаль к S_1 :

$$A = \begin{vmatrix} \sin v & -1 \\ u \cos v & -a \sin v \end{vmatrix} = -a \sin^2 v + u \cos v$$

$$B = \begin{vmatrix} -1 & \cos v \\ -a \sin v & -u \sin v \end{vmatrix} = u \sin v + a \sin v \cos v$$

$$C = u$$

$$\iint_{S_1} dS = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \int_0^{a \cos u} u \cos v (a \sin^2 v + u \cos v) + u \sin v (u \sin v + a \sin v \cos v) + (-u + a \cos v) u du dv =$$

$$= \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \int_0^{a \cos u} a u \cos v du dv = \frac{a^3}{2} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos^3 v dv = a^3 \int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 - \sin^2 v) d(\sin v) = \frac{2a^3}{3}$$

$$S_2 : z = 0, x^2 + y^2 \leq ax$$

Нормаль к S_2 :

$$\vec{n} = (0, 0, -1)$$

$$\iint_{S_2} dS = 0$$

Значит, объем равен:

$$V = \frac{2a^3}{9}$$

Номер 74.4(в)

С помощью формулы Остроградского-Гаусса вычислите следующий поверхностный интеграл:

$$\int_S (x - y + z)dydz + (y - z + x)dzdx + (z - x + y)dxdy,$$

где S - внешняя сторона поверхности

$$\{|x - y + z| + |y - z + x| + |z - x + y| = 1\}$$

Решение

На Рис. 23 построена заданная поверхность.

Рис. 23. График поверхности с разных точек обзора

T - тело, ограниченное поверхностью S . Тогда:

$$\begin{aligned} I &= \iiint_T \left(\frac{\partial}{\partial x}(x - y + z) + \frac{\partial}{\partial y}(y - z + x) + \frac{\partial}{\partial z}(z - x + y) \right) dx dy dz = 3 \iiint_T = \\ &= \left[u = x - y + z, v = y - z + x, w = z - x + y, J = \frac{1}{4} \right] = \frac{3}{4} \iiint_{|u|+|v|+|w|\leq 1} dudv dw = \end{aligned}$$

$$= 6 \int_0^1 du \int_0^{1-u} dv \int_0^{1-u-v} dw = 6 \int_0^1 du \int_0^{1-u} (1-u-v)dv = 6 \int_0^1 \frac{(1-u)^2}{2} du = 1$$

Номер 74.4(е)

С помощью формулы Остроградского-Гаусса вычислите следующий поверхностный интеграл:

$$\int_S y^2 dz dx - x^2 dy dz + z^2 dx dy,$$

где S - часть поверхности тела

$$V = \{2x^2 + 2y^2 \leq az \leq x^2 + y^2 + a^2\}, a > 0$$

Решение

На Рис. 24 ($a = 1$) построена заданная поверхность.

Рис. 24. График поверхности с разных точек обзора

$$\begin{aligned} \int_S y^2 dz dx - x^2 dy dz + z^2 dx dy &= \iiint_V (-2x + 2y + 2z) dx dy dz = \iint_{x^2+y^2 \leq a^2} \int_{\frac{2x^2+2y^2}{a}}^{\frac{x^2+y^2+a^2}{a}} (-2x+2y+2z) dz dx dy = \\ &= \int_0^\pi \int_0^a (-2x+2y) \left(\frac{a^2-x^2-y^2}{a} \right) r dr d\varphi + \int_0^\pi \int_0^a \left(\left(\frac{x^2+y^2+a^2}{a} \right)^2 - \left(\frac{2x^2+2y^2}{a} \right)^2 \right) r dr d\varphi = a^3 + \frac{\pi a^4}{2} \end{aligned}$$

Номер 75.8(а)

Найти поток поля:

$$\vec{a} = yi + zj + xk$$

через поверхность

$$S = \{\sqrt{x} + \sqrt{y} + \sqrt{z} = \sqrt{r}\},$$

если нормаль $\vec{n}$ направлена от начала координат.

Решение

На Рис. 25 ($r = 1$) построена заданная поверхность.

Рис. 25. График поверхности с разных точек обзора

По формуле Остроградского:

$$\iint_S a_n dS = \iiint_S (a_x \cos \alpha + a_y \cos \beta + a_z \cos \gamma) dS = \iiint_V \operatorname{div} a dx dy dz,$$

где a_n - проекция $\vec{a}$ в направлении нормали.

Добавим к нашей поверхности области, высекаемые ею на координатных плоскостях. Тогда

$$\iiint_{S \cup S_1 \cup S_2 \cup S_3} = \iiint_V \operatorname{div} a dx dy dz = 0$$

Поэтому наш интеграл равен:

$$\iint_S = - \iint_{S_{yz}} - \iint_{S_{xy}} - \iint_{S_{xz}}$$

$$\begin{aligned} \iint_{S_{yz}} a_n dS &= \iint_{\sqrt{y}+\sqrt{z}\leq\sqrt{r}} (-y) dy dz = [y = \rho \cos^4 \varphi, z = \rho \sin^4 \varphi, J = 4\rho \sin^3 \varphi \cos^3 \varphi] = \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \int_0^r 4\rho \sin^3 \varphi \cos^3 \varphi (-\rho \cos^4 \varphi) d\rho d\varphi = [t = \sin \varphi] = -\frac{4}{3} r^3 \int_0^1 t^3 (1-t^2)^3 dt = -\frac{2}{3} r^3 \left(\frac{1}{2} - 1 + \frac{3}{4} - \frac{1}{5}\right) = \\ &= -\frac{r^3}{30} \end{aligned}$$

$$\iint_{S_{xy}} a_n dS = \iint_{\sqrt{x}+\sqrt{y}\leq\sqrt{r}} (-x) dx dy = -\frac{r^3}{30}$$

$$\iint_{S_{xz}} a_n dS = \iint_{\sqrt{x}+\sqrt{z}\leq\sqrt{r}} (-x) dx dz = -\frac{r^3}{30}$$

Значит, искомый поток равен:

$$\iint_S a_n dS = \frac{r^3}{10}$$

Номер 75.8(б)

Найти поток поля:

$$\vec{a} = x^2 i - y^2 j + z^2 k$$

через поверхность

$$S = \left\{ x^2 + y^2 + z^2 \leq 3R^2, 0 \leq z \leq \sqrt{x^2 + y^2 - R^2}, R > 0 \right\},$$

если нормаль $\vec{n}$ направлена от начала координат.

Решение

На Рис. 26 ($r = 1, R = 2$) построена заданная поверхность.

По формуле Остроградского:

$$\begin{aligned} \iint_S a_n dS &= \iiint_V \operatorname{div} a dx dy dz = \\ &= \iiint_V (2x - 2y + 2z) dx dy dz = \end{aligned}$$

Рис. 26. Общий график - трехмерный

$$\begin{aligned}
&= \iint_{2R^2 \leq x^2 + y^2 \leq 3R^2} \int_0^{\sqrt{3R^2 - x^2 - y^2}} (2x - 2y + 2z) dz dx dy + \iint_{R^2 \leq x^2 + y^2 \leq 2R^2} \int_0^{\sqrt{x^2 + y^2 - R^2}} (2x - 2y + 2z) dz dx dy = \\
&= \iint_{2R^2 \leq x^2 + y^2 \leq 3R^2} (2x - 2y) \sqrt{3R^2 - x^2 - y^2} dx dy + \iint_{2R^2 \leq x^2 + y^2 \leq 3R^2} (3R^2 - x^2 - y^2) dx dy + \\
&\quad + \iint_{R^2 \leq x^2 + y^2 \leq 2R^2} (2x - 2y) \sqrt{x^2 + y^2 - R^2} dx dy + \iint_{R^2 \leq x^2 + y^2 \leq 2R^2} (x^2 + y^2 - R^2) dx dy = \\
&= \int_0^{2\pi} \int_{\sqrt{2}R}^{\sqrt{3}R} 2r(\cos \varphi - \sin \varphi) \sqrt{3R^2 - r^2} r dr d\varphi + 2\pi \int_{\sqrt{2}R}^{\sqrt{3}R} (3R^2 - r^2) r dr + 2\pi \int_R^{\sqrt{2}R} (r^2 - R^2) r dr = \\
&= 2\pi \left(\frac{3R^4}{2} - \frac{5R^4}{4} + \frac{3R^4}{4} - \frac{R^4}{2} \right) = \pi R^4
\end{aligned}$$