

1 LU-разложение матрицы

LU-разложением матрицы A называется разложение вида $A = LU$, где L - нижнетреугольная матрица с единицами на диагонали, а U - верхнетреугольная матрица с ненулевыми диагональными элементами.

2 Разложение Холецкого

Разложением Холецкого матрицы $A = A^T > 0$ называется разложение вида $A = LL^T$, где L - нижнетреугольная матрица с положительными числами на диагонали.

3 QR - разложение матрицы

QR разложением матрицы A называется разложение вида $A = QR$, где Q - ортогональная матрица, а R - верхнетреугольная с положительными числами на диагонали.

4 Матрица вращения

Матрицей вращения называется матрица следующего вида:

$$\begin{pmatrix} 1 & \dots & 0 & \dots & 0 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & \dots & C_{ki} & \dots & S_{ki} & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & \dots & -S_{ki} & \dots & C_{ki} & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & \dots & 0 & \dots & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix}$$

, где C_{ki}, S_{ki} - косинус и синус некоторого угла.

5 Матрица отражения

Пусть гиперплоскость описывается единичным вектором u , который ортогонален ей, тогда $H = I - 2uu^T$ - матрица отражений(Хаусхолдера). $H_u(x) = x - 2(x, u)u$ - оператор отражения (Хаусхолдера).

6 Ленточная матрица

Матрица $A = (a_{ij}) \in R^{n \times n}$ называется ленточной, если $a_{ij} = 0$ при $i - j > p$, $a_{ij} = 0$ при $j - i > q$, для некоторых $p, q \in \overline{0, n - 1}$. Причем:

1. Если $\exists i_1, j_1 : i_1 - j_1 = p, a_{i_1 j_1} \neq 0$, то p - нижняя ширина ленты матрицы A .
2. Если $\exists i_2, j_2 : j_1 - i_1 = q, a_{i_2 j_2} \neq 0$, то q - верхняя ширина ленты матрицы A .

7 Полуширина ленточной матрицы

Пусть матрица A - ленточная и $p = q$, тогда число $p = q$ называется полушириной матрицы A .

8 Число обусловленности матрицы

Пусть $A \in R^{n \times n}$, $|A| \neq 0$ тогда число обусловленности матрицы: $cond(A) = \|A\| \|A^{-1}\|$

9 Матрица перестановок

Матрица перестановок общего вида - матрица, которая получается из единичной перестановкой некоторого количества строк. В каждой строке и каждом столбце этой матрица 1 элемент отличный от 0, этот элемент равен 1.

10 PLU разложение матрицы

PLU разложением матрицы A называется разложение вида $A = PLU$, где P - матрица перестановок, L - нижнетреугольная матрица с единицами на диагонали, а U - верхнетреугольная матрица с ненулевыми диагональными элементами

11 Энергетическая норма

$\|x\|_D = (Dx, x)^{1/2}$, где D - положительно определённый оператор.

12 Предобуславливатель

Матрица P называется предобуславливателем для A , если у $P^{-1}A$ число обусловленности меньше, чем у A .

13 Многочлен наилучшего равномерного приближения

Многочлен наилучшего приближения - наилучшее приближение функции $f(x)$ многочленом степени $\leq m$. Пусть E^N - евклидово пространство, $L = L(\phi_1, \dots, \phi_n)$, $n < N$, $\dim L = n$. $\forall x \in E^N \|x - \sum_{k=1}^n \alpha_k \phi_k\|_E \rightarrow \min$. $\exists! p \in L, h \in L^T : x = p + h$ - наилучшее приближение.

14 Многочлены Чебышева первого рода

$$P_0(x) = 1, P_1(x) = x. P_{n+1}(x) = 2x * P_n(x) - P_{n-1}(x).$$

15 Невязка

$AX = B$. Вектор невязки: $R = B - AX'$, где X' - приближенное решение.

16 А - сопряженные векторы

Вектора p^1, p^2, \dots, p^m называются А-сопряженными, если $(Ap^i, p^j) = \begin{cases} = 0, i \neq j \\ \neq 0, i = j \end{cases}$

17 Пространства Крылова

Пространством Крылова, порожденным матрицей А и вектором f называют пространство $K^{(m)} = \text{span}\{f, Af, \dots, A^{m-1}f\}$

18 Подобные матрицы

Квадратные матрицы А и В одинакового порядка называются подобными, если существует невырожденная матрица Р того же порядка, такая что $B = P^{-1}AP$

19 Ортогонально подобные матрицы

Квадратные матрицы А и В одинакового порядка называются подобными, если существует ортогональная матрица Р того же порядка, такая что $B = P^{-1}AP$

20 Отношение Рэлея

Отношением Рэлея для матрицы A называется выражения вида

$$R(x) = \frac{(Ax, x)}{(x, x)}, x \neq 0.$$

21 Матрица подобия

Невырожденная матрица P называется матрицей подобия между A, B, если $B = P^{-1}AP$.

22 Матрица Хесенберга

Квадратная ленточная матрица с нижней полушириной $p_1 = 1$ и верхней по шириной $p_2 = n - 1$.