

С. Л. СОБОЛЕВ

# УРАВНЕНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ

ИЗДАНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

*Допущено  
Министерством  
высшего образования РСФСР  
в качестве учебника  
для студентов механико-математических  
и физико-математических факультетов  
государственных университетов*



ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»  
ГЛАВНАЯ РЕДАКЦИЯ  
ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  
МОСКВА 1966

517.2

С 54

УДК 517. 91 (075. 8)

# ОГЛАВЛЕНИЕ

|                                                                                                   |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Предисловие к третьему изданию . . . . .                                                          | 7  |
| Предисловие к первому изданию . . . . .                                                           | 8  |
| Л е к ц и я I. Вывод основных уравнений . . . . .                                                 | 9  |
| § 1. Формула Остроградского . . . . .                                                             | 9  |
| § 2. Уравнение колебаний струны . . . . .                                                         | 11 |
| § 3. Уравнение колебаний мембраны . . . . .                                                       | 14 |
| § 4. Уравнение неразрывности при движении жидкости и уравнение Лапласа . . . . .                  | 16 |
| § 5. Уравнение передачи тепла . . . . .                                                           | 19 |
| § 6. Звуковые волны . . . . .                                                                     | 23 |
| Л е к ц и я II. Постановка задач математической физики. Пример Адамара . . . . .                  | 28 |
| § 1. Начальные и краевые условия . . . . .                                                        | 28 |
| § 2. Зависимость решения от предельных условий. Пример Адамара . . . . .                          | 32 |
| Л е к ц и я III. Классификация линейных уравнений 2-го порядка . . . . .                          | 39 |
| § 1. Линейные уравнения и квадратичные формы. Канонический вид уравнения . . . . .                | 39 |
| § 2. Канонический вид уравнений с двумя независимыми переменными . . . . .                        | 44 |
| § 3. Второй канонический вид гиперболических уравнений с двумя независимыми переменными . . . . . | 47 |
| § 4. Характеристики . . . . .                                                                     | 48 |
| Л е к ц и я IV. Уравнение колебаний струны и его решение методом Даламбера . . . . .              | 52 |
| § 1. Формула Даламбера. Неограниченная струна . . . . .                                           | 52 |
| § 2. Струна с двумя закрепленными концами . . . . .                                               | 55 |
| § 3. Решение задачи для неоднородного уравнения и для более общих граничных условий . . . . .     | 57 |
| Л е к ц и я V. Метод Римана . . . . .                                                             | 63 |
| § 1. Первая краевая задача для гиперболических уравнений . . . . .                                | 63 |
| § 2. Сопряженные дифференциальные операторы . . . . .                                             | 67 |
| § 3. Метод Римана . . . . .                                                                       | 70 |
| § 4. Функция Римана для сопряженного уравнения . . . . .                                          | 74 |
| § 5. Некоторые качественные следствия формулы Римана . . . . .                                    | 76 |

|                                                                                                |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>Л е к ц и я VI. Кратные интегралы</b> . . . . .                                             | 78  |
| § 1. Замкнутые и открытые множества точек . . . . .                                            | 79  |
| § 2. Интегралы по открытым множествам от непрерывных функций . . . . .                         | 84  |
| § 3. Интегралы по ограниченным замкнутым множествам от непрерывных функций . . . . .           | 90  |
| § 4. Суммируемые функции . . . . .                                                             | 96  |
| § 5. Неопределенный интеграл от функции одной переменной. Примеры . . . . .                    | 103 |
| § 6. Измеримые множества. Теорема Егорова . . . . .                                            | 106 |
| § 7. Сходимость в среднем суммируемых функций . . . . .                                        | 114 |
| § 8. Теорема Лебега — Фубини . . . . .                                                         | 124 |
| <b>Л е к ц и я VII. Интегралы, зависящие от параметра</b> . . . . .                            | 128 |
| § 1. Интегралы, равномерно сходящиеся при данном значении параметра . . . . .                  | 128 |
| § 2. Производная по параметру от несобственных интегралов . . . . .                            | 131 |
| <b>Л е к ц и я VIII. Уравнение распространения тепла</b> . . . . .                             | 136 |
| § 1. Фундаментальное решение . . . . .                                                         | 136 |
| § 2. Решение задачи Коши . . . . .                                                             | 142 |
| <b>Л е к ц и я IX. Уравнения Лапласа и Пуассона</b> . . . . .                                  | 149 |
| § 1. Теорема максимума . . . . .                                                               | 149 |
| § 2. Фундаментальное решение. Формула Грина . . . . .                                          | 151 |
| § 3. Потенциалы объема, простого слоя и двойного слоя . . . . .                                | 153 |
| <b>Л е к ц и я X. Некоторые общие следствия из формулы Грина</b> . . . . .                     | 159 |
| § 1. Теорема о среднем арифметическом . . . . .                                                | 159 |
| § 2. Поведение гармонической функции вблизи особой точки . . . . .                             | 163 |
| § 3. Поведение гармонической функции на бесконечности. Взаимно сопряженные точки . . . . .     | 167 |
| <b>Л е к ц и я XI. Уравнение Пуассона в неограниченной среде. Ньютонов потенциал</b> . . . . . | 171 |
| <b>Л е к ц и я XII. Решение задачи Дирихле для шара</b> . . . . .                              | 176 |
| <b>Л е к ц и я XIII. Задачи Дирихле и Неймана для полупространства</b> . . . . .               | 185 |
| <b>Л е к ц и я XIV. Волновое уравнение и запаздывающие потенциалы</b> . . . . .                | 193 |
| § 1. Характеристики волнового уравнения . . . . .                                              | 193 |
| § 2. Метод Кирхгофа для решения задачи Коши . . . . .                                          | 194 |
| <b>Л е к ц и я XV. Свойства потенциалов простого и двойного слоя</b> . . . . .                 | 208 |
| § 1. Общие замечания . . . . .                                                                 | 208 |
| § 2. Свойства потенциала двойного слоя . . . . .                                               | 209 |
| § 3. Свойства потенциала простого слоя . . . . .                                               | 216 |
| § 4. Правильная нормальная производная . . . . .                                               | 225 |
| § 5. Нормальная производная потенциала двойного слоя . . . . .                                 | 226 |
| § 6. Поведение потенциалов на бесконечности . . . . .                                          | 228 |

|                                                                                           |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Л е к ц и я XVI. Сведение задач Дирихле и Неймана к интегральным уравнениям . . . . .     | 229 |
| § 1. Постановка задач и единственность их решений . . . . .                               | 229 |
| § 2. Интегральные уравнения для поставленных задач . . . . .                              | 232 |
| Л е к ц и я XVII. Уравнения Лапласа и Пуассона на плоскости . . .                         | 235 |
| § 1. Фундаментальное решение . . . . .                                                    | 235 |
| § 2. Основные задачи . . . . .                                                            | 237 |
| § 3. Логарифмический потенциал . . . . .                                                  | 241 |
| Л е к ц и я XVIII. Теория интегральных уравнений . . . . .                                | 244 |
| § 1. Общие замечания . . . . .                                                            | 244 |
| § 2. Метод последовательных приближений . . . . .                                         | 245 |
| § 3. Уравнение Вольтерра . . . . .                                                        | 249 |
| § 4. Уравнения с вырожденным ядром . . . . .                                              | 251 |
| § 5. Ядро специального вида. Теоремы Фредгольма . . . . .                                 | 256 |
| § 6. Обобщение результатов . . . . .                                                      | 261 |
| § 7. Уравнения с неограниченными ядрами специального вида . .                             | 264 |
| Л е к ц и я XIX. Применение теории Фредгольма к решению задач Дирихле и Неймана . . . . . | 267 |
| § 1. Вывод свойств интегральных уравнений . . . . .                                       | 267 |
| § 2. Исследование уравнений . . . . .                                                     | 269 |
| Л е к ц и я XX. Функция Грина . . . . .                                                   | 274 |
| § 1. Дифференциальные операторы с одной независимой переменной . . . . .                  | 274 |
| § 2. Сопряженные операторы и сопряженные семейства . . . . .                              | 278 |
| § 3. Основная лемма об интегралах сопряженных уравнений . . .                             | 281 |
| § 4. Функция влияния . . . . .                                                            | 285 |
| § 5. Определение и построение функции Грина . . . . .                                     | 287 |
| § 6. Обобщенная функция Грина для линейного уравнения 2-го порядка . . . . .              | 291 |
| § 7. Примеры . . . . .                                                                    | 296 |
| Л е к ц и я XXI. Функция Грина для оператора Лапласа . . . . .                            | 301 |
| § 1. Функция Грина для задачи Дирихле . . . . .                                           | 301 |
| § 2. Функция Грина для задачи Неймана . . . . .                                           | 306 |
| Л е к ц и я XXII. Корректность постановки краевых задач математической физики . . . . .   | 311 |
| § 1. Уравнение теплопроводности . . . . .                                                 | 311 |
| § 2. Понятие обобщенного решения . . . . .                                                | 314 |
| § 3. Волновое уравнение . . . . .                                                         | 318 |
| § 4. Обобщенные решения волнового уравнения . . . . .                                     | 322 |
| § 5. Свойство обобщенных решений однородных уравнений . . .                               | 329 |
| § 6. Неравенства Буняковского и Минковского . . . . .                                     | 334 |
| § 7. Теорема Рисса — Фишера . . . . .                                                     | 335 |

|                                                                                                                                          |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Л е к ц и я XXIII. Метод Фурье . . . . .                                                                                                 | 338 |
| § 1. Разделение переменных . . . . .                                                                                                     | 338 |
| § 2. Аналогия между задачей о колебании непрерывной среды и колебаниями механических систем с конечным числом степеней свободы . . . . . | 345 |
| § 3. Неоднородное уравнение . . . . .                                                                                                    | 347 |
| § 4. Продольные колебания стержня со свободными концами . . . . .                                                                        | 351 |
| Л е к ц и я XXIV. Интегральные уравнения с вещественным симметрическим ядром . . . . .                                                   | 354 |
| § 1. Простейшие свойства. Вполне непрерывные операторы . . . . .                                                                         | 354 |
| § 2. Доказательство существования собственного значения . . . . .                                                                        | 366 |
| Л е к ц и я XXV. Билинейная формула и теорема Гильберта — Шмидта . . . . .                                                               | 370 |
| § 1. Билинейная формула . . . . .                                                                                                        | 370 |
| § 2. Теорема Гильберта — Шмидта . . . . .                                                                                                | 378 |
| § 3. Обоснование метода Фурье для решения краевых задач математической физики . . . . .                                                  | 381 |
| § 4. Применение теории интегральных уравнений с симметрическим ядром . . . . .                                                           | 390 |
| Л е к ц и я XXVI. Неоднородное интегральное уравнение с симметрическим ядром . . . . .                                                   | 391 |
| § 1. Разложение резольвенты . . . . .                                                                                                    | 391 |
| § 2. Представление решения при помощи аналитических функций . . . . .                                                                    | 393 |
| Л е к ц и я XXVII. Колебания прямоугольного параллелепипеда . . . . .                                                                    | 397 |
| Л е к ц и я XXVIII. Уравнение Лапласа в криволинейных координатах. Примеры применения метода Фурье . . . . .                             | 403 |
| § 1. Уравнение Лапласа в криволинейных координатах . . . . .                                                                             | 403 |
| § 2. Функции Бесселя . . . . .                                                                                                           | 409 |
| § 3. Полное разделение переменных в уравнении $\Delta u = 0$ в полярных координатах . . . . .                                            | 412 |
| Л е к ц и я XXIX. Гармонические полиномы и сферические функции . . . . .                                                                 | 417 |
| § 1. Определение сферических функций . . . . .                                                                                           | 417 |
| § 2. Приближение при помощи сферических функций . . . . .                                                                                | 421 |
| § 3. Задача Дирихле для шара . . . . .                                                                                                   | 424 |
| § 4. Дифференциальные уравнения для сферических функций . . . . .                                                                        | 425 |
| Л е к ц и я XXX. Некоторые простейшие свойства сферических функций . . . . .                                                             | 431 |
| § 1. Представление полиномов Лежандра . . . . .                                                                                          | 431 |
| § 2. Производящая функция . . . . .                                                                                                      | 432 |
| § 3. Формула Лапласа . . . . .                                                                                                           | 435 |
| Предметный указатель . . . . .                                                                                                           | 438 |

## ПРЕДИСЛОВИЕ К ТРЕТЬЕМУ ИЗДАНИЮ

Третье издание курса «Уравнения математической физики» мало отличается от второго, подвергнувшегося серьезной переработке. Уже при втором издании была исключена лекция, посвященная методу Ритца, как стоящая несколько особняком от остального курса. Некоторые упрощения были внесены в теорию кратных интегралов Лебега и в теорию интегральных уравнений. Более точно было проведено обоснование метода Фурье.

Как во втором, так и в третьем издании были произведены отдельные улучшения стиля, исправлены неудачные формулировки.

Кроме того, редактором книги В. С. Рябенким в третьем издании более подробно развита лекция о зависимости решений уравнений математической физики от дополнительных условий.

Автор выражает свою благодарность за ценные замечания, сделанные ему при втором и третьем издании различными лицами. Особенно ценные замечания были сделаны акад. В. И. Смирновым и редактором третьего издания В. С. Рябенким.

*С. Соболев*

В четвертом издании исправлены замеченные опечатки и неточности.

---

## ПРЕДИСЛОВИЕ К ПЕРВОМУ ИЗДАНИЮ

Эта книга составлена в результате переработки курса лекций, читанного автором в Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова. Поэтому автор сохранил за отдельными лекциями их название. Этим объясняется и подбор материала, который был ограничен в объеме количеством лекционных часов.

Автор выражает свою глубокую благодарность акад. В. И. Смирнову, прочитавшему книгу в рукописи, за ряд весьма ценных замечаний, а также проф. В. В. Степанову за полезные указания.

*С. Соболев*

# ЛЕКЦИИ

## ВЫВОД ОСНОВНЫХ УРАВНЕНИЙ

Предмет теории уравнений математической физики составляет изучение дифференциальных, интегральных и функциональных уравнений, описывающих различные явления природы. Точные рамки этой дисциплины, как это обычно бывает, определить довольно трудно. Кроме того, большое разнообразие вопросов, относящихся к уравнениям математической физики, не позволяет охватить их сколько-нибудь полно в университетском курсе. Содержание настоящей книги составляет лишь часть обширной теории уравнений математической физики. В нее вошло только то, что казалось нам наиболее важным для первоначального ознакомления с этой теорией.

Наш курс будет посвящен по преимуществу изучению уравнений в частных производных 2-го порядка с одной неизвестной функцией, в частности волнового уравнения, уравнения Лапласа и уравнения теплопередачи, обычно называемых *классическими уравнениями математической физики*.

Попутно мы разовьем необходимую теорию смежных вопросов.

### § 1. Формула Остроградского

Прежде чем переходить к выводу тех уравнений математической физики, которыми мы будем в дальнейшем заниматься, напомним одну формулу интегрального исчисления, касающуюся преобразования поверхностных интегралов в объемные.

Пусть  $P(x, y, z)$ ,  $Q(x, y, z)$  и  $R(x, y, z)$  — три функции переменных  $x$ ,  $y$ ,  $z$ , заданные в некоторой области  $D$  и имеющие в ней непрерывные производные первого порядка по  $x$ ,  $y$  и  $z$ .

Рассмотрим в  $D$  некоторую замкнутую поверхность  $S$ , которая состоит из конечного числа кусков с непрерывно меняющейся на них касательной плоскостью.

Такую поверхность называют *кусочно гладкой*. Мы будем, кроме того, предполагать, что прямые, параллельные координатным осям, встречаются ее либо в конечном числе точек, либо имеют общим целый отрезок.

Рассмотрим интеграл

$$\iint_S [P \cos(n, x) + Q \cos(n, y) + R \cos(n, z)] dS, \quad (I.1)$$

где через  $\cos(n, x)$ ,  $\cos(n, y)$  и  $\cos(n, z)$  обозначены косинусы углов, составленных *внутренней нормалью* к поверхности  $S$  с осями координат, а  $dS$  — положительный элемент поверхности. Пользуясь векторными обозначениями, мы можем считать  $P$ ,  $Q$ ,  $R$  компонентами <sup>1)</sup> некоторого вектора, который обозначим одной буквой  $T$ . Тогда

$$P \cos(n, x) + Q \cos(n, y) + R \cos(n, z) = T_n,$$

где  $T_n$  — проекция вектора  $T$  на направление внутренней нормали.

Классическая теорема интегрального исчисления позволяет перейти от поверхностного интеграла (I.1) к объемному, распространенному на область  $D$ , ограниченную поверхностью  $S$ , удовлетворяющей перечисленным выше ограничениям. Мы будем иметь:

$$\begin{aligned} \iint_S [P \cos(n, x) + Q \cos(n, y) + R \cos(n, z)] dS = \\ = - \iiint_D \left( \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dx dy dz \end{aligned}$$

или в векторных обозначениях

$$\iint_S T_n dS = - \iiint_D \operatorname{div} T dv, \quad (I.2)$$

где  $dv$  обозначает дифференциал объема, а

$$\operatorname{div} T = \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \quad (I.3)$$

(знак  $\operatorname{div}$  читается «расходимость»).

Приведенная нами формула справедлива в более общих предположениях относительно  $S$ . В частности, формула (I.2) имеет место для любой кусочно гладкой поверхности  $S$ , ограничивающей некоторую область  $D$ .

В дальнейшем, если не будет сделано оговорок, под словом «поверхность» мы будем понимать кусочно гладкую поверхность.

Из формулы (I.2) вытекает важное следствие.

**Л е м м а 1.** Пусть  $F$  — непрерывная функция, заданная в некоторой области трехмерного евклидова пространства. Для того чтобы для любой замкнутой поверхности  $S$ , проведенной внутри

<sup>1)</sup> Относительно  $P$ ,  $Q$ ,  $R$  предполагается, что они непрерывны вплоть до границы и имеют непрерывные первые производные внутри области  $D$ .

области задания векторной функции  $T$  и ограничивающей область  $\Omega$ , имело место равенство

$$\iint_S T_n dS - \iiint_{\Omega} F dv = 0, \quad (I.4)$$

необходимо и достаточно, чтобы

$$\operatorname{div} T + F = 0.$$

Применяя формулу (I.2), равенство (I.4) можно привести к виду

$$\iiint_{\Omega} (\operatorname{div} T + F) dv = 0.$$

После этого достаточность условия леммы становится очевидной. Установим его необходимость. В самом деле, если бы в некоторой точке  $A$ , а тем самым в силу непрерывности и в ее окрестности, функция  $\operatorname{div} T + F$  была бы отлична от нуля, например положительна, то интеграл

$$\iiint_{\omega} (\operatorname{div} T + F) dv,$$

распространенный по малой области  $\omega$  вокруг  $A$ , был бы не равен нулю и левая часть (I.4) была бы также отлична от нуля. Следовательно, наше предположение противоречит условию. Необходимость равенства

$$\operatorname{div} T + F = 0$$

доказана.

Точно таким же образом может быть доказана аналогичная лемма для двумерной области, лежащей на плоскости.

## § 2. Уравнение колебаний струны

Рассмотрим струну, натянутую между двумя точками. *Струной* называют твердое тело, в котором длина значительно превосходит остальные размеры. Сила натяжения, действующая на это тело, предполагается значительной. Поэтому его сопротивлением при изгибании можно пренебречь по сравнению с натяжением.

Пусть направление этой струны совпадает в состоянии покоя с направлением оси  $Ox$ . Под влиянием поперечных сил она примет другую форму, вообще говоря, непрямолинейную.

Если мы в некоторой точке  $x$  разрежем струну на две части, то влияние правой части на левую выразится в виде силы  $T(x)$ , направленной по касательной к линии струны (рис. 1). Допустим, для простоты рассуждений, что движение струны происходит в одной плоскости, и обозначим через  $u$  отклонение струны от положения равновесия. Пусть уравнение изогнутой линии струны

в плоскости  $xOy$  будет  $u = u(x, t)$ . Обозначим через  $\rho(x)$  погонную плотность струны, т. е. предел отношения массы малого участка струны к его длине.

Рассмотрим сначала струну, находящуюся в равновесии.

Допустим, что струна находится под действием поперечно действующей нагрузки  $p(x)$ . Иными словами, если мы выделим

участок ее  $x_1 \leq x \leq x_2$ , то приложенная к этому участку сила направлена по оси  $u$  и величина

ее равна  $\int_{x_1}^{x_2} p(x) dx$ . Обозначим

через  $\alpha(x)$  угол, образованный направлением касательной к струне с осью  $Ox$ ; тогда проекция на ось  $u$  силы натяжения, действующей в точке  $x_2$ , будет

$|T(x_2)| \sin \alpha(x_2) = T(x_2) \sin \alpha(x_2)$ ,

где  $T(x)$  — абсолютная величина (длина) вектора  $T(x)$ , а проекция натяжения на ось  $u$  в точке  $x_1$  будет:

$$- |T(x_1)| \sin \alpha(x_1) = -T(x_1) \sin \alpha(x_1).$$

Заметим, что

$$\sin \alpha = \frac{\frac{\partial u}{\partial x}}{\sqrt{1 + \left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)^2}}.$$

Считая величину  $\frac{\partial u}{\partial x}$  малой и пренебрегая ее квадратом, получим условие равновесия участка струны в виде

$$T \frac{\partial u}{\partial x} \Big|_{x=x_2} - T \frac{\partial u}{\partial x} \Big|_{x=x_1} + \int_{x_1}^{x_2} p(x) dx = 0. \quad (1.5)$$

Очевидно,

$$T \frac{\partial u}{\partial x} \Big|_{x=x_2} - T \frac{\partial u}{\partial x} \Big|_{x=x_1} = \int_{x_1}^{x_2} \frac{\partial}{\partial x} \left( T \frac{\partial u}{\partial x} \right) dx.$$

Условие (1.5) переходит при этом в условие:

$$\int_{x_1}^{x_2} \left[ \frac{\partial}{\partial x} \left( T \frac{\partial u}{\partial x} \right) + p(x) \right] dx = 0. \quad (1.6)$$

Подынтегральная функция в (1.6) должна, очевидно, обратиться в нуль тождественно (иначе нашлись бы такие  $x_1, x_2$ , для которых

интеграл (I.6) не обратился бы в нуль), и уравнение (I.6) переписывается в виде

$$\frac{\partial}{\partial x} \left( T \frac{\partial u}{\partial x} \right) + p(x) = 0. \quad (\text{I.7})$$

Уравнение (I.7) и есть *уравнение равновесия струны при поперечной нагрузке*  $p(x)$ .

Если мы теперь перейдем от статического случая к динамическому, т. е. рассмотрим колебания струны, то, пользуясь принципом Даламбера, нужно будет в уравнение равновесия включить еще и силы инерции струны, которые имеют вид

$$\int_{x_1}^{x_2} \left( -\rho(x) \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} \right) dx;$$

тогда условие равновесия примет вид

$$\int_{x_1}^{x_2} \left[ \frac{\partial}{\partial x} \left( T \frac{\partial u}{\partial x} \right) - \rho(x) \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} + p(x) \right] dx = 0,$$

и *уравнение колебаний струны* будет

$$\frac{\partial}{\partial x} \left( T \frac{\partial u}{\partial x} \right) - \rho(x) \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} + p(x) = 0. \quad (\text{I.8})$$

Будем считать колебания струны поперечными. Тогда составляющая по оси  $Ox$  суммы всех сил, приложенных к каждому участку струны, должна быть равна нулю. Так как нагрузка  $p(x)$  также предполагается поперечной, то это позволяет написать равенство

$$T \cos \alpha|_{x=x_2} - T \cos \alpha|_{x=x_1} = 0,$$

где  $x_1$  и  $x_2$  — два произвольных значения.

Отсюда, пренебрегая величинами порядка  $\alpha^2$ , получим:

$$T|_{x=x_1} = T|_{x=x_2},$$

или  $T$  не зависит от  $x$ . Следовательно, в равенстве (I.8)  $T$  можно вынести из-под знака производной по  $x$ . Если, кроме того, предположить, что натяжение  $T$  не зависит от времени, т. е. постоянно, и что плотность  $\rho$  также постоянна, а нагрузка  $p(x)$  равна нулю, то уравнение (I.8) примет вид:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \quad (\text{I.9})$$

где

$$a^2 = \frac{T}{\rho} = \text{const.}$$

Уравнение (I.9) рассматривали еще в XVIII в. Даниил Бернулли, Даламбер и Эйлер.

### § 3. Уравнение колебаний мембраны

Рассмотрим пленку, т. е. очень тонкое твердое тело, натянутое равномерно по всем направлениям. Пусть в спокойном состоянии она расположена в плоскости  $xOy$ . Будем предполагать, что эта пленка столь тонка, что не сопротивляется изгибу. Такую пленку мы будем называть *мембраной*.

Пусть в изогнутом состоянии уравнение ее будет

$$u = u(t, x, y).$$

Какой бы участок  $S$  этой мембраны мы ни выделили, будем считать, что со стороны остальной части мембраны на этот участок действует направленное по нормали к контуру равномерно распределенное натяжение  $T$ , лежащее в касательной плоскости к мембране (рис. 2).

Составим уравнение равновесия участка мембраны  $S$ , ограниченного кривой  $\delta$  и находящегося под действием поперечных сил. Составляющая натяжения на ось  $u$  запишется в виде интеграла

$$\int T \cos(l, u) ds, \quad (I.10)$$

где  $T$  — длина вектора натяжения  $T$ , а через  $l$  обозначен какой-либо вектор, имеющий направление действия натяжения. Вычислим  $\cos(l, u)$ .

Направление  $l$  по условию есть направление общего перпендикуляра к контуру  $\delta$  и к вектору  $v$ , направленному по внутренней нормали  $v$  к поверхности  $u = u(t, x, y)$ . В свою очередь, всякий вектор  $s$ , направленный по касательной к контуру  $\delta$ , перпендикулярен к вектору  $v$  и к единичному вектору  $n$ , направленному по внутренней нормали к проекции контура  $\delta$  на плоскость  $xOy$ , ибо касательная  $s$  и касательная к проекции  $\delta$  на плоскость  $xOy$  лежат в касательной плоскости проектирующего цилиндра.

За вектор  $s$  можно принять векторное произведение

$$n \times v.$$

Рассмотрим вектор  $l_1$ , определенный формулой

$$l_1 = (n \times v) \times v.$$

По формулам аналитической геометрии мы имеем:

$$l_1 = -nv^2 + v(nv).$$




Рис. 2

Принимая во внимание, что вектор  $\mathbf{n}$  имеет составляющие  $\cos(n, x)$ ,  $\cos(n, y)$ , 0, а вектор  $\mathbf{v}$  — составляющие  $-\frac{\partial u}{\partial x}$ ,  $-\frac{\partial u}{\partial y}$ , 1, получим, отбрасывая малые величины 2-го порядка, содержащие  $(\frac{\partial u}{\partial x})^2$ ,  $(\frac{\partial u}{\partial y})^2$  и  $\frac{\partial u}{\partial x} \frac{\partial u}{\partial y}$ , для составляющих  $l_1$  выражения:

$$-\cos(n, x), \quad -\cos(n, y), \quad -\frac{\partial u}{\partial x} \cos(n, x) - \frac{\partial u}{\partial y} \cos(n, y).$$

Длина вектора  $l_1$ , с точностью до малых величин высших порядков, равна единице. Поэтому, не уменьшая точности, можно считать  $l_1$  равным единичному вектору  $\mathbf{l}$ , направленному по линии действия натяжения.

Подставляя это выражение в уравнение равновесия мембраны, которое в данном случае имеет вид

$$\iint_{\omega} p(x, y) dx dy + \oint_{\mathfrak{F}} T \cos(l, u) ds = 0,$$

где через  $p(x, y)$  обозначена величина поперечно действующей нагрузки, отнесенной к единице площади, а через  $\omega$  — проекция  $S$  на плоскость  $xOy$ , получим:

$$\iint_{\omega} p(x, y) dx dy - \oint_{\mathfrak{F}} \left( \frac{\partial u}{\partial x} \cos(n, x) + \frac{\partial u}{\partial y} \cos(n, y) \right) T ds = 0,$$

или, в силу леммы 1,

$$\frac{\partial}{\partial x} \left( T \frac{\partial u}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left( T \frac{\partial u}{\partial y} \right) + p(x, y) = 0. \quad (I.11)$$

Уравнение колебаний мембраны напишется в виде

$$\iint_{\omega} \left( p(x, y) - \rho \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} \right) dx dy - \oint_{\mathfrak{F}} T \left( \frac{\partial u}{\partial x} \cos(n, x) + \frac{\partial u}{\partial y} \cos(n, y) \right) ds = 0,$$

где  $\rho = \rho(x, y)$  — плотность мембраны на единицу поверхности, или, по лемме 1:

$$\frac{\partial}{\partial x} \left( T \frac{\partial u}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left( T \frac{\partial u}{\partial y} \right) + p(x, y) - \rho(x, y) \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = 0. \quad (I.12)$$

Из (I.12) при постоянных  $T$  и  $\rho$  получим:

$$T \left( \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right) + p(x, y) = \rho \frac{\partial^2 u}{\partial t^2}. \quad (I.13)$$

Сумму  $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$  или, в трехмерном пространстве,

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2}$$

часто называют *оператором Лапласа* и обозначают символом  $\Delta u$ . При этом уравнение (I.13) можно записать в виде

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \Delta u + \frac{p(x, y)}{\rho}, \quad (\text{I.14})$$

где

$$a^2 = \frac{T}{\rho} = \text{const.}$$

#### § 4. Уравнение неразрывности при движении жидкости и уравнение Лапласа

Прежде чем приступить к выводу уравнения, называемого уравнением неразрывности, выведем одну важную формулу математического анализа. Рассмотрим некоторую замкнутую кусочно гладкую поверхность  $S(t)$ , зависящую от параметра  $t$  и ограничивающую переменный объем  $\Omega(t)$ . Пусть  $\rho(x, y, z, t)$  есть некоторая функция координат и времени  $t$ . Рассмотрим интеграл

$$Q(t) = \iiint_{\Omega(t)} \rho \, dx \, dy \, dz$$

и зададимся целью вычислить производную по времени от этого выражения.

Рассмотрим сначала частный случай, когда объем  $\Omega(t)$  ограничен цилиндрической поверхностью с образующими, параллельными оси  $z$ , и поверхностями  $z = 0$  и  $z = \varphi(x, y, t)$ , причем  $z = \varphi(x, y, t)$  есть уравнение кусочно гладкой поверхности  $S(t)$ ; производная  $\frac{\partial \varphi}{\partial t}$  ограничена:  $\left| \frac{\partial \varphi}{\partial t} \right| \leq M$ .

В этом случае имеем:

$$Q(t) = \iint_{\Omega_1} \left[ \int_0^{\varphi} \rho(x, y, z, t) \, dz \right] dx \, dy,$$

где плоская область  $\Omega_1$  есть часть границы объема  $\Omega$ , которая лежит в плоскости  $xOy$ .

Составим разностное отношение для вычисления  $\frac{dQ}{dt}$ :

$$\begin{aligned} \frac{\Delta Q}{\Delta t} &= \frac{1}{\Delta t} \iint_{\Omega_1} \left[ \int_{\varphi(x, y, t)}^{\varphi(x, y, t + \Delta t)} \rho(x, y, z, t + \Delta t) \, dz \right] dx \, dy + \\ &+ \frac{1}{\Delta t} \iint_{\Omega_1} \left\{ \int_0^{\varphi(x, y, t)} [\rho(x, y, z, t + \Delta t) - \rho(x, y, z, t)] \, dz \right\} dx \, dy = \\ &= \iint_{\Omega_1} \frac{\Delta \varphi}{\Delta t} \frac{1}{\Delta \varphi} \left[ \int_{\varphi}^{\varphi + \Delta \varphi} \rho(t + \Delta t) \, dz \right] dx \, dy + \iint_{\Omega_1} \left[ \int_0^{\varphi} \frac{\rho(t + \Delta t) - \rho(t)}{\Delta t} dz \right] dx \, dy. \end{aligned}$$

Переходя к пределу при  $\Delta t \rightarrow 0$ , получим:

$$\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta Q}{\Delta t} = \iint_{\Omega_t} \frac{\partial \Phi}{\partial t} \rho(x, y, \varphi, t) dx dy + \int_{\Omega} \int \frac{\partial \rho}{\partial t} dx dy dz,$$

или

$$\begin{aligned} \frac{dQ}{dt} &= \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta Q}{\Delta t} = \iiint_{\Omega} \frac{\partial \rho}{\partial t} dx dy dz + \int_{z=\varphi} \rho \frac{\partial \Phi}{\partial t} dx dy = \\ &= \iiint_{\Omega} \frac{\partial \rho}{\partial t} dx dy dz - \int_S \rho \frac{\partial \Phi}{\partial t} \cos(n, z) dS, \end{aligned}$$

где  $n$  — направление внутренней нормали к поверхности  $S$ .

Выражение  $\frac{\partial \Phi}{\partial t}$  называют *кажущейся скоростью движения поверхности  $S(t)$  по направлению оси  $z$* . Оно допускает очень наглядную интерпретацию:  $\frac{\partial \Phi}{\partial t}$  — это скорость движения по прямой  $x = \text{const}$ ,  $y = \text{const}$  точки пересечения поверхности  $z = \varphi$  с этой прямой.

Запишем выражение кажущейся скорости в другом виде. Для этого представим семейство поверхностей  $S(t)$  в виде, разрешенном относительно  $t$ :

$$t = S(x, y, z).$$

Тогда

$$\frac{\partial z}{\partial t} = \frac{1}{\frac{\partial t}{\partial z}}.$$

Но  $\frac{\partial t}{\partial z}$  есть составляющая по оси  $z$  вектора  $\text{grad } t$ , направленного по нормали к поверхности  $S$  и имеющего следующие компоненты:

$$\frac{\partial t}{\partial n} \cos(n, x), \quad \frac{\partial t}{\partial n} \cos(n, y), \quad \frac{\partial t}{\partial n} \cos(n, z).$$

Отсюда

$$\frac{\partial \Phi}{\partial t} = \frac{\partial z}{\partial t} = \frac{1}{\frac{\partial t}{\partial z}} = \frac{1}{\frac{\partial t}{\partial n} \cos(n, z)}.$$

Выражение  $\frac{1}{\frac{\partial t}{\partial n}}$  называется *кажущейся скоростью движения поверхности по нормали*. Мы обозначим его через  $v_n$ . Для кажущейся скорости движения поверхности  $S$  по направлению оси  $z$  (эту величину мы обозначим через  $\tilde{v}_z$ ) имеем:

$$\tilde{v}_z = \frac{\partial \Phi}{\partial t} = \frac{v_n}{\cos(n, z)}.$$

Если поверхность  $S$  состоит из материальных частиц, движущихся со скоростью  $v$ , то скорость в направлении нормали будет

$$v_n = v_x \cos(n, x) + v_y \cos(n, y) + v_z \cos(n, z),$$

и мы можем записать нашу формулу в виде

$$\frac{d}{dt} \iiint_{\Omega(t)} \rho \, dx \, dy \, dz = \iiint_{\Omega(t)} \frac{\partial \rho}{\partial t} \, dx \, dy \, dz - \iint_{S(t)} \rho v_n \, dS. \quad (I \, 15)$$

В общем случае, когда поверхность  $S(t)$  имеет произвольную форму, получим ту же формулу, так как поверхность  $S(t)$  всегда может быть разбита на конечное число кусков таким образом, что для точек каждого из этих кусков какая-нибудь одна пространственная координата является однозначной функцией двух других.

Полезно дать наглядную физическую иллюстрацию формуле (I 15). В некоторый момент времени  $t$  выделим на поверхности  $S$  некоторый элементарный участок  $dS$  и проведем траектории всех точек, принадлежащих  $dS$ , на отрезке времени  $(t, t + \Delta t)$ . Этот участок заполнит объем, приближенно совпадающий с косым цилиндром, образующие которого имеют вид  $v dt$ , где  $v$  есть вектор скорости движения поверхности. Объем этого цилиндра равен произведению площади основания на высоту, т. е.  $v_n dt dS$ . Все приращение интеграла  $\iiint \rho \, d\Omega$ , вызванное перемещением поверхности  $S$ , приблизительно равняется интегралу

$$\iint_S \rho v_n dt \, dS$$

Деля это выражение на  $dt$  и вычисляя отдельно приращение  $Q$ , обусловленное изменением  $\rho$ , получим формулу (I.15).

Формула (I.15) позволяет получить уравнение, выражающее неизменность количества жидкости или газа при движении. Пусть в некоторой части пространства происходит движение жидкости, причем составляющие скорости  $v_x(x, y, z, t)$ ,  $v_y(x, y, z, t)$  и  $v_z(x, y, z, t)$  суть заданные функции координат и времени. Представим себе материальную поверхность  $S(t)$ , состоящую из одних и тех же движущихся частиц и ограничивающую некоторый переменный объем  $\Omega(t)$ . Количество жидкости, заключенной в объеме  $\Omega(t)$ , равно

$$Q = \iiint_{\Omega(t)} \rho(x, y, z, t) \, dx \, dy \, dz,$$

где  $\rho(x, y, z, t)$  — плотность жидкости.

Так как жидкость не поступает извне и не исчезает, то количество ее в таком объеме должно оставаться постоянным.

Дифференцируя по  $t$ , получим:

$$\frac{dQ}{dt} = \iiint_{\Omega(t)} \frac{\partial \rho}{\partial t} d\Omega - \iint_{S(t)} \rho v_n dS = 0.$$

Это равенство должно иметь место для любой поверхности  $S$  и любого момента времени  $t$ . Применяя лемму 1, получим

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \operatorname{div}(\rho v) = 0, \quad (I.16)$$

или в раскрытом виде

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x}(\rho v_x) + \frac{\partial}{\partial y}(\rho v_y) + \frac{\partial}{\partial z}(\rho v_z) = 0.$$

Это и есть так называемое *уравнение неразрывности*. Покажем одно применение этого уравнения для случая движения несжимаемой однородной жидкости, т. е. для случая, когда плотность жидкости постоянна. Задача о потенциальном движении несжимаемой жидкости есть задача об отыскании неизвестной функции  $V$  такой, что

$$v = \operatorname{grad} V \quad \text{или} \quad v_x = \frac{\partial V}{\partial x}, \quad v_y = \frac{\partial V}{\partial y}, \quad v_z = \frac{\partial V}{\partial z}$$

Подставляя выражения для скоростей в уравнение неразрывности, получим:

$$\rho \left( \frac{\partial^2 V}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial z^2} \right) = 0,$$

или

$$\Delta V = 0, \quad (I.17)$$

где  $\Delta$  обозначает введенный выше оператор Лапласа  $\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}$ . Уравнение (I.17) называется *уравнением Лапласа*. В дальнейшем, когда мы выпишем полную систему уравнений движения жидкости, мы проверим, что любая функция  $V$ , удовлетворяющая уравнению (I.17), действительно описывает некоторое возможное движение жидкости. Таким образом, для решения этой задачи достаточно уметь находить нужные решения уравнения (I.17). Иногда скорость  $v$ , а следовательно, и функция  $V$ , не зависят от времени. Такое движение называют *установившимся*.

## § 5. Уравнение передачи тепла

Как известно из курсов физики, теплота представляет собой результат беспорядочного движения частиц вещества. Степень нагретости тела определяется его температурой. Между энергией теплового движения какого-либо тела и температурой существует

простая зависимость:

$$Q = \iiint_D c_p T dv,$$

где  $D$  — объем, занимаемый этим телом,  $Q$  — энергия теплового движения, или, что то же самое, количество тепла в калориях,  $\rho$  — плотность вещества,  $T$  — абсолютная температура,  $c$  — теплоемкость.

Передача тепла от одного тела к другому или от одного участка среды к другому происходит различными путями. Не принимая во внимание лучеиспускание, химические процессы и т. п., мы будем здесь рассматривать лишь перенос тепла непосредственной передачей кинетической энергии от частицы к частице.

Выделим мысленно участок некоторой гладкой поверхности  $S$ , лежащий внутри изучаемой среды, и пусть  $n$  — единичный вектор, направленный по нормали к  $S$ . Тепловая энергия движения частиц, расположенных по обе стороны этого участка, с течением времени может изменяться за счет столкновений их между собою или за счет перехода частиц через поверхность.

Частица, центр тяжести которой находился по одну сторону поверхности и которая имела некоторую энергию, может передать эту энергию либо при переходе на другую сторону поверхности, либо при столкновении с частицей, центр тяжести которой находился с другой стороны поверхности. Обозначим через  $\Delta_S Q$  количество энергии, отнесенное к единице времени, которое передается в момент времени  $t$  через поверхность  $S$  частицам, находящимся с той стороны поверхности, куда направлена нормаль, от частиц, находящихся с другой стороны  $S$ .

Сделаем допущение, что величину  $\Delta_S Q$  можно представить в виде

$$\Delta_S Q = \iint_S \chi(S, t) ds,$$

где

$$\chi(S, t) = f(x, y, z; n; t).$$

Эти формулы равносильны предположению, что количество тепловой энергии, проходящей через элементарную площадку, зависит только от положения центра площадки и направления вектора  $n$ ; при этом переход тепла считается положительным в направлении вектора  $n$ . Будем еще предполагать, что  $f$ ,  $\rho$ ,  $c$  и  $T$  — непрерывно дифференцируемые функции своих аргументов.

Изучая распространение тепла в некотором теле, мы будем для общности предполагать, что внутри этого тела непрерывно

распределены источники тепла с интенсивностью  $q(x, y, z, t)$ . Записывая баланс тепла для объема  $D$ , получим:

$$\begin{aligned} \frac{dQ}{dt} &= \frac{d}{dt} \iiint_D c_p T dv = \iiint_D \frac{\partial (c_p T)}{\partial t} dv = \\ &= - \iint_S f(x, y, z; \mathbf{n}; t) dS + \iiint_D q dv, \end{aligned} \quad (1.18)$$

где вектор  $\mathbf{n}$  направлен по внешней нормали.

Объем  $D$  является совершенно произвольным. Применим эту формулу, взяв за  $D$  тетраэдр  $\Omega$ , одна из вершин которого лежит в точке  $A(x_0, y_0, z_0)$ , а три грани, пересекающиеся в этой точке, параллельны координатным плоскостям (рис. 3).

Обозначим грани этого тетраэдра, перпендикулярные соответственно к осям  $x, y, z$ , через  $S_x, S_y, S_z$ , а наклонную грань — через  $S_0$ . Обозначим площадь грани  $S_0$  через  $\sigma_0$ , а площади остальных граней соответственно через  $\sigma_x, \sigma_y, \sigma_z$ . Для  $\sigma_x, \sigma_y$  и  $\sigma_z$  получим:

$$\begin{aligned} \sigma_x &= \sigma_0 \cos(n_0, x), \quad \sigma_y = \sigma_0 \cos(n_0, y), \\ \sigma_z &= \sigma_0 \cos(n_0, z), \end{aligned}$$

где  $\cos(n_0, x), \cos(n_0, y), \cos(n_0, z)$  — направляющие косинусы внешней нормали к грани  $S_0$ .

Применим формулу (1.18) к тетраэдру  $\Omega$ . Мы получим:

$$\begin{aligned} \iiint_{\Omega} \frac{\partial}{\partial t} (c_p T) dv - \iiint_{\Omega} q dv = \\ = \iint_{S_x} f(x, y, z; \mathbf{i}; t) d\sigma_x + \iint_{S_y} f(x, y, z; \mathbf{j}; t) d\sigma_y + \\ + \iint_{S_z} f(x, y, z; \mathbf{k}; t) d\sigma_z + \iint_{S_0} f(x, y, z; -\mathbf{n}_0; t) d\sigma_0, \end{aligned}$$

где  $\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}$  обозначают единичные векторы, параллельные координатным осям  $x, y, z$ . Если объем  $\Omega$  равен  $\omega$ , то теорема о среднем дает:

$$\omega \frac{\partial}{\partial t} (c_p T)|_{cp} - \omega q|_{cp} = \sigma_x v_x|_{cp} + \sigma_y v_y|_{cp} + \sigma_z v_z|_{cp} + \sigma_0 f(x, y, z; -\mathbf{n}_0; t)|_{cp},$$

где положено в целях сокращения

$$\begin{aligned} v_x &= f(x, y, z; \mathbf{i}; t), \\ v_y &= f(x, y, z; \mathbf{j}; t), \\ v_z &= f(x, y, z; \mathbf{k}; t). \end{aligned}$$




Рис. 3.

Знаком  $|\text{ср}$  обозначено некоторое среднее значение функции. Разделим обе части на  $\sigma_0$  и перейдем к пределу при  $\sigma_0 \rightarrow 0$ , учитывая, что направление  $n_0$  при этом остается постоянным. Предел левой части будет, очевидно, равен нулю. Принимая во внимание, что

$$f(x, y, z; -n; t) = -f(x, y, z; n; t),$$

получим:

$$f(x_0, y_0, z_0; n; t) = [v_x \cos(n, x) + v_y \cos(n, y) + v_z \cos(n, z)]|_{(x_0, y_0, z_0)} = v_n|_{(x_0, y_0, z_0)},$$

где  $n$  — направление внешней нормали к границе  $S$  тетраэдра  $\Omega$ , совпадающее на гранях  $S_x, S_y, S_z, S_0$  соответственно с направлениями  $-i, -j, -k, n_0$ .

Мы видим, таким образом, что функция  $f(x, y, z; n; t)$  представляет собой проекцию на направление  $n$  некоторого вектора  $v$ . Имеем:

$$\int_D \int \int \frac{\partial}{\partial t} (\rho c T) dv = - \int_S v_n dS + \int_D \int \int g dv$$

при произвольном объеме  $D$ . Эта формула напоминает формулу (I.15).

Вектор  $v$ , аналогичный вектору скорости течения жидкости, мы будем называть *потокм тепла*.

Поток тепла, существующий в среде, связан с распределением температуры в ней. В естественных условиях тепло всегда течет от частей с более высокой температурой к тем частям, температура которых ниже. Выделим некоторую малую площадку  $dS$  в нашей среде и будем исследовать, как меняется температура в точках, близких к этой площадке.

Рост температуры характеризуется величиной

$$\frac{\partial T}{\partial n} = n \text{grad } T.$$

Допустим, что наша среда является *изотропной*, т. е. свойства ее во всех направлениях одинаковы. Естественно предположить, что если температура возрастает в направлении нормали, то поток тепла через площадку  $S$  отрицателен. Иными словами, величины

$$n \text{grad } T = \text{grad}_n T \text{ и } v_n dS$$

должны иметь противоположные знаки. Это должно быть верно при любом направлении  $n$ . Следовательно, проекции векторов  $\text{grad } T$  и  $v$  на любое направление должны быть обратны по знаку, что возможно только при условии, что эти векторы

противоположно направлены. Значит,

$$v = -k \operatorname{grad} T,$$

где  $k$  — некоторая положительная скалярная величина, которая может зависеть от свойств среды, от температуры, от характера изменения температуры и т. п. В случае, когда температура меняется не очень сильно, в первом приближении можно считать  $k$  функцией только от точки среды. Это предположение хорошо согласуется с опытом.

Подставляя полученное выражение для  $v$  в последнюю формулу для баланса тепла, получим:

$$\iiint_D \frac{\partial}{\partial t} (\rho c T) dv = \iint_S k \frac{\partial T}{\partial n} dS + \iiint_D q dv.$$

Применяя лемму из § 1 и учитывая, что при замене направления внешней нормали направлением внутренней нормали производная  $\frac{\partial T}{\partial n} = (\operatorname{grad} T)_n$  меняет знак, получим:

$$\frac{\partial}{\partial t} (\rho c T) = \frac{\partial}{\partial x} \left( k \frac{\partial T}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left( k \frac{\partial T}{\partial y} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left( k \frac{\partial T}{\partial z} \right) + q. \quad (1.19)$$

Предполагая  $\rho$ ,  $c$  и  $k$  постоянными, получим:

$$\frac{\partial T}{\partial t} = a^2 \Delta T + q_1, \quad (1.20)$$

где

$$a^2 = \frac{k}{\rho c} = \operatorname{const}, \quad q_1 = \frac{q}{\rho c}.$$

Уравнения (1.19) или (1.20) носят название *уравнений переноса тепла*, или *уравнений теплопроводности*.

## § 6. Звуковые волны

В качестве последнего примера рассмотрим *уравнение распространения звука*.

Пусть какая-либо сжимаемая жидкость или газ движется со скоростью  $v$ , проекции которой на оси координат обозначим:

$$v_x(t, x, y, z), \quad v_y(t, x, y, z), \quad v_z(t, x, y, z)$$

Траектория каждой материальной точки этой жидкости будет определяться уравнениями

$$\frac{dx}{dt} = v_x, \quad \frac{dy}{dt} = v_y, \quad \frac{dz}{dt} = v_z.$$

Легко подсчитать ее ускорение. Мы будем иметь:

$$\left. \begin{aligned} \frac{d^2x}{dt^2} &= \frac{\partial v_x}{\partial t} + v_x \frac{\partial v_x}{\partial x} + v_y \frac{\partial v_x}{\partial y} + v_z \frac{\partial v_x}{\partial z} = \\ &= \frac{\partial v_x}{\partial t} + v_x \frac{\partial v_x}{\partial x} + v_y \frac{\partial v_x}{\partial y} + v_z \frac{\partial v_x}{\partial z}, \\ \frac{d^2y}{dt^2} &= \frac{\partial v_y}{\partial t} + v_x \frac{\partial v_y}{\partial x} + v_y \frac{\partial v_y}{\partial y} + v_z \frac{\partial v_y}{\partial z}, \\ \frac{d^2z}{dt^2} &= \frac{\partial v_z}{\partial t} + v_x \frac{\partial v_z}{\partial x} + v_y \frac{\partial v_z}{\partial y} + v_z \frac{\partial v_z}{\partial z}. \end{aligned} \right\} \quad (1.21)$$

Напишем уравнение движения жидкости, на которую в каждой точке действует сила с объемной плотностью  $F$ ; проекции этой силы на координатные оси обозначим через  $X, Y, Z$ . Если давление в каждой точке будет  $p(t, x, y, z)$ , то на некоторую поверхность  $S$ , ограничивающую объем  $\Omega$ , будет действовать сила, проекция которой на ось  $x$  равна:

$$\iint_S p(t, x, y, z) \cos(n, x) dS.$$

Прибавляя к этому проекции объемных сил и сил инерции на ту же ось, получим:

$$\begin{aligned} \iint_S p \cos(n, x) dS + \iiint_{\Omega} X dv - \\ - \iiint_{\Omega} \rho \left( \frac{\partial v_x}{\partial t} + v_x \frac{\partial v_x}{\partial x} + v_y \frac{\partial v_x}{\partial y} + v_z \frac{\partial v_x}{\partial z} \right) dv = 0, \end{aligned}$$

где  $dv$  — элемент объема.

На основании леммы 1 уравнение движения будет:

$$\rho \left( \frac{\partial v_x}{\partial t} + v_x \frac{\partial v_x}{\partial x} + v_y \frac{\partial v_x}{\partial y} + v_z \frac{\partial v_x}{\partial z} \right) + \frac{\partial p}{\partial x} - X = 0. \quad (1.22)$$

Аналогично пишутся два других уравнения для составляющих на оси  $y$  и  $z$ :

$$\begin{aligned} \rho \left( \frac{\partial v_y}{\partial t} + v_x \frac{\partial v_y}{\partial x} + v_y \frac{\partial v_y}{\partial y} + v_z \frac{\partial v_y}{\partial z} \right) + \frac{\partial p}{\partial y} - Y = 0, \\ \rho \left( \frac{\partial v_z}{\partial t} + v_x \frac{\partial v_z}{\partial x} + v_y \frac{\partial v_z}{\partial y} + v_z \frac{\partial v_z}{\partial z} \right) + \frac{\partial p}{\partial z} - Z = 0. \end{aligned}$$

Написанные выше три уравнения содержат пять неизвестных функций:  $v_x, v_y, v_z, p$  и  $\rho$ . Для того чтобы система стала определенной, необходимо добавить еще два уравнения. Одно уравнение, связывающее эти величины, мы уже вывели — уравнение неразрывности.

В общем случае нам нужно было бы отыскать еще одно уравнение. Однако, предполагая жидкость несжимаемой и однородной, мы можем положить

$$\rho = \text{const}$$

и получить сразу достаточное число уравнений.

Мы можем теперь проверить, что полученное нами выше решение задачи о потенциальном движении несжимаемой жидкости:

$$v = \text{grad } V,$$

$$\Delta V = 0,$$

действительно удовлетворяет полной системе уравнений движения жидкости, если определить соответствующим образом функцию  $p$  и если, кроме того,

$$X = \frac{\partial U}{\partial x}, \quad Y = \frac{\partial U}{\partial y}, \quad Z = \frac{\partial U}{\partial z},$$

т. е. если внешние силы имеют потенциал. Достаточно убедиться, что уравнения (I.22) позволяют построить функцию  $p$ , если считать

$$v_x = \frac{\partial V}{\partial x}, \quad v_y = \frac{\partial V}{\partial y}, \quad v_z = \frac{\partial V}{\partial z}.$$

Подставим в уравнения (I.22) вместо  $v_x$ ,  $v_y$ ,  $v_z$  приведенные выше их значения. Тогда из этих уравнений мы получим явные выражения для

$$\frac{\partial p}{\partial x}, \quad \frac{\partial p}{\partial y}, \quad \frac{\partial p}{\partial z}.$$

Из теории уравнений в частных производных 1-го порядка известно, что система будет совместной в том случае, если вторые смешанные производные

$$\frac{\partial^2 p}{\partial x \partial y}, \quad \frac{\partial^2 p}{\partial x \partial z}, \quad \frac{\partial^2 p}{\partial y \partial z},$$

определенные из различных уравнений, получаются одними и теми же. Проверить это мы предоставляем читателю.

В общем случае сжимаемой жидкости из физики известно, что давление и плотность всякой жидкости или газа связаны так называемым уравнением состояния, в которое входит еще абсолютная температура  $T$ . Для идеального газа это уравнение имеет вид

$$\rho = \frac{p}{RT},$$

где  $R$  есть так называемая газовая постоянная. Это уравнение вводит еще одну неизвестную функцию —  $T$ . В некоторых случаях к приведенным уравнениям приходится добавлять еще одно уравнение, называемое уравнением притока тепла.

Однако в ряде случаев можно предположить, что давление и плотность связаны между собой прямой функциональной зависимостью:

$$\rho = f(p), \quad (I.23)$$

где  $f$  — заданная функция.

Это обстоятельство имеет место, например, при рассмотрении процессов, протекающих столь быстро, что тепло не успевает передаваться от одной частицы к другой. Такие процессы называются адиабатическими.

Для того чтобы из общих уравнений (I.16), (I.22), (I.23) получить нужные нам уравнения распространения звука, мы сделаем несколько упрощающих предположений. Будем считать, что движение рассматриваемого газа представляет собой малые колебания вокруг положения равновесия. В этом состоянии равновесия давление  $p_0$  и плотность  $\rho_0$  постоянны. Отклонения  $p - p_0$  и  $\rho - \rho_0$ , равно как и скорости, мы будем предполагать малыми и, в частности, будем считать, что членами типа  $\left(v_x \frac{\partial v_x}{\partial x}\right)$ , ... и т. д. в уравнениях (I.22) можно пренебречь. Мы получим:

$$\rho \frac{\partial v_x}{\partial t} + \frac{\partial p}{\partial x} = X, \quad \rho \frac{\partial v_y}{\partial t} + \frac{\partial p}{\partial y} = Y, \quad \rho \frac{\partial v_z}{\partial t} + \frac{\partial p}{\partial z} = Z.$$

С точностью до выражений вида  $\frac{\partial \rho}{\partial t} v_x$ ,  $\frac{\partial \rho}{\partial t} v_y$ ,  $\frac{\partial \rho}{\partial t} v_z$ , которые мы предполагаем малыми, эти уравнения могут быть записаны в виде

$$\frac{\partial}{\partial t} (\rho v_x) + \frac{\partial p}{\partial x} = X, \quad \frac{\partial}{\partial t} (\rho v_y) + \frac{\partial p}{\partial y} = Y, \quad \frac{\partial}{\partial t} (\rho v_z) + \frac{\partial p}{\partial z} = Z.$$

Дифференцируя эти уравнения соответственно по  $x$ ,  $y$  и  $z$  и складывая, получим:

$$\frac{\partial}{\partial t} [\operatorname{div}(\rho v)] + \frac{\partial^2 p}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 p}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 p}{\partial z^2} = \frac{\partial X}{\partial x} + \frac{\partial Y}{\partial y} + \frac{\partial Z}{\partial z}. \quad (I.24)$$

Левая часть уравнения (I.24), в силу уравнения неразрывности, может быть записана в виде

$$\frac{\partial^2 p}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 p}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 p}{\partial z^2} - \frac{\partial^2 \rho}{\partial t^2} = \frac{\partial^2 p}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 p}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 p}{\partial z^2} - f'(p) \frac{\partial^2 p}{\partial t^2} - f''(p) \left(\frac{\partial p}{\partial t}\right)^2.$$

Наконец, принимая  $f'(p)$  в малом промежутке изменения  $p$  за постоянную:  $f'(p) = f'(p_0)$ , и обозначая правую часть (I.24), то есть  $\frac{\partial X}{\partial x} + \frac{\partial Y}{\partial y} + \frac{\partial Z}{\partial z}$ , через  $\Phi$ , будем иметь:

$$\frac{\partial^2 p}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 p}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 p}{\partial z^2} - \frac{1}{a^2} \frac{\partial^2 p}{\partial t^2} = \Phi, \quad (I.25)$$

где  $a$  — постоянная, определяемая по формуле

$$\frac{1}{a} = \sqrt{f'(p_0)}.$$

Используя символическое обозначение, имеем

$$\Delta p - \frac{1}{a^2} \frac{\partial^2 p}{\partial t^2} = \Phi.$$

Можно получить уравнения распространения звука и иным путем, взяв, например, за неизвестную функцию не давление  $p$ , а плотность  $\rho$ . Оказывается, что при этом для  $\rho$  получается уравнение в частных производных того же самого вида, что и уравнение (1.25).

Выведенные нами уравнения достаточно характерны. Мы могли бы привести еще много других примеров, однако вывод уравнений математической физики не входит в нашу задачу, так как нашей основной целью является исследование и решение таких уравнений.

Поэтому ограничимся указанными примерами и перейдем к изучению различных задач для этих уравнений.

---

# ПОСТАНОВКА ЗАДАЧ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ. ПРИМЕР АДАМАРА

## § 1. Начальные и краевые условия

Из курса обыкновенных дифференциальных уравнений известно, что решение этих уравнений не определяется однозначно.

Решение уравнения

$$F(x, y, y', \dots, y^{(n)}) = 0 \quad (\text{II.1})$$

зависит, вообще говоря, от  $n$  произвольных постоянных

$$y = \varphi(x, c_1, c_2, \dots, c_n). \quad (\text{II.2})$$

Часто можно взять в качестве этих постоянных начальные значения неизвестной функции и ее производных:

$$y|_{x=0} = y_0, \quad y'|_{x=0} = y_0^{(1)}, \dots, \quad y^{(n-1)}|_{x=0} = y_0^{(n-1)}. \quad (\text{II.3})$$

Решение вида (II.2) называется общим тогда, когда можно удовлетворить условиям (II.3) с любыми  $y_0, y_0^{(1)}, \dots, y_0^{(n-1)}$ , выбрав соответствующие значения для постоянных  $c_1, \dots, c_n$ ; для этого бывает нужно решить некоторую систему конечных (недифференциальных) уравнений. В частности, если уравнение (II.1) является линейным однородным, то общий интеграл (II.2) имеет весьма простой вид

$$y = c_1 y_1 + c_2 y_2 + \dots + c_n y_n,$$

где функции  $y_1, y_2, \dots, y_n$  являются системой линейно независимых частных решений.

Подобно этому для уравнений в частных производных также нет единственности решения. Решение уравнения в частных производных зависит, вообще говоря, от некоторых произвольных функций. Например, общим решением уравнения

$$\frac{\partial u}{\partial y} = 0$$

с двумя независимыми переменными  $x$  и  $y$  будет

$$u = f(x),$$

где  $f(x)$  — произвольная функция.

Для того чтобы сделать решение определенным, обычно нужно задать некоторые дополнительные условия, например потребовать, чтобы неизвестная функция, а также часто еще некоторые ее производные или некоторые комбинации функции и ее производных принимали заданные значения на различных многообразиях.

Мыслима, вообще говоря, и постановка задачи об отыскании общего вида решений для уравнения в частных производных, аналогичная соответствующей задаче для уравнений вида (II.1). Однако, хотя такие общие решения и существуют, знание их, за редким исключением, ничего не дает нам для решения важных частных задач, ибо вместо системы конечных уравнений для нахождения  $c_1, c_2, \dots, c_n$ , как это имело место для обыкновенных уравнений, мы получим при решении этих частных задач систему столь сложных функциональных соотношений для произвольных функций, что их отыскание практически невозможно.

Каждая задача математической физики ставится как задача решения некоторого уравнения, например (I.9), (I.14), (I.17), (I.19) или (I.25) при определенных дополнительных условиях, которые в большинстве случаев диктуются ее физической постановкой.

Укажем некоторые из возможных постановок задач для уравнений, выведенных нами выше.

В задаче о колебании струны естественно, например, рассматривать участок струны  $0 \leq x \leq l$ , закрепленный по обоим концам. Следовательно, нужно искать решения уравнения (I.9), удовлетворяющие условиям

$$u|_{x=0} = 0 \text{ и } u|_{x=l} = 0. \quad (\text{II.4})$$

Если концы не закреплены, а сами приводятся в движение по определенному закону, то условия (II.4) заменяются условиями

$$u|_{x=0} = f_1(t) \text{ и } u|_{x=l} = f_2(t). \quad (\text{II.5})$$

Возможно задание также и других условий на концах. Всех типов подобных заданий мы разбирать не будем.

Задания поведения струны на концах недостаточно для решения задачи. Необходимо еще знать, например, значение функции  $u$  и ее скорости  $\frac{\partial u}{\partial t}$  в начальный момент времени, т. е.

$$u|_{t=0} = \varphi_0(x) \text{ и } \frac{\partial u}{\partial t}|_{t=0} = \varphi_1(x). \quad (\text{II.6})$$

Условия (II.5) и (II.6) совместно полностью определяют решение уравнения (I.9). Мы в дальнейшем установим, что при условии

некоторой гладкости функций  $f_1, f_2, \varphi_0, \varphi_1$  такое решение всегда существует и, следовательно, среди этих условий нет лишних.

Задача о колебании мембраны ставится совершенно аналогично. Для того чтобы определить ее движение, достаточно, например, задать

$$\left. \begin{aligned} u|_{t=0} &= \varphi_0(x, y), \\ \frac{\partial u}{\partial t}|_{t=0} &= \varphi_1(x, y) \end{aligned} \right\} \quad (II.7)$$

и значение функции  $u$  на границе  $S$

$$u|_S = f(S, t), \quad (II.8)$$

где функция  $f(S, t)$  зависит от точки на границе  $S$  и времени  $t$ .

Вместо значения  $u$  на границе иногда задается линейная комбинация:

$$\alpha u|_S + \beta \frac{\partial u}{\partial n}|_S = f(S, t). \quad (II.9)$$

Условия (II.7) и (II.9) делают, как мы установим далее, задачу вполне определенной. Решение, удовлетворяющее им, всегда существует, и поэтому среди условий (II.7) и (II.9) нет лишних.

Задача о распространении звука в области пространства  $x, y, z$ , ограниченной поверхностью  $S$ , становится вполне определенной и имеет единственное решение, если наряду с уравнением (I.25) рассмотреть начальные условия

$$\left. \begin{aligned} p|_{t=0} &= \varphi_0(x, y, z), \\ \frac{\partial p}{\partial t}|_{t=0} &= \varphi_1(x, y, z) \end{aligned} \right\} \quad (II.7')$$

и краевое условие

$$p|_S = f(S, t), \quad (II.8')$$

где  $\varphi_0, \varphi_1$  и  $f$  — заданные функции.

Для решения задачи о распространении тепла в некотором теле [см. (I.19)] достаточно знать его начальную температуру

$$T|_{t=0} = \varphi(x, y, z), \quad (II.10)$$

а также условия на границе тела

$$\alpha T|_S + \beta \frac{\partial T}{\partial n}|_S = f(S), \quad (II.11)$$

где  $f(S)$  обозначает заданную функцию точки на поверхности.

Во всех рассмотренных уравнениях — уравнении колебаний мембраны и струны, уравнении теплопроводности — вовсе не обязательно рассматривать ограниченное тело. Мы можем рассматривать наряду с этим и неограниченно простирающуюся прямую,

плоскость или пространство; тогда условия (II.4), (II.5), (II.8), (II.9) и (II.11), которые обычно называют *краевыми*, или *граничными условиями*, отпадают. Задача без таких условий носит название *задачи Коши*; условия (II.6), (II.7) и (II.10) называются *начальными условиями* или *данными Коши*.

Мы можем рассматривать тело, внутри которого в результате продолжительного действия различных постоянных влияний на границе установилась некоторая температура, постоянная в каждой точке, но меняющаяся от одной точки к другой.

При этом в теле образуется установившееся тепловое состояние. Из уравнения (I.20), полагая  $\frac{\partial T}{\partial t} = 0$ , получим:

$$\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial z^2} = -\frac{q}{k}. \quad (\text{II.12})$$

Уравнение (II.12) можно решать при условии (II.14). Особый интерес представляют два простейших случая, когда  $\alpha = 0$  или  $\beta = 0$ . Задача решения уравнения (II.12) при условии

$$T|_S = f(S) \quad (\text{II.13})$$

называется *задачей Дирихле*. Эту же задачу можно ставить и решать и для уравнения с двумя независимыми переменными; тогда уравнение (II.12) запишется так:

$$\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} = -\frac{q}{k}. \quad (\text{II.14})$$

При  $q \equiv 0$  задача может рассматриваться одновременно и как задача о равновесии мембраны.

В самом деле, если мы в уравнении колебаний мембраны (I.14) положим  $\frac{\partial u}{\partial t} = 0$  и, следовательно,  $\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = 0$ , то получим опять уравнение вида (II.14).

Интересно отметить, что одно и то же уравнение, как мы видим, описывает совершенно различные физические процессы или состояния.

Математические уравнения оказываются, таким образом, обладающими высокой степенью общности, полученной благодаря отвлечению от конкретных физических свойств того или иного явления.

Другая задача об отыскании решений уравнения (II.12) при условии

$$\frac{\partial T}{\partial n} = f(S) \quad (\text{II.15})$$

называется *задачей Неймана*; ее также можно рассматривать и для двух независимых переменных. К той же задаче Неймана приводит и задача о потенциальном движении несжимаемой жидкости (I.17). Желая найти скорости жидкости внутри некоторой

области, естественно задать на границе этой области величину нормальной составляющей скорости  $v_n$ , которая характеризует поток жидкости через каждую точку поверхности. Если, например, поверхность  $S$  является неподвижной непроницаемой стенкой, мы должны поставить условие, что поток жидкости через эту стенку равен нулю. Если стенка движется, то нормальная составляющая скорости стенки должна совпадать с нормальной составляющей скорости жидкости. Но  $v_n = \frac{\partial V}{\partial n}$ , откуда видно, что поставленная нами задача сводится к задаче Неймана.

Для уравнения (II.12), как и для предыдущих, вовсе не обязательно заниматься лишь решением его в конечной области. Очень часто бывает важно решить его для области неограниченной. Это бывает, например, тогда, когда размеры рассматриваемой области очень велики по сравнению с масштабом изучаемого явления. Естественно, например, при изучении явления теплоотдачи некоторого длинного трубопровода, заложенного в земле, считать, что земля является не шаром, а неограниченным полупространством, и решать уравнение (II.12) в полупространстве с вырезанным цилиндром и т. д.

При рассмотрении бесконечных областей далеко не безразлично, как ведет себя решение в далеких точках изучаемой области; во многих случаях только при известных предположениях об этом поведении задача становится определенной. Например, если решать уравнение (II.12) в бесконечном пространстве с шаровым вырезом (т. е. решать его для внешности некоторого шара), приходится накладывать на решение то дополнительное ограничение, что оно должно обращаться в нуль на бесконечности. Иначе решение остается неопределенным.

Важную роль играет еще одно дополнительное соображение.

## § 2. Зависимость решения от предельных условий.

### Пример Адамара

Постановка задач математической физики содержит, как мы видели, некоторые функции, входящие в *предельные* (начальные или граничные) *условия*, и решение, вообще говоря, зависит от этих функций. Эти функции определяются обычно из опыта и поэтому не могут быть найдены абсолютно точно.

Всегда неизбежна некоторая погрешность в начальных или граничных условиях. Эта погрешность будет сказываться и на решении, и не всегда погрешность в решении окажется, в свою очередь, малой.

Мы рассмотрим простые примеры задач, где малая ошибка в данных может повлечь за собой очень большую ошибку в результате. Исследуя уравнения математической физики, мы всегда

должны особо рассматривать вопрос о зависимости решения от предельных условий.

Пусть рассматриваемая нами задача математической физики свелась к отысканию некоторой функции  $u(x, y, z, t)$  четырех переменных в какой-то области  $\Omega$  изменения этих переменных, удовлетворяющей в этой области уравнению

$$F\left(u, \frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}, \frac{\partial u}{\partial z}, \frac{\partial u}{\partial t}, \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \dots, \frac{\partial^m u}{\partial t^m}\right) = 0. \quad (\text{II.16})$$

В примерах, разобранных выше, такой областью служила область  $\Omega$  независимых переменных  $x, y, z$  и какой-то промежутков времени  $0 \leq t \leq T$ .

Пусть искомое решение подчинено дополнительным условиям вида

$$\Psi_j\left(u, \frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}, \frac{\partial u}{\partial z}, \dots, \frac{\partial^r u}{\partial t^r}\right)\Big|_{S_i} = \varphi_j(S_i), \quad (\text{II.17})$$

$$i = 1, 2, \dots, l; j = 1, 2, \dots, p,$$

где  $S_i$  — некоторое многообразие в пространстве  $x, y, z, t$ , число измерений которого меньше четырех, а  $\varphi_j(S_i)$  — заданная функция, определенная на многообразии  $S_i$ <sup>1)</sup>.

Эти условия были поставлены нами выше, например на многообразиях  $t = 0$  и на некоторой поверхности  $S$  пространства  $(x, y, z)$  для всех значений  $t$ .

Ниже мы определим понятие непрерывной зависимости решения  $u$  от предельных данных  $\{\varphi_j(S_i)\}$ . Для того чтобы это можно было сделать, необходимо предварительно ввести понятие расстояния между любыми двумя системами предельных функций  $\{\varphi_j(S_i)\}_1$  и  $\{\varphi_j(S_i)\}_2$ , а также между любыми двумя функциями  $u_1$  и  $u_2$ .

Рассмотрим подробнее известную задачу об измерении расстояния между точками какого-нибудь множества, лежащего на плоскости. Пусть, например, это множество состоит из населенных пунктов какого-либо района. Каждым двум населенным пунктам  $A$  и  $B$  можно поставить в соответствие число  $\rho(A, B)$  — расстояние между ними. При этом за расстояние  $\rho(A, B)$  в различных условиях естественно принимать различные числа. Так, для летчика расстоянием будет длина отрезка  $AB$ ; для шофера — кратчайшее расстояние между пунктами  $A$  и  $B$  по дорогам. Шофер может также считать расстоянием наименьшее количество времени, необходимое для проезда из  $A$  в  $B$ , не принимая во внимание километры («пункт  $B$  находится в двух часах езды от пункта  $A$ »). При таком понимании расстояния шоссе, идущее в объезд, может оказаться короче, чем проселочная дорога, совпадающая с прямолинейным отрезком  $AB$ .

Рассмотрим еще, например, множество перекрестков улиц некоторого города. Будем считать, что каждая улица параллельна

<sup>1)</sup>  $S_i$  лежат внутри или на границе области  $\Omega$ .

одной из осей прямоугольных координат  $x$  и  $y$ . За расстояние  $\rho(A, B)$  между двумя перекрестками  $A(x_A, y_A)$  и  $B(x_B, y_B)$  можно принять длину отрезка  $AB$

$$\rho(A, B) = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2};$$

для пешехода естественно считать за расстояние наименьший путь, который он должен проделать, чтобы попасть с перекрестка  $A$  на перекресток  $B$ :

$$\rho(A, B) = |x_B - x_A| + |y_B - y_A|.$$

Может оказаться удобным определить расстояние формулой

$$\rho(A, B) = \max(|x_B - x_A|, |y_B - y_A|).$$

Возьмем теперь некоторый класс  $\Phi$  систем функций  $\{\varphi_j(S_i)\}$ , определенных на многообразиях  $S_i$ , и некоторый класс  $U$  функций  $u(x, y, z, t)$ , определенных в  $\Omega$ . Обобщая понятие расстояния, рассмотренное выше, поставим в соответствие разности каждой двух систем функций  $\{\varphi_j(S_i)\}$  и  $\{\varphi_j^*(S_i)\}$  по некоторой формуле неотрицательное число  $\rho_\Phi$ , которое будем считать расстоянием между этими системами функций:

$$\rho_\Phi = \rho_\Phi \{\varphi_j^*(S_i) - \varphi_j(S_i)\}.$$

Аналогичным образом введем расстояние в классе функций  $U$ :

$$\rho_U = \rho_U(u^* - u).$$

Пусть для некоторой системы функций  $\{\varphi_j(S_i)\}$  из  $\Phi$  задача (II.16), (II.17) имеет единственное решение  $u$  из  $U$ . Изменим теперь правые части (II.17), подставив вместо системы функций  $\{\varphi_j(S_i)\}$  другую систему функций  $\{\varphi_j^*(S_i)\}$  из  $\Phi$ :

$$\varphi_j^*(S_i) = \varphi_j(S_i) + \tilde{\varphi}_j(S_i). \quad (\text{II.18})$$

Предположим, что для всякой системы функций  $\{\varphi_j^*\}$  достаточно близкой к системе  $\{\varphi_j(S_i)\}$ , задача имеет единственное решение, которое обозначим  $u^*$ :

$$u^* = u + \tilde{u}. \quad (\text{II.19})$$

Допустим, далее, что для всякого  $\varepsilon > 0$  можно указать такое  $\delta > 0$ , что величина отклонения решения  $\rho_U(\tilde{u})$  меньше  $\varepsilon$ :

$$\rho_U(\tilde{u}) < \varepsilon,$$

как только величина отклонения предельных функций  $\rho_\Phi(\{\tilde{\varphi}_j(S_i)\})$  меньше  $\delta$ :

$$\rho_\Phi(\{\tilde{\varphi}_j(S_i)\}) < \delta.$$

В этом случае мы будем говорить, что в области  $\Omega$  решение  $u$  непрерывно зависит от предельных данных.

Такое определение непрерывной зависимости является, очевидно, непосредственным обобщением известного из анализа понятия непрерывной зависимости функции от своего аргумента.

Для того чтобы понятие непрерывной зависимости решения от предельных функций приобрело определенный смысл, необходимо выбрать классы  $\Phi$  и  $U$ , а также формулы для вычисления  $\rho_\Phi$  и  $\rho_U$ .

Приведем для примера два возможных определения понятия непрерывной зависимости, естественность которых будет выяснена ниже.

**О п р е д е л е н и е п е р в о е.** Класс  $\Phi$  определим как класс систем функций  $\{\varphi_j(S_i)\}$ , непрерывных вместе со своими частными производными до некоторого порядка  $k$  включительно<sup>1)</sup>; класс  $U$  определим как класс функций  $u$ , непрерывных вместе со своими частными производными до порядка  $p$  включительно. За расстояние  $\rho_\Phi$  между двумя системами функций примем верхнюю грань абсолютных величин разностей этих функций и их производных до порядка  $k$  включительно на многообразиях  $S_i$ ; за расстояние  $\rho_U$  между двумя функциями  $u$  и  $u^*$  примем верхнюю грань абсолютной величины разности этих функций и их производных до порядка  $p$  включительно в области  $\Omega$ .

Если в указанном смысле имеет место непрерывная зависимость решения от предельных данных, то будем говорить, что *решение зависит от предельных данных непрерывно порядка  $(p, k)$  в  $\Omega$* ; если, наоборот, для некоторого  $\varepsilon_0 > 0$  и для любого  $\delta > 0$  существует отклонение системы предельных функций  $\{\tilde{\varphi}_j(S_i)\}$  такое, что

$$\rho_\Phi[\{\tilde{\varphi}_j(S_i)\}] < \delta,$$

но

$$\rho_U(\tilde{u}) > \varepsilon_0,$$

то *решение  $u$  в области  $\Omega$  зависит от предельных условий разрывным образом порядка  $(p, k)$* .

**О п р е д е л е н и е в т о р о е** (непрерывная зависимость в среднем). Относительно систем функций  $\{\varphi_j(S_i)\}$ , образующих класс  $\Phi$ , предположим, что функции  $\varphi_j(S_i)$  и их частные производные до некоторого порядка  $k$  включительно обладают интегрируемыми на  $S_i$  квадратами; относительно функций  $u$ , образующих класс  $U$ , будем предполагать, что эти функции и их частные производные до некоторого порядка  $p$  включительно обладают интегрируемыми по области  $\Omega$  квадратами.

Квадрат расстояния  $\rho_\Phi$  между двумя системами функций  $\{\varphi_j(S_i)\}$  и  $\{\varphi_j^*(S_i)\}$  определим как сумму интегралов от квадратов функций  $\varphi_j(S_i) - \varphi_j^*(S_i)$  и всех их производных

<sup>1)</sup> Мы имеем в виду, что дифференцирование производится по каким-нибудь параметрам на многообразиях  $S_i$ .

до порядка  $k$  включительно по многообразиям  $S_i$ . Квадрат расстояния  $\rho_U$  между функциями  $u^*$  и  $u$  определим как сумму интегралов по области  $\Omega$  от квадратов функции  $u^* - u$  и всех ее производных до порядка  $p$  включительно.

Если решение  $u$  задачи (II.16), (II.17) непрерывно зависит от предельных условий в смысле этого определения, то будем говорить, что *решение зависит от предельных условий непрерывно в среднем порядка  $(p, k)$* .

Заметим, что непрерывная зависимость порядка  $(0, 0)$  допускает простую физическую интерпретацию. Так, в задаче (II.12), (II.13), где роль  $u$  играет  $T$  — температура тела, роль  $\varphi_j(S_j)$  — функция  $f(S)$  — температура на границе, непрерывная зависимость порядка  $(0, 0)$  означает, что малое изменение температуры в каждой точке границы вызывает малое изменение температуры в каждой точке внутри тела.

Так же просто можно истолковать непрерывную зависимость в среднем. В задаче о распространении звука (I.25), (II.7'), (II.8'), как можно показать, имеет место непрерывная в среднем зависимость решения от функций  $\varphi_0$  и  $\varphi_1$  соответственно порядка  $(1, 1)$  и  $(0, 1)$ . Это свойство, как можно установить, является математическим отражением того факта, что малое изменение энергии колеблющегося воздуха в начальный момент вызывает малое изменение энергии впоследствии.

В математической физике обычно пользуются понятием непрерывной зависимости порядка  $(p, k)$ , либо непрерывной в среднем зависимости порядка  $(p, k)$ . Существуют естественные определения непрерывной зависимости, отличающиеся от двух приведенных выше, но мы их не будем касаться.

Заметим, что может иметь место непрерывная зависимость в смысле одного определения, в то время как в смысле другого определения ее может не быть.

Если для любой системы функций  $\{\varphi_j(S_i)\}$  из  $\Phi$  можно указать такую область  $\Omega'$ , содержащую многообразия  $S_i$ , что решение  $u$  задачи (II.16), (II.17) зависит в этой области от предельных условий непрерывно порядка  $(p, k)$  или непрерывно в среднем порядка  $(p, k)$ , где  $p$  и  $k$  — какие-нибудь натуральные числа, то мы будем говорить, что *задача (II.16), (II.17) поставлена корректно*. В противном случае *задача поставлена некорректно*. Иногда рассматривают не любую, а какую-нибудь фиксированную систему функций  $\{\varphi_j(S_i)\}$ , и соответственно говорят о корректности постановки задачи для этой системы функций.

Для обыкновенных дифференциальных уравнений задача об интегрировании уравнения

$$\frac{d^m u}{dx^m} = f\left(x, u, \frac{du}{dx}, \dots, \frac{d^{m-1}u}{dx^{m-1}}\right)$$

с начальными условиями

$$u \Big|_{x=0} = u_0, \quad \frac{du}{dx} \Big|_{x=0} = u_1, \dots, \quad \frac{d^{m-1}u}{dx^{m-1}} \Big|_{x=0} = u_{m-1}$$

при ограничениях, налагаемых на функцию  $f$  теоремой существования и единственности, как известно, всегда поставлена корректно.

То же самое относится к уравнениям в частных производных 1-го порядка

$$\frac{\partial u}{\partial t} = f \left( t, x, y, z, \frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}, \frac{\partial u}{\partial z} \right).$$

Задача Коши, т. е. задача решения уравнения при начальных данных  $u|_{t=0} = u_0(x, y, z)$ , для этого уравнения поставлена корректно, так как  $u$  зависит от  $u_0$  непрерывно до порядка (1.1).

Это обстоятельство для уравнений в частных производных более высокого порядка уже не всегда будет иметь место; поэтому ставить для них ту же задачу Коши не всегда имеет смысл.

Разберем следующий пример, принадлежащий Адамару. Найдем решение уравнения

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0 \quad (\text{II.20})$$

в полуполосе  $y > 0$ ;  $-\frac{\pi}{2} \leq x \leq \frac{\pi}{2}$ , удовлетворяющее условиям

$$u \Big|_{x=-\frac{\pi}{2}} = u \Big|_{x=\frac{\pi}{2}} = u|_{y=0} = 0; \quad \frac{\partial u}{\partial y} \Big|_{y=0} = e^{-\sqrt{n}} \cos(n, x), \quad (\text{II.21})$$

где  $n$  нечетное число.

Нетрудно видеть, что это решение будет иметь вид

$$u = \frac{1}{n} e^{-\sqrt{n}} \cos nx \cdot \operatorname{sh} ny. \quad (\text{II.22})$$

Можно доказать, что решение поставленной задачи единственно. Легко видеть, что когда  $n$  стремится к бесконечности, функция  $e^{-\sqrt{n}} \cos nx$  равномерно стремится к нулю и притом не только сама, но и все ее производные. Однако решение (II.22) при любом  $y$ , отличном от нуля, имеет вид косинусоиды со сколь угодно большой амплитудой.

Ясно, что в этом случае ни в какой области  $x, y$ , примыкающей к оси  $y = 0$ , не имеет места непрерывная зависимость в смысле первого определения.

Покажем, что нет непрерывной зависимости и в смысле второго определения. Легко видеть, что интеграл

$$\int_0^y \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \left( \frac{1}{n} e^{-\sqrt{n}} \cos nx \cdot \operatorname{sh} ny \right)^2 dx dy$$

при  $n \rightarrow \infty$  стремится к бесконечности, сколь бы мало ни было значение  $y > 0$ , откуда и следует справедливость нашего утверждения.

Итак, рассмотренная задача для уравнения Лапласа поставлена некорректно.

Если рассматривать вопрос о непрерывной зависимости в бесконечной области, то даже для обыкновенных дифференциальных уравнений этот вопрос перестает быть столь простым. Непрерывная зависимость от начальных данных там носит название «устойчивости по Ляпунову».

Аналогичные вопросы теории уравнений в частных производных также естественно называть теорией устойчивости. Эти вопросы пока еще мало разработаны и трудны для элементарного курса, и мы заниматься ими не будем.

Решение задачи, некорректно поставленной, в большинстве случаев не имеет практической ценности.

Разбирая решения всех задач, входящих в курс, мы будем каждый раз останавливаться на корректности их постановки.

В следующей лекции мы займемся более детальным изучением различий между всеми теми уравнениями, которые мы до сих пор изучали.

---

# КЛАССИФИКАЦИЯ ЛИНЕЙНЫХ УРАВНЕНИЙ 2-го ПОРЯДКА

## § 1. Линейные уравнения и квадратичные формы. Канонический вид уравнения

Все рассмотренные нами до сих пор уравнения представляли собой линейные уравнения 2-го порядка с вещественными коэффициентами, т. е. уравнения вида

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n A_{ij} \frac{\partial^2 u}{\partial x_i \partial x_j} + \sum_{i=1}^n B_i \frac{\partial u}{\partial x_i} + Cu = F, \quad (\text{III.1})$$

где  $A_{ij}$ ,  $B_i$ ,  $C$  и  $F$  представляют собой заданные функции от  $x_1$ ,  $x_2$ , ...,  $x_n$ . Для того чтобы изучить свойства этих уравнений более детально, мы займемся исследованием некоторых свойств их коэффициентов. Посмотрим прежде всего, по какому закону преобразуются коэффициенты уравнения (III.1) при произвольной замене независимых переменных, или, что то же самое, при каком-либо геометрическом преобразовании пространства переменных  $x_1$ ,  $x_2$ , ...,  $x_n$ .

Введем вместо  $x_1$ ,  $x_2$ , ...,  $x_n$  новые переменные

$$y_1, y_2, \dots, y_n.$$

Допустим, что функции  $y_1(x_1, \dots, x_n)$ , ...,  $y_n(x_1, \dots, x_n)$  обладают непрерывными вторыми производными.

Тогда

$$\frac{\partial u}{\partial x_i} = \sum_{l=1}^n \frac{\partial u}{\partial y_l} \frac{\partial y_l}{\partial x_i}; \quad (\text{III.2})$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x_i \partial x_j} = \frac{\partial}{\partial x_j} \left( \frac{\partial u}{\partial x_i} \right) = \sum_{h=1}^n \sum_{l=1}^n \frac{\partial^2 u}{\partial y_l \partial y_h} \frac{\partial y_l}{\partial x_i} \frac{\partial y_h}{\partial x_j} + \sum_{l=1}^n \frac{\partial u}{\partial y_l} \frac{\partial^2 y_l}{\partial x_i \partial x_j}. \quad (\text{III.3})$$

Подставляя выражения (III.2) и (III.3) в уравнение (III.1), мы получим:

$$\sum_{k=1}^n \sum_{l=1}^n \frac{\partial^2 u}{\partial y_k \partial y_l} \left( \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n A_{ij} \frac{\partial y_k}{\partial x_i} \frac{\partial y_l}{\partial x_j} \right) + \\ + \sum_{l=1}^n \frac{\partial u}{\partial y_l} \left( \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n A_{ij} \frac{\partial^2 y_l}{\partial x_i \partial x_j} + \sum_{i=1}^n B_i \frac{\partial y_l}{\partial x_i} \right) + Cu = F. \quad (\text{III.4})$$

Если обозначить через  $\bar{A}_{kl}$  новые коэффициенты при вторых производных  $\frac{\partial^2 u}{\partial y_k \partial y_l}$  в уравнении (III.4), то, очевидно,

$$\bar{A}_{kl} = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n A_{ij} \frac{\partial y_k}{\partial x_i} \frac{\partial y_l}{\partial x_j}. \quad (\text{III.5})$$

Фиксируем определенную точку пространства, и пусть в этой точке

$$\frac{\partial y_k}{\partial x_i} = \alpha_{ki}. \quad (\text{III.6})$$

Формулы преобразования

$$\bar{A}_{kl} = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n A_{ij} \alpha_{ki} \alpha_{lj} \quad (\text{III.7})$$

совпадают с формулами преобразования коэффициентов квадратичной формы

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n A_{ij} p_i p_j, \quad (\text{III.8})$$

если сделать в ней замену переменных:

$$p_i = \sum_{k=1}^n \alpha_{ki} q_k, \quad (\text{III.9})$$

переводящую ее в форму

$$\sum_{k=1}^n \sum_{l=1}^n \bar{A}_{kl} q_k q_l. \quad (\text{III.10})$$

Для того чтобы формулы (III.9) давали взаимно однозначную замену переменных, необходимо, разумеется, потребовать, чтобы определитель  $[\alpha_{ki}]$  был отличен от нуля.

Если мы хотим, чтобы замена переменных помогла нам как-либо упростить уравнение (III.1), мы можем вместо этой задачи рассмотреть другую задачу об упрощении вида квадратичной формы (III.8) при помощи замены переменных (III.9) с вещественными  $\alpha_{ki}$ .

Такая задача встречается в курсе аналитической геометрии при упрощении уравнений поверхностей 2-го порядка. Здесь эта задача будет еще легче, так как мы не связаны ортогональностью преобразований, и нам нет надобности требовать, чтобы в пространстве  $p_1, p_2, \dots, p_n$  направления осей  $q_1, q_2, \dots, q_n$  были ортогональны.

В курсе линейной алгебры доказывается, что всегда можно выбрать коэффициенты преобразования таким образом, чтобы квадратичная форма (III.8) приняла вид

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n A_{ij} p_i p_j = \sum_{i=1}^n k_i q_i^2, \quad (\text{III.11})$$

где  $k_i$  — некоторые числа, положительные или отрицательные.

Справедлива следующая

**Теорема 1.** (Закон инерции квадратичных форм). Число положительных, а также число отрицательных чисел среди коэффициентов  $k_1, k_2, \dots, k_n$  не зависит от того, как выбрана замена переменных (III.9) с определителем  $|\alpha_{ki}|$ , отличным от нуля, приводящая квадратичную форму (III.8) к виду (III.11).

Отсюда, между прочим, следует, что число коэффициентов  $k_n$ , не равных нулю, также одинаково при всех представлениях (III.11).

Теорема эта также доказывается в курсах линейной алгебры, но мы изложим здесь ее доказательство.

Приведа нашу форму двумя способами к сумме квадратов, мы получим равенство

$$\sum_{i=1}^n k_i q_i^2 = \sum_{s=1}^n \rho_s m_s^2, \quad (\text{III.12})$$

где  $m_s$  и  $q_i$  — координаты в пространстве, выбранные в обоих случаях, связаны между собой линейными соотношениями

$$m_s = \sum_{i=1}^n \beta_{si} q_i.$$

Допустим, например, что число положительных  $k_i$  больше, чем число положительных  $\rho_s$ . Приравняем нулю все те  $q_i$ , коэффициенты при квадратах которых неположительны, а также все те  $m_s$ , коэффициенты при квадратах которых положительны. Если считать, что

$$k_1 \geq k_2 \geq \dots \geq k_r > 0 \geq k_{r+1} \geq k_{r+2} \geq \dots \geq k_n, \\ \rho_1 \geq \rho_2 \geq \dots \geq \rho_t > 0 \geq \rho_{t+1} \geq \rho_{t+2} \geq \dots \geq \rho_n,$$

то положим

$$q_{r+1} = q_{r+2} = \dots = q_n = 0, \\ m_1 = m_2 = \dots = m_t = 0.$$

Те из выписанных выше соотношений между  $m_s$  и  $q_l$ , левые части которых оказались равными нулю, можно рассматривать как систему однородных линейных уравнений для определения  $q_1, q_2, \dots, q_r$ , а остальные — как равенства, определяющие значения  $m_{t+1}, m_{t+2}, \dots, m_n$ . Ввиду того, что число этих уравнений меньше, чем число неизвестных, мы можем всегда найти решение этой системы, в котором не все  $q_1, q_2, \dots, q_r$  обращаются в нуль. Подставляя эти значения  $q_1, q_2, \dots, q_r$  в равенство (III.12), мы видим, что левая часть его будет положительна, а правая неположительна, следовательно, равенство (III.12) не имеет места, и наше предположение неверно.

Теорема доказана.

Эта теорема позволяет получить классификацию уравнений в частных производных 2-го порядка.

В каждой точке пространства переменных  $(x_1, x_2, \dots, x_n)$  мы можем совершить замену независимых переменных  $p_i$  таким образом, чтобы в этой точке форма

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n A_{ij} p_i p_j$$

превратилась в сумму квадратов с некоторыми коэффициентами:

$$\sum_{i=1}^n k_i r_i^2.$$

Далее, простая замена

$$q_i = \sqrt{|k_i|} r_i$$

превращает нашу форму в выражение

$$\sum_{i=1}^r q_i^2 - \sum_{i=r+1}^m q_i^2, \quad (\text{III.13})$$

где  $r$  — число положительных коэффициентов  $k_i$ , а  $m$  — общее число коэффициентов, не равных нулю.

Допустим теперь, что подстановка (III.9), приводящая основную форму (III.8) к виду (III.13), найдена и записывается формулами

$$p_i = \sum_{k=1}^n a_{ik}^* q_k.$$

Введем линейную замену независимых переменных  $x_1, x_2, \dots, x_n$  в нашем пространстве с помощью формул

$$y_k = \sum_{i=1}^n a_{ki}^* x_i,$$

При этом в формуле (III.6)  $\alpha_{hi} = \alpha_{hi}^*$  и, следовательно, в рассматриваемой точке пространства все  $\bar{A}_{hi}$  при  $i \neq k$  будут равны нулю, а  $\bar{A}_{ii}$  — либо  $\pm 1$ , либо нулю. Совокупность членов уравнения, содержащих вторые производные, примет вид

$$\sum_{i=1}^r \frac{\partial^2 u}{\partial y_i^2} - \sum_{i=r+1}^m \frac{\partial^2 u}{\partial y_i^2}.$$

Если уравнение (III.1) имеет постоянные коэффициенты, то линейная замена переменных переведет его снова в уравнение с постоянными коэффициентами. Следовательно, мы сумеем в этом случае во всем пространстве привести уравнение к такому виду, когда в новых координатах все коэффициенты при смешанных производных 2-го порядка обратятся в нуль, а коэффициенты при тех производных  $\frac{\partial^2 u}{\partial x_i^2}$ , которые не обратятся в нуль, будут равны  $\pm 1$ .

Этот вид мы будем называть *каноническим*.

Как мы увидим в дальнейшем, характер уравнения 2-го порядка полностью определится числом  $r$  положительных и числом  $s$  отрицательных коэффициентов после такого преобразования. Если мы будем рассматривать уравнения с переменными коэффициентами, то такое приведение к каноническому виду сразу во всем пространстве становится невозможным, и мы вынуждены будем ограничиться приведением к каноническому виду в каждой точке пространства отдельно. При этом в различных точках мы будем получать, возможно, разные значения чисел  $r$  и  $s$ . Бывает удобно, разбив пространство на части, где  $r$  и  $s$  постоянны, исследовать уравнение порознь в каждой части.

Введем теперь понятие о типе уравнения в частных производных 2-го порядка. В области, где  $r$  и  $s$  сохраняют постоянные значения, мы будем говорить, что *уравнение принадлежит к типу*  $(r, s)$ ; очевидно, что типы  $(r, s)$  и  $(s, r)$  по существу совпадают, так как перемена знаков у всех коэффициентов меняет  $r$  и  $s$  местами. Уравнение колебаний струны имеет тип  $(1, 1)$  при  $n = 2$ . Уравнение колебаний мембраны относится к типу  $(2, 1)$  при  $n = 3$ . Уравнение передачи тепла принадлежит к типу  $(3, 0)$  при  $n = 4$ , уравнение Лапласа — к типу  $(3, 0)$  при  $n = 3$ .

Мы будем называть тип  $(n, 0)$  *эллиптическим* типом, типы  $(r, s)$ , где  $r + s = n$ ,  $s > 0$ ,  $r > 0$ , *гиперболическими*. Из них тип  $(n - 1, 1)$  мы будем называть *нормально-гиперболическим*. Типы  $(r, s)$ , где  $r + s < n$ , будут называться *параболическими*.

*Нормально-параболическим* назовем тип  $(n - 1, 0)$ . Параболические типы, где  $s = 0$ , будут называться *эллиптико-параболическими*, а типы, где  $r > 0$  и  $s > 0$ , — *гиперболо-параболическими*.

Уравнения колебаний струны и мембраны (I.9) и (I.13) принадлежат, очевидно, к нормально-гиперболическому типу,

уравнение теплопроводности (I.19) — к нормально-параболическому, а уравнение Лапласа — к эллиптическому.

В нашем курсе мы ограничимся лишь изучением нормально-гиперболического, нормально-параболического и эллиптического типов. Все уравнения, рассмотренные нами в лекции I, имели канонический вид и относились именно к этим типам. Мы видим, таким образом, что эти уравнения не сводимы одно к другому вещественными преобразованиями координат и что каждое из них является в некотором роде типичным.

**З а м е ч а н и е.** Координатная система, в которой уравнение принимает канонический вид, не является единственной.

Уравнение Лапласа  $\Delta u = \frac{\partial^2 u}{\partial x_1^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial x_2^2} + \dots + \frac{\partial^2 u}{\partial x_n^2}$  остается инвариантным при любом переносе начала координат и ортогональном преобразовании координат.

В самом деле, коэффициенты  $A_{kl}$  после такого поворота будут иметь вид

$$\bar{A}_{kl} = \sum_{i=1}^n \alpha_{ik} \alpha_{il},$$

где

$$\alpha_{ik} = \frac{\partial y_k}{\partial x_i} = \cos(y_k, x_i),$$

и, так как в силу условий ортогональности

$$\sum_{i=1}^n \alpha_{ik} \alpha_{il} = \begin{cases} 1 & (k=l), \\ 0 & (k \neq l), \end{cases} \quad \text{то} \quad \bar{A}_{kl} = \begin{cases} 1 & (k=l), \\ 0 & (k \neq l), \end{cases}$$

что и требовалось доказать.

Преобразования независимых переменных, оставляющие волновое уравнение инвариантным, носят название *преобразований Лоренца*. Они играют важную роль в теории относительности.

## § 2. Канонический вид уравнений с двумя независимыми переменными

Как мы видели, уравнение с переменными коэффициентами всегда может быть приведено к каноническому виду в отдельной точке пространства. Если число независимых переменных больше двух, то привести уравнение к каноническому виду во всей области задания уравнения можно лишь в исключительных случаях. Однако уравнение с двумя независимыми переменными всегда может быть приведено к каноническому виду во всей области изменения новых независимых переменных.

Рассмотрим этот вопрос подробнее. В случае двух переменных сумма членов, содержащих вторые производные, может быть

записана в виде

$$Lu \equiv A \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + 2B \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} + C \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}.$$

Мы будем называть эту сумму *главным членом оператора 2-го порядка*.

Оператор  $Lu$  после перехода к новым переменным  $\xi = \xi(x, y)$ ,  $\eta = \eta(x, y)$  примет вид

$$\begin{aligned} Lu = & \left[ A \left( \frac{\partial \xi}{\partial x} \right)^2 + 2B \frac{\partial \xi}{\partial x} \frac{\partial \xi}{\partial y} + C \left( \frac{\partial \xi}{\partial y} \right)^2 \right] \frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2} + \\ & + 2 \left[ A \frac{\partial \xi}{\partial x} \frac{\partial \eta}{\partial x} + B \left( \frac{\partial \xi}{\partial x} \frac{\partial \eta}{\partial y} + \frac{\partial \eta}{\partial x} \frac{\partial \xi}{\partial y} \right) + C \frac{\partial \xi}{\partial y} \frac{\partial \eta}{\partial y} \right] \frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} + \\ & + \left[ A \left( \frac{\partial \eta}{\partial x} \right)^2 + 2B \frac{\partial \eta}{\partial x} \frac{\partial \eta}{\partial y} + C \left( \frac{\partial \eta}{\partial y} \right)^2 \right] \frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2} + \frac{\partial u}{\partial \xi} L\xi + \frac{\partial u}{\partial \eta} L\eta = \\ & = L_1 u + \frac{\partial u}{\partial \xi} L\xi + \frac{\partial u}{\partial \eta} L\eta. \end{aligned}$$

Относительно функций  $\xi(x, y)$  и  $\eta(x, y)$  помимо гладкости мы будем предполагать, что линии  $\xi(x, y) = \text{const}$  и  $\eta(x, y) = \text{const}$  некасаются в точках их пересечения. Через  $L_1 u$  здесь обозначен главный член оператора в новых переменных.

Для того чтобы после преобразования координат уравнение имело канонический вид, необходимо, во-первых, чтобы обратился в нуль коэффициент при смешанной производной

$$B_1 = A \frac{\partial \xi}{\partial x} \frac{\partial \eta}{\partial x} + B \left( \frac{\partial \xi}{\partial x} \frac{\partial \eta}{\partial y} + \frac{\partial \eta}{\partial x} \frac{\partial \xi}{\partial y} \right) + C \frac{\partial \xi}{\partial y} \frac{\partial \eta}{\partial y}$$

и, во-вторых, чтобы имело место равенство

$$A_1 = \pm C_1,$$

если уравнение принадлежит к эллиптическому или гиперболическому типу, и

$$A_1 = 0 \text{ или } C_1 = 0,$$

если уравнение параболического типа.

Из курса аналитической геометрии известно, что канонический вид формы

$$Ap^2 + 2Bpq + Cq^2,$$

коэффициенты которой преобразуются так же, как коэффициенты оператора  $Lu$ , определяется знаком ее дискриминанта

$$\Delta = B^2 - AC,$$

а именно:

если  $\Delta < 0$ , форма эллиптическая и приводится к виду  $r_1^2 + r_2^2$ ;  
если  $\Delta > 0$ , форма гиперболическая и приводится к виду  $r_1^2 - r_2^2$ ;  
если  $\Delta = 0$ , форма параболическая и приводится к виду  $r_1^2$ .

В последнем случае мы исключим возможность полного вырождения формы ( $A = B = C = 0$ ). Рассмотрим сначала

параболический случай. Если  $\Delta = 0$ , то  $B^2 = AC$  и, значит, по крайней мере один из коэффициентов  $A$  и  $C$  не равен нулю. Пусть  $A \neq 0$ . Положим

$$k = \frac{B}{A} = \frac{C}{B}.$$

(Если  $B = 0$ , то и  $C = 0$  и, значит, уравнение уже имеет канонический вид.) Имеем:

$$\begin{aligned} A_1 &= A \left( \frac{\partial \xi}{\partial x} \right)^2 + 2B \frac{\partial \xi}{\partial x} \frac{\partial \xi}{\partial y} + C \left( \frac{\partial \xi}{\partial y} \right)^2 = A \left( \frac{\partial \xi}{\partial x} + k \frac{\partial \xi}{\partial y} \right)^2; \\ C_1 &= A \left( \frac{\partial \eta}{\partial x} \right)^2 + 2B \frac{\partial \eta}{\partial x} \frac{\partial \eta}{\partial y} + C \left( \frac{\partial \eta}{\partial y} \right)^2 = A \left( \frac{\partial \eta}{\partial x} + k \frac{\partial \eta}{\partial y} \right)^2; \\ B_1 &= A \frac{\partial \xi}{\partial x} \frac{\partial \eta}{\partial x} + B \left( \frac{\partial \xi}{\partial x} \frac{\partial \eta}{\partial y} + \frac{\partial \eta}{\partial x} \frac{\partial \xi}{\partial y} \right) + C \frac{\partial \xi}{\partial y} \frac{\partial \eta}{\partial y} = \\ &= A \left( \frac{\partial \xi}{\partial x} + k \frac{\partial \xi}{\partial y} \right) \left( \frac{\partial \eta}{\partial x} + k \frac{\partial \eta}{\partial y} \right). \end{aligned}$$

Для того чтобы обратились в нуль коэффициенты  $B_1$  и  $C_1$  одновременно, достаточно положить

$$\frac{\partial \eta}{\partial x} + k \frac{\partial \eta}{\partial y} = 0. \quad (\text{III.14})$$

Уравнение (III.14) есть уравнение 1-го порядка для неизвестной функции  $\eta(x, y)$ . Любое из решений этого уравнения мы примем за новое независимое переменное  $\eta$ . В новых переменных  $\xi, \eta$  главный член уравнения примет вид

$$A_1 \frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2}.$$

Коэффициент  $A_1$  нигде не может обращаться в нуль, так как ни  $A$ , ни  $\frac{\partial \xi}{\partial x} + k \frac{\partial \xi}{\partial y}$  в нуль не обращаются. В самом деле,  $A \neq 0$  по условию, а выражение  $\frac{\partial \xi}{\partial x} + k \frac{\partial \xi}{\partial y}$  могло бы обратиться в нуль лишь в тех точках, где линии  $\xi = \text{const}$  и  $\eta = \text{const}$  касательны, а таких точек быть не может. Разделив уравнение на  $A_1$ , приведем главный член к виду  $\frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2}$ . Полезно отметить, что уравнение (III.14) определяет лишь семейство линий  $\eta = \text{const}$ , причем остается некоторый произвол для выбора функции  $\xi(x, y)$ .

В случае, если уравнение 2-го порядка в частных производных принадлежит к эллиптическому или гиперболическому типу, легко добиться обращения в нуль коэффициента  $B_1$ . Полное приведение к каноническому виду уравнения эллиптического типа является сложной задачей, на которой мы не будем останавливаться. Уравнение гиперболического типа, как мы сейчас покажем, всегда легко преобразовать к каноническому виду.

Разберем вначале случай, когда линейное уравнение второго порядка с двумя независимыми переменными не принадлежит к параболическому типу и коэффициент  $A$  не обращается в нуль (случай  $C \neq 0, A = 0$  рассматривается аналогично; случай  $A = C = 0$  мы выделим особо). Итак, пусть  $A \neq 0$ . Положим:

$$\xi = x, \quad \eta = \varphi(x, y).$$

Тогда  $\frac{\partial \xi}{\partial y} = 0, \frac{\partial \xi}{\partial x} = 1$ , и условие обращения коэффициента  $B_1$  в нуль примет вид

$$A \frac{\partial \eta}{\partial x} + B \frac{\partial \eta}{\partial y} = 0. \quad (\text{III.15})$$

Принимая опять за  $\eta$  любое решение уравнения (III.15), получим систему координат, в которой уравнение имеет требуемый вид.

Этот вид не будет каноническим, так как в этой форме коэффициенты при вторых производных, вообще говоря, не равны положительной или отрицательной единице.

Если  $A = C = 0$ , то уравнение имеет главный член вида

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y}$$

и является гиперболическим. Легко видеть, что в этом случае оно приводится подстановкой

$$\xi = x + y, \quad \eta = x - y$$

к каноническому виду

$$\frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2} - \frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2} + \dots$$

Из этого видно, что приведение гиперболического уравнения к виду

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} + \dots$$

решило бы полностью нашу задачу. Кроме того, во многих вопросах именно этот вид является наиболее удобным, поэтому мы посвятим ему особый параграф.

### § 3. Второй канонический вид гиперболических уравнений с двумя независимыми переменными

Вторым каноническим видом для уравнений в частных производных 2-го порядка гиперболического типа с двумя независимыми переменными называется такая форма уравнения, при которой оно не содержит производных  $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$  и  $\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$ .

Из формул предыдущего параграфа вытекает, что для приведения уравнения к этому виду нужно найти функции  $\xi(x, y)$  и  $\eta(x, y)$ , удовлетворяющие уравнениям

$$\begin{aligned} A_1 &\equiv A \left( \frac{\partial \xi}{\partial x} \right)^2 + 2B \frac{\partial \xi}{\partial x} \frac{\partial \xi}{\partial y} + C \left( \frac{\partial \xi}{\partial y} \right)^2 = 0, \\ C_1 &\equiv A \left( \frac{\partial \eta}{\partial x} \right)^2 + 2B \frac{\partial \eta}{\partial x} \frac{\partial \eta}{\partial y} + C \left( \frac{\partial \eta}{\partial y} \right)^2 = 0. \end{aligned}$$

Оба уравнения, по сути дела, совпадают, поэтому нам нужно найти два независимых решения одного уравнения. Это уравнение может быть написано в виде

$$A \left( \frac{\partial \chi}{\partial x} \right)^2 + 2B \frac{\partial \chi}{\partial x} \frac{\partial \chi}{\partial y} + C \left( \frac{\partial \chi}{\partial y} \right)^2 = 0, \quad (\text{III.16})$$

где через  $\chi$  обозначена одна из функций  $\xi, \eta$ . Вдоль линии  $\chi = \text{const}$  мы имеем:

$$\frac{\partial y}{\partial x} = - \frac{\frac{\partial \chi}{\partial x}}{\frac{\partial \chi}{\partial y}},$$

поэтому уравнение (III.16) переписывается в виде

$$Ay'^2 - 2By' + C = 0.$$

В таком виде оно представляет собой квадратное уравнение относительно  $y'$ . Условие  $B^2 - AC > 0$  обеспечивает существование двух различных вещественных корней

$$\left. \begin{aligned} y_1 &= \frac{B + \sqrt{B^2 - AC}}{A}, \\ y_2 &= \frac{B - \sqrt{B^2 - AC}}{A}. \end{aligned} \right\} \quad (\text{III.17})$$

Взяв интегральные кривые первого и второго из уравнений (III.17) соответственно за линии  $\xi = \text{const}$  и  $\eta = \text{const}$ , мы получим решение нашей задачи.

#### § 4. Характеристики

Введение соответственно подобранных переменных  $\xi$  и  $\eta$  избавило нас в уравнении гиперболического типа с двумя переменными от членов, содержащих  $\frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2}$  и  $\frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2}$ .

В общем случае  $n$  переменных мы также могли бы, выбрав координаты  $y_1, y_2, \dots, y_n$ , добиться, например, того, чтобы

в уравнение не вошел член, содержащий  $\frac{\partial^2 u}{\partial y_1^2}$ . Мы видели, что коэффициент при этой производной выражается формулой

$$\bar{A}_{11} = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n A_{ij} \alpha_{1i} \alpha_{1j} = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n A_{ij} \frac{\partial y_1}{\partial x_i} \frac{\partial y_1}{\partial x_j}. \quad (\text{III.18})$$

Относительно функции  $y_1(x_1, x_2, \dots, x_n)$  будем предполагать, что на поверхности  $y_1 = 0$  и в некоторой ее окрестности справедливо неравенство

$$\sum_{i=1}^n \left( \frac{\partial y_1}{\partial x_i} \right)^2 > 0,$$

которое обеспечивает отсутствие особых точек на поверхностях  $y_1(x_1, x_2, \dots, x_n) = \text{const}$ . Это условие может быть выполнено всегда, если поверхность  $y_1 = 0$  достаточно гладкая и семейство поверхностей  $y_1 = C$ , при переменном  $C$ , заполняет некоторую часть пространства, примыкающую к поверхности  $y_1 = 0$ . Любая гладкая поверхность с уравнением  $\varphi(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0$  может быть принята за поверхность  $y_1 = 0$ .

Рассмотрим условие обращения в нуль коэффициента  $A_{11}$  на поверхности  $y_1 = 0$ . Из курса дифференциального исчисления известны формулы

$$\cos(n, x_i) = \frac{\frac{\partial y_1}{\partial x_i}}{\sqrt{\sum_{k=1}^n \left( \frac{\partial y_1}{\partial x_k} \right)^2}},$$

где  $\cos(n, x_i)$  обозначает косинус угла между нормалью к поверхности  $y_1 = 0$  и осью  $x_i$ . Уравнение  $\bar{A}_{11} = 0$  переписывается таким образом в виде

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n A_{ij} \cos(n, x_i) \cos(n, x_j) = 0.$$

Это уравнение показывает, что обращение  $A_{11}$  в нуль на поверхности  $y_1 = 0$  есть индивидуальное свойство этой поверхности, совершенно не зависящее от выбора переменных  $y_2, y_3, \dots, y_n$ .

**О п р е д е л е н и е. Поверхность**

$$y_1(x_1, x_2, \dots, x_n) = c_0$$

называется *характеристикой уравнения* (III.1), если при замене переменных  $x_1, x_2, \dots, x_n$  на переменные  $y_1, y_2, \dots, y_n$ , где

$u_2, \dots, u_n$  — произвольные функции от  $x_1, x_2, \dots, x_n$ , непрерывные с производными первого порядка, и с неравным нулю якобианом вблизи рассматриваемой поверхности, коэффициент  $\bar{A}_{11}$  при  $\frac{\partial^2 u}{\partial y_1^2}$  обращается на этой поверхности в нуль.

Нетрудно проверить, что уравнения эллиптического типа не имеют вещественных характеристик, ибо  $\bar{A}_{11}$  представляет собою положительно определенную квадратичную форму относительно  $\alpha_{1i}$  и не может обратиться в нуль.

Если для уравнения

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n A_{ij} \frac{\partial^2 u}{\partial x_i \partial x_j} + \sum_{i=1}^n B_i \frac{\partial u}{\partial x_i} + Cu = F$$

поверхность  $x_1 = 0$  есть характеристика, т. е.  $A_{11}|_{x_1=0} = 0$ , то это уравнение представляет собою дифференциальное уравнение, связывающее  $u|_{x_1=0}$  и  $\frac{\partial u}{\partial x_1}|_{x_1=0}$ . В самом деле, мы можем переписать его при  $x_1 = 0$  в виде

$$\begin{aligned} 2 \sum_{i=2}^n A_{1i} \Big|_{x_1=0} \frac{\partial}{\partial x_i} \left( \frac{\partial u}{\partial x_1} \Big|_{x_1=0} \right) + \sum_{i=2}^n \sum_{j=2}^n A_{ij} \Big|_{x_1=0} \frac{\partial^2}{\partial x_i \partial x_j} (u|_{x_1=0}) + \\ + B_1 \Big|_{x_1=0} \left( \frac{\partial u}{\partial x_1} \Big|_{x_1=0} \right) + \sum_{i=2}^n B_i \Big|_{x_1=0} \frac{\partial}{\partial x_i} (u|_{x_1=0}) + \\ + C \Big|_{x_1=0} (u|_{x_1=0}) = F|_{x_1=0}. \quad (\text{III.19}) \end{aligned}$$

Задачей Коши для уравнения 2-го порядка в общем виде называют задачу о нахождении решения этого уравнения, удовлетворяющего на некоторой поверхности  $S$  условиям:

$$u|_S = \Phi_0; \quad \frac{\partial u}{\partial n} \Big|_S = \Phi_1.$$

Мы видели выше на примерах, что к этой задаче приводит, в частности, рассмотрение колебаний струны или мембраны, когда в начальный момент времени задаются положения и скорости частиц колеблющегося тела.

Полезно заметить, что, вообще говоря, нет надобности задавать именно нормальную производную  $\frac{\partial u}{\partial n} \Big|_S$ . В самом деле, задание самой неизвестной функции на  $S$  позволяет определить все ее производные в касательной плоскости, а знание нормальной производной позволяет найти значение градиента функции на поверхности  $S$ . Производная же от функции по любому направлению есть проекция ее градиента на это направление. Этой же цели

мы достигнем, если нам будет известна в каждой точке поверхности производная от  $u$  по любому некасательному направлению.

Из равенства (III.19) следует, что в случае, когда поверхность  $x_1 = 0$  есть характеристика,  $u|_{x_1=0}$  и  $\frac{\partial u}{\partial x_1}|_{x_1=0}$  не являются независимыми функциями переменных  $x_2, x_3, \dots, x_n$ , и задачу Коши для этой поверхности  $x_1 = 0$  ставить нельзя, ибо, задавая произвольно  $u|_{x_1=0}$  и  $\frac{\partial u}{\partial x_1}|_{x_1=0}$ , мы придем к противоречию с уравнением (III.19).

Предыдущие рассуждения показывают, что на характеристических поверхностях нельзя задавать произвольно функцию и какую-либо составляющую градиента, не лежащую в касательной плоскости.

---

## ЛЕКЦИЯ IV

# УРАВНЕНИЕ КОЛЕБАНИЙ СТРУНЫ И ЕГО РЕШЕНИЕ МЕТОДОМ ДАЛАМБЕРА

### § 1. Формула Даламбера. Неограниченная струна

Приводя ко второму каноническому виду уравнение свободных колебаний струны, т. е. уравнение колебаний в отсутствии внешних поперечных сил

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - \frac{1}{a^2} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = 0, \quad (\text{IV.1})$$

где  $a = \sqrt{\frac{T}{\rho}}$ , мы положим:

$$\left. \begin{aligned} \xi &= x - at, \\ \eta &= x + at. \end{aligned} \right\} \quad (\text{IV.2})$$

Тогда уравнение (IV.1) перейдет в уравнение:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} = 0. \quad (\text{IV.3})$$

Решение уравнения (IV.3) легко получается в общем виде, причем это общее решение, в противоположность тому общему положению, о котором мы говорили в лекции II, позволяет также легко получать решения различных конкретных задач.

Из (IV.3) имеем:

$$\frac{\partial}{\partial \xi} \frac{\partial u}{\partial \eta} = 0,$$

откуда

$$\frac{\partial u}{\partial \eta} = \psi'_2(\eta), \quad (\text{IV.4})$$

где  $\psi'_2(\eta)$  — произвольная функция.

Из (IV.4) находим:

$$u = \psi_2(\eta) + \psi_1(\xi),$$

где  $\psi_1(\xi)$  — произвольная функция. Возвращаясь к переменным  $x$ ,  $t$ , получаем:

$$u = \psi_1(x - at) + \psi_2(x + at). \quad (\text{IV.5})$$

Полученное решение зависит от двух произвольных функций  $\psi_1$  и  $\psi_2$ . Оно называется *решением Даламбера*.

Для того чтобы решить ту или иную задачу о свободных колебаниях струны, мы должны лишь в каждом конкретном случае определить  $\psi_1$  и  $\psi_2$ .

Рассмотрим прежде всего задачу Коши для неограниченной струны, т. е. задачу отыскания решения, удовлетворяющего условиям:

$$\left. \begin{aligned} u|_{t=0} &= \varphi_0(x), \\ \frac{\partial u}{\partial t}|_{t=0} &= \varphi_1(x). \end{aligned} \right\} \quad (\text{IV.6})$$

Подставляя формулу (IV.5) в (IV.6), будем иметь:

$$\begin{aligned} \psi_1(x) + \psi_2(x) &= \varphi_0(x), \\ -a\psi_1'(x) + a\psi_2'(x) &= \varphi_1(x), \end{aligned}$$

откуда

$$-a\psi_1(x) + a\psi_2(x) = \int_0^x \varphi_1(x) dx + aC,$$

где  $C$  — произвольная постоянная, или

$$\begin{aligned} \psi_1(x) &= \frac{1}{2} \left[ \varphi_0(x) - \frac{1}{a} \int_0^x \varphi_1(x) dx - C \right], \\ \psi_2(x) &= \frac{1}{2} \left[ \varphi_0(x) + \frac{1}{a} \int_0^x \varphi_1(x) dx + C \right]. \end{aligned}$$

При этом

$$\begin{aligned} u &= \frac{1}{2} \left[ \varphi_0(x - at) - \frac{1}{a} \int_0^{x-at} \varphi_1(y) dy - C + \right. \\ &\quad \left. + \varphi_0(x + at) + \frac{1}{a} \int_0^{x+at} \varphi_1(y) dy + C \right], \end{aligned}$$

и окончательно получаем формулу

$$u = \frac{1}{2} \left[ \varphi_0(x - at) + \varphi_0(x + at) + \frac{1}{a} \int_{x-at}^{x+at} \varphi_1(y) dy \right]. \quad (\text{IV.7})$$

Очевидно, что полученное решение удовлетворяет уравнению (IV.1), а также начальным условиям. Способ вывода (IV.7)

доказывает единственность решения поставленной задачи. Несомненно, далее, корректность постановки задачи. Для каждого  $\varepsilon > 0$  мы можем указать такое  $\eta$ , что если мы заменим  $\varphi_0(x)$  и  $\varphi_1(x)$  на  $\varphi_0^{(1)}(x)$  и  $\varphi_1^{(1)}(x)$  так, что

$$|\varphi_0(x) - \varphi_0^{(1)}(x)| < \eta, \quad |\varphi_1(x) - \varphi_1^{(1)}(x)| < \eta,$$

то разность между новым решением и первоначальным будет по абсолютной величине меньше  $\varepsilon$  на любом заранее заданном конечном отрезке времени. Таким образом, решение задачи зависит от начальных данных непрерывно порядка  $(0,0)$ . Полезно рассмотреть несколько подробнее качественную картину колебания неограниченной струны. Разберем несколько простейших случаев.

**С л у ч а й 1.** Функция  $\varphi_1(x)$  тождественно равна 0, функция  $\varphi_0(x)$  отлична от нуля лишь в конечном промежутке  $-k \leq x \leq k$ .

Решение (IV.7) выражается при этом формулой

$$u = \frac{1}{2} [\varphi_0(x - at) + \varphi_0(x + at)];$$

слагаемое  $\frac{1}{2} \varphi_0(x - at)$  есть постоянное по форме возмущение, передвигающееся со скоростью  $a$  в положительном направлении




Рис. 4

по оси  $x$ . Это ясно из того, что, поместив начало подвижной системы координат  $\xi$  в точке  $x = at$ , т. е. полагая  $\xi = x - at$ , мы будем видеть в этой подвижной системе координат возмущение постоянным. Аналогично, слагаемое  $\frac{1}{2} \varphi_0(x + at)$  есть такое же по форме возмущение, идущее в другую сторону. Возмущения эти называются *волнами*. Первое — пря-

мая волна, а второе — обратная волна. Вначале волны налегают одна на другую, а затем расходятся и потом все больше разбегаются в разные стороны друг от друга.

В каждом месте струны после прохождения обеих волн (а для точек, лежащих вне области начального возмущения, после прохождения только одной) воцаряется покой. Схематически вид возмущенной струны изображен на рис. 4.

**С л у ч а й 2.** Функция  $\varphi_0(x)$  тождественно равна нулю, а  $\varphi_1(x)$  отлична от нуля лишь в конечном промежутке  $-k \leq x \leq k$ . В таком случае говорят иногда, что струна не имеет начального возмущения, а имеет лишь начальный импульс.

Рассмотрим функцию  $\Phi_1(x)$ , первообразную для  $\varphi_1(x)$ , равную нулю при значениях  $x$  в промежутке  $-\infty < x \leq -k$ . При  $x \geq k$  она будет равна некоторой постоянной, значение которой, вообще говоря, отлично от нуля. Очевидно, эта постоянная равна

$$\int_{-k}^k \varphi_1(x) dx.$$

Формула (IV.7) дает:

$$u = \frac{1}{2a} [\Phi_1(x+at) - \Phi_1(x-at)].$$

В этом случае по струне опять бегут две волны — одна прямая и одна обратная. Волны эти будут отличаться лишь знаком одна от другой.

Там, где обе волны — и прямая, и обратная — уже прошли, струна придет в состояние покоя, но не вернется, вообще говоря, к исходному положению, так как для достаточно больших значений времени  $x+at > k$  и  $\Phi_1(x+at)$  будет при этом равна постоянной, а  $x-at < -k$  и  $\Phi_1(x-at)$  равна нулю.

В струне останется так называемое остаточное смещение. Форма отклонения струны в этом случае изображена на рис. 5.




Рис. 5.

Легко убедиться в том, что можно было бы так задать начальное возмущение и начальную скорость струны, чтобы получить волну, идущую в одном направлении. Для этого нужно лишь, чтобы обратные волны, вызванные начальным смещением и начальным импульсом, отличались одна от другой только знаком.

## § 2. Струна с двумя закрепленными концами

Рассмотрим теперь струну с закрепленными концами и будем искать решение при условиях (IV.6) и условиях

$$u|_{x=0} = 0 \text{ и } u|_{x=l} = 0.$$

Функции  $\varphi_0(x)$  и  $\varphi_1(x)$  в этом случае, очевидно, будут заданы только в промежутке  $0 \leq x \leq l$ .

Возвращаясь к формуле (IV.5), мы видим, что нужно определить  $\psi_1(x)$  в промежутке от  $-\infty$  до  $l$ , а  $\psi_2(x)$  в промежутке

от 0 до  $+\infty$ . Подставляя в решение (IV.5)  $x = 0$  и  $x = l$ , получим:

$$\left. \begin{aligned} \psi_1(-at) + \psi_2(at) &= 0, \\ \psi_1(l-at) + \psi_2(l+at) &= 0 \end{aligned} \right\} \quad (\text{IV.8})$$

или

$$\left. \begin{aligned} \psi_1(-x) + \psi_2(x) &= 0, & 0 \leq x < \infty; \\ \psi_1(-x) + \psi_2(x+2l) &= 0, & -l \leq x < \infty. \end{aligned} \right\} \quad (\text{IV.8}')$$

Всякие две функции  $\psi_1(x)$  и  $\psi_2(x)$ , удовлетворяющие (IV.8'), дают решение поставленной задачи.

Первое из условий (IV.8) позволяет выразить функцию  $\psi_2(x)$  при положительных значениях аргумента через  $\psi_1(x)$  при отрицательных значениях аргумента. Подставляя значение функции  $\psi_2(x)$ , определяемое из первого условия, во второе, получим:

$$\psi_1(-x) - \psi_1(-x-2l) = 0. \quad (\text{IV.9})$$

Эта формула говорит о том, что функция  $\psi_1(x)$  должна быть периодической с периодом  $2l$  во всей области, где она нас интересует.

Рассматривая систему (IV.8') как систему уравнений с двумя неизвестными функциями, мы видим, что первое из этих уравнений можно рассматривать как определение  $\psi_2(x)$ . Очевидно, что эта система полностью эквивалентна уравнению (IV.9), удовлетворение которого обеспечивает удовлетворение обоих уравнений (IV.8). Формулируем полученный результат.

Нами доказано, что всякое решение уравнения (IV.1) при условиях (IV.8) выражается через произвольную периодическую функцию  $\psi_1(x)$  с периодом  $2l$ , заданную в промежутке  $-\infty < x \leq l$ , по формуле

$$u = \psi_1(x-at) - \psi_1(-x-at). \quad (\text{IV.10})$$

Если  $\psi_1(x)$  продолжить с периодом  $2l$  на всю прямую  $-\infty < x < \infty$ , то функция (IV.10) не изменится для значений  $0 \leq x \leq l$ , которые нас интересуют в рассматриваемой задаче. В то же время функция (IV.10) в этом случае станет решением некоторой задачи о колебании неограниченной струны.

Полагая в (IV.10)  $t = 0$ , видим, что

$$\begin{aligned} u|_{t=0} &= \psi_1(x) - \psi_1(-x), \\ \frac{\partial u}{\partial t} \Big|_{t=0} &= -a[\psi_1'(x) - \psi_1'(-x)]. \end{aligned}$$

Но  $\psi_1(x) - \psi_1(-x)$  есть, как легко видеть, нечетная функция, имеющая по доказанному, период  $2l$ . Такую функцию легко построить полностью по ее значениям на отрезке  $0 \leq x \leq l$ , где имеем равенство

$$\psi_1(x) - \psi_1(-x) = \varphi_0(x), \quad 0 \leq x \leq l.$$

Аналогично, исходя из равенства

$$-a\psi'_1(x) + a\psi'_1(-x) = \varphi_1(x) \text{ при } 0 \leq x \leq l,$$

легко построим  $-a[\psi'_1(x) - \psi'_1(-x)]$  всюду как нечетную периодическую функцию. Это равносильно продолжению функций  $\varphi_0(x)$  и  $\varphi_1(x)$  на всю прямую нечетным периодическим образом.

После того как функции  $\varphi_0(x)$  и  $\varphi_1(x)$  построены на всей прямой,  $\psi_1(x)$  можно без труда найти таким же образом, как мы это делали в случае неограниченной струны.

Отсюда следует, что решение нашей задачи выражается той же формулой (IV.7), если в ней считать  $\varphi_0(x)$  и  $\varphi_1(x)$  нечетными периодическими функциями. Формула (IV.7) действительно дает искомое решение, так как из нечетности начальных условий следует, что  $u|_{x=0} = 0$ ; нечетная функция периода  $2l$  является, очевидно, нечетной и относительно точек вида  $x = kl$  ( $k = 0, 1, -1, 2, -2, \dots$ ). Поэтому точно также  $u|_{x=l} = 0$ .

Необходимо сделать одно важное замечание. Строго говоря, функция, даваемая формулой (IV.5), будет удовлетворять уравнению в том случае, если  $\psi_1(x)$  и  $\psi_2(x)$  непрерывны вместе со своими производными до 2-го порядка.

Возникает вопрос, будет ли полученное нами решение обладать этим свойством.

Очевидно, это можно гарантировать, если  $\varphi_0(x)$  и  $\varphi_1(x)$  после своего продолжения будут удовлетворять этому условию. Читатель может сам проверить, что для этого необходимо иметь

$$\varphi_0(l) = \varphi_0'(l) = \varphi_0(0) = \varphi_0'(0) = 0,$$

$$\varphi_1(l) = \varphi_1'(l) = \varphi_1(0) = \varphi_1'(0) = 0.$$

Однако можно рассматривать и функции, не удовлетворяющие всем этим условиям. Тогда приходится соответствующим образом обобщить класс рассматриваемых решений уравнения (IV.1).

Этот вопрос мы рассмотрим позднее.

### § 3. Решение задачи для неоднородного уравнения и для более общих граничных условий

Рассмотрим теперь более общую задачу. Пусть требуется найти решение уравнения

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - \frac{1}{a^2} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = p(x, t) \quad (\text{IV.11})$$

при условиях

$$\left. \begin{aligned} \alpha u \Big|_{x=0} + \beta \frac{\partial u}{\partial x} \Big|_{x=0} &= f_1(t), \\ \gamma u \Big|_{x=l} + \delta \frac{\partial u}{\partial x} \Big|_{x=l} &= f_2(t) \end{aligned} \right\} \quad (\text{IV.12})$$

п

$$\left. \begin{aligned} u|_{t=0} &= \varphi_0(x), \\ \frac{\partial u}{\partial t}|_{t=0} &= \varphi_1(x). \end{aligned} \right\} \quad (\text{IV.13})$$

Отметим, что решение ищется в области, определяемой неравенствами  $0 < x < l$  и  $0 < t$ .

Прежде всего заметим, что легко построить некоторое частное решение уравнения (IV.11), не удовлетворяющее, правда, условиям (IV.12) и (IV.13). Вводя переменные  $\xi$  и  $\eta$ , при помощи формул

$$\left. \begin{aligned} \xi &= x - at, \\ \eta &= x + at, \end{aligned} \right\} \quad (\text{IV.14})$$

преобразуем уравнение (IV.11) к виду

$$4 \frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} = Q(\xi, \eta). \quad (\text{IV.15})$$

Область изменения переменных  $\xi$  и  $\eta$  будет:

$$\eta - \xi > 0, \quad (\text{IV.16})$$

$$0 < \xi + \eta < 2l; \quad (\text{IV.17})$$

на чертеже это будет полуплоскость (рис. 6). Продолжим функцию  $Q(\xi, \eta)$  совершенно произвольным образом за обе прямые

$$\left. \begin{aligned} \xi + \eta &= 0, \\ \xi + \eta &= 2l, \end{aligned} \right\}$$

определив ее во всей полуплоскости (IV.16). Если мы найдем решение уравнения (IV.15) во всей полуплоскости, то оно, очевидно, будет удовлетворять нашему уравнению и в полосе, определяемой неравенствами (IV.16) и (IV.17). Будем искать частное решение  $v_1$  уравнения (IV.15). Полагая

$$\frac{\partial v_1}{\partial \eta} = z(\xi, \eta), \quad (\text{IV.18})$$

из (IV.15) получим:

$$\frac{\partial z}{\partial \xi} = \frac{1}{4} Q(\xi, \eta); \quad (\text{IV.19})$$

частное решение уравнения (IV.19) имеет вид

$$z(\xi, \eta) = \frac{1}{4} \int_{\eta}^{\xi} Q(\alpha, \eta) d\alpha. \quad (\text{IV.20})$$




Рис. 6.

Далее, частное решение (IV.18) будет:

$$v_1 = \int_{\xi}^{\eta} z(\xi, \beta) d\beta \quad (\text{IV.21})$$

или, сопоставляя (IV.20) и (IV.21), имеем частное решение уравнения (IV.15) в виде

$$\begin{aligned} v_1 &= \frac{1}{4} \int_{\xi}^{\eta} \left[ \int_{\beta}^{\xi} Q(\alpha, \beta) d\alpha \right] d\beta = \\ &= -\frac{1}{4} \int_{\xi}^{\eta} \left[ \int_{\xi}^{\beta} Q(\alpha, \beta) d\alpha \right] d\beta, \end{aligned} \quad (\text{IV.22})$$

Интеграл (IV.22) взят по области

$$\xi < \alpha < \beta < \eta,$$

которая представляет собой треугольник  $ABC$  (см. рис. 6), где координаты точки  $A$  будут  $\xi$  и  $\eta$ .

Иначе

$$v_1 = -\frac{1}{4} \iint_{\Delta ABC} Q(\alpha, \beta) d\alpha d\beta.$$

Заметим теперь, что этот интеграл разбивается на сумму трех других:

$$\begin{aligned} v_1 &= -\frac{1}{4} \iint_{\Delta CEG} Q(\alpha, \beta) d\alpha d\beta - \frac{1}{4} \iint_{\Delta DBF} Q(\alpha, \beta) d\alpha d\beta - \\ &\quad - \frac{1}{4} \iint_{\Delta DFG E} Q(\alpha, \beta) d\alpha d\beta \end{aligned}$$

(обозначения понятны сами собой).

Треугольник  $CEG$  зависит только от координаты  $\xi$  точки  $A$ , а треугольник  $DBF$  — только от координаты  $\eta$  этой точки. Точка  $A$  берется внутри полуполосы.

Следовательно,

$$\begin{aligned} -\frac{1}{4} \iint_{\Delta CEG} Q(\alpha, \beta) d\alpha d\beta &= w_1(\xi), \\ -\frac{1}{4} \iint_{\Delta DBF} Q(\alpha, \beta) d\alpha d\beta &= w_2(\eta). \end{aligned}$$

Если функция  $v_1$  удовлетворяет уравнению (IV.15), то и функция

$$v = v_1 - w_1(\xi) - w_2(\eta) = -\frac{1}{4} \iint_{ADFE} Q(\alpha, \beta) d\alpha d\beta \quad (\text{IV.23})$$

будет удовлетворять тому же уравнению.

Если преобразовать в интеграле (IV.23) переменные, вернувшись к  $x$  и  $t$ , мы получим:

$$\frac{D(\alpha, \beta)}{D(x, t)} = \left| \begin{array}{cc} 1 & -a \\ 1 & a \end{array} \right| = 2a,$$

откуда

$$v = -\frac{a}{2} \iint_{ADFE} p(x, t) dx dt, \quad (\text{IV.24})$$

где  $ADFE$  имеет вид, изображенный на рис. 7.

Решение поставленной задачи мы будем искать в виде частного решения неоднородного уравнения и решения однородного уравнения, удовлетворяющего предельным условиям. Для этого введем вместо  $u$  новую искомую функцию по формуле

$$w = u - v. \quad (\text{IV.25})$$

Тогда функция  $w$  будет удовлетворять однородному уравнению колебаний струны и условиям того же типа, что (IV.12) и (IV.13).

Рассматривая задачу, мы можем с самого начала считать, что  $p(x, t) = 0$ , а условия (IV.12) и (IV.13) считать уже преобразованными по формуле (IV.25).

Наша замена не нарушает единственности и существования решения. Если задача в первоначальной постановке была корректной, то она остается такой же и после замены. В самом деле, решение  $w$  непрерывно зависит от начальных условий. Новые условия для  $w$  будут непрерывно связаны с  $v$  и, следовательно, с функцией  $p(x, t)$ . Поэтому малые отклонения в  $p(x, t)$ ,  $f_1$ ,  $f_2$  будут давать малые отклонения в решении  $u$ .

Решение уравнения

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - \frac{1}{a^2} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = 0 \quad (\text{IV.4})$$

можно искать опять в прежней форме:

$$u = \psi_1(x - at) + \psi_2(x + at). \quad (\text{IV.5})$$




Рис. 7

Начальные условия (IV.13) позволяют, как и в первой задаче, определить функции  $\psi_1(x)$  и  $\psi_2(x)$  в промежутке

$$0 \leq x \leq l.$$

Функция  $u$  определяется при этом в треугольнике, лежащем в полосе и опирающемся на ось абсцисс ( $t > 0$ ) (рис. 8).

Посмотрим, можно ли удовлетворить условиям (IV.12), выбирая нужным образом продолжение  $\psi_1(t)$  и  $\psi_2(t)$  на всю область, которая нас интересует.

Подставляя выражение (IV.5) в (IV.12), получим:

$$\left. \begin{aligned} \alpha\psi_1(-at) + \beta\psi_1'(-at) + \\ + \alpha\psi_2(at) + \beta\psi_2'(at) &= f_1(t), \\ \gamma\psi_1(l-at) + \delta\psi_1'(l-at) + \\ + \gamma\psi_2(l+at) + \delta\psi_2'(l+at) &= f_2(t). \end{aligned} \right\} \quad (IV.26)$$




Рис. 8

В плоскости  $(x, t)$  можно провести два ряда полос, параллельных прямым  $x-at=0$  и  $x+at=0$ , в которых удовлетворяются неравенства

$$-lk < x - at < -l(k-1), \quad [k]$$

$$ml < x + at < (m+1)l; \quad \{m\}$$

каждую такую полосу мы будем обозначать номером соответственно в квадратных или фигурных скобках (рис. 8).

Первое условие (IV.26) позволяет определить значение  $\psi_1$  в полосе  $[m]$ , если известно значение  $\psi_2$  в полосе  $\{m-1\}$ , а второе позволяет определить значение  $\psi_2$  в полосе  $\{k\}$ , если известно  $\psi_1$  в полосе  $[k-1]$ , при помощи решения обыкновенного дифференциального уравнения с постоянными коэффициентами. Для этого достаточно, например, обозначить в первом из уравнений (IV.26)  $-at$  через  $\xi$ , после чего оно получит вид

$$\alpha\psi_1(\xi) + \beta\psi_1'(\xi) = -\alpha\psi_2(-\xi) - \beta\psi_2'(-\xi) + f_1\left(-\frac{\xi}{a}\right), \quad (IV.27)$$

а во втором из уравнений (IV.26) положить  $l-at = \xi$ , преобразуя его к виду

$$\gamma\psi_1(\xi) + \delta\psi_1'(\xi) = -\gamma\psi_2(2l-\xi) - \delta\psi_2'(2l-\xi) + f_2\left(\frac{l-\xi}{a}\right). \quad (IV.28)$$

Зная  $\psi_2$  в  $\{0\}$  и решая уравнение (IV.27) относительно  $\psi_1$ ,

мы получим значения  $\psi_1$  в  $\{1\}$ , а затем, решая (IV.28) относительно  $\psi_2$ , мы определим  $\psi_2$  в  $\{2\}$  и т. д. Произвольную постоянную мы определим из условия непрерывности  $\psi_1$  и  $\psi_2$ .

Точно так же, исходя из значений  $\psi_1$  в  $\{0\}$  и решая уравнение (IV.28), получим значения  $\psi_2$  в  $\{1\}$ , а затем, решая (IV.27) относительно  $\psi_1$ , найдем значение  $\psi_1$  в  $\{2\}$  и т. д.

Ясно, что таким образом можно удовлетворить всем поставленным условиям.

При этом не вызывает сомнений ни вопрос о существовании и единственности решения задачи, ни вопрос о ее корректности.

Не ясно только, будут ли построенные нами функции  $\psi_1$  и  $\psi_2$  допускать непрерывные производные 2-го порядка.

Мы предоставим читателю вывести необходимые и достаточные условия для этого и ограничимся замечанием, что, расширяя класс решений уравнения (IV.4), можно отбросить требование непрерывности вторых производных функций  $\psi_1$  и  $\psi_2$ .

Уравнение струны и аналогичные ему уравнения гиперболического типа с двумя независимыми переменными часто встречаются в разнообразных вопросах математической физики.

---

## ЛЕКЦИЯ V

### МЕТОД РИМАНА

#### § 1. Первая краевая задача для гиперболических уравнений

Для построения решения уравнения колебаний струны мы воспользовались основным свойством характеристик этого уравнения, позволившем сразу проинтегрировать уравнение (IV.3).

Это свойство состоит в том, что уравнение (IV.3) на характеристической линии  $\eta = \text{const.}$  превратилось в обыкновенное дифференциальное уравнение относительно функции  $\frac{\partial u}{\partial \eta}$  с независимой переменной  $\xi$ . Поэтому функцию  $u$  нам удалось найти при помощи квадратур. Это же свойство характеристик — наличие уравнений с меньшим числом переменных, связывающих значения неизвестной функции и ее производных, лежит в основе нескольких важных методов интегрирования уравнений в частных производных гиперболического типа.

Рассмотрим уравнение вида

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} + a(x, y) \frac{\partial u}{\partial x} + b(x, y) \frac{\partial u}{\partial y} + c(x, y) u = F(x, y), \quad (\text{V.1})$$

к такому виду, как мы видели, приводится любое линейное гиперболическое уравнение с двумя независимыми переменными. Рассмотрим следующую вспомогательную задачу.

*Пусть дано значение  $u$  на двух пересекающихся прямых, параллельных координатным осям (т. е. на характеристиках):*

$$\left. \begin{aligned} u|_{x=x_0} &= \varphi_1(y); & y_0 \leq y \leq b, \\ u|_{y=y_0} &= \varphi_2(x); & x_0 \leq x \leq a, \end{aligned} \right\} \quad (\text{V.2})$$

*причем  $\varphi_1(y_0) = \varphi_2(x_0)$ .*

Функции  $\varphi_1(y)$  и  $\varphi_2(x)$  предположим имеющими непрерывные производные 1-го порядка.

Мы докажем, что уравнение (V.1) имеет в прямоугольнике

$$\begin{aligned}x_0 &\leq x \leq a, \\ y_0 &\leq y \leq b\end{aligned}$$

единственное решение, удовлетворяющее условиям (V.2).

Положим:

$$\frac{\partial u}{\partial x} = v, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = w. \quad (\text{V.3})$$

Уравнение (V.1) можно переписать в виде

$$\frac{\partial v}{\partial y} = \frac{\partial w}{\partial x} = F(x, y) - a(x, y)v - b(x, y)w - c(x, y)u. \quad (\text{V.4})$$

Отсюда сразу следует, что

$$\left. \begin{aligned}v(x, y) &= v(x, y_0) + \\ &+ \int_{y_0}^y [F(x, y) - a(x, y)v - b(x, y)w - c(x, y)u] dy, \\ w(x, y) &= w(x_0, y) + \\ &+ \int_{x_0}^x [F(x, y) - a(x, y)v - b(x, y)w - c(x, y)u] dx, \\ u(x, y) &= u(x, y_0) + \int_{y_0}^y w(x, y) dy\end{aligned} \right\} \quad (\text{V.5})$$

и, в силу (V.2),

$$\begin{aligned}v(x, y_0) &= \left. \frac{\partial u}{\partial x} \right|_{y=y_0} = \varphi_2'(x), \\ w(x_0, y) &= \left. \frac{\partial u}{\partial y} \right|_{x=x_0} = \varphi_1(y).\end{aligned}$$

Из (V.4) и (V.5) следует:

$$\left. \begin{aligned}v(x, y) &= \varphi_2'(x) + \\ &+ \int_{y_0}^y [F(x, y) - a(x, y)v - b(x, y)w - c(x, y)u] dy, \\ w(x, y) &= \varphi_1(y) + \\ &+ \int_{x_0}^x [F(x, y) - a(x, y)v - b(x, y)w - c(x, y)u] dx, \\ u(x, y) &= \varphi_2(x) + \int_{y_0}^y u dy.\end{aligned} \right\} \quad (\text{V.6})$$

Обратно, всякое решение системы (V.6) удовлетворяет, очевидно, системе уравнений (V.4) и второму из уравнений (V.3). Кроме того,

$$\begin{aligned}\frac{\partial u}{\partial x} &= \varphi_2'(x) + \int_{y_0}^y \frac{\partial w}{\partial x} dy = \\ &= \varphi_2'(x) + \int_{y_0}^y [F(x, y) - a(x, y)v - b(x, y)w - c(x, y)u] dy = v.\end{aligned}$$

Следовательно, удовлетворяется и первое уравнение (V.3). Далее из (V.6) следует:

$$\begin{aligned}u|_{y=y_0} &= \varphi_2(x), \\ u|_{x=x_0} &= \varphi_2(x_0) + \int_{y_0}^y w|_{x=x_0} dy = \varphi_2(x_0) + \int_{y_0}^y \varphi_1'(y) dy = \\ &= \varphi_2(x_0) + \varphi_1(y) - \varphi_1(y_0) = \varphi_1(y).\end{aligned}$$

Итак, всякое решение системы (V.6) есть решение поставленной задачи. Из всего сказанного выше следует, что система (V.6) эквивалентна уравнению (V.1) при условиях (V.2). Решение системы (V.6) мы будем искать методом последовательных приближений. Пусть

$$v_0 = \varphi_2(x), \quad w_0 = \varphi_1(y), \quad u_0 = \varphi_2(x).$$

Положим, далее,

$$\left. \begin{aligned}v_n &= \varphi_2'(x) + \\ &+ \int_{y_0}^y [F(x, y) - a(x, y)v_{n-1} - b(x, y)w_{n-1} - c(x, y)u_{n-1}] dy, \\ w_n &= \varphi_1'(y) + \\ &+ \int_{x_0}^x [F(x, y) - a(x, y)v_{n-1} - b(x, y)w_{n-1} - c(x, y)u_{n-1}] dx, \\ u_n &= \varphi_2(x) + \int_{y_0}^y w_{n-1} dy\end{aligned} \right\} (n = 1, 2, \dots).$$

Докажем сходимость последовательностей  $u_n$ ,  $v_n$  и  $w_n$ . Для этого мы предположим, что все функции  $\varphi_1(y)$ ,  $\varphi_2(x)$ ,  $\varphi_1'(y)$ ,  $\varphi_2'(x)$ ,

$F(x, y)$ ,  $a(x, y)$ ,  $b(x, y)$  и  $c(x, y)$  ограничены в прямоугольнике (V.2). Имеем:

$$\left. \begin{aligned} v_{n+1} - v_n &= - \int_{y_0}^y [a(x, y)(v_n - v_{n-1}) + \\ &\quad + b(x, y)(w_n - w_{n-1}) + c(x, y)(u_n - u_{n-1})] dy, \\ w_{n+1} - w_n &= - \int_{x_0}^x [a(x, y)(v_n - v_{n-1}) + \\ &\quad + b(x, y)(w_n - w_{n-1}) + c(x, y)(u_n - u_{n-1})] dx, \\ u_{n+1} - u_n &= \int_{y_0}^y (w_n - w_{n-1}) dy. \end{aligned} \right\} \quad (V.8)$$

Докажем, что  $|u_n - u_{n-1}|$ ,  $|v_n - v_{n-1}|$ ,  $|w_n - w_{n-1}|$  удовлетворяют неравенствам:

$$\left. \begin{aligned} |v_n - v_{n-1}| &\leq K^{n-1} A \frac{(x+y-x_0-y_0)^{n-1}}{(n-1)!}, \\ |w_n - w_{n-1}| &\leq K^{n-1} A \frac{(x+y-x_0-y_0)^{n-1}}{(n-1)!}, \\ |u_n - u_{n-1}| &\leq K^{n-1} A \frac{(x+y-x_0-y_0)^{n-1}}{(n-1)!}, \end{aligned} \right\} \quad (V.9)$$

где  $K > |a(x, y)| + |b(x, y)| + |c(x, y)|$  и  $A$  — некоторые числа, не зависящие от  $n$ .

При  $n = 1$  справедливость (V.9) очевидна, если выбрать постоянную  $A$  достаточно большой. Покажем, что эти неравенства останутся справедливыми при замене  $n$  на  $n + 1$ . Из (V.8) имеем, например:

$$\begin{aligned} |v_{n+1} - v_n| &\leq \int_{y_0}^y (|a| + |b| + |c|) K^{n-1} A \frac{(x+y-x_0-y_0)^{n-1}}{(n-1)!} dy \leq \\ &\leq AK^n \int_{y_0}^y \frac{(x+y-x_0-y_0)^{n-1}}{(n-1)!} dy = \\ &= AK^n \left[ \frac{(x+y-x_0-y_0)^n}{n!} - \frac{(x-x_0)^n}{n!} \right] \leq AK^n \frac{(x+y-x_0-y_0)^n}{n!}. \end{aligned}$$

Так же оцениваются и остальные разности (V.9).

Из оценок (V.9) следует абсолютная и равномерная сходимость рядов:

$$u_0 + \sum_{n=1}^{\infty} (u_n - u_{n-1}), \quad v_0 + \sum_{n=1}^{\infty} (v_n - v_{n-1}), \quad w_0 + \sum_{n=1}^{\infty} (w_n - w_{n-1}),$$

члены которых по абсолютной величине меньше членов равномерно сходящегося ряда

$$A + A \sum_{n=1}^{\infty} K^{n-1} \frac{(x+y-x_0-y_0)^{n-1}}{(n-1)!},$$

представляющего, как известно, функцию

$$A + Ae^{K(x+y-x_0-y_0)}.$$

Следовательно,  $u_n$ ,  $v_n$  и  $w_n$  в прямоугольнике  $\{x_0 \leq x \leq a, y_0 \leq y \leq b\}$  равномерно стремятся к определенным пределам. Переходя к пределу в формулах (V.7), видим, что предельные функции  $u$ ,  $v$  и  $w$  удовлетворяют (V.6), и наша задача решена. Заметим, что мы с тем же успехом могли рассмотреть и случай, когда  $x < x_0$ ,  $y < y_0$ . Все рассуждения от этого не изменились бы.

Нетрудно установить единственность решения рассматриваемой задачи. Для этого достаточно проверить, что в том случае, когда  $F \equiv 0$ ,  $\varphi_1(y) \equiv \varphi_2(x) \equiv 0$ , система (V.6) не имеет других ограниченных решений, кроме  $u \equiv 0$ ,  $v \equiv 0$ ,  $w \equiv 0$ . Допустим, что существует какое-то решение, удовлетворяющее условиям  $|u| < A$ ,  $|v| < A$ ,  $|w| < A$ . Функции  $u$ ,  $v$ ,  $w$  удовлетворяют неравенствам:

$$\left. \begin{aligned} |u| &\leq K^{n-1} A \frac{(x+y-x_0-y_0)^{n-1}}{(n-1)!}, \\ |v| &\leq K^{n-1} A \frac{(x+y-x_0-y_0)^{n-1}}{(n-1)!}, \\ |w| &\leq K^{n-1} A \frac{(x+y-x_0-y_0)^{n-1}}{(n-1)!}. \end{aligned} \right\} \quad (\text{V.9'})$$

Эти неравенства получаются тем же способом, каким были получены неравенства (V.9), то есть последовательными оценками.

Отсюда непосредственно вытекает единственность решения поставленной задачи, так как единственной системой функций, удовлетворяющей неравенствам (V.9') при любом  $n$ , является  $u = v = w = 0$ .

## § 2. Сопряженные дифференциальные операторы

Рассмотрим линейный дифференциальный оператор 2-го порядка

$$Lu \equiv \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n A_{ij} \frac{\partial^2 u}{\partial x_i \partial x_j} + \sum_{i=1}^n B_i \frac{\partial u}{\partial x_i} + Cu, \quad (\text{V.10})$$

где  $A_{ij}$ ,  $B_i$  и  $C$  являются дважды дифференцируемыми функциями  $x_1, x_2, \dots, x_n$ . Не уменьшая общности можно считать, что  $A_{ij} = A_{ji}$ . Для этого достаточно обозначить через  $A_{ij}$  полусумму

коэффициентов при  $\frac{\partial^2 u}{\partial x_i \partial x_j}$  и  $\frac{\partial^2 u}{\partial x_j \partial x_i}$ . Назовем оператор

$$Mv \equiv \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \frac{\partial^2 (A_{ij}v)}{\partial x_i \partial x_j} - \sum_{i=1}^n \frac{\partial (B_i v)}{\partial x_i} + Cv \quad (V.11)$$

сопряженным с оператором  $Lu$ .

Легко установить непосредственным вычислением, что понятие сопряженности обладает свойством взаимности: сопряженным оператором для сопряженного оператора  $M$  будет первоначальный оператор  $L$ .

Если оператор  $L$  совпадает с ему сопряженным  $M$ , то такой оператор называют *самосопряженным*.

Имеет место формула

$$vLu - uMv = \sum_{i=1}^n \frac{\partial}{\partial x_i} \left\{ \sum_{j=1}^n \left[ vA_{ij} \frac{\partial u}{\partial x_j} - u \frac{\partial (A_{ij}v)}{\partial x_j} \right] + B_i uv \right\}. \quad (V.12)$$

Иными словами, выражение  $vLu - uMv$  представляет собой сумму частных производных по  $x_i$  от некоторых выражений  $P_i$ , т. е.

$$vLu - uMv = \sum_{i=1}^n \frac{\partial P_i}{\partial x_i},$$

где

$$P_i = \sum_{j=1}^n \left( vA_{ij} \frac{\partial u}{\partial x_j} - u \frac{\partial (A_{ij}v)}{\partial x_j} \right) + B_i uv. \quad (V.13)$$

Формула (V.12) проверяется с помощью непосредственного дифференцирования. Мы имеем:

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n \frac{\partial P_i}{\partial x_i} &= \left[ \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n vA_{ij} \frac{\partial^2 u}{\partial x_j \partial x_i} + \sum_{i=1}^n vB_i \frac{\partial u}{\partial x_i} + Cuv \right] - \\ &- \left[ \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n u \frac{\partial^2 (A_{ij}v)}{\partial x_j \partial x_i} - \sum_{i=1}^n u \frac{\partial (B_i v)}{\partial x_i} + Cuv \right] + \\ &+ \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \left( \frac{\partial u}{\partial x_j} \frac{\partial (A_{ij}v)}{\partial x_i} - \frac{\partial u}{\partial x_i} \frac{\partial (A_{ij}v)}{\partial x_j} \right). \end{aligned}$$

Последняя сумма обращается в нуль, и мы получаем:

$$\sum_{i=1}^n \frac{\partial P_i}{\partial x_i} = vLu - uMv, \quad (V.14)$$

что и требовалось доказать.

Рассмотрим теперь некоторый  $n$ -мерный объем  $\Omega$ , ограниченный кусочно гладкой поверхностью  $S^1$ ).

(В случае, если  $n = 2$  или  $1$ , слова «объем» и «поверхность» заменяются соответственно словами «область» и «линия»; «отрезок» и «концы отрезка».)

На основании формулы, аналогичной формуле (I.2), будем иметь:

$$\begin{aligned} \iint_{\Omega} \dots \int (vLu - uMv) dx_1 \dots dx_n = \\ = - \int \dots \int_S \sum_{i=1}^n P_i \cos nx_i dS, \end{aligned} \quad (\text{V.15})$$

где  $\cos nx_1, \cos nx_2, \dots$  — направляющие косинусы внутренней нормали к  $S$ .

Формула (V.15) носит название *формулы Грина*.

Рассмотрим два примера.

**Пример 1.** Формула Грина для оператора Лапласа. Пусть  $Lu = \Delta u$ . При этом

$$\begin{aligned} Mv = \Delta v, \quad P_x = v \frac{\partial u}{\partial x} - u \frac{\partial v}{\partial x}, \quad P_y = v \frac{\partial u}{\partial y} - u \frac{\partial v}{\partial y}, \\ P_z = v \frac{\partial u}{\partial z} - u \frac{\partial v}{\partial z}. \end{aligned}$$

Формула Грина примет вид

$$\begin{aligned} \iiint_{\Omega} (v\Delta u - u\Delta v) dx dy dz = - \iint_S \left[ \left( v \frac{\partial u}{\partial x} - u \frac{\partial v}{\partial x} \right) \cos nx + \right. \\ \left. + \left( v \frac{\partial u}{\partial y} - u \frac{\partial v}{\partial y} \right) \cos ny + \left( v \frac{\partial u}{\partial z} - u \frac{\partial v}{\partial z} \right) \cos nz \right] dS = \\ = \iint_S \left( u \frac{\partial v}{\partial n} - v \frac{\partial u}{\partial n} \right) dS, \end{aligned} \quad (\text{V.16})$$

где, как обычно, через  $\frac{\partial v}{\partial n}$  обозначена нормальная производная функции  $v$ . Она равна проекции вектора  $\text{grad } v$  с составляющими  $\frac{\partial v}{\partial x}, \frac{\partial v}{\partial y}, \frac{\partial v}{\partial z}$  на направление внутренней нормали. Формулу (V.16) также называют *формулой Грина для оператора Лапласа*.

**Пример 2.** Рассмотрим уравнение (V.1).

<sup>1)</sup> Предполагаем, что все условия непрерывности функций и их производных, о которых говорилось при установлении формулы (I.2), выполнены.

Для оператора  $Lu$ , стоящего в левой части этого уравнения, сопряженный оператор  $Mv$  и функции  $P_1$  и  $P_2$  будут иметь вид:

$$\begin{aligned} Mv &\equiv \frac{\partial^2 v}{\partial x \partial y} - \frac{\partial (av)}{\partial x} - \frac{\partial (bv)}{\partial y} + cv, \\ P_1 &= \frac{1}{2} \left( v \frac{\partial u}{\partial y} - u \frac{\partial v}{\partial y} \right) + auv, \\ P_2 &= \frac{1}{2} \left( v \frac{\partial u}{\partial x} - u \frac{\partial v}{\partial x} \right) + buv. \end{aligned}$$

При этом формула Грина дает (нормаль внутренняя):

$$\begin{aligned} \int_{\Omega} (vLu - uMv) dx dy = - \int_{\Sigma} \left\{ \left[ \frac{1}{2} \left( v \frac{\partial u}{\partial y} - u \frac{\partial v}{\partial y} \right) + auv \right] \cos(n, x) + \right. \\ \left. + \left[ \frac{1}{2} \left( v \frac{\partial u}{\partial x} - u \frac{\partial v}{\partial x} \right) + buv \right] \cos(n, y) \right\} dS. \quad (V.17) \end{aligned}$$

### § 3. Метод Римана

Риманом был предложен важный метод нахождения различных решений уравнения (V.1), основанный на использовании формулы Грина (V.17). Займемся решением задачи Коши для уравнения (V.1). Пусть нам даны значения  $u$  и  $\frac{\partial u}{\partial y}$  на кривой

$$y = \mu(x),$$

причем предполагается, что

$$\mu'(x) < 0, \quad (V.18)$$

$$u|_{y=\mu(x)} = \varphi_0(x), \quad (V.19)$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} \Big|_{y=\mu(x)} = \varphi_1(x) \quad (V.20)$$

(производная в формуле (V.20) берется частная, а не вдоль кривой  $y = \mu(x)$ ).

Дифференцируя формулу (V.19), имеем:

$$\frac{\partial u}{\partial x} \Big|_{y=\mu(x)} + \frac{\partial u}{\partial y} \Big|_{y=\mu'(x)} \mu'(x) = \varphi_0'(x),$$

откуда

$$\frac{\partial u}{\partial x} \Big|_{y=\mu(x)} = \varphi_0'(x) - \varphi_1(x) \mu'(x). \quad (V.21)$$

Преобразуем формулу (V.17) к несколько более удобному виду. Считая, что обход области совершается против часовой стрелки,

так что обходимая площадь остается слева, будем иметь:

$$\begin{aligned} dx &= \cos(n, y) dS, \\ dy &= -\cos(n, x) dS, \end{aligned}$$

если считать  $dS$  всегда положительным.

Пользуясь этими соотношениями, мы получим из формулы (V.17):

$$\begin{aligned} \iint_{\Omega} (vLu - uMv) dx dy &= \\ &= \int_S \left[ \frac{1}{2} \left( u \frac{\partial v}{\partial x} - v \frac{\partial u}{\partial x} \right) - buv \right] dx - \\ &- \left[ \frac{1}{2} \left( u \frac{\partial v}{\partial y} - v \frac{\partial u}{\partial y} \right) - auv \right] dy. \quad (\text{V.22}) \end{aligned}$$

Через точку  $M(x_0, y_0)$  проведем две прямые, параллельные координатным осям, до пересечения в точках  $P$  и  $Q$  с кривой  $y = \mu(x)$  (рис. 9).




Рис. 9

Применяя формулу (V.17) к треугольнику  $MPQ$ , имеем:

$$\begin{aligned} \iint_{\Omega} (vLu - uMv) dx dy &= \int_P^Q \left\{ \left[ \frac{1}{2} \left( u \frac{\partial v}{\partial x} - v \frac{\partial u}{\partial x} \right) - buv \right] dx - \right. \\ &- \left[ \frac{1}{2} \left( u \frac{\partial v}{\partial y} - v \frac{\partial u}{\partial y} \right) - auv \right] dy \Big\} + \int_Q^M \left[ \frac{1}{2} \left( v \frac{\partial u}{\partial y} - u \frac{\partial v}{\partial y} \right) + auv \right] dy + \\ &+ \int_P^M \left[ \frac{1}{2} \left( v \frac{\partial u}{\partial x} - u \frac{\partial v}{\partial x} \right) + buv \right] dx. \quad (\text{V.23}) \end{aligned}$$

Преобразуем два последних интеграла:

$$\begin{aligned} \int_Q^M \left[ \frac{1}{2} \left( v \frac{\partial u}{\partial y} - u \frac{\partial v}{\partial y} \right) + auv \right] dy &= \frac{1}{2} uv \Big|_Q^M + \int_Q^M \left( -u \frac{\partial v}{\partial y} + auv \right) dy = \\ &= \frac{1}{2} uv \Big|_Q^M + \int_Q^M u \left( -\frac{\partial v}{\partial y} + av \right) dy, \quad (\text{V.24}) \end{aligned}$$

$$\int_P^M \left[ \frac{1}{2} \left( v \frac{\partial u}{\partial x} - u \frac{\partial v}{\partial x} \right) + buv \right] dx = \frac{1}{2} uv \Big|_P^M + \int_P^M u \left( -\frac{\partial v}{\partial x} + bv \right) dx. \quad (\text{V.25})$$

Эти формулы позволяют легко решить нашу задачу. Пусть  $v(x, y; x_0, y_0)$  — некоторая функция, удовлетворяющая условиям:

$$Mv = 0,$$

$$v|_{x=x_0} = e^{\int_{y_0}^y a(x_0, y) dy}, \quad v|_{y=y_0} = e^{\int_{x_0}^x b(x, y_0) dx}.$$

При этом

$$v(x_0, y_0; x_0, y_0) = 1,$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial v}{\partial y} \Big|_{x=x_0} &= a(x_0, y) e^{\int_{y_0}^y a(x_0, y) dy} = a(x_0, y) v \Big|_{x=x_0}, \\ \frac{\partial v}{\partial x} \Big|_{y=y_0} &= b(x, y_0) e^{\int_{x_0}^x b(x, y_0) dx} = b(x, y_0) v \Big|_{y=y_0}. \end{aligned}$$

Существование такой функции нами уже установлено в §§ 1, 2 в результате решения первой краевой задачи. Функция  $v$ , удовлетворяющая этим условиям, называется *функцией Римана*.

Так как на прямой  $PM$  имеем  $y = y_0$ , а на прямой  $QM$  имеем  $x = x_0$ , то последние члены в формулах (V.24) и (V.25) обращаются в нуль, и мы получим:

$$\left. \begin{aligned} \int_Q^M \left[ \frac{1}{2} \left( v \frac{\partial u}{\partial y} - u \frac{\partial v}{\partial y} \right) + auv \right] dy &= \frac{1}{2} uv \Big|_Q^M, \\ \int_P^M \left[ \frac{1}{2} \left( v \frac{\partial u}{\partial x} - u \frac{\partial v}{\partial x} \right) + buv \right] dx &= \frac{1}{2} uv \Big|_P^M. \end{aligned} \right\} \quad (V.26)$$

Вернемся теперь к формуле (V.23), которая после подстановки в нее (V.26) дает:

$$\iint_{\Omega} vF(x, y) dx dy = u \Big|_M - \frac{1}{2} (uv) \Big|_P - \frac{1}{2} (uv) \Big|_Q + \Phi, \quad (V.27)$$

где через  $\Phi$  обозначено первое слагаемое правой части формулы (V.23), которое полностью выражается через  $v$  и известные функции, ибо на кривой  $PQ$  в силу (V.19), (V.20) и (V.21) известны  $u$ ,  $\frac{\partial u}{\partial x}$ ,  $\frac{\partial u}{\partial y}$ .

При этом (V.27) дает так называемую *формулу Римана*

$$u(x_0, y_0) = \frac{1}{2} (uv) \Big|_P + \frac{1}{2} (uv) \Big|_Q - \Phi + \iint_{\Omega} vF(x, y) dx dy. \quad (V.28)$$

Как мы видим, формула (V.28) позволяет в явном виде написать решение интересующей нас задачи, так как  $M(x_0, y_0)$  — произвольная точка.

Из самого способа получения формулы Римана следует, что поставленная задача может иметь лишь единственное решение, так как мы получили для неизвестной функции  $u$  явное и однозначно определенное выражение, не делая никаких предположений о ней, кроме ее существования. Для того чтобы закончить исследование, нам остается показать, что решение рассматриваемой задачи Коши действительно существует.

Заметим, что достаточно установить существование решения уравнения (V.1) при условиях, когда на кривой  $y = \mu(x)$  функция  $u$  вместе с производными 1-го порядка обращается в нуль. В самом деле, мы могли бы вместо функции  $u$  ввести новую неизвестную функцию

$$w = u - \varphi_0(x) - [y - \mu(x)] \varphi_1(x).$$

Функция  $w$  будет удовлетворять уравнению

$$\frac{\partial^2 w}{\partial x \partial y} + a(x, y) \frac{\partial w}{\partial x} + b(x, y) \frac{\partial w}{\partial y} + c(x, y) w = F_1(x, y), \quad (\text{V.29})$$

где

$$\begin{aligned} F_1(x, y) = \\ = F(x, y) - \varphi_1'(x) - a(x, y) \{ \varphi_0'(x) + [y - \mu(x)] \varphi_1'(x) - \mu'(x) \varphi_1(x) \} - \\ - b(x, y) \varphi_1(x) - c(x, y) \{ \varphi_0(x) + [y - \mu(x)] \varphi_1(x) \}, \end{aligned}$$

и однородным условиям

$$w \Big|_{y=\mu(x)} = \frac{\partial w}{\partial y} \Big|_{y=\mu(x)} = 0.$$

Уравнение (V.29) имеет тот же вид, что и (V.1), но отличается от него свободным членом. Если мы докажем существование решения новой задачи, поставленной для функции  $w$ , то из этого будет следовать существование решения первоначальной задачи. Действительно, при этом  $u = w + \varphi_0(x) + [y - \mu(x)] \varphi_1(x)$  будет решением уравнения. В том случае, когда функции  $\varphi_0$  и  $\varphi_1$  равны нулю, формула Римана дает:

$$u(x_0, y_0) = \iint_{\Omega} v F(x, y) dx dy. \quad (\text{V.30})$$

Нам достаточно показать, что функция  $u(x_0, y_0)$ , определяемая формулой (V.30), удовлетворяет уравнению (V.1) и обращается в нуль вместе с производными 1-го порядка при  $y_0 = \mu(x_0)$ .

Проверим сначала последнее. При  $y_0 = \mu(x_0)$  область  $\Omega$  исчезает и, следовательно,  $u|_{y_0 = \mu(x_0)} = 0$ .

Далее, на основании указанного выше правила дифференцирования интегралов по переменной области имеем:

$$\left. \begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial x_0} &= \int_Q^M v F(x_0, y) dy + \iint_{\Omega} \frac{\partial v}{\partial x_0} F(x, y) dx dy, \\ \frac{\partial u}{\partial y_0} &= \int_P^M v F(x, y_0) dx + \iint_{\Omega} \frac{\partial v}{\partial y_0} F(x, y) dx dy. \end{aligned} \right\} \quad (V.31)$$

В обеих формулах интегралы, стоящие в правых частях, обращаются в нуль при  $y_0 = \mu(x_0)$ . Остается убедиться в том, что  $u(x_0, y_0)$  удовлетворяет уравнению (V.4). Мы проверим это несколько позднее.

#### § 4. Функция Римана для сопряженного уравнения

В § 1 мы нашли решение первой краевой задачи при помощи последовательных приближений. Метод Римана позволяет найти ее решение в более удобном виде. Пусть, как и в первом параграфе настоящей лекции, требуется найти решение  $u$  уравнения (V.1) при условиях (V.2). Проведем на плоскости  $(x, y)$  прямые  $x = x_1$  и  $y = y_1$ , которые обозначим соответственно  $SP$  и  $SQ$ , где точка  $S$  имеет координаты  $(x_1, y_1)$ . Из точки  $M$  с координатами  $(x_0, y_0)$  проведем прямые  $MP$  и  $MQ$ , параллельные координатным осям. Применим формулу (V.22) к прямоугольнику  $MPSQ$ , взяв в качестве  $u$  неизвестное пока решение, а в качестве  $v$  — функцию Римана  $v(x, y; x_0, y_0)$ . Мы будем иметь:

$$\begin{aligned} \iint_{\Omega} (vLu - uMv) dx dy &= \iint_{\Omega} vF dx dy = \\ &= \int_P^M \left[ \frac{1}{2} \left( v \frac{\partial u}{\partial x} - u \frac{\partial v}{\partial x} \right) + buv \right] dx + \int_Q^M \left[ \frac{1}{2} \left( v \frac{\partial u}{\partial y} - u \frac{\partial v}{\partial y} \right) + auv \right] dy - \\ &\quad - \int_S^Q \left[ \frac{1}{2} \left( v \frac{\partial u}{\partial x} - u \frac{\partial v}{\partial x} \right) + buv \right] dx - \int_S^P \left[ \frac{1}{2} \left( v \frac{\partial u}{\partial y} - u \frac{\partial v}{\partial y} \right) + auv \right] dy. \end{aligned}$$

Преобразуя, как прежде, интегралы по отрезкам  $PM$  и  $QM$  и замечая, что на отрезках  $SQ$  и  $SP$  выражения, стоящие под

знаком интеграла, составлены из известных функций, получим:

$$\begin{aligned} \iint_{\Omega} v F(x, y) dx dy = \\ = u|_M - \frac{1}{2} uv|_P - \frac{1}{2} uv|_Q - \int_S^Q \left[ \frac{1}{2} (v\varphi'_2 - \frac{\partial v}{\partial x} \varphi_2) + bv\varphi_2 \right] dx - \\ - \int_S^P \left[ \frac{1}{2} (v\varphi'_1 - \frac{\partial v}{\partial x} \varphi_1) + av\varphi_1 \right] dy. \quad (V.32) \end{aligned}$$

Удобно избавиться в этой формуле от производных функции  $v$ . С этой целью проинтегрируем по частям оба интеграла в правой части формулы (V.32). Оставляя  $u|_M$  в левой части уравнения и перенося в правую часть остальные члены, получим:

$$\begin{aligned} u|_M = \frac{1}{2} uv|_P + \frac{1}{2} uv|_Q - \frac{1}{2} uv|_S^Q - \frac{1}{2} uv|_S^P + \\ + \int_S^Q v(\varphi'_2 + b\varphi_2) dx + \int_S^P v(\varphi'_1 + a\varphi_1) dy + \iint_{\Omega} v F(x, y) dx dy. \end{aligned}$$

Итак,

$$u|_M = uv|_S + \int_S^Q v(\varphi'_2 + b\varphi_2) dx + \int_S^P v(\varphi'_1 + a\varphi_1) dy + \iint_{\Omega} v F(x, y) dx dy. \quad (V.33)$$

Из формулы (V.33) вытекает важное следствие. Пусть функция  $u$  является функцией Римана для сопряженного уравнения

$$Mv = 0,$$

то есть представляет собой функцию, удовлетворяющую однородному уравнению  $Lu = 0$  и условиям

$$u|_{y=y_1} = e^{-\int_{x_1}^x b(x, y_1) dx}, \quad u|_{x=x_1} = e^{-\int_{y_1}^y a(x_1, y) dy}.$$

При этом предположении все слагаемые правой части (V.33) обратятся в нуль, и мы получим, пользуясь равенством  $u|_S = 1$ ,

$$u|_M = v|_S, \quad \text{или} \quad u(x_0, y_0; x_1, y_1) = v(x_1, y_1; x_0, y_0).$$

Это соотношение называется *теоремой о симметрии функции Римана*. Словесно оно выражается следующим образом:

Если в функции Римана рассматривать переменные  $x_0, y_0$  как текущие координаты, а  $x_1, y_1$  как координаты вершины, то получится функция Римана для сопряженного уравнения.

**С л е д с т в и е.** *Функция Римана  $v(x, y; x_0, y_0)$ , определенная выше, удовлетворяет уравнению*

$$\frac{\partial^2 v}{\partial x_0 \partial y_0} + a(x_0, y_0) \frac{\partial v}{\partial x_0} + b(x_0, y_0) \frac{\partial v}{\partial y_0} + c(x_0, y_0) v = 0. \quad (\text{V.34})$$

Пользуясь этим фактом, можно легко проверить, что функция  $u(x_0, y_0)$ , которая определяется формулой (V.30), действительно удовлетворяет уравнению (V.1) и, следовательно, является решением задачи Коши. Дифференцируя первую из формул (V.31) по  $y_0$ , получим:

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 u}{\partial x_0 \partial y_0} = v \Big|_{(x_0, y_0)} F(x_0, y_0) + \int_Q^S \frac{\partial v}{\partial y_0} F(x_0, y) dy + \\ + \int_P^S \frac{\partial v}{\partial x_0} F(x, y_0) dx + \iint_{\Omega} \frac{\partial^2 v}{\partial x_0 \partial y_0} F(x, y) dx dy. \end{aligned}$$

Отсюда

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 u}{\partial x_0 \partial y_0} + a(x_0, y_0) \frac{\partial u}{\partial x_0} + b(x_0, y_0) \frac{\partial u}{\partial y_0} + c(x_0, y_0) u(x_0, y_0) = \\ = F(x_0, y_0) + \int_Q^S \left[ \frac{\partial v}{\partial y_0} + a(x_0, y_0) v \right] F(x_0, y) dy + \\ + \int_P^S \left[ \frac{\partial v}{\partial x_0} + b(x_0, y_0) v \right] F(x, y_0) dx + \\ + \iint_{\Omega} \left[ \frac{\partial^2 v}{\partial x_0 \partial y_0} + a(x_0, y_0) \frac{\partial v}{\partial x_0} + b(x_0, y_0) \frac{\partial v}{\partial y_0} + \right. \\ \left. + c(x_0, y_0) v \right] F(x, y) dx dy. \end{aligned}$$

Из последней формулы непосредственно получаем

$$Lu = F,$$

что и требовалось доказать.

## § 5. Некоторые качественные следствия формулы Римана

Из формулы Римана вытекают некоторые следствия, представляющие общий интерес. Остановимся на них несколько подробнее.

Будем изучать поведение решения задачи Коши для уравнения (V.1) в зависимости от изменения начальных условий. Легко видеть, что значение этого решения в некоторой точке  $(x_0, y_0)$  вовсе не

зависит от данных Коши вне криволинейного треугольника  $MPQ$ , образованного двумя характеристиками, проведенными через эту точку, и кривой, несущей начальные данные. Если мы будем менять данные вне этого треугольника, то решение будет меняться лишь вне этого треугольника. Таким образом, каждая характеристика будет отделять область, где решение осталось неизменным, от той области, где оно изменилось. Мы приходим к следующему выводу: *к данному решению задачи, зафиксированному внутри треугольника  $MPQ$ , можно присоединять вдоль характеристики, вообще говоря, различные решения, являющиеся его продолжением.*

Таким образом, характеристики суть линии, вдоль которых можно разрезать область существования решения, если мы хотим в некоторых частях этой области заменить одно решение другим так, чтобы при этом снова получить решение уравнения во всей области. Это важное свойство характеристик тесно связано с тем, что при произвольных начальных данных, заданных на характеристиках, задача Коши, вообще говоря, неразрешима. Для всякой другой линии, зная решение по одну сторону линии, мы могли бы найти значения решения и его производных на этой линии и решить задачу Коши по другую сторону линии. Таким образом, за всякую нехарактеристическую линию решение уравнения продолжается однозначно.

---

## ЛЕКЦИЯ VI

### КРАТНЫЕ ИНТЕГРАЛЫ

В курсе математического анализа изучают главным образом непрерывные функции одного или многих независимых переменных. Однако такие функции оказываются недостаточными в вопросах математической физики, где существенное значение приобретают разрывные и неограниченные функции. Наиболее важным понятием, применение которого для разрывных функций необходимо в вопросах математической физики, является понятие интеграла. Поэтому мы специально остановимся на теории интегрирования разрывных и неограниченных функций. Мы построим для таких функций теорию интеграла Лебега, следуя в основном идеям русской математической школы, и докажем для этого интеграла все основные теоремы, излагаемые обычно в курсах интегрального исчисления для интегралов от непрерывных функций.

Не следует думать, что целью нашего изложения является просто желание достичь наибольшей общности в теории интегрирования разрывных функций. Обобщение понятия интеграла придает теории интегрирования внутреннюю законченность и позволяет благодаря этому получить целый ряд важных теорем, не имеющих места для обычных интегралов от непрерывных функций.

В дальнейшем мы будем пользоваться следующими тремя важными результатами.

1. Признак допустимости предельного перехода под знаком интеграла.
2. Теорема о возможности перемены порядка интегрирования в кратных интегралах (теорема Лебега—Фубини).

3. Признак сходимости в среднем последовательности функций.

Интегрирование разрывных и неограниченных функций мы будем рассматривать, пользуясь главным образом идеей, которую можно назвать идеей исключения особенностей.

Если функция  $f$  многих переменных  $x_1, x_2, \dots, x_n$ , заданная в некоторой области  $\Omega$ , разрывна в этой области, но после исключения из  $\Omega$  некоторой частичной сколь угодно малой области  $\sigma$  становится непрерывной в оставшейся области  $\Omega'$ , то естественный путь к нахождению интеграла от этой функции состоит в том, чтобы рассмотреть сначала интеграл по  $\Omega'$ , а затем перейти к пределу, устремляя  $\Omega'$  к  $\Omega$ . Этот способ всегда используют в элементарной теории несобственных интегралов.

Теорию интегралов Лебега мы будем излагать, пользуясь тем же приемом и лишь несколько обобщив его. Основное значение для нас будет иметь понятие функции, непрерывной на замкнутом множестве. Свойства замкнутых множеств, то есть множеств, содержащих все свои предельные точки, мы изучим несколько позднее. Сейчас отметим, что функция, непрерывная на замкнутом множестве точек, обладает рядом весьма важных свойств, которые позволяют, в частности, построить интеграл от нее.

Наряду с замкнутыми множествами мы будем изучать открытые множества, то есть такие, которые не содержат ни одной точки своей

границы. Вначале определим понятие интеграла для функций, непрерывных на открытом множестве. Пользуясь этим понятием, мы разовьем далее теорию интегрирования непрерывных функций на замкнутых множествах и исследуем поведение интеграла при изменении области интегрирования.

В общем случае интеграл Лебега от разрывной функции строится следующим способом. Из области  $\Omega$ , где задана функция  $f$ , исключается множество  $\sigma$  так, чтобы осталось замкнутое множество  $\Omega'$ , на котором функция непрерывна. Далее вычисляется интеграл от  $f$  по замкнутому множеству  $\Omega'$ . Переходя к пределу, когда  $\Omega'$  стремится к  $\Omega$ , получаем интеграл от функции  $f$  по множеству  $\Omega$ .

В построенной таким образом теории интегрирования мы, естественно, стремимся сохранить ряд основных свойств обычного интеграла, как, например, возможность почленного интегрирования суммы нескольких функций. Это заставляет уже на первых шагах несколько ограничить класс функций, подлежащих нашему рассмотрению. Таким путем мы приходим к понятиям суммируемой функции. Именно для суммируемых функций и ведется дальнейшее исследование; для них остаются справедливыми все важнейшие свойства обычного интеграла.

В настоящей лекции мы затронем также упомянутые выше вопросы теории суммируемых функций.

## § 1. Замкнутые и открытые множества точек

Прежде чем приступить к изложению теории интеграла Лебега, мы должны остановиться на некоторых свойствах точечных множеств в  $n$ -мерном пространстве.

Рассмотрим  $n$ -мерное пространство с координатами  $x_1, x_2, \dots, x_n$ . Открытым множеством в этом пространстве мы будем называть такое множество точек  $M$ , каждая точка которого является внутренней для этого множества, то есть может быть окружена шаром с центром в этой точке, целиком принадлежащим множеству  $M$ .

Открытое множество может быть связным, то есть состоять из одного куска, но может быть и несвязным, будучи образованным отдельными кусками в конечном или бесконечном числе. Связное открытое множество принято называть областью.

**Пример 1.** Множество всех внутренних точек некоторого прямоугольного параллелепипеда, определенное неравенствами

$$0 < x_i < a_i \quad (i = 1, 2, \dots, n),$$

есть открытое множество. (Знак  $<$  нельзя заменить знаком  $\leq$ . Параллелепипед с границей не является открытым множеством.)

**Пример 2.** Множество всех внутренних точек некоторого шара, определенных неравенством  $\sum_{i=1}^n x_i^2 < R^2$ , является открытым.

Если исключить из этого множества начало координат, рассматривая только точки, для которых

$$0 < \sum_{i=1}^n x_i^2 < R^2,$$

то мы опять получим открытое множество.

Будем называть суммой нескольких множеств, или их объединением, множество всех точек, принадлежащих хотя бы одному из них. Сумму  $E$  множеств  $E_1$  и  $E_2$  будем обозначать  $E_1 + E_2$  и записывать  $E = E_1 + E_2$ .

Сумма конечного или бесконечного числа открытых множеств есть снова открытое множество.

В самом деле, каждая точка такой суммы является внутренней по крайней мере для одного из открытых множеств и, следовательно, будет внутренней точкой для суммы.

Кроме открытых множеств, большую роль играют еще *замкнутые множества*, т. е. такие множества, которые содержат все свои предельные точки.

Приведем примеры замкнутых множеств.

Пр и м е р 3. Множество всех точек шара

$$\sum_{i=1}^n x_i^2 \leq R^2$$

есть замкнутое множество (знак  $\leq$  здесь нельзя заменить знаком  $<$ ).

Пр и м е р 4. Множество всех точек некоторого параллелепипеда  $0 \leq x_i \leq a_i$  ( $i = 1, 2, \dots, n$ ) есть замкнутое множество.

Пр и м е р 5. Множество, состоящее из одной точки  $x_i = a_i$  ( $i = 1, 2, \dots, n$ ), является замкнутым. В самом деле, это множество вообще не имеет предельных точек.

*Сумма конечного числа замкнутых множеств есть замкнутое множество.* (Для бесконечного числа множеств это утверждение уже не имеет места.) Доказательство не представляет большого труда, и мы оставляем его читателю.

Условимся множество, не содержащее ни одной точки, называть *пустым множеством*. Это соглашение позволит упростить формулировки ряда дальнейших теорем. Пустое множество будем считать одновременно и открытым и замкнутым.

Пусть  $E_1, E_2, \dots, E_k, \dots$  — некоторые множества в конечном или бесконечном числе. Будем называть их *пересечением множеств  $E$  всех точек, каждая из которых принадлежит всем этим множествам*. Иногда это пересечение будет пустым множеством. Будем обозначать пересечение  $E$  множеств  $E_1, E_2, \dots, E_k, \dots$  следующим образом:

$$E = E_1 E_2 E_3 \dots E_k \text{ или } E = \prod_k E_k.$$

*Пересечение  $F$  конечного или бесконечного числа замкнутых множеств  $F_1, F_2, \dots, F_k, \dots$  есть замкнутое множество.* (В частности, оно может быть пустым.) В самом деле, предельная точка множества  $F$  является предельной точкой каждого из множеств  $F_1, F_2, \dots, F_k, \dots$  и, следовательно, принадлежит им всем и должна содержаться в их пересечении  $F$ .

Если все точки некоторого множества  $E_1$  принадлежат множеству  $E_2$ , то мы будем говорить, что  $E_1$  содержится в  $E_2$  или заключено в  $E_2$ . Это свойство мы будем выражать символически следующим образом:

$$E_2 \supseteq E_1 \text{ или } E_1 \subseteq E_2.$$

*З а м е ч а н и е.* Ограниченное бесконечное множество в  $n$ -мерном пространстве всегда имеет хотя бы одну предельную точку.

Справедливость этого замечания устанавливается так же, как и в случае одного псевдопеременного. В самом деле, пусть координаты точки  $P^{(i)}$  ( $i = 1, 2, \dots$ ), принадлежащей множеству  $E$ , будут  $(x_1^{(i)}, x_2^{(i)}, \dots, x_n^{(i)})$ .

Рассмотрим множество чисел  $\{x_1^{(i)}\}$ , представляющих собой первые координаты точек  $P^{(i)}$ . Это множество, будучи бесконечным и ограниченным, имеет по крайней мере одну предельную точку (в частности, если какое-либо число  $x_1^{(0)}$  повторяется в нашей последовательности бесконечно много раз, то оно может быть принято за такую предельную точку).

Выберем из последовательности  $P^{(i)}$  подпоследовательность  $P_1^{(j)}$  такую, что для нее последовательность  $x_1^{(j)}$  имеет предел. Повторяя это рассуждение, выберем из  $P_1^{(j)}$  подпоследовательность  $P_2^{(k)}$ , у которой будут иметь пределы уже последовательности двух первых координат, затем построим последовательность  $P_3^{(l)}$  и т. д. После  $n$  шагов придем к последовательности  $P_n^{(s)}$ , у которой все координаты сходятся и которая, следовательно, имеет предельную точку, что и требовалось доказать.

**Теорема 1.** Если последовательность ограниченных замкнутых множеств является суживающейся, т. е.

$$F_1 \supseteq F_2 \supseteq \dots \supseteq F_k \supseteq \dots$$

и ни одно из множеств  $F_k$  не пусто, то и их пересечение  $F$  не пусто.

В самом деле, рассмотрим последовательности точек  $P_1, P_2, \dots, P_k, \dots$ , причем  $P_k \in F_k$ . Множество точек этой последовательности, будучи ограниченным, должно иметь по крайней мере одну предельную точку. Эта точка, являясь предельной для каждого  $F_k$ , принадлежит всем  $F_k$  и, следовательно, войдет в их пересечение, которое уже поэтому не может быть пустым, что и требовалось доказать.

Полезно заметить, что пересечение конечного числа открытых множеств

$$\Omega = \Omega_1 \cap \Omega_2 \cap \dots \cap \Omega_k$$

представляет собой открытое множество.

В самом деле, любая точка  $\Omega$  есть внутренняя точка для каждого из множеств  $\Omega_1, \Omega_2, \dots, \Omega_k$  и в каждом из них является центром некоторого внутреннего шара. Наименьший из этих шаров будет внутренним шаром в  $\Omega$ .

Пусть  $E_1$  и  $E_2$  — два множества. Удалим из  $E_1$  все точки, принадлежащие пересечению  $E_1 E_2$ . Оставшееся множество мы будем называть разностью и обозначать  $E = E_1 - E_2$ . С помощью операции образования разности мы можем построить еще несколько примеров замкнутых и открытых множеств.

Пусть  $\Omega$  — открытое множество, а  $F$  — замкнутое множество. Тогда

$$\Omega_0 = \Omega - F$$

есть открытое множество.

В самом деле, если бы  $\Omega_0$  принадлежала точка, не окруженная внутренним по отношению к  $\Omega_0$  шаром, то в любой ее окрестности имелись бы точки, выброшенные из  $\Omega$ , т. е. принадлежащие  $F$ . Будучи, таким образом, предельной точкой для множества  $F$ , сама эта точка должна была бы принадлежать  $F$  и, следовательно, не могла бы принадлежать  $\Omega_0 = \Omega - F$ . Полученное противоречие доказывает наше утверждение.

Далее,  $F_0 = F - \Omega$  есть замкнутое множество.

Точка  $P$ , предельная для множества  $F_0$ , являясь точкой из  $F$ , могла бы быть исключена из последнего только в том случае, если бы она принадлежала  $\Omega$ . Но точки  $\Omega$  не могут быть предельными для  $F_0$ , так как они принадлежат  $\Omega$  вместе с некоторыми окрестностями, которые в силу этого не могут содержать точек из  $F_0$ . Значит, ни одна точка  $P$ , предельная для  $F_0$ , не может быть выброшена из  $F$  при вычитании  $\Omega$  и, следовательно,  $F_0$  содержит все свои предельные точки. Таким образом,  $F_0$  замкнуто.

Замыкание  $\bar{E}$  любого множества  $E$ , то есть множество, получаемое присоединением к  $E$  всех его предельных точек, представляет собой замкнутое множество.

В самом деле, пусть точка  $P_0$  является предельной для некоторой последовательности  $P_1, P_2, \dots, P_k, \dots$  точек из  $E$ . Покажем, что точка  $P_0$  является предельной точкой не только для  $\bar{E}$ , но и для  $E$  и, следовательно, входит в  $\bar{E}$ . Отсюда будет вытекать, что множество  $\bar{E}$  содержит все свои

предельные точки и является замкнутым. Внутри каждого шара  $\sigma_k$ , описанного вокруг  $P_k$  радиусом  $\frac{1}{2^k}$ , найдется хотя бы одна точка  $Q_k$ , принадлежащая  $E$ . Последовательность  $Q_k$  сходится, очевидно, снова к  $P_0$  и, следовательно,  $P_0$  есть предельная точка множества  $E$ , что и требовалось доказать.

Граница  $C$  открытого множества  $\Omega$ , т. е. множество предельных точек этого открытого множества, не являющихся внутренними точками, представляет собой замкнутое множество.

В самом деле, по определению множества  $C$  имеем

$$C = \bar{\Omega} - \Omega,$$

где  $\bar{\Omega}$  есть замыкание множества  $\Omega$ . По доказанному выше, множество  $C$  замкнуто.

При помощи рассмотренных операций над множествами из замкнутых и открытых множеств простого строения могут быть получены замкнутые множества довольно сложной структуры, как показывают следующие два примера.

**Пример 6.** Множество  $F_*$  всех точек замкнутого отрезка  $[0, 1]$ , координата которых может быть записана по десятичной системе без применения цифры 5, есть замкнутое множество. При этом допускается запись числа при помощи бесконечного ряда девяток, например:  $0,5 = 0,4999\ldots$ . Поэтому, если десятичная дробь, выражающая координату какой-то точки, конечная и содержит только одну пятерку в последнем разряде, то эта точка войдет в множество  $F_*$ .

Замкнутость этого множества проще всего установить, если заметить, что оно представляет собой разность

$$[0, 1] - \Omega_*,$$

где  $[0, 1]$  — замкнутый отрезок, а  $\Omega_*$  — открытое множество, состоящее из всех точек, принадлежащих открытым промежуткам  $\Omega_i$ , которые задаются неравенствами вида

$$0,5 < x < 0,6; \quad 0,15 < x < 0,16; \quad 0,25 < x < 0,26; \quad \dots; \quad \Omega_* = \sum \Omega_i.$$

Действительно, каждая точка, координата которой не может быть записана без помощи пятерки, принадлежит одному из промежутков  $\Omega_i$ . Все  $\Omega_i$  суть открытые множества, поэтому множество  $\Omega_*$  также открытое и, значит,  $F_*$  — замкнутое множество.

Множество точек  $E$ , для которого в любом открытом множестве  $\Omega_1$  найдется открытое подмножество  $\Omega_2$ , не содержащее ни одной точки  $E$ , называется нигде не плотным.

Рассмотренное выше множество  $F_*$ , как мы видим, является примером замкнутого нигде не плотного множества.

**Пример 7.** Рассмотрим в некотором открытом множестве непрерывную функцию  $f$ . Множества  $E(f > a)$  и  $E(f < a)$ , где  $a$  — любое число, являются открытыми.

Докажем это, например, для  $E(f > a)$ . В самом деле, если в некоторой точке  $P$  значение непрерывной функции  $f$  больше  $a$ , то и в достаточно малом шаре вокруг  $P$  имеет место неравенство  $f > a$ . Следовательно, множество  $E(f > a)$  состоит только из внутренних точек и является открытым.

**Пример 8.** Пусть теперь функция  $f$  непрерывна в замыкании  $\bar{\Omega}$  открытого множества  $\Omega$ :

$$\bar{\Omega} = \Omega + C,$$

где  $C$  — граница множества  $\Omega$ . Множества  $E(f \geq a)$  и  $E(f \leq a)$  при любом  $a$  являются замкнутыми множествами.

Проведем доказательство для  $E$  ( $f \geq a$ ). Действительно, если для некоторой последовательности точек  $P_1, P_2, \dots, P_k, \dots$ , стремящейся к  $P_0$ , имеет место неравенство  $f(P_k) \geq a$ , то и  $\lim_{k \rightarrow \infty} f(P_k) \geq a$ , но по непрерывности

$\lim_{k \rightarrow \infty} f(P_k) = f(P_0)$  и, следовательно, точка  $P_0$  принадлежит множеству

$E$  ( $f \geq a$ ). Это и означает замкнутость множества  $E$  ( $f \geq a$ ).

В курсе математического анализа рассматриваются функции, заданные, как правило, в открытой или замкнутой области. Нам придется в дальнейшем изучать и функции, заданные на множествах более общей природы.

Функция, заданная на некотором множестве  $E$ , называется *непрерывной в точке  $P_0$*  (принадлежащей  $E$ ) по множеству  $E$ , если для произвольного положительного числа  $\varepsilon$  найдется столь малая окрестность точки  $P_0$ , что для любой точки  $P$  из множества  $E$ , принадлежащей этой окрестности, имеет место неравенство

$$|f(P_0) - f(P)| < \varepsilon.$$

Из этого определения, в частности, следует, что в изолированных точках  $E$  любая функция непрерывна. Функция, непрерывная во всех точках некоторого множества, называется *непрерывной на этом множестве*.

Пусть

$$\Omega = \Omega_1 + \Omega_2 + \dots + \Omega_k + \dots$$

есть сумма конечного или бесконечного числа открытых множеств. Если функция  $f$ , заданная на  $\Omega$ , непрерывна на каждом множестве  $\Omega_k$ , то она непрерывна и на  $\Omega$ .

В самом деле, любая точка  $\Omega$  вместе с некоторой окрестностью входит в одно из множеств  $\Omega_k$  и является в нем точкой непрерывности  $f$ .

Мы остановимся подробнее на функциях, которые заданы и непрерывны на замкнутых множествах. Докажем прежде всего две важные теоремы.

**Т е о р е м а 2.** (Вейерштрасса.) *Функция  $f$ , непрерывная на ограниченном замкнутом множестве  $F$ , ограничена на этом множестве и принимает там свое наибольшее и наименьшее значение.*

Докажем сначала ограниченность функции  $f$  на множестве  $F$ . Допустив противное, мы получим последовательность точек, принадлежащих  $F$ , в которых значения неограниченно возрастают. Эта последовательность будет иметь по крайней мере одну предельную точку, принадлежащую множеству  $F$ , ввиду его ограниченности и замкнутости. Обозначим эту предельную точку  $P_0$ . В любой окрестности  $P_0$  должны содержаться точки, в которых функция  $f$  принимает сколь угодно большие по абсолютной величине значения, но это противоречит непрерывности  $f$  в точке  $P_0$ , так как, по определению непрерывности, для достаточно близких к  $P_0$  точек  $P$ , принадлежащих  $F$ , должно выполняться неравенство

$$|f(P_0) - f(P)| < \varepsilon$$

при любом  $\varepsilon > 0$ .

Таким образом, ограниченность функции  $f$  на  $F$  доказана. Множество значений, принимаемых функцией на  $F$ , будучи ограниченным, имеет верхнюю грань  $M$  и нижнюю грань  $m$ . Мы докажем теперь, что функция принимает значения  $M$  и  $m$  в некоторых точках множества  $F$ . Согласно определению верхней грани, для любого  $\varepsilon > 0$  должна существовать такая точка  $P_\varepsilon$  из  $F$ , что  $M - f(P_\varepsilon) < \varepsilon$ . Полагая  $\varepsilon = \frac{1}{n}$ , получим последовательность точек  $P_n$  такую, что  $f(P_n) \rightarrow M$  при  $n \rightarrow \infty$ . В силу замкнутости и ограниченности  $F$  эта последовательность имеет в  $F$  по крайней мере одну предельную точку  $P_0$ . Ввиду непрерывности  $f$ , в точке  $P_0$  имеет место равенство  $f(P_0) = M$ , что и требовалось доказать.

Точно так же доказывается, что  $f$  принимает наименьшее значение в некоторой точке из  $F$ .

**Теорема 3. (Вейерштрасса.)** Функция  $f$ , непрерывная на ограниченном замкнутом множестве  $F$ , равномерно непрерывна на нем; иными словами, каково бы ни было положительное число  $\varepsilon$ , можно указать такое число  $\delta = \delta(\varepsilon)$ , что для любых двух точек  $P, Q$  множества  $F$ , расстояние между которыми меньше  $\delta$ , имеет место неравенство

$$|f(P) - f(Q)| < \varepsilon.$$

Если, как обычно, назвать колебанием функции на некотором замкнутом множестве разность между наибольшим и наименьшим значениями ее на этом множестве, то теорему Вейерштрасса можно перефразировать так: для всякого  $\varepsilon > 0$  существует такое число  $\delta(\varepsilon)$ , что колебание функции  $f$  не превосходит  $\varepsilon$  на пересечении  $F$  с любым шаром радиуса  $\delta(\varepsilon)$ .

Доказательство этой теоремы будем вести от противного. Предположим, что функция  $f$  не является равномерно непрерывной на  $F$ . Тогда найдется такое положительное число  $\varepsilon_0$ , что при любом  $\delta > 0$  найдутся две точки  $P_\delta$  и  $Q_\delta$  такие, что расстояние между ними меньше  $\delta$ , а разность значений  $f$  в этих точках по абсолютной величине больше  $\varepsilon_0$ . Полагая  $\delta = \frac{1}{n}$  и выбирая из

последовательности  $P_n$  подпоследовательность  $P_{n_k}$ , сходящуюся к некоторой точке  $P_0$ , принадлежащей  $F$  (очевидно, к этой же точке будет сходиться соответствующая подпоследовательность точек  $Q_{n_k}$ ), придем к выводу, что в любой окрестности точки  $P_0$  колебание  $f$  не меньше  $\varepsilon_0$ , а это противоречит предположению теоремы о непрерывности  $f$  на  $F$ . Теорема доказана.

Отметим одно применение доказанных теорем. Пусть  $F$  — замкнутое множество и  $P_0$  — некоторая фиксированная точка. Расстояние  $r(P, P_0)$  от переменной точки  $P$  замкнутого множества  $F$  до точки  $P_0$  представляет непрерывную функцию точки  $P$  при заданной точке  $P_0$ . По первой теореме Вейерштрасса эта функция достигает своего наименьшего значения. Положим

$$\delta(P_0) = \min_P r(P, P_0).$$

Число  $\delta(P_0)$  называется расстоянием точки  $P_0$  до замкнутого множества  $F$ . Если  $P_0$  не принадлежит  $F$ , то это расстояние отлично от нуля.

## § 2. Интегралы по открытым множествам от непрерывных функций

Как уже указывалось выше, при построении общего понятия интеграла мы будем шаг за шагом расширять класс множеств, для которых оно определяется. Начнем с интегрирования по открытым множествам.

Пусть функция  $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$  задана, непрерывна и неотрицательна на некотором открытом множестве. (Разумеется, она может быть неограниченной и неравномерно непрерывной, как, например, функция

$$\frac{1}{r} = \frac{1}{\sqrt{x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2}}$$

в области  $0 < r < 1$ , полученной удалением начала координат из открытого шара  $0 \leq r < 1$ .)

Разобьем все пространство на кубические ячейки  $F_{k_1, k_2, \dots, k_n}$  со стороной  $h$ , определенные неравенствами

$$k_i h \leq x_i \leq (k_i + 1)h \quad (i = 1, 2, \dots, n),$$

где  $k_i$  — целые числа. Такое подразделение назовем сеткой.

Составим теперь из конечного числа кубиков сетки какое-либо множество  $\Phi_h$ , лежащее целиком внутри  $\Omega$ . Такое множество мы назовем *внутренним сеточным множеством*. Будем уменьшать  $h$ , подразделяя каждый кубик сетки на целое число более мелких кубиков, и снова строить внутренние сеточные множества. Систему внутренних сеточных множеств мы назовем *исчерпывающей для области  $\Omega$* , если выполнены два условия:

а) последовательность  $\Phi_h$  расширяется, т. е.

$$\Phi_{h_1} \subseteq \Phi_{h_2} \subseteq \dots \subseteq \Phi_{h_k} \subseteq \dots;$$

б) каждая точка области  $\Omega$  попадает строго внутрь всех множеств  $\Phi_{h_k}$ , начиная с некоторого  $k$ .

Отметим, что для любого открытого множества существует хотя бы одна исчерпывающая система внутренних сеточных множеств. В самом деле, строя внутреннее сеточное множество, мы можем включить в него все кубики сетки, которые вместе с границей лежат внутри  $\Omega$ . Полученная таким путем система внутренних сеточных множеств будет исчерпывающей. Действительно, любая точка  $P_0$  из множества  $\Omega$  может быть окружена малым шаром  $\sigma$ , принадлежащим  $\Omega$ . Следовательно, при достаточно мелкой сетке, когда наибольшая диагональ кубика с ребром  $h$  станет меньше половины радиуса шара  $\sigma$ , один из кубиков вместе с точкой  $P_0$  и все граничащие с ним кубики войдут в  $\Phi_h$ , что и требовалось доказать.

Положим

$$J_k = \int \dots \int_{\Phi_{h_k}} f(x_1, x_2, \dots, x_n) dx_1 dx_2 \dots dx_n,$$

где  $\Phi_{h_k}$  образуют исчерпывающую систему сеточных множеств. Ввиду неотрицательности функции  $f$  величина  $J_k$  с возрастанием  $k$  не убывает. Если при  $k \rightarrow \infty$  последовательность  $J_k$  остается ограниченной, то, очевидно, она стремится к некоторому пределу. При этом функцию  $f$  назовем *интегрируемой по области  $\Omega$* , а предел последовательности  $J_k$  — *интегралом от функции  $f(x_1, \dots, x_n)$  по области  $\Omega$* :

$$\int \dots \int_{\Omega} f(x_1, \dots, x_n) dx_1 \dots dx_n = \lim_{k \rightarrow \infty} \int \dots \int_{\Phi_{h_k}} f(x_1, \dots, x_n) dx_1 \dots dx_n.$$

Этот предел, как мы докажем, не зависит от того, каким способом выбрана исчерпывающая система и как расположены координатные оси в пространстве.

Интеграл

$$\int \dots \int_{\Omega} f(x_1, x_2, \dots, x_n) dx_1 dx_2 \dots dx_n$$

мы будем более кратко записывать в виде

$$\int_{\Omega} f dv \text{ или } \int_{\Omega} f dx_1 dx_2 \dots dx_n.$$

Если последовательность расширяющихся множеств не является исчерпывающей, то

$$\lim \int_{\Phi_{h_k}} f dv \leq \int_{\Omega} f dv.$$

**З а м е ч а н и е 1.** Функция  $f$ , неотрицательная, ограниченная и непрерывная в ограниченном открытом множестве  $\Omega$ , интегрируема в этом множестве. В самом деле, интегралы по исчерпывающей системе сеточных множеств ограничены в совокупности и, следовательно, стремятся к определенному пределу.

**Л е м м а 1.** Рассмотрим расширяющуюся систему открытых множеств

$$\Omega_1 \subseteq \Omega_2 \subseteq \dots \subseteq \Omega_k \subseteq \dots,$$

и пусть  $\Omega = \Omega_1 + \Omega_2 + \dots + \Omega_k + \dots$ . Тогда любое замкнутое ограниченное множество  $F$ , лежащее целиком внутри  $\Omega$ , попадет внутрь всех  $\Omega_k$ , начиная с некоторого  $k$ .

В самом деле, допустим, что утверждение леммы не имеет места. Тогда для любого  $k$  можно указать точку  $P_k$ , принадлежащую  $F$ , но не принадлежащую  $\Omega_k$ . Множество точек  $P_k$  имеет по крайней мере одну предельную точку  $P_0$ , принадлежащую, очевидно,  $F$ . Легко видеть, что  $P_0$  не принадлежит ни одному  $\Omega_k$ , ибо в любой его окрестности имеются точки  $P_k$  со сколь угодно большими номерами  $k$ . Это, однако, невозможно, так как множество  $F$  принадлежит сумме  $\Omega$  и, следовательно, каждая его точка должна принадлежать одному из слагаемых суммы  $\Omega$ . Полученное противоречие доказывает лемму.

Покажем теперь, что интеграл по открытому множеству не зависит ни от направления координатных осей в пространстве, ни от способа составления исчерпывающей системы внутренних сеточных множеств.

Рассмотрим открытые множества  $\Omega_k$ , состоящие из всех внутренних точек множеств  $\Phi_{h_k}$ . Сумма этих открытых множеств есть открытое множество  $\Omega$  и, значит, любое ограниченное замкнутое множество  $F$ , лежащее внутри  $\Omega$ , будет содержаться во всех сеточных множествах  $\Phi_{h_k}$ , начиная с некоторого  $k$ . Пусть  $\Phi_{h_k}$  и  $\Psi_{h_k}$  — две исчерпывающие системы сеточных множеств, не обязательно заданные в одной и той же системе координат. В силу леммы 1 при надлежащем выборе  $k_2 = k_2(k_1)$  и  $k_3 = k_3(k_2)$  и любом  $k_1$  будем иметь:

$$\Phi_{h_{k_1}} \subseteq \Psi_{h_{k_2}} \subseteq \Phi_{h_{k_3}}.$$

Следовательно,

$$\int_{\Phi_{h_{k_1}}} f dv \leq \int_{\Psi_{h_{k_2}}} f dv \leq \int_{\Phi_{h_{k_3}}} f dv,$$

откуда видно, что пределы по системам  $\Phi_h$  и  $\Psi_h$  равны. Независимость интеграла от выбора исчерпывающей системы сеточных множеств и направления осей координат доказана.

Каждая неотрицательная функция, интегрируемая на открытом множестве  $\Omega$ , интегрируема на любом открытом подмножестве  $\Omega_1$ . В самом деле, интегралы по исчерпывающей системе сеточных множеств для  $\Omega_1$  будут мажорироваться интегралами по соответствующим сеточным множествам, построенным для  $\Omega$ , поэтому они образуют ограниченную и, следовательно, сходящуюся последовательность.

**З а м е ч а н и е 2.** Если  $\Omega_2 \subset \Omega_1$  и функция  $f$  неотрицательна, то

$$\int_{\Omega_2} f dv \leq \int_{\Omega_1} f dv.$$

Действительно, исчерпывающие множества для  $\Omega_2$  можно брать так, чтобы они входили в исчерпывающие множества для  $\Omega_1$ .

**З а м е ч а н и е 3.** Если  $f_1$  и  $f_2$  — какие-либо две неотрицательные функции, непрерывные и интегрируемые в  $\Omega$ , то и их сумма  $f_1 + f_2$  интегрируема в  $\Omega$ , причем

$$\int_{\Omega} (f_1 + f_2) dv = \int_{\Omega} f_1 dv + \int_{\Omega} f_2 dv.$$

Доказательство этого утверждения не представляет труда. Оно получается предельным переходом из очевидного равенства

$$\int_{\Phi_h} (f_1 + f_2) dv = \int_{\Phi_h} f_1 dv + \int_{\Phi_h} f_2 dv.$$

**З а м е ч а н и е 4.** Если  $f$  неотрицательна, непрерывна и интегрируема в  $\Omega$ , то и  $af$  при  $a \geq 0$  обладает этими свойствами, причем

$$\int_{\Omega} af dv = a \int_{\Omega} f dv.$$

Доказательство этого утверждения также не представляет труда.

**Т е о р е м а 4.** Пусть  $\Omega_1$  и  $\Omega_2$  — два открытых множества, которые могут пересекаться друг с другом, и пусть  $f$  — непрерывная неотрицательная функция в множестве  $\Omega_1 + \Omega_2$ , интегрируемая по этому множеству. Тогда справедливо соотношение

$$\int_{\Omega_1} f dv + \int_{\Omega_2} f dv = \int_{\Omega_1 + \Omega_2} f dv + \int_{\Omega_1 \Omega_2} f dv. \quad (\text{VI.1})$$

Построим в  $\Omega_1$  и  $\Omega_2$  исчерпывающие сеточные множества  $\Phi_h^{(1)}$  и  $\Phi_h^{(2)}$ . Очевидно,

$$\int_{\Phi_h^{(1)}} f dv + \int_{\Phi_h^{(2)}} f dv = \int_{\Phi_h^{(1)} + \Phi_h^{(2)}} f dv + \int_{\Phi_h^{(1)} \Phi_h^{(2)}} f dv. \quad (\text{VI.2})$$

Легко видеть, что множества  $\Phi_h^{(1)} + \Phi_h^{(2)}$  образуют исчерпывающую систему для множества  $\Omega_1 + \Omega_2$ , ибо каждая точка этого множества рано или поздно попадет в какое-либо множество  $\Phi_h^{(1)}$  или  $\Phi_h^{(2)}$ , а  $\Phi_h^{(1)} \Phi_h^{(2)}$  образуют исчерпывающую систему для  $\Omega_1 \Omega_2$ , ибо каждая точка этого множества рано или поздно попадет в оба сеточных множества  $\Phi_h^{(1)}$  и  $\Phi_h^{(2)}$ . Поэтому, переходя к пределу в (VI.2), получим (VI.1). Теорема доказана.

**С л е д с т в и е.** Интеграл по сумме конечного числа открытых множеств от неотрицательной функции не превосходит суммы интегралов, взятых по всем этим множествам:

$$\int_{\Omega} f dv \leq \int_{\Omega_1} f dv + \int_{\Omega_2} f dv + \dots + \int_{\Omega_h} f dv.$$

Отсюда следует, что если все интегралы по открытым множествам  $\Omega_k$  существуют, то и интеграл по  $\Omega$  существует.

**Т е о р е м а 5.** Пусть дана расширяющаяся последовательность открытых множеств

$$\Omega_1 \subseteq \Omega_2 \subseteq \dots \subseteq \Omega_h \subseteq \dots$$

Обозначим через  $\Omega_0$  их сумму

$$\Omega_1 + \Omega_2 + \dots + \Omega_h + \dots$$

Пусть  $f$  — какая-либо неотрицательная, непрерывная и интегрируемая функция в  $\Omega_0$ . Тогда

$$\int_{\Omega_0} f dv = \lim_{k \rightarrow \infty} \int_{\Omega_k} f dv$$

Доказательство. Очевидно,  $\int_{\Omega_0} f dv \geq \int_{\Omega_k} f dv$ , поэтому

$$\int_{\Omega_0} f dv \geq \lim_{k \rightarrow \infty} \int_{\Omega_k} f dv. \quad (*)$$

Построим систему исчерпывающих сеточных множеств  $\Phi_h$  для открытого множества  $\Omega$ . На основании леммы 1 каждое такое сеточное множество будет целиком заключено в некотором  $\Omega_n$ .

Мы будем иметь, следовательно,

$$\int_{\Phi_h} f dv \leq \int_{\Omega_n} f dv \leq \lim_{k \rightarrow \infty} \int_{\Omega_k} f dv$$

и, переходя к пределу при  $h \rightarrow 0$ , получим:

$$\int_{\Omega_0} f dv \leq \lim_{k \rightarrow \infty} \int_{\Omega_k} f dv.$$

Сопоставляя это неравенство с (\*), имеем

$$\int_{\Omega_0} f dv = \lim_{k \rightarrow \infty} \int_{\Omega_k} f dv,$$

что и требовалось доказать.

С л е д с т в и е. Пусть дана последовательность открытых множеств  $\Omega_1, \Omega_2, \dots, \Omega_k, \dots$  (не обязательно расширяющаяся) и  $f$  — некоторая неотрицательная непрерывная функция. Если суммы

$$\sum_{k=1}^N \int_{\Omega_k} f dv \quad (N = 1, 2, \dots)$$

ограничены в совокупности, то существует интеграл по сумме  $\Omega_0$  множеств  $\Omega_k$  и справедливо неравенство

$$\int_{\Omega_0} f dv = \lim_{k \rightarrow \infty} \int_{\Omega_1 + \Omega_2 + \dots + \Omega_k} f dv \leq \lim_{k \rightarrow \infty} \left[ \int_{\Omega_1} f dv + \int_{\Omega_2} f dv + \dots + \int_{\Omega_k} f dv \right].$$

З а м е ч а н и е 5. Пусть  $\Omega$  — открытое множество,  $\Phi_{h_0}$  — сеточное множество, содержащееся в нем, а  $f$  — неотрицательная функция, непрерывная и интегрируемая в  $\Omega$ . Тогда

$$\int_{\Omega - \Phi_{h_0}} f dv + \int_{\Phi_{h_0}} f dv = \int_{\Omega} f dv.$$

Для доказательства заключим  $\Phi_{h_0}$  строго внутри сеточного множества  $\Phi_{h_\varepsilon}$  так, чтобы

$$\int_{\Phi_{h_\varepsilon}} f dv < \int_{\Phi_{h_0}} f dv + \varepsilon.$$

Множества  $\Phi_{h_\varepsilon} + \Psi_h$ , где  $\Psi_h$  — исчерпывающая система внутренних сеточных множеств для  $\Omega - \Phi_{h_0}$ , будут исчерпывающими для  $\Omega$  и, следовательно,

$$\int_{\Omega} f dv = \lim_{h \rightarrow 0} \int_{\Phi_{h_\varepsilon} + \Psi_h} f dv \leq \lim_{h \rightarrow 0} \left[ \int_{\Phi_{h_\varepsilon}} f dv + \int_{\Psi_h} f dv \right] \leq \int_{\Phi_{h_0}} f dv + \int_{\Omega - \Phi_{h_0}} f dv + \varepsilon,$$

откуда и вытекает наше утверждение.

**Т е о р е м а 6.** Пусть дана сужающаяся последовательность открытых множеств  $\Omega_1 \supseteq \Omega_2 \supseteq \dots \supseteq \Omega_k \supseteq \dots$  и пусть пересечение их также представляет собой открытое множество (в частности, оно может быть пустым)  $\Omega_0 = \Omega_1 \cap \Omega_2 \cap \dots \cap \Omega_k \cap \dots$ . Пусть  $f$  — непрерывная, неотрицательная и интегрируемая на  $\Omega_1$  функция. Тогда

$$\int_{\Omega_0} f dv = \lim_{k \rightarrow \infty} \int_{\Omega_k} f dv$$

(если  $\Omega_0$  — пустое множество, предел этот равен нулю).

**Доказательство.** Приведем каждому множеству  $\Omega_k$  в соответствие внутреннее сеточное множество  $\Phi_h^{(k)}$  так, чтобы имело место неравенство

$$\int_{\Omega_k} f dv - \int_{\Phi_h^{(k)}} f dv < \frac{\varepsilon}{2^k}.$$

Составим открытые множества  $\Omega_k' = \Omega_k - \Phi_h^{(k+1)}$ . Нетрудно видеть, что открытое множество  $\Omega_1$  совпадает с суммой  $\Omega_0 + \Omega_1' + \dots + \Omega_k' + \dots$ . На основании следствия из теоремы 5

$$\int_{\Omega_1} f dv \leq \int_{\Omega_0} f dv + \int_{\Omega_1'} f dv + \dots + \int_{\Omega_k'} f dv + \dots$$

Но, в силу выбора  $\Phi_h^{(k+1)}$  и замечания 5,

$$\int_{\Omega_k'} f dv = \int_{\Omega_k} f dv - \int_{\Phi_h^{(k+1)}} f dv \leq \int_{\Omega_k} f dv - \int_{\Omega_{k+1}} f dv + \frac{\varepsilon}{2^{k+1}}$$

и, значит,

$$\begin{aligned} \int_{\Omega_1} f dv &\leq \int_{\Omega_0} f dv + \left( \int_{\Omega_1} f dv - \int_{\Omega_2} f dv + \frac{\varepsilon}{2^2} \right) + \left( \int_{\Omega_2} f dv - \int_{\Omega_3} f dv + \frac{\varepsilon}{2^3} \right) + \dots = \\ &= \int_{\Omega_0} f dv + \lim_{k \rightarrow \infty} \left( \int_{\Omega_1} f dv - \int_{\Omega_k} f dv \right) + \frac{\varepsilon}{2}, \end{aligned}$$

откуда

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_{\Omega_k} f dv \leq \int_{\Omega_0} f dv + \frac{\varepsilon}{2}.$$

Утверждение теоремы следует теперь из того, что, очевидно,

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_{\Omega_k} f dv \geq \int_{\Omega_0} f dv.$$

В этом параграфе рассматривались только неотрицательные функции. В § 4 мы покажем, что интегрирование знакопеременных функций сводится к интегрированию неотрицательных функций. Это будет доказано для интеграла, понимаемого в более общем смысле, а именно, для интеграла Лебега, частными случаями которого являются интегралы от непрерывной функции на открытом (§ 2) и замкнутом (§ 3) множествах.

### § 3. Интегралы по ограниченным замкнутым множествам от непрерывных функций

Перейдем теперь к определению понятия интеграла от непрерывной функции по ограниченному замкнутому множеству. Естественно сделать это следующим образом. Пусть функция  $f$  определена на некотором ограниченном замкнутом множестве  $F$  и непрерывна на нем. Заключим  $F$  в некоторое открытое множество  $\Omega$ . Пусть нам удалось непрерывным образом продолжить функцию  $f$  на открытое множество  $\Omega$  и  $f$  оказалась интегрируемой в этом множестве. Образует еще открытое множество  $\Omega - F$ . Тогда, по определению, положим:

$$\int_F f dv = \int_{\Omega} f dv - \int_{\Omega - F} f dv.$$

Однако в этом определении остается еще много невыясненного. Не ясно, во-первых, всегда ли можно непрерывно продолжить функцию  $f$  и получить при этом интегрируемую функцию и, во-вторых, неизвестно, приводит ли подобное определение интеграла к однозначному результату.

Для того чтобы выяснить корректность нашего определения, мы докажем сейчас несколько вспомогательных предложений.

Пусть  $f$  — какая-нибудь неотрицательная функция, непрерывная и интегрируемая в открытом множестве  $\Omega_1$ . Далее, пусть  $\Omega$  содержится в  $\Omega_1$ , а  $F$  — замкнутое множество, заключенное в  $\Omega$ . Мы будем иметь:

$$\Omega + (\Omega_1 - F) = \Omega_1, \quad \Omega (\Omega_1 - F) = \Omega - F.$$

Отсюда, на основании теоремы 4,

$$\int_{\Omega} f dv + \int_{\Omega_1 - F} f dv = \int_{\Omega_1} f dv + \int_{\Omega - F} f dv$$

и, значи,

$$\int_{\Omega} f dv - \int_{\Omega - F} f dv = \int_{\Omega_1} f dv - \int_{\Omega_1 - F} f dv.$$

Пусть  $f$  неотрицательна, непрерывна и интегрируема в открытых множествах  $\Omega_1$  и  $\Omega_2$ , а  $F \subseteq \Omega_1 \Omega_2$ . Положим  $\Omega = \Omega_1 \Omega_2$ . По доказанному

$$\int_{\Omega} f dv - \int_{\Omega - F} f dv = \int_{\Omega_1} f dv - \int_{\Omega_1 - F} f dv = \int_{\Omega_2} f dv - \int_{\Omega_2 - F} f dv.$$

Мы получили важный результат:

*Разность*

$$\int_{\Omega} f dv - \int_{\Omega - F} f dv$$

не зависит от выбора открытого множества  $\Omega$ .

**Л е м м а 2.** Пусть непрерывная функция  $f$  обращается в нуль в точках некоторого ограниченного замкнутого множества  $F$ , лежащего внутри открытого множества  $\Omega$ ; тогда

$$\int_{\Omega} f dv = \int_{\Omega - F} f dv.$$

Предположим сначала, что множество  $\Omega$  ограничено.

В силу сказанного выше (см. стр. 86, Замечание 2)

$$\int_{\Omega - F} f dv \leq \int_{\Omega} f dv. \quad (**)$$

Рассмотрим открытое множество  $\Omega_\varepsilon$  тех точек, в которых  $f < \varepsilon$ , где  $\varepsilon$  — малое положительное число. Пользуясь ограниченностью множества  $\Omega$  и, значит, всех  $\Omega_\varepsilon$ , мы видим, что

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{\Omega_\varepsilon} f dv = 0.$$

На основании следствия из теоремы 4

$$\int_{\Omega} f dv \leq \int_{\Omega - F} f dv + \int_{\Omega_\varepsilon} f dv$$

и, значит,

$$\int_{\Omega - F} f dv \geq \int_{\Omega} f dv.$$

Сопоставляя это с (\*\*), получим доказываемое утверждение.

В общем случае представим множество  $\Omega$  как сумму расширяющихся ограниченных открытых множеств  $\Omega_k$ . Переходя к пределу при  $k \rightarrow \infty$  в равенстве

$$\int_{\Omega_k} f dv = \int_{\Omega_k - F} f dv,$$

получим утверждение леммы.

Если две функции  $f_1$  и  $f_2$  совпадают во всех точках замкнутого множества  $F$ , то для них имеет место равенство

$$\int_{\Omega} f_1 dv - \int_{\Omega - F} f_1 dv = \int_{\Omega} f_2 dv - \int_{\Omega - F} f_2 dv.$$

В самом деле, из леммы 2 следует равносильное равенство

$$\int_{\Omega} (f_1 - f_2) dv = \int_{\Omega - F} (f_1 - f_2) dv.$$

Доказанное утверждение означает, что определенный выше интеграл от функции  $f$ , непрерывной на замкнутом множестве  $F$ , по этому множеству не зависит от способа продолжения  $f$  вне  $F$ . Нам остается еще установить возможность такого продолжения.

**Л е м м а 3.** Рассмотрим открытое множество  $\Omega$  с границей  $C$ . Пусть  $F$  — замкнутое множество, лежащее в множестве  $\Omega + C$ . Пусть на  $F$  задана некоторая непрерывная неотрицательная функция  $f$ . Тогда в  $\Omega + C$  можно построить непрерывную неотрицательную функцию  $\Phi$ , совпадающую с  $f$  в точках  $F$ . При этом наибольшее и наименьшее значения  $\Phi$  равны соответственно наибольшему и наименьшему значениям  $f$ .

Как было показано на стр. 84, каждая точка  $P$  области  $\Omega$ , не принадлежащая  $F$ , находится на конечном положительном расстоянии  $\delta(P)$  от множества  $F$ . Построим шар радиуса  $R$  с центром в данной точке  $P$  и рассмотрим максимальное значение функции  $f$  в этом шаре.

Пусть

$$\max_{r \leq R} f = M_P(R).$$

Если точек  $F$  внутри этого шара нет, то будем считать  $M_P(R) = 0$ .  $M_P(R)$  — монотонно возрастающая и, следовательно, интегрируемая в обычном смысле слова функция переменного  $R$ <sup>1)</sup>.

За функцию  $\Phi$  можно взять, например,

$$\Phi(P) = \frac{1}{\delta(P)} \int_{\delta(P)}^{2\delta(P)} M_P(R) dR.$$

В точках множества  $F$  положим  $\Phi(P) = f(P)$ .

Докажем, что при таком определении  $\Phi(P)$  будет непрерывной. В самом деле, в точке  $P_1$ , отстоящей на расстоянии  $\delta > 0$  от какой-нибудь точки  $P_0$  множества  $F$ , значение этой функции заключено между

$$\min_{r \leq 3\delta} f(P) \quad \text{и} \quad \max_{r \leq 3\delta} f(P),$$

причем шар радиуса  $3\delta$  берется с центром в точке  $P_0$ , и, следовательно,  $\Phi(P_1)$  стремится к  $f(P_0)$  при  $\delta \rightarrow 0$  в силу непрерывности  $f$ .

Для двух точек  $P_1$  и  $P_2$ , не являющихся точками  $F$ , отстоящих одна от другой на величину  $h$ , имеем:

$$\begin{aligned} M_{P_1}(R) &\leq M_{P_2}(R+h) \quad \text{и} \quad \delta(P_1) \leq \delta(P_2) + h, \\ M_{P_2}(R) &\leq M_{P_1}(R+h) \quad \text{и} \quad \delta(P_2) \leq \delta(P_1) + h. \end{aligned}$$

<sup>1)</sup> См., например, В. И. Смирнов, Курс высшей математики, т. I, стр. 282. Изд. 11-е, Л.—М., 1948.

Будем считать  $h < \min \left\{ \frac{\delta(P_1)}{3}; \frac{\delta(P_2)}{3} \right\}$ ; тогда

$$\begin{aligned} \Phi(P_1) - \Phi(P_2) &= \frac{1}{\delta(P_1)} \int_{\delta(P_1)}^{2\delta(P_1)} M_{P_1}(R) dR - \frac{1}{\delta(P_2)} \int_{\delta(P_2)}^{2\delta(P_2)} M_{P_2}(R) dR \leq \\ &\leq \frac{1}{\delta(P_1)} \int_{\delta(P_1)}^{2\delta(P_1)} M_{P_1}(R) dR - \frac{1}{\delta(P_1) + h} \int_{\delta(P_1) + h}^{2\delta(P_1) - 2h} M_{P_1}(R - h) dR = \\ &= \frac{1}{\delta(P_1)} \int_{\delta(P_1)}^{2\delta(P_1) - 3h} M_{P_1}(R) dR + \frac{1}{\delta(P_1)} \int_{2\delta(P_1) - 3h}^{2\delta(P_1)} M_{P_1}(R) dR - \\ &- \frac{1}{\delta(P_1) + h} \int_{\delta(P_1)}^{2\delta(P_1) - 3h} M_{P_1}(y) dy = \frac{h}{\delta(P_1)[\delta(P_1) + h]} \int_{\delta(P_1)}^{2\delta(P_1) - 3h} M_{P_1}(R) dR + \\ &+ \frac{1}{\delta(P_1)} \int_{2\delta(P_1) - 3h}^{2\delta(P_1)} M_{P_1}(R) dR \leq \frac{h}{[\delta(P)]^2} \int_{\delta(P_1)}^{2\delta(P_1)} M_{P_1}(R) dR + \\ &+ \frac{1}{\delta(P_1)} \int_{2\delta(P_1) - 3h}^{2\delta(P_1)} M_{P_1}(R) dR \leq \frac{4hM}{\delta(P_1)}, \end{aligned}$$

где  $M = \max f \geq M_P(R)$ .

При достаточно малом  $h$  эта величина сколь угодно мала и, значит, при любом заданном  $\varepsilon > 0$  для достаточно малых  $h$  имеем  $\Phi(P_1) - \Phi(P_2) < \varepsilon$ . Но точки  $P_1$  и  $P_2$  равноправны, поэтому справедливо также неравенство  $\Phi(P_2) - \Phi(P_1) < \varepsilon$ . Отсюда следует непрерывность  $\Phi(P)$ , и лемма доказана.

Заметим, что случай, когда функция  $f$  принимает значения разных знаков, легко свести к предыдущему, рассматривая вместо  $f$  функцию  $f + c$ , где  $c$  — положительное достаточно большое постоянное число.

Понятие интеграла по замкнутому множеству нами, таким образом, обосновано. Мы доказали одновременно, что всякая неотрицательная функция  $f$ , непрерывная на ограниченном замкнутом множестве  $F$ , интегрируема на этом множестве.

В самом деле, если воспользоваться, на основании теоремы Вейерштрасса, ограниченностью функции  $f$ , то прямое применение леммы 3 устанавливает интегрируемость  $f$ . Для таких замкнутых множеств, как параллелепипеды или сеточные множества, наше определение интеграла, очевидно, полностью совпадает с обычным определением интеграла Римана для непрерывных функций.

Справедлива следующая

**Теорема 7.** Пусть  $F_1$  и  $F_2$  — ограниченные замкнутые множества и  $f$  — неотрицательная, непрерывная на каждом из них функция. Тогда

$$\int_{F_1} f dv + \int_{F_2} f dv = \int_{F_1 + F_2} f dv + \int_{F_1 F_2} f dv$$

Эта теорема легко сводится к теореме 4, если заключить  $F_1 + F_2$  в область  $\Omega$  и обозначить  $\Omega - F_1 = \Omega_1$ ,  $\Omega - F_2 = \Omega_2$ . Принимая во внимание, что

$$\Omega_1 + \Omega_2 = \Omega - F_1 F_2, \quad \Omega_1 \Omega_2 = \Omega - (F_1 + F_2),$$

получим:

$$\left. \begin{aligned} \int_{F_1} f dv &= \int_{\Omega} f dv - \int_{\Omega_1} f dv; & \int_{F_2} f dv &= \int_{\Omega} f dv - \int_{\Omega_2} f dv; \\ \int_{F_1 + F_2} f dv &= \int_{\Omega} f dv - \int_{\Omega_1 \cup \Omega_2} f dv; & \int_{F_1 F_2} f dv &= \int_{\Omega} f dv - \int_{\Omega_1 + \Omega_2} f dv. \end{aligned} \right\} \text{(VI.3)}$$

Из формул (VI.1) и (VI.3) и следует наша теорема.

**Т е о р е м а 8.** Пусть  $F_1 \supseteq F_2 \supseteq \dots \supseteq F_k \supseteq \dots$  — сужающаяся последовательность ограниченных замкнутых множеств. Обозначим через  $F_0$  их пересечение:  $F_0 = F_1 F_2 \dots F_k \dots$ . Пусть  $f$  — некоторая неотрицательная непрерывная функция на  $F_1$ . Тогда

$$\int_{F_0} f dv = \lim_{k \rightarrow \infty} \int_{F_k} f dv.$$

Доказательство этой теоремы сводится к теореме 5 из предыдущего параграфа, если продолжить  $f$  на открытое множество  $\Omega$ , содержащее  $F_1$ , и положить  $\Omega_k = \Omega - F_k$ . Тогда, полагая еще

$$\Omega_0 = \Omega_1 + \Omega_2 + \dots + \Omega_k + \dots,$$

мы будем иметь:

$$\Omega - \Omega_0 = F_0,$$

$$\int_{F_k} f dv = \int_{\Omega} f dv - \int_{\Omega_k} f dv \quad (k = 1, 2, \dots).$$

Пользуясь теоремой 5 из § 2 и переходя к пределу, докажем наше предположение.

**Т е о р е м а 9.** Если пересечение сужающейся последовательности открытых множеств  $\Omega_1 \supseteq \Omega_2 \supseteq \dots \supseteq \Omega_k \supseteq \dots$  есть замкнутое множество  $F$ :

$$F = \Omega_1 \Omega_2 \dots \Omega_k \dots,$$

и если  $f$  — некоторая неотрицательная непрерывная функция, интегрируемая на  $\Omega_1$ , то

$$\int_F f dv = \lim_{k \rightarrow \infty} \int_{\Omega_k} f dv.$$

В самом деле, пусть

$$\Omega'_k = \Omega_k - F,$$

тогда

$$\int_{F'} f dv = \int_{\Omega_k} f dv - \int_{\Omega'_k} f dv.$$

Переходя к пределу в обеих частях равенства и замечая, что

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_{\Omega_k} f dv = 0$$

в силу теоремы 6, ибо пересечение  $\Omega'_k$  пусто, получим  $\int_F f dv = \lim_{k \rightarrow \infty} \int_{\Omega_k} f dv$ ,

что и требовалось доказать.

Заметим, что любое замкнутое множество  $F$  всегда можно представить как пересечение вложенных друг в друга открытых множеств  $\Omega_k$ . В самом деле, за  $\Omega_k$  можно взять множество точек, расстояние которых до замкнутого множества  $F$  меньше, чем  $\varepsilon_k$ , где  $\varepsilon_k \rightarrow 0$  при  $k \rightarrow \infty$ . Очевидно, что пересечение таких множеств  $\Omega_k$  будет содержать только точки, расстояние которых до  $F$  равно нулю, и, следовательно, будет совпадать с замкнутым множеством  $F$ .

**Т е о р е м а 10.** Пусть  $F_1 \subseteq F_2 \subseteq \dots \subseteq F_k \subseteq \dots$  — расширяющаяся последовательность замкнутых множеств и пусть сумма их  $E$  ограничена и является замкнутым или открытым множеством. Пусть  $f$  — неотрицательная функция, непрерывная на всех  $F_k$  и  $E$ , интегрируемая на  $E$ <sup>1)</sup>. Тогда

$$\int_E f dv = \lim_{k \rightarrow \infty} \int_{F_k} f dv.$$

Теорема сводится к предыдущей в случае открытого множества  $E = \Omega$ , если перейти к рассмотрению открытых множеств  $\Omega_k = \Omega - F_k$ , и к теореме 6, если множество  $E = F$  замкнуто.

Рассмотрим теперь частный случай  $f = 1$ .

Будем называть интегралы

$$\int_{\Omega} dv \quad \text{и} \quad \int_F dv$$

соответственно *лебеговой мерой* открытого множества  $\Omega$  или замкнутого множества  $F$ . Меру открытого множества  $\Omega$  или замкнутого множества  $F$  мы будем обозначать соответственно

$$m\Omega \quad \text{или} \quad mF.$$

Все доказанные выше теоремы об интегралах, будучи применены к случаю  $f = 1$ , сразу дают апалогичные теоремы о мере открытых или замкнутых множеств. Мера является естественным обобщением объема. К свойствам меры мы еще вернемся.

Для применений важное значение имеет следующая

**Т е о р е м а 11.** (О среднем значении.) Пусть  $E$  — открытое или ограниченное замкнутое множество, на котором функция  $f$  непрерывна. В случае, когда  $E$  — открытое множество, будем еще предполагать, что  $E$  имеет конечную меру и  $f$  на  $E$  интегрируема. Пусть всюду на  $E$  выполнены неравенства

$$M_1 \leq f \leq M_2,$$

где  $M_1, M_2$  — постоянные. Тогда

$$M_1 mE \leq \int_E f dv \leq M_2 mE.$$

Доказательство этой теоремы совершенно очевидно: оно получается из того, что

$$\int_E (f - M_1) dv \geq 0, \quad \int_E (M_2 - f) dv \geq 0$$

<sup>1)</sup> Требование интегрируемости функции  $f$  не является дополнительным ограничением, если  $E$  — замкнутое множество.

## § 4. Суммируемые функции

Переходим к рассмотрению общей теории интеграла Лебега.

Пусть  $f$  — произвольная неотрицательная функция, заданная в ограниченном открытом множестве  $\Omega$ . Рассмотрим все замкнутые множества  $F$ , на которых  $f$  непрерывна, и определим верхнюю грань интегралов от  $f$ , взятых по множествам  $F$ :

$$\sup_F \int_F f \, dv.$$

Будем называть эту верхнюю грань, если она существует и конечна, *внутренним интегралом по множеству  $\Omega$  от функции  $f$*  и обозначать

$$(\text{вн}) \int_{\Omega} f \, (dv).$$

Понятие внутреннего интеграла приобретает особое значение в тех случаях, когда функция  $f$  *измерима*.

Функция  $f$ , заданная в некотором ограниченном открытом множестве  $\Omega$ , называется *измеримой на множестве  $\Omega$* , если существуют замкнутые множества  $F_\delta$  с мерой, сколь угодно близкой к мере  $\Omega$ , на которых  $f$  непрерывна:  $m\Omega - mF_\delta \leq \delta$ , где  $\delta$  — любое положительное число.

Если неотрицательная измеримая функция  $f$  в открытом множестве  $\Omega$  имеет внутренний интеграл, то она называется *интегрируемой*, или *суммируемой*, в смысле Лебега по области  $\Omega$ , а внутренний интеграл от нее называют просто *интегралом* или *интегралом Лебега*. В этом случае мы будем пользоваться обычным обозначением интеграла.

**З а м е ч а н и е.** Если функция  $f$  измерима на ограниченном открытом множестве  $\Omega$ , то она измерима и на всяком открытом множестве  $\Omega'$ , целиком содержащемся в  $\Omega$ .

Для доказательства достаточно взять за множества  $F'_\delta$  пересечения множества  $F_\delta$  с внутренним сеточным множеством  $\Phi'_\delta$ , принадлежащим исчерпывающей системе для  $\Omega'$ .

**С л е д с т в и е.** Если функция  $f$  суммируема по ограниченному открытому множеству  $\Omega$ , то она суммируема и по открытому его подмножеству  $\Omega'$ .

**З а м е ч а н и е.** Легко доказать, что сумма и произведение двух измеримых функций измеримы.

Как мы докажем далее, интеграл Лебега обладает рядом весьма важных свойств, чрезвычайно упрощающих пользование им. Следующий простой пример показывает, что для неизмеримых функций внутренний интеграл даже тогда, когда он существует, не обладает важнейшими свойствами обычного интеграла.

Рассмотрим функцию  $f$ , положительную в открытом множестве  $\Omega$  и имеющую там внутренний интеграл, но не измеримую. (Можно доказать, что такие функции существуют.)

Ввиду неизмеримости функции  $f$  замкнутые множества, где  $f$  непрерывна, имеют меру, существенно меньшую, чем  $m\Omega$ , т. е.  $\sup_F \int_F f \, dv = a < m\Omega$ .

Очевидно, замкнутые множества непрерывности для  $f$  и  $f + 1$  будут одни и те же. Для любого из них имеем:

$$\int_F (f + 1) \, dv = \int_F f \, dv + mF$$

(см. Замечание 3 на стр. 87).

Отсюда

$$\int_F (f+1) dv = \int_F f dv + mF \leq \sup_{F_1} \int_{F_1} f dv + a$$

$$(\text{вн}) \int_{\Omega} (f+1) dv \leq (\text{вн}) \int_{\Omega} f dv + a.$$

Следовательно,

$$(\text{вн}) \int_{\Omega} (f+1) dv \neq (\text{вн}) \int_{\Omega} f dv + (\text{вн}) \int_{\Omega} 1 dv,$$

так как  $(\text{вн}) \int_{\Omega} 1 dv = m\Omega > a$ .

Последнее неравенство означает, что для внутреннего интеграла от неизмеримых функций не выполнено, вообще говоря, свойство аддитивности.

**Л е м м а 4.** Пусть  $f$  — измеримая неотрицательная функция в ограниченном открытом множестве  $\Omega$  и пусть  $F_\varepsilon$  — некоторая система замкнутых множеств, на которых  $f$  непрерывна, таких, что

$$m\Omega - mF_\varepsilon < \varepsilon.$$

Если существует конечный предел

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{F_\varepsilon} f dv,$$

то функция  $f$  суммируема, и этот предел равен  $\int_{\Omega} f dv$ .

Если хотя бы одно из этих утверждений оказалось неверным, то имело бы место неравенство

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{F_\varepsilon} f dv < \sup_F \int_F f dv,$$

так как, по определению, либо  $\sup_F \int_F f dv = \infty$ , либо  $\sup_F \int_F f dv = \int_{\Omega} f dv$ .

Мы могли бы, следовательно, указать такое замкнутое множество  $F_0$ , чтобы при любом  $\varepsilon > 0$  имело место неравенство

$$\int_{F_0} f dv - \int_{F_\varepsilon} f dv \geq \eta > 0,$$

причем  $f$  непрерывна на  $F_0$ , а  $\eta$  не зависит от  $\varepsilon$ . Положим  $F'_\varepsilon = F \setminus F_\varepsilon$ . Усиливая предыдущее неравенство, получим:

$$\int_{F'_0} f dv - \int_{F'_\varepsilon} f dv \geq \eta > 0.$$

Функция  $f$  на  $F_0$  ограничена. Пусть  $f \leq M$ . При этом

$$\int_{F_0} f dv - \int_{F'_\varepsilon} f dv = \left\{ \int_{F_0} (f - M) dv - \int_{F'_\varepsilon} (f - M) dv \right\} + M(mF_0 - mF'_\varepsilon).$$

Но выражение в фигурных скобках, очевидно, неположительно и, следовательно,

$$mF_0 - mF'_\varepsilon \geq \frac{\eta}{M}.$$

Но в силу теоремы 7

$$mF_0 - mF'_\varepsilon = m(F_0 + F_\varepsilon) - mF_\varepsilon < \varepsilon,$$

и мы получаем:

$$\frac{\eta}{M} < \varepsilon.$$

Следовательно, наше предположение неправильно. Лемма доказана.

**С л е д с т в и е.** Пусть в ограниченном открытом множестве  $\Omega$  задана расширяющаяся система замкнутых множеств

$$F_1 \subseteq F_2 \subseteq \dots \subseteq F_k \subseteq \dots,$$

причем  $mF_k > m\Omega - \delta_k$ , где  $\delta_k \rightarrow 0$  при  $k \rightarrow \infty$ . Пусть  $f$  — неотрицательная измеримая функция, непрерывная на всех  $F_k$ . Если интегралы

$$\int_{F_k} f dv$$

ограничены одним и тем же числом  $A$ , то функция  $f$  суммируема в  $\Omega$  и интеграл от нее выражается формулой

$$\int_{\Omega} f dv = \lim_{k \rightarrow \infty} \int_{F_k} f dv.$$

Это следствие непосредственно вытекает из леммы, если принять во внимание, что неубывающая ограниченная последовательность величин

$$\int_{F_k} f dv$$

имеет предел.

**Т е о р е м а 12.** Пусть  $f$  суммируема и неотрицательна в ограниченном открытом множестве  $\Omega$ . Тогда для всякого  $\varepsilon > 0$  существует такое  $\delta(\varepsilon)$ , что коль скоро  $\Omega_\delta \subseteq \Omega$  и  $m\Omega_\delta < \delta$ , имеет место неравенство

$$\int_{\Omega_\delta} f dv \leq \varepsilon.$$

Предположим обратное. Тогда найдутся такое число  $\varepsilon_0 > 0$  и открытые множества  $\Omega_\delta$  со сколь угодно малой мерой

$$m\Omega_\delta < \delta,$$

для которых

$$\int_{\Omega_\delta} f dv \geq \varepsilon_0. \quad (VI.4)$$

С помощью открытых множеств  $\Omega_\delta$  можно построить сужающуюся последовательность открытых множеств  $\Omega_k$ , для которых  $m\Omega_k < \delta_k$ ,  $\delta_k \rightarrow 0$  при  $k \rightarrow \infty$  и выполнено неравенство (VI.4). Для этого достаточно, например, выбрать из  $\Omega_\delta$  какую-то последовательность множеств  $\Omega'_s$  так, чтобы  $m\Omega'_s < \frac{1}{2s+1}$ , и положить  $\Omega_k = \sum_{s=k}^{\infty} \Omega'_s$ . По следствию теоремы 5 получим

$m\Omega_k < \frac{1}{2k}$ , так что можно считать  $\delta_k = \frac{1}{2k}$ . Пусть  $F_k$  — расширяющаяся система исчерпывающих<sup>1)</sup> множеств для  $f$  в  $\Omega$ , причем  $m(\Omega - F_k) < \delta_k$ . Тогда замкнутые множества  $F_k^* = F_k - \Omega_k$  обладают тем свойством, что

$$mF_k^* \geq m\Omega - 2\delta_k.$$

Это следует из того, что

$$\Omega - F_k^* \subseteq (\Omega - F_k) + \Omega_k$$

и, значит,

$$m(\Omega - F_k^*) \leq m(\Omega - F_k) + m\Omega_k \leq 2\delta_k.$$

На основании следствия из леммы 4

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_{F_k^*} f dv = \int_{\Omega} f dv.$$

При этом для достаточно большого  $k$

$$\int_{F_k^*} f dv > \int_{\Omega} f dv - \frac{\varepsilon_0}{3}.$$

С другой стороны, внутри множества  $\Omega_k$  можно найти такое замкнутое множество  $F_k^{**}$ , на котором  $f$  непрерывна и для которого

$$\int_{F_k^{**}} f dv > \frac{2\varepsilon_0}{3}.$$

По построению  $F_k^*$  не имеет общих точек с  $F_k^{**}$ . Тогда функция  $f$  непрерывна на замкнутом множестве  $F_k^* + F_k^{**}$ , причем

$$\int_{F_k^* + F_k^{**}} f dv > \int_{\Omega} f dv + \frac{\varepsilon_0}{3}.$$

Это, однако, невозможно, так как  $\int_{\Omega} f dv = \sup_F \int_F f dv$ . Полученное противоречие доказывает теорему.

Доказанное нами свойство, имеющее основное значение, называют *абсолютной непрерывностью интеграла Лебега*. Оно полностью характеризует зависимость интеграла Лебега от множества, по которому происходит интегрирование. Впоследствии мы неоднократно будем пользоваться этим свойством.

<sup>1)</sup> Систему замкнутых множеств  $F_\delta$ , лежащих в  $\Omega$ , будем называть *исчерпывающей для  $f$  в  $\Omega$* , если функция  $f$  непрерывна на каждом  $F_\delta$  и если для всякого  $\delta > 0$  найдется такое  $F_\delta$ , что  $m(\Omega - F_\delta) < \delta$ . Термин «исчерпывающая (интеграл)» оправдан доказываемой теоремой.

Займемся теперь более подробным выяснением зависимости интеграла Лебега от подинтегральной функции.

**Л е м м а 5.** Если функция  $f_2$  измерима и неотрицательна, а  $f_1$  суммируема, причем

$$f_2 \leq f_1,$$

то и функция  $f_2$  также суммируема и, кроме того, имеет место неравенство

$$\int_{\Omega} f_2 dv \leq \int_{\Omega} f_1 dv.$$

В самом деле, рассмотрим расширяющуюся систему замкнутых множеств  $F_{\varepsilon}^{(1)}$ , на которых непрерывна функция  $f_1$  и мера которых удовлетворяет неравенствам

$$mF_{\varepsilon}^{(1)} \geq m\Omega - \varepsilon,$$

а также аналогичную систему  $F_{\varepsilon}^{(2)}$  для функции  $f_2$ . Мера множеств  $F_{\varepsilon}^{(3)} = F_{\varepsilon}^{(1)} \cap F_{\varepsilon}^{(2)}$ , как вытекает из теоремы 7, будет стремиться к  $m\Omega$ :

$$mF_{\varepsilon}^{(3)} \geq m\Omega - 2\varepsilon.$$

Мы имеем

$$\int_{F_{\varepsilon}^{(3)}} f_2 dv \leq \int_{F_{\varepsilon}^{(3)}} f_1 dv \leq \int_{\Omega} f_1 dv.$$

Последовательность

$$\int_{F_{\varepsilon}^{(3)}} f_2 dv$$

не убывает, ограничена и, следовательно, имеет предел. На основании леммы 4 функция  $f_2$  суммируема. Переходя к пределу, убеждаемся в справедливости написанного выше неравенства для интегралов от  $f_1$  и  $f_2$ .

**Т е о р е м а 13.** Если  $f_1$  и  $f_2$  неотрицательны и суммируемы в  $\Omega$ , то и их сумма  $f_1 + f_2$  суммируема, причем

$$\int_{\Omega} (f_1 + f_2) dv = \int_{\Omega} f_1 dv + \int_{\Omega} f_2 dv. \quad (*)$$

Построим  $F_{\varepsilon}^{(1)}$ ,  $F_{\varepsilon}^{(2)}$  и  $F_{\varepsilon}^{(3)}$  так же, как в предыдущей лемме. Функция  $f_1 + f_2$  будет, очевидно, непрерывна на  $F_{\varepsilon}^{(3)}$  и, кроме того,

$$\int_{F_{\varepsilon}^{(3)}} (f_1 + f_2) dv = \int_{F_{\varepsilon}^{(3)}} f_1 dv + \int_{F_{\varepsilon}^{(3)}} f_2 dv. \quad (\text{VI.5})$$

Правая часть имеет пределом  $\int_{\Omega} f_1 dv + \int_{\Omega} f_2 dv$ . Следовательно, левая часть имеет предел.

Применяя лемму 4, убеждаемся в интегрируемости  $f_1 + f_2$  и справедливости формулы (\*).

До сих пор мы рассматривали лишь интегралы от неотрицательных функций, непрерывных по открытым и замкнутым множествам, а также измеримых по ограниченным открытым множествам. Перейдем теперь к ин-

тегрированию знакопеременных функций. Пусть  $f$  — функция, могущая принимать как положительные, так и отрицательные значения. Положим

$$f^+ = \frac{1}{2} [|f| + f],$$

$$f^- = \frac{1}{2} [|f| - f].$$

Функции  $f^+$  и  $f^-$  называются соответственно *положительной и отрицательной частями функции  $f$* . Функция  $f^+$  совпадает с функцией  $f$  в тех точках, где  $f$  положительна или нуль, и равна нулю там, где  $f$  отрицательна. Напротив,  $f^-$  равна нулю в тех точках, где  $f$  положительна, и равна  $-f$  в точках, где  $f$  отрицательна или нуль. Очевидно,

$$f = f^+ - f^-.$$

Если функция  $f$  непрерывна на замкнутом множестве  $F$ , то обе функции  $f^+$  и  $f^-$  также будут непрерывны на этом множестве. В самом деле, если точка  $P$  принадлежит  $F$  и в ней  $f$  положительна, то  $f$  будет положительна во всех точках множества  $F$ , достаточно близких к  $P$ . При этом в окрестности точки  $P$  функция  $f^+$  будет совпадать с  $f$  и, следовательно, будет непрерывна. Точно так же доказывается непрерывность  $f^-$  в точках, где  $f$  отрицательна. В точках, где  $f = 0$ , обе функции  $f^+$  и  $f^-$  также будут непрерывны, так как, например, значения  $f^+$  при стремлении точек  $P_h$  к  $P$  по  $F$  будут либо совпадать со значениями  $f$  в этих же точках, либо будут равны нулю, но, во всяком случае, будут стремиться к предельному значению, равному нулю. Отсюда следует

**З а м е ч а н и е.** Если функция  $f$  измерима в открытом множестве  $\Omega$ , то обе функции  $f^+$ ,  $f^-$  также измеримы в  $\Omega$ .

Интеграл от функции  $f$  по открытому или замкнутому множеству  $E$  мы определим формулой

$$\int_E f dv = \int_E f^+ dv - \int_E f^- dv.$$

Функция  $f$  называется *суммируемой*, если суммируемы  $f^+$  и  $f^-$ . Из этого определения следует

**Т е о р е м а 14.** Если функция  $f$  суммируема в ограниченном открытом множестве  $\Omega$ , то какова бы ни была система ограниченных замкнутых множеств  $F_\delta$ , на которых  $f$  непрерывна и таких, что

$$mF_\delta > m\Omega - \delta, \quad \delta \rightarrow 0,$$

имеет место равенство

$$\int_\Omega f dv = \lim_{\delta \rightarrow 0} \int_{F_\delta} f dv.$$

Для доказательства достаточно заметить, что

$$\int_{F_\delta} f dv = \int_{F_\delta} f^+ dv - \int_{F_\delta} f^- dv,$$

и перейти к пределу.

Докажем теперь еще одну лемму.

**Л е м м а 6.** Пусть функция  $f$ , измеримая в открытом множестве  $\Omega$ , представлена двумя различными способами в виде разности неотрицательных

суммируемых функций:

$$f = f_1 - f_2 \quad \text{и} \quad f = f_3 - f_4.$$

Тогда имеет место равенство

$$\int_{\Omega} f_1 dv - \int_{\Omega} f_2 dv = \int_{\Omega} f_3 dv - \int_{\Omega} f_4 dv.$$

В самом деле, равенство, которое требуется доказать, равносильно соотношению

$$\int_{\Omega} f_1 dv + \int_{\Omega} f_4 dv = \int_{\Omega} f_2 dv + \int_{\Omega} f_3 dv,$$

которое немедленно следует из теоремы 13, если принять во внимание, что

$$f_1 + f_4 = f_2 + f_3.$$

Лемма доказана. Из этой леммы следует, между прочим, что, каким бы способом мы ни представили  $f$  в виде разности двух неотрицательных суммируемых функций, имеет место равенство

$$\int_{\Omega} f_1 dv - \int_{\Omega} f_2 dv = \int_{\Omega} f^+ dv - \int_{\Omega} f^- dv.$$

Для измеримой функции суммируемость и существование интеграла от абсолютной величины функции равносильны.

Действительно, если существует интеграл от  $|f| = f^+ + f^-$ , то по лемме 5 будут суммируемы каждая из функций  $f^+$  и  $f^-$ . Обратно, если суммируемы  $f^+$  и  $f^-$ , то по теореме 13 суммируема и функция  $|f|$ .

**З а м е ч а н и е.** Пусть  $c$  — произвольная постоянная,  $f$  — суммируемая в открытом множестве  $\Omega$  функция. Тогда

$$\int_{\Omega} cf dv = c \int_{\Omega} f dv.$$

Справедливость этого замечания почти очевидна. Чтобы убедиться в этом, надо воспользоваться аналогичным свойством интегралов от знакопостоянных функций.

Из предыдущего замечания вытекает следующее важное общее свойство интеграла Лебега.

Пусть  $f_1, f_2, \dots, f_k$  — суммируемые функции, а  $a_1, a_2, \dots, a_k$  — произвольные постоянные. Тогда

$$\int_{\Omega} (a_1 f_1 + a_2 f_2 + \dots + a_k f_k) dv = a_1 \int_{\Omega} f_1 dv + a_2 \int_{\Omega} f_2 dv + \dots + a_k \int_{\Omega} f_k dv.$$

Эта формула доказывается полной индукцией.

Отметим еще одно свойство интеграла Лебега.

**Т е о р е м а 15.** Пусть функция  $f$  суммируема, а функция  $\varphi$  измерима и ограничена, причем

$$|\varphi| \leq M.$$

Тогда произведение  $f\varphi$  будет суммируемо и

$$\left| \int_{\Omega} f\varphi dv \right| \leq M \int_{\Omega} |f| dv.$$

В самом деле,  $|f\varphi| \leq M|f|$ . Функция  $M|f|$  суммируема, значит, и  $|f\varphi|$  суммируема, причем

$$\left| \int_{\Omega} f\varphi \, dv \right| \leq \int_{\Omega} |f\varphi| \, dv \leq M \int_{\Omega} |f| \, dv.$$

## § 5. Неопределенный интеграл от функции одной переменной. Примеры

Если  $f(x)$  — суммируемая функция в промежутке  $0 < x < 1$ , то она, очевидно, будет суммируема и в любом промежутке  $0 < x < y$ , где  $y \leq 1$ . Интеграл

$$F(y) = \int_0^y f(x) \, dx$$

называется *неопределенным интегралом*.

По самому определению меры изолированная точка имеет меру нуль. Поэтому интеграл по открытому промежутку  $0 < x < y$  равен интегралу, взятому по любому из следующих полуоткрытых и замкнутых промежутков:

$$0 \leq x < y, \quad 0 < x \leq y, \quad 0 \leq x \leq y.$$

Это оправдывает обозначение

$$\int_0^y f(x) \, dx$$

и позволяет утверждать справедливость равенства

$$\int_a^b f(x) \, dx + \int_b^c f(x) \, dx = \int_a^c f(x) \, dx$$

для любой суммируемой функции  $f(x)$ .

Докажем теорему.

**Теорема 16.** Производная от неопределенного интеграла равна подинтегральной функции во всех точках непрерывности этой функции.

В самом деле,

$$\frac{F(y+h) - F(y)}{h} = \frac{1}{h} \int_y^{y+h} f(x) \, dx.$$

Обозначим через  $m_h$  и  $M_h$  соответственно нижнюю и верхнюю грани функции  $f(x)$  в промежутке  $y \leq x \leq y+h$  при  $h > 0$  и в промежутке  $y+h \leq x \leq y$  при  $h < 0$ .

Тогда

$$m_h \leq \frac{F(y+h) - F(y)}{h} \leq M_h$$

и, следовательно,

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{F(y+h) - F(y)}{h} = f(y),$$

что и требовалось доказать.

Измеримая функция может не быть суммируемой.

Рассмотрим некоторые примеры.

**Пример 8.** Функция  $f = \frac{1}{R^{n-\alpha}}$ , где  $R = \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2}$  измерима в шаре  $R < 1$ . В самом деле, если исключить из этого шара внутренность малого шарика,  $R \leq \varepsilon$ , то в оставшейся части  $f$  будет непрерывна. Эта функция будет суммируема в случае  $\alpha > 0$ . Для того, чтобы доказать это, заметим, что

$$\int_{\frac{1}{2^h} \leq R \leq 1} \dots \int \frac{dx_1 \dots dx_n}{R^{n-\alpha}} = \sum_{m=0}^{h-1} \psi_m,$$

где

$$\psi_m = \int_{\frac{1}{2^{m+1}} \leq R \leq \frac{1}{2^m}} \dots \int \frac{dx_1 \dots dx_n}{R^{n-\alpha}}.$$

Сделаем в  $\psi_m$  замену переменных  $x_i = \frac{\xi_i}{2^m}$  ( $i = 1, \dots, n$ ). При этом

$$\psi_m = \frac{1}{2^{m\alpha}} \int_{\frac{1}{2} \leq \rho \leq 1} \dots \int \frac{d\xi_1 \dots d\xi_n}{\left[ \sqrt{\sum_{i=1}^n \xi_i^2} \right]^{n-\alpha}} = \frac{1}{2^{m\alpha}} \psi_0,$$

где

$$\rho = \sqrt{\sum_{i=1}^n \xi_i^2},$$

откуда

$$\sum_{m=0}^{h-1} \psi_m \leq \sum_{m=0}^{\infty} \frac{1}{2^{m\alpha}} \psi_0 = \psi_0 \frac{2^\alpha}{2^\alpha - 1},$$

что и требовалось доказать.

**Пример 9.** Функция  $f = \frac{1}{r^{n-\alpha}}$ , где  $r = \sqrt{(x_1 - y_1)^2 + \dots + (x_n - y_n)^2}$ , измерима в  $2n$ -мерной области  $0 < x_i < 1$ ;  $0 < y_i < 1$  ( $i = 1, \dots, n$ ). Она будет суммируемой при  $\alpha > 1$ .

В самом деле, если исключить из этого куба множество  $r \leq \varepsilon$ , то  $f$  в оставшейся части будет непрерывна. Объем исключенной области, как легко видеть, есть малая величина порядка  $\varepsilon^n$ . Суммируемость  $f$  при  $\alpha > 1$  устанавливается, как в примере 8.

**Пример 10.** Функция  $f$  в кубе  $v_0$ ,  $-1 < x_i < 1$  ( $i = 1, \dots, n$ ), принимающая значение единица в точках, все координаты которых рациональны, и нуль во всех остальных, суммируема.

Все рациональные точки могут быть перенумерованы числами натурального ряда.

Действительно, пусть координаты какой-либо положительной рациональной точки выражаются дробями

$$\frac{p_1}{q_1}, \frac{p_2}{q_2}, \dots, \frac{p_n}{q_n}.$$

Выпишем подряд  $2n$  целых чисел  $p_1, p_2, \dots, p_n, q_1, q_2, \dots, q_n$ . Каждой рациональной точке отвечает много таких комбинаций целых чисел, так как

одно и то же рациональное число можно представить в виде различных сократимых дробей. Однако каждой комбинации  $2n$  целых чисел отвечает только одна вполне определенная рациональная точка. Все такие комбинации можно перенумеровать подряд при помощи последовательности нечетных чисел. Для этого выпишем сначала целочисленные комбинации, сумма элементов которых равна нулю (их, очевидно, будет конечное число), затем единице, двум и так далее. Таким образом, все положительные рациональные точки будут занумерованы, причем каждой из них будет отвечать бесчисленное множество различных номеров. Для того чтобы сделать нумерацию взаимно однозначной, надо при последовательной нумерации точек выбрасывать уже занумерованные. Что касается отрицательных рациональных точек, то мы их включим в нумерацию при помощи последовательности четных чисел.

Каждую из рациональных точек

$$P_1, P_2, \dots, P_k, \dots$$

можно заключить внутри некоторого шара  $\Omega_k$  с центром в данной точке так, что  $m\Omega_k \leq \frac{1}{2^{k+1}}$ .

Сумма  $\Omega_0^{(j)} = \Omega_1 + \dots + \Omega_k + \dots$  будет открытым множеством с мерой  $\leq \frac{1}{2^j}$  и поэтому сколь угодно малой. Исключим из куба  $v_0$  те точки, которые отстоят от границы менее чем на  $\frac{1}{t}$ . Обозначим оставшееся замкнутое множество через  $v_t$ . Замкнутое множество  $F_t = v_t - \Omega_0^{(j)}$  имеет меру, сколь угодно близкую к мере  $v_0$ . На нем  $f$  непрерывна и равна нулю. Следовательно,

$$\int_{-1 < x_i < 1} \dots \int f \, dv = 0.$$

Нам часто придется рассматривать функции, заданные в неограниченной области  $\Omega$ .

Рассмотрим систему шаров  $R < N$ , и пусть  $\Omega_N$  обозначает часть открытого множества  $\Omega$ , лежащую внутри этого шара. Неотрицательную функцию  $f$  мы будем называть *измеримой в  $\Omega$* , если она измерима в любом  $\Omega_N$ , и *суммируемой в  $\Omega$* , если интегралы

$$\int_{\Omega_N} f \, dv$$

ограничены в совокупности. Тогда по определению

$$\int_{\Omega} f \, dv = \lim_{N \rightarrow \infty} \int_{\Omega_N} f \, dv.$$

Интегралы от знакопеременных функций определены на стр. 101. Для таких интегралов справедливы все обычные свойства, которые мы перечислим:

1.  $\int_{\Omega} (f_1 + f_2) \, dv = \int_{\Omega} f_1 \, dv + \int_{\Omega} f_2 \, dv;$
2.  $\int_{\Omega} a f \, dv = a \int_{\Omega} f \, dv;$
3.  $\left| \int_{\Omega} \varphi f \, dv \right| \leq \max |\varphi| \int_{\Omega} |f| \, dv,$

причем из существования правых частей этих соотношений вытекает и существование левых частей. Доказательство этих свойств получается очевидным образом путем предельного перехода.

**Пример 11.** Пусть  $f = \frac{1}{R^{n+\alpha}}$ ,  $R = \sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2}$  в области  $R > 1$ . Функция  $f$ , очевидно, измерима в  $\Omega$ . Она будет суммируемой в  $\Omega$  при  $\alpha > 0$ . В самом деле,

$$\int_{R>1} \dots \int \frac{dx_1 \dots dx_n}{R^{n+\alpha}} = \sum_{m=0}^{\infty} \psi_m,$$

где

$$\psi_m = \int_{2^m < R < 2^{m+1}} \frac{dx_1 \dots dx_n}{R^{n+\alpha}}.$$

Положим

$$x_i = 2^m \xi_i \quad (i = 1, \dots, n) \quad \text{и} \quad \rho = \sqrt{\sum_{i=1}^n \xi_i^2};$$

тогда

$$\psi_m = \frac{1}{2^{m\alpha}} \int_{1 < \rho < 2} \frac{d\xi_1 \dots d\xi_n}{\rho^{n+\alpha}} = \frac{1}{2^{m\alpha}} \psi_0,$$

или

$$\sum_{m=0}^{\infty} \psi_m = \frac{2^\alpha}{2^\alpha - 1} \psi_0,$$

что и требовалось доказать.

Из примеров 8 и 11 следует, между прочим, что интегралы

$$\int_{R < \delta} \dots \int \frac{dx_1 \dots dx_n}{R^{n-\alpha}} \quad \text{и} \quad \int_{R > \frac{1}{\delta}} \dots \int \frac{dx_1 \dots dx_n}{R^{n+\alpha}}$$

стремятся к нулю при  $\delta \rightarrow 0$ .

## § 6. Измеримые множества. Теорема Егорова

Имея в виду дальнейшее изучение свойств суммируемых функций, введем теперь понятие измеримого множества. Пусть  $\Omega$  — ограниченное открытое множество, а  $E$  — какое-нибудь заключенное в нем точечное множество. Построим *характеристическую функцию*  $\xi_E(P)$  для множества  $E$ , т. е. функцию, равную единице в точках  $E$  и нулю вне  $E$ .

Если функция  $\xi_E(P)$  измерима (и, следовательно, суммируема ввиду ограниченности  $\xi_E(P)$  и  $\Omega$ ), то множество  $E$  называется *измеримым*, а интеграл

$$\int_{\Omega} \xi_E(P) dv$$

называется *мерой*  $E$  и обозначается  $mE$ .

Нетрудно проверить, что в случаях, когда  $E$  — открытое или замкнутое множество, новое определение меры совпадает с ранее данным (см. стр. 95), ибо  $mE$  в этих случаях строится точно так же, как и раньше.

Если множество  $E$  измеримо, то и множество  $\Omega - E$  измеримо. В самом деле, если измерима функция  $\xi_E(P)$ , то будет измеримой и функция  $1 - \xi_E(P) = \xi_{\Omega - E}(P)$ . При этом

$$m(\Omega - E) = \int_{\Omega} [1 - \xi_E(P)] dv = m\Omega - mE.$$

Для любых двух измеримых множеств справедлива формула

$$\xi_{E_1}(P) + \xi_{E_2}(P) = \xi_{E_1 + E_2}(P) + \xi_{E_1 E_2}(P). \quad (\text{VI.6})$$

Далее,  $\xi_{E_1 E_2} = \xi_{E_1} \xi_{E_2}$ . Очевидно,  $\xi_{E_1 E_2}(P)$  измерима и, следовательно, измерима  $\xi_{E_1 + E_2}$ . Мы видим, что сумма и пересечение двух измеримых множеств всегда измеримы.

**Теорема 17.** Для того чтобы множество  $E$ , лежащее в открытом множестве  $\Omega$ , было измеримым, необходимо и достаточно, чтобы существовала последовательность замкнутых множеств  $F_k$ , заключенных в  $E$ , и открытых множеств  $\Omega_k$ , содержащих  $E$ , таких, что

$$m(\Omega_k - F_k) \rightarrow 0 \text{ при } k \rightarrow \infty.$$

**Доказательство.** Предположим, что функция  $\xi_E(P)$  измерима. Тогда можно указать замкнутые множества  $E_k$  с мерой, сколь угодно близкой к  $m\Omega$ , на которых  $\xi_E(P)$  непрерывна. Каждое такое множество  $F_k$  распадается на два подмножества без общих точек:

$$F_k = F_k^{(1)} + F_k^{(2)},$$

где  $F_k^{(1)} = F_k E$ ,  $F_k^{(2)} = F_k - E$ . На  $F_k^{(1)}$  функция  $\xi_E(P)$  равна 1, а на  $F_k^{(2)}$  она равна нулю.

Каждое из множеств, как легко видеть, будет замкнутым. В самом деле, предельная точка для последовательности точек  $P_n$  из  $F_k^{(1)}$  есть точка множества  $F_k$  и, следовательно, принадлежит одному из множеств  $F_k^{(1)}$  или  $F_k^{(2)}$ . Однако она не может принадлежать  $F_k^{(2)}$ , так как в этой точке функция  $\xi_E(P)$  была бы разрывна на  $F_k$ , что противоречит выбору  $F_k$ . Таким же образом доказывается замкнутость  $F_k^{(2)}$ .

Мы имеем по условию

$$mF_k = mF_k^{(1)} + mF_k^{(2)} > m\Omega - \delta_k,$$

где  $\delta_k \rightarrow 0$ . Отсюда

$$mF_k^{(1)} + m\Omega - m(\Omega - F_k^{(2)}) > m\Omega - \delta_k$$

или

$$m(\Omega - F_k^{(2)}) - mF_k^{(1)} < \delta_k.$$

Множества  $F_k^{(1)}$  и  $(\Omega - F_k^{(2)})$  и суть те множества, существование которых утверждает теорема.

Обратно, пусть существуют множества  $F_k$  и  $\Omega_k$ , обладающие указанным в теореме свойством. Мы можем всегда заменить множества  $\Omega_k$  на

множества  $\Omega_k^{**}$  такие, что множества  $\Omega - \Omega_k^{**}$  будут замкнутыми. Для этого присоединим к множеству  $\Omega_k$  множество  $\frac{\Omega_k^*}{k}$ , состоящее из тех точек множества  $\Omega$ , расстояние которых от границы  $C$  множества  $\Omega$  меньше  $\frac{1}{k}$ . Очевидно,  $m\frac{\Omega_k^*}{k} \rightarrow 0$  при  $k \rightarrow \infty$  и поэтому, если положить  $\Omega_k^{**} = \Omega_k + \frac{\Omega_k^*}{k}$ , то разность  $m\Omega_k^{**} - mF_k$  будет попрежнему сколь угодно мала при достаточно большом  $k$ . Множество  $\Omega - \Omega_k^{**}$  будет замкнутым как разность между замкнутым множеством  $\Omega_k$  и открытым множеством  $\Omega_k + \frac{\Omega_k^*}{k}$ .

Легко убеждаемся, что функция  $\xi_E(P)$  непрерывна на  $F_k$  и на  $\Omega - \Omega_k^{**}$ . Следовательно, она непрерывна на множестве  $F_k + (\Omega - \Omega_k^{**})$ , так как функция, непрерывная на двух замкнутых множествах, непрерывна на сумме этих множеств. Оценим меру этого множества, обозначив его  $\Phi_k$ . Очевидно,

$$\Phi_k \equiv F_k + (\Omega - \Omega_k^{**}) = \Omega - (\Omega_k^{**} - F_k).$$

Далее,

$$m\Omega = m[\Phi_k + \Omega_k^{**} - F_k] \leq m\Phi_k + m(\Omega_k^{**} - F_k).$$

Следовательно,

$$m\Phi_k \geq m\Omega - \delta_k, \text{ где } \delta_k \rightarrow 0 \text{ при } k \rightarrow \infty.$$

Таким образом,  $\xi_E(P)$  непрерывна на замкнутых множествах  $\Phi_k$  с мерой, сколь угодно близкой к мере  $\Omega$ , и, следовательно, измерима, что и требовалось доказать.

Нетрудно доказать, что если множество  $E$  измеримо, то

$$mE = \sup_F mF = \inf_{\Omega} m\Omega,$$

где  $F$  — замкнутые множества, содержащиеся в  $E$ , а  $\Omega$  — открытые множества, содержащие  $E$ .

Пусть  $E$  — измеримое множество, а  $f$  — суммируемая функция в  $\Omega$ . Определим интеграл от  $f$  по множеству  $E$  формулой

$$\int_E f dv = \int_{\Omega} \xi_E(P) f(P) dv.$$

Легко видеть, что это определение не зависит от выбора открытого множества  $\Omega$ , содержащего множество  $E$ . Если множество  $E$  заключить в какое-нибудь другое открытое множество, величина интеграла останется прежней.

Это определение равносильно прежнему для тех случаев, когда  $E = F$  есть замкнутое множество, на котором функция непрерывна, и когда  $E = \Omega$  есть открытое множество, где функция непрерывна. В самом деле, пусть  $F_{\delta}^{(1)}, F_{\delta}^{(2)}$  — замкнутые множества без общих точек, на которых  $\xi_E(P)$  непрерывна и принимает соответственно значения единица или нуль, причем

$$mF_{\delta}^{(1)} + mF_{\delta}^{(2)} > m\Omega - \delta, \quad \delta \rightarrow 0.$$

Существование таких множеств установлено при доказательстве теоремы 17. Если  $E = F$  — замкнутое множество и  $f$  непрерывна на  $F$ , то за

множество  $F_{\delta}^{(1)}$  можно взять само множество  $F$ . Тогда на основании теоремы 14

$$\int_{\Omega} \xi_E(P) f(P) dv = \lim_{\delta \rightarrow 0} \int_{F_{\delta}^{(1)} + F_{\delta}^{(2)}} \xi_E(P) f(P) dv = \int_F f dv.$$

Если  $E = \Omega_0$  — открытое множество и  $\Phi_{\delta}$  — система исчерпывающих множеств для  $f$  в  $\Omega_0$ , то множества  $F_{\delta}^{(1)}$  можно заменить на  $\Phi_{\delta}$ , ибо

$$[\Omega - (\Phi_{\delta} + F_{\delta}^{(2)})] \subseteq [\Omega - (F_{\delta}^{(1)} + F_{\delta}^{(2)})] + (\Omega_0 - \Phi_{\delta})$$

и, значит,

$$m[\Omega - (\Phi_{\delta} + F_{\delta}^{(2)})] \leq m[\Omega - (F_{\delta}^{(1)} + F_{\delta}^{(2)})] + m(\Omega_0 - \Phi_{\delta}) \leq 2\delta.$$

Таким образом,  $\Phi_{\delta} + F_{\delta}^{(2)}$  будет исчерпывающей системой для функции  $\xi_E(P) f(P)$ . Отсюда

$$\begin{aligned} \int_{\Omega} \xi_E(P) f(P) dv &= \lim_{\delta \rightarrow 0} \int_{\Phi_{\delta} + F_{\delta}^{(2)}} \xi_E(P) f(P) dv = \\ &= \lim_{\delta \rightarrow 0} \int_{\Phi_{\delta}} \xi_E(P) f(P) dv = \lim_{\delta \rightarrow 0} \int_{\Phi_{\delta}} f(P) dv = \int_{\Omega_0} f dv, \end{aligned}$$

что и требовалось доказать.

В силу формулы (VI.6) имеем:

$$\int_{E_1} f dv + \int_{E_2} f dv = \int_{E_1 + E_2} f dv = \int_{E_1 E_2} f dv.$$

В частности, для  $f = 1$  получим равенство

$$mE_1 + mE_2 = m(E_1 + E_2) + m(E_1 E_2).$$

Если для некоторого множества  $E$  существуют такие содержащие его открытые множества  $\Omega_k$ , что  $\inf m\Omega_k = 0$ , то согласно сказанному выше  $mE = 0$ . Обратно, всякое множество меры нуль может быть заключено в открытое множество сколь угодно малой меры.

**Т е о р е м а 18.** Если функция  $f$  отлична от нуля лишь на множестве  $E$  меры нуль, то интеграл этой функции по открытому множеству  $\Omega$  равен нулю.

В самом деле, пусть  $F_k$  — исчерпывающая система замкнутых множеств для  $f$ , а  $\Omega_k$  — система открытых множеств с мерой, стремящейся к нулю, содержащих  $E$ . Мера замкнутых множеств  $\Phi_k = F_k - \Omega_k$  будет стремиться к мере  $\Omega$ , так как  $\Omega - \Phi_k = (\Omega_k - F_k) + \Omega_k$ ; отсюда  $m(\Omega - \Phi_k) \leq m(\Omega_k - F_k) + m\Omega_k \rightarrow 0$ . Таким образом, система замкнутых множеств  $\Phi_k$  будет исчерпывающей. Утверждение теоремы следует из того, что для этой системы все интегралы

$$\int_{\Phi_k} f dv$$

равны нулю.

**С л е д с т в и е.** Если две суммируемые функции  $f_1$  и  $f_2$  отличаются одна от другой лишь на множестве точек меры нуль, то

$$\int_{\Omega} f_1 dv = \int_{\Omega} f_2 dv.$$

В самом деле,

$$\left| \int_{\Omega} f_1 dv - \int_{\Omega} f_2 dv \right| = \left| \int_{\Omega} (f_1 - f_2) dv \right| \leq \int_{\Omega} |f_1 - f_2| dv = 0.$$

Мы будем говорить, что некоторое утверждение имеет место *почти всюду*, если оно имеет место для всех точек, кроме, быть может, точек некоторого множества  $E$  меры нуль. Как было показано выше, если две функции совпадают почти всюду, то интегралы от них равны и равен нулю интеграл от модуля их разности. Такие функции мы будем называть *эквивалентными*.

Рассмотрим еще один вопрос, важный для дальнейшего. Пусть  $E$  — некоторое измеримое ограниченное множество, и пусть  $F^{(1)}$  — расширяющаяся система замкнутых множеств, принадлежащих множеству  $E$ :

$$F_1^{(1)} \subseteq F_2^{(1)} \subseteq F_3^{(1)} \subseteq \dots \subseteq F_k^{(1)} \subseteq \dots$$

Систему  $F^{(2)}$ , состоящую из множеств

$$F_1^{(2)} \subseteq F_2^{(2)} \subseteq F_3^{(2)} \subseteq \dots \subseteq F_k^{(2)} \subseteq \dots,$$

мы назовем *внутренней по отношению к  $F^{(1)}$* , если для любого  $F_k^{(2)}$  можно указать такое множество  $F_{n_k}^{(1)}$ , что  $F_k^{(2)} \subseteq F_{n_k}^{(1)}$ .

Условимся при этом писать:

$$F^{(2)} \ll F^{(1)} \quad \text{или} \quad F^{(1)} \gg F^{(2)}.$$

(Соотношение  $F^{(1)} \gg F^{(2)}$  не исключает  $F^{(1)} \ll F^{(2)}$ .) Из  $F^{(1)} \gg F^{(2)}$  и  $F^{(2)} \gg F^{(3)}$  следует  $F^{(1)} \gg F^{(3)}$ .

**Л е м м а 7.** Пусть дана последовательность расширяющихся систем замкнутых множеств на множестве  $E$ :

$$F^{(1)} \gg F^{(2)} \gg F^{(3)} \gg \dots \gg F^{(S)} \gg \dots$$

и таких, что

$$\lim_{k \rightarrow \infty} (mE - mF_k^{(S)}) = 0, \quad S = 1, 2, \dots$$

Тогда существует система  $F^{(\omega)}$ , внутренняя по отношению ко всем  $F^{(S)}$  и такая, что опять  $\lim_{k \rightarrow \infty} (mE - mF_k^{(\omega)}) = 0$ .

Докажем эту лемму. В каждой системе  $F^{(S)}$  выберем такое множество  $F_n^{(S)} = F_n^{(S)*}$ , что

$$mF_n^{(S)} \geq mE - \frac{1}{2^S}.$$

Пусть

$$F_k^{(\omega)} = F_k^{(k)*} F_k^{(k+1)*} \dots F_k^{(m)*} \dots$$

Очевидно, что

$$F_1^{(\omega)} \subseteq F_2^{(\omega)} \subseteq \dots \subseteq F_k^{(\omega)} \subseteq \dots$$

Множества  $F_k^{(\omega)}$  суть замкнутые множества.

Нетрудно видеть, что система  $F^{(\omega)}$  является внутренней по отношению к любой из систем  $F^{(S)}$ . Это следует из того, что  $F_k^{(\omega)} \subseteq F_n^{(S)*}$  для любого  $S \geq k$ .

Остается показать, что  $\lim_{k \rightarrow \infty} mF_k^{(\omega)} = mE$ . Имеем

$$mE - mF_k^{(\omega)} \leq m(E - F^{(k)*}) + m(E - F^{(k+1)*}) + \dots + m(E - F^{(k+m)*}) + \dots \leq \\ \leq \frac{1}{2^k} + \frac{1}{2^{k+1}} + \dots = \frac{1}{2^{k-1}},$$

откуда и следует наше утверждение. Лемма доказана.

Следствием этой важной леммы является

**Т е о р е м а 19.** *Последовательность функций  $f_1, f_2, \dots, f_k, \dots$  непрерывных на замкнутом множестве  $F$ , сходящаяся всюду на  $F$ , сходится равномерно на каждом множестве из некоторой системы замкнутых множеств  $F_\delta$ , таких, что*

$$\lim_{\delta \rightarrow 0} mF_\delta = mF.$$

Для доказательства этой теоремы рассмотрим замкнутые множества  $F_k(\varepsilon)$ , обладающие тем свойством, что на них

$$|f_{m_1} - f_{m_2}| \leq \varepsilon$$

для любых  $m_1 > k$  и  $m_2 > k$ .

Каково бы ни было  $\varepsilon$ , каждая точка  $F$  принадлежит хотя бы одному  $F_k(\varepsilon)$ . Следовательно,

$$F = F_1(\varepsilon) + \dots + F_k(\varepsilon) + \dots$$

Кроме того,

$$F_1(\varepsilon) \subseteq F_2(\varepsilon) \subseteq \dots \subseteq F_k(\varepsilon) \subseteq \dots$$

Применяя теорему 10, будем иметь:

$$\lim_{k \rightarrow \infty} mF_k(\varepsilon) = mF.$$

Рассмотрим последовательность систем  $F^{(S)}$ , состоящих из  $F_1\left(\frac{1}{2^S}\right)$ ,  $F_2\left(\frac{1}{2^S}\right)$ , ... Очевидно,

$$F^{(1)} \supseteq F^{(2)} \supseteq \dots$$

Применяя лемму 7, убеждаемся в существовании системы  $F^{(\omega)}$ , внутренней по отношению ко всем  $F^{(S)}$ . На любом множестве  $F_k^{(\omega)}$  последовательность  $f_1, f_2, \dots$  сходится равномерно.

В самом деле,  $F_k^{(\omega)}$  лежит внутри некоторого  $F_{n_S}^{(S)}$  для любого  $(S)$  и, значит, мы получим:

$$|f_{m_1} - f_{m_2}| < \frac{1}{2^S} \quad \text{при} \quad m_1 > n_S, \quad m_2 > n_S.$$

Теорема доказана.

Из этой теоремы непосредственно следует основной факт теории измеримых функций.

**Т е о р е м а Е г о р о в а.** *Сходящаяся почти всюду последовательность измеримых в ограниченном открытом множестве  $\Omega$  функций  $f_1, f_2, \dots, f_k, \dots$  имеет своим пределом измеримую функцию.*

Действительно, выделим замкнутые множества  $F_k$ , на которых  $f_k$  непрерывна, так, чтобы иметь

$$m\Omega - mF_k \leq \frac{\delta}{2^{k+1}}.$$

На множестве

$$F_0 = F_1 F_2 \dots F_k \dots$$

все функции  $f_1, f_2, \dots$  непрерывны.

Подсчитаем меру  $F_0$ . Мы имеем:

$$mF_0 = \lim_{k \rightarrow \infty} mF_1 F_2 \dots F_k,$$

$$mF_1 - mF_1 F_2 = m(F_1 + F_2) - mF_2 \leq m\Omega - mF_2 \leq \frac{\delta}{2^2},$$

$$mF_1 F_2 - mF_1 F_2 F_3 = m(F_1 F_2 + F_3) - mF_3 \leq m\Omega - mF_3 \leq \frac{\delta}{2^4} \text{ и т. д.,}$$

откуда

$$mF_1 F_2 \dots F_k \geq mF_1 - \frac{\delta}{4} = m\Omega - (m\Omega - mE_1) - \frac{\delta}{4} \geq m\Omega - \frac{\delta}{2}$$

и, следовательно,

$$mF_0 \geq m\Omega - \frac{\delta}{2}.$$

Из сходимости последовательности  $f_1, \dots, f_k, \dots$  почти всюду следует существование замкнутых множеств  $F_\delta$  таких, что  $mF_\delta \geq m\Omega - \frac{\delta}{2}$ , на которых она сходится. Тогда  $F_\delta^* = F_0 F_\delta$  обладает свойством

$$mF_\delta^* \geq m\Omega - \delta.$$

На основании теоремы 19 последовательность  $f_1, f_2, \dots, f_k, \dots$  сходится равномерно на множестве  $F_\delta' \subseteq F_\delta^*$ , таком, что

$$mF_\delta^* - mF_\delta' < \delta.$$

Отсюда  $mF_\delta' \geq m\Omega - 2\delta$  и, следовательно, функция

$$f_0 = \lim_{k \rightarrow \infty} f_k$$

непрерывна на множестве  $F_\delta'$  с мерой, сколь угодно близкой к  $m\Omega$ , т. е. является измеримой, что и требовалось доказать.

Пользуясь теоремой 19, можно доказать следующую важную лемму.

**Л е м м а 8.** Если убывающая последовательность суммируемых функций  $f_1, f_2, \dots, f_k, \dots$  в ограниченной области  $\Omega$  обладает тем свойством, что

$$\int_{\Omega} f_k dv \leq A,$$

т. е. если интегралы от ее членов остаются ограниченными, то последовательность  $f_1, f_2, \dots, f_k, \dots$  сходится почти всюду и имеет своим пределом суммируемую функцию

$$\lim_{k \rightarrow \infty} f_k = f_0$$

и, кроме того,

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_{\Omega} f_k dv = \int_{\Omega} f_0 dv.$$

Лемма будет доказана, если мы установим существование таких замкнутых множеств  $F_\delta^*$ , на которых все  $f_k$  непрерывны, последовательность  $f_k$  равномерно сходится, и притом  $m(\Omega - F_\delta^*) < \delta$ , где  $\delta$  — любое положительное число.

В самом деле, при этом предельная функция  $f_0$  будет непрерывна на всех множествах  $F_\delta^*$  и будет выполнено неравенство

$$\int_{F_\delta^*} f_0 dv \leq A.$$

На основании леммы 4,  $f_0$  будет измеримой и суммируемой на  $\Omega$  функцией. Замкнутые множества  $F_\delta^*$  образуют исчерпывающую систему для  $f_0$  и поэтому

$$\int_{\Omega} f_0 dv = \lim_{\delta \rightarrow 0} \int_{F_\delta^*} f_0 dv \leq A.$$

Наконец, каково бы ни было  $\varepsilon > 0$ , при достаточно большом  $k$  будем иметь

$$\int_{F_\delta^*} f_k dv \leq \int_{F_\delta^*} f_0 dv \leq \int_{F_\delta^*} f_k dv + \varepsilon,$$

и, следовательно,

$$\int_{\Omega} f_k dv \leq \int_{\Omega} f_0 dv \leq \int_{\Omega} f_k dv + \varepsilon.$$

Значит,

$$\int_{\Omega} f_0 dv = \lim_{k \rightarrow \infty} \int_{\Omega} f_k dv,$$

что и требовалось доказать.

Докажем существование множеств, обладающих указанным свойством. Рассмотрим сначала случай, когда  $f_k \geq 0$ .

Введем в рассмотрение функции

$$\psi_k = \operatorname{arctg} f_k.$$

Очевидно,  $\psi_k$  будет неубывающей ограниченной последовательностью. Поэтому  $\psi_k$  сходится всюду на  $\Omega$ .

Обозначим

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \psi_k = \psi_0.$$

Из рассуждений, приведенных при доказательстве теоремы Егорова, мы видим, что существуют замкнутые множества  $F_\delta$

$$m\Omega - mF_\delta < \delta,$$

на которых сходимостъ равномерная и  $\psi_0$  непрерывна.

Пусть  $F_\delta'$  — замкнутое множество тех точек  $F_\delta$ , для которых  $\psi_0 = \frac{\pi}{2}$ . На  $F_\delta'$  функция  $\psi_k$  равномерно стремится к  $\frac{\pi}{2}$  и, значит,  $f_k = \operatorname{tg} \psi_k$  равномерно стремится к  $\infty$ . Следовательно,

$$mF_\delta' = 0,$$

иначе мы имели бы

$$\int_{F_\delta} f_k dv \rightarrow \infty,$$

что, очевидно, невозможно.

Заклучив  $F'_\delta$  в область  $\Omega_\delta$ , такую, что

$$m\Omega_\delta < \delta,$$

положим

$$F_\delta^* = F_\delta - \Omega_\delta.$$

Очевидно,

$$mF_\delta^* > mF_\delta - m\Omega_\delta > m\Omega - 2\delta.$$

На множествах  $F_\delta^*$  последовательность  $\psi_k$  равномерно сходится к пределу, отличному от  $\frac{\pi}{2}$ , и, значит,  $f_k$  равномерно сходится к конечному пределу.

Лемма доказана.

Если  $f_k$  — знакопеременная функция, то достаточно рассмотреть последовательность

$$\varphi_k = f_k - f_1,$$

и доказательство сводится к предыдущему.

## § 7. Сходимость в среднем суммируемых функций

В качестве примеров применения доказанных выше теорем приведем несколько предложений о свойствах меры.

**Теорема 20.** Пусть на ограниченном открытом множестве  $\Omega$  задана последовательность измеримых множеств  $E_1, E_2, \dots, E_k, \dots$ , не имеющих попарно общих точек. Тогда сумма этих множеств

$$E_0 = E_1 + E_2 + \dots + E_k + \dots$$

измерима и

$$mE_0 = \sum_{i=1}^{\infty} mE_i.$$

Действительно, пусть  $\xi_i(P)$  есть характеристическая функция множества  $E_i$ . Положим

$$\psi_s = \sum_{i=1}^s \xi_i(P).$$

Каждая из функций  $\psi_s$  суммируема по теореме 13, как сумма конечного числа суммируемых функций. Последовательность  $\psi_s$  является неубывающей последовательностью, которая сходится к характеристической функции множества  $E_0$ , т. е. к  $\xi_0(P)$ . Кроме того,  $\psi_s \leq 1$ , так как множества не имеют общих точек и, следовательно, не может быть двух функций  $\xi_i(P)$ , отличных от нуля в какой-либо точке. На основании только что доказанной леммы функция  $\xi_0(P) = \lim_{s \rightarrow \infty} \psi_s$  суммируема и

$$\int_{\Omega} \xi_0(P) dv = \lim_{s \rightarrow \infty} \int_{\Omega} \left( \sum_{k=1}^s \xi_k(P) \right) dv = \sum_{k=1}^s \int_{\Omega} \xi_k(P) dv.$$

Отсюда и следует наша теорема.

**С л е д с т в и е 1.** Если  $E_1, E_2, \dots, E_k, \dots$  — произвольная последовательность измеримых множеств, лежащих в ограниченной области  $\Omega$ , и

$$E_0 = E_1 + E_2 + \dots + E_k + \dots,$$

то  $E_0$  измеримо и

$$mE_0 \leq \sum_{k=1}^{\infty} mE_k.$$

Действительно, множество  $E_0$  можно представить в виде

$$E_1 + (E_2 - E_1) + [E_3 - (E_1 + E_2)] + \dots + [E_k - (E_1 + E_2 + \dots + E_{k-1})] + \dots$$

Каждое из слагаемых, очевидно, измеримо, все они попарно не имеют общих точек и

$$m[E_k - (E_1 + E_2 + \dots + E_{k-1})] \leq mE_k.$$

Отсюда и вытекает наше утверждение.

**С л е д с т в и е 2.** Сумма последовательности множеств меры нуль

$$E_0 = E_1 + E_2 + \dots + E_k + \dots, \quad mE_k = 0,$$

является также множеством меры нуль.

Следствие 2 непосредственно вытекает из следствия 1.

Мы доказали выше, что если функция  $f$  обращается в нуль почти всюду, то интеграл от нее равен нулю. Сейчас мы докажем теорему, в некотором смысле обратную для этого утверждения.

**Т е о р е м а 21.** Если интеграл от неотрицательной суммируемой функции  $f$  по ограниченному открытому множеству равен нулю, то функция  $f$  равна нулю всюду, кроме, быть может, некоторого множества точек  $E$  меры нуль.

Для доказательства рассмотрим расширяющуюся систему замкнутых множеств  $F_k$ , на которых функция  $f$  непрерывна, причем  $m(\Omega - F_k) < \frac{1}{2^k}$ .

Множество точек  $E_0$ , принадлежащих открытому множеству  $\Omega$ , которые не войдут ни в одно из множеств  $F_k$ , имеет меру нуль, так как оно может быть заключено в семейство открытых множеств  $\Omega - F_k$ , мера которых стремится к нулю при  $k \rightarrow \infty$ .

Множество  $\Phi_k$  тех точек множества  $F_k$ , где  $f \geq \frac{1}{2^k}$ , есть, очевидно, замкнутое множество. По условию теоремы

$$\int_{\Phi_k} f \, dv = 0,$$

откуда следует  $m\Phi_k = 0$ . Положим  $E = E_0 + \sum_{k=1}^{\infty} \Phi_k$ . Множества  $\Phi_k$  образуют

расширяющуюся последовательность. Всякая точка, в которой  $f > 0$ , должна войти или в  $E_0$ , или в одно из множеств  $\Phi_k$ , т. е. будет принадлежать множеству  $E$ . По доказанному выше  $mE = 0$ , что и требовалось доказать.

**Т е о р е м а 22.** Если функция  $f$  суммируема в открытом множестве  $\Omega$  и если при любой непрерывной в  $\Omega$  функции  $\psi$  имеет место равенство

$$\int_{\Omega} f \psi \, dv = 0,$$

то функция  $f$  удовлетворяет условию

$$\int_{\Omega} |f| dv = 0$$

и, следовательно, равна нулю почти всюду.

Докажем эту теорему приведением к нелепости. Если бы интеграл  $\int_{\Omega} |f| dv$  был отличен от нуля, то по крайней мере один из интегралов

$$\int_{\Omega} f^+ dv, \quad \int_{\Omega} f^- dv,$$

сумма которых равна  $\int_{\Omega} |f| dv$ , был бы отличен от нуля. Разность этих интегралов равна нулю, ибо она равна интегралу от  $f$ . Следовательно, оба интеграла должны быть отличны от нуля. Тогда существует замкнутое множество  $F'$ , на котором  $f^+ > 0$  и, следовательно,  $f = f^+$ , причем для этого множества

$$\int_{F'} f^+ dv = \int_{F'} f dv = h > 0.$$

Этот интеграл может быть записан в виде

$$\int_{\Omega} f(P) \xi_{F'}(P) dv,$$

где  $\xi_{F'}(P)$  — характеристическая функция множества  $F'$ . По лемме 3 и по определению измеримой функции (см. стр. 96) существует непрерывная функция  $\chi_h(P)$ , значения которой заключены между нулем и единицей:

$$0 \leq \chi_h(P) \leq 1, \quad 0 \leq \chi_h(P) - \xi_{F'}(P) \leq 1,$$

и которая может отличаться от  $\xi_{F'}(P)$  только на множестве  $\Omega_h$  сколь угодно малой меры. При этом

$$\int_{\Omega} f(P) \xi_{F'}(P) dv = \int_{\Omega} f(P) \chi_h(P) dv + \int_{\Omega} f(P) [\xi_{F'}(P) - \chi_h(P)] dv.$$

Но по условию теоремы первый интеграл в правой части равен нулю ввиду непрерывности  $\chi_h(P)$ . Пользуясь еще теоремой 15, получим:

$$\left| \int_{\Omega} f(P) [\xi_{F'}(P) - \chi_h(P)] dv \right| \leq \int_{\Omega_h} |f(P)| dv.$$

В силу абсолютной непрерывности интеграла от  $|f(P)|$  последний интеграл становится сколь угодно малым вместе с мерой  $\Omega_h$  и, следовательно, не может равняться постоянному числу  $h > 0$ . Получилась нелепость, опровергающая наше предположение. Теорема доказана.

**Л е м м а 9.** Любая непрерывная в открытом множестве  $\Omega$  функция  $\psi(P)$ , отличная от нуля лишь в открытом множестве  $\Omega_{\psi}$ , лежащем внутри  $\Omega$  вместе с границей, может быть со сколь угодно большой точностью равномерно на  $\Omega$  приближена с помощью функции  $\psi_h(P)$ ,

имеющей непрерывные производные любого порядка и отличной от нуля лишь в открытом множестве  $\Omega_h$ , состоящем из точек, расстояние которых до  $\Omega_\psi$  меньше  $h$ . Здесь  $h$  — достаточно малое положительное число, зависящее от желаемой степени точности приближения и от конфигурации  $\Omega$  и  $\Omega_\psi$ .

Построим функцию  $\psi_h(P)$  по формуле

$$\psi_h(P) = \frac{\int_{r \leq h} e^{\frac{r^2}{r^2 - h^2}} \psi(P') dP'}{\int_{r \leq h} e^{\frac{r^2}{r^2 - h^2}} dP'},$$

где

$$r = \sqrt{(x_1 - x'_1)^2 + (x_2 - x'_2)^2 + \dots + (x_n - x'_n)^2}.$$

Функция  $\psi_h(P)$  неограниченно дифференцируема. В самом деле обозначим:

$$\int_{r \leq h} e^{\frac{r^2}{r^2 - h^2}} dP' = \kappa(h)$$

и определим функцию  $\omega(P, P')$  соотношениями

$$\omega(P, P') = \begin{cases} 0; & r > h, \\ \frac{1}{\kappa(h)} e^{\frac{r^2}{r^2 - h^2}}; & r \leq h. \end{cases}$$

Функция  $\psi_h(P)$  может быть записана в виде

$$\psi_h(P) = \int_{\Omega} \psi(P') \omega(P, P') dP'.$$

В таком виде к ней применима теорема о дифференцировании по параметру под знаком интеграла.

В самом деле, функция  $\omega(P, P')$  имеет непрерывные производные любого порядка по координатам точки  $P$ . Производные любого порядка от  $\omega(P, P')$ , очевидно, существуют при  $r < h$  и  $r > h$ . Их предельные значения при  $r > h$  и  $r \rightarrow h$  будут все равны нулю. Нам нужно установить, что и предельные значения всех производных от  $\omega$  при  $r < h$ ,  $r \rightarrow h$  тоже будут равны нулю. Это следует из того, что любая производная от  $\omega$  порядка  $s$  будет иметь вид:

$$\frac{\partial^s \omega}{\partial x_1^{a_1} \dots \partial x_n^{a_n}} = \frac{e^{\frac{r^2}{r^2 - h^2}}}{(r^2 - h^2)^s} Q(x_1, \dots, x_n, x'_1, \dots, x'_n),$$

где  $Q$  — многочлен от своих аргументов. Но  $e^{\frac{r^2}{r^2 - h^2}}$  стремится к нулю быстрее, чем  $\frac{1}{(r^2 - h^2)^s}$  стремится к бесконечности, и, значит,

$$\lim_{r \rightarrow h} \frac{\partial^s \omega}{\partial x_1^{a_1} \dots \partial x_n^{a_n}} = 0.$$

Для разности  $\psi_h(P) - \psi(P)$  имеем:

$$\psi_h(P) - \psi(P) = \frac{\int_{r \leq h} e^{\frac{r^2}{r^2 - h^2}} [\psi(P') - \psi(P)] dP'}{\int_{r \leq h} e^{\frac{r^2}{r^2 - h^2}} dP'}.$$

При достаточно малом  $h$

$$|\psi(P') - \psi(P)| < \varepsilon,$$

откуда по теореме о среднем

$$|\psi_h(P) - \psi(P)| < \varepsilon.$$

Лемма доказана.

Эта лемма позволяет пользоваться интегральным признаком обращения функции в нуль в несколько ослабленной форме (см. теорему 22). Пусть  $f$  суммируема в  $\Omega$ . Положим, что

$$\int_{\Omega} f(P) \psi(P) dP = 0 \quad (\text{VI.7})$$

для всех функций  $\psi(P)$ , имеющих непрерывные производные любого порядка и отличных от нуля каждая только в некоторой внутренней под-области  $\Omega_{\psi}$  области  $\Omega$ .

Этого достаточно для того, чтобы утверждать, что

$$\int_{\Omega} |f(P)| dP = 0.$$

В самом деле, если условие (VI.7) выполнено для всех неограниченно дифференцируемых функций, то оно выполнено и для всех непрерывных функций. Предположим противное. Тогда существует функция  $\psi_0(P)$ , такая, что

$$\left| \int_{\Omega} f(P) \psi_0(P) dP \right| > \varepsilon.$$

В силу леммы существуют функции  $\psi_h(P)$ , сколь угодно близкие к  $\psi_0$  и дифференцируемые неограниченно. Имеем:

$$\int_{\Omega} f(P) \psi_0(P) dP = \int_{\Omega} f(P) \psi_h(P) dP + \int_{\Omega} f(P) [\psi_0(P) - \psi_h(P)] dP.$$

По условию первое слагаемое равно нулю. С другой стороны,

$$\left| \int_{\Omega} f(P) [\psi_0(P) - \psi_h(P)] dP \right| \leq \max |\psi_0(P) - \psi_h(P)| \int_{\Omega} |f(P)| dP < \varepsilon,$$

где  $\varepsilon$  — произвольное положительное число. Мы пришли к противоречию, доказывающему наше утверждение.

Для доказательства важной теоремы 23 нам потребуется следующая

**Лемма о наибольшем и наименьшем пределах последовательности.** Пусть  $x_1, x_2, \dots, x_h, \dots$  есть какая-нибудь ограниченная последовательность вещественных чисел. *Наибольшим пределом*

последовательности  $\{x_k\}$  называется такое число  $Y$ , что при любом  $\varepsilon > 0$  среди чисел  $\{x_k\}$  найдется лишь конечное множество таких, для которых выполнено неравенство

$$x_k > Y + \varepsilon,$$

и бесконечное множество таких, для которых

$$x_k > Y - \varepsilon.$$

Наименьшим пределом последовательности называется такое число  $y$ , что неравенство

$$x_k < y - \varepsilon$$

выполняется лишь для конечного множества чисел  $x_k$ , а неравенство

$$x_k < y + \varepsilon$$

имеет место для бесконечного множества чисел  $x_k$ . Если наибольший и наименьший пределы совпадают, то, очевидно, последовательность сходится и имеет только одну предельную точку. Принято обозначать

$$Y = \overline{\lim} x_k, \quad y = \underline{\lim} x_k.$$

*Справедливы следующие формулы*

$$\overline{\lim} x_k = \lim_{j \rightarrow \infty} \left\{ \lim_{s \rightarrow \infty} \max(x_j, \dots, x_{j+s}) \right\}, \quad (\text{VI.8})$$

$$\underline{\lim} x_k = \lim_{j \rightarrow \infty} \left\{ \lim_{s \rightarrow \infty} \min(x_j, \dots, x_{j+s}) \right\}. \quad (\text{VI.9})$$

В правых частях (VI.8) и (VI.9) оба предела имеют смысл. В самом деле, при возрастании  $s$  величины

$$z_s^{(j)} = \max(x_j, x_{j+1}, \dots, x_{j+s})$$

не убывают, оставаясь ограниченными, и, следовательно, стремятся к некоторым пределам, которые мы обозначим  $z_0^{(j)}$ . Величины  $z_0^{(j)}$  ограничены снизу и не возрастают с увеличением  $j$ , так как  $z_s^{(j)} \leq z_s^{(j-1)}$  и, следовательно,

$$z_0^{(j)} = \lim_{s \rightarrow \infty} z_s^{(j)} \leq \lim_{s \rightarrow \infty} z_s^{(j-1)} = z_0^{(j-1)}.$$

Отсюда вытекает существование предела  $\lim_{j \rightarrow \infty} z_0^{(j)}$ .

Докажем теперь справедливость формулы (VI.8). Каково бы ни было  $\varepsilon > 0$ , бесконечное множество чисел  $z_s^{(j)}$  будет удовлетворять условию

$$z_s^{(j)} > \overline{\lim} x_k - \varepsilon$$

и, следовательно,

$$z_0^{(j)} \leq \overline{\lim} x_k.$$

С другой стороны, при достаточно большом  $j$  все  $z_s^{(j)}$  будут удовлетворять неравенству

$$z_s^{(j)} < \overline{\lim} x_k + \varepsilon.$$

Значит,

$$z_0^{(j)} \leq \overline{\lim} x_k,$$

откуда и вытекает справедливость формулы (VI.8). Аналогично может быть доказана формула (VI.9) для нижнего предела, которая, впрочем, сводится к формуле (VI.8) заменой  $x_k$  на  $-x_k$ .

Пусть дана последовательность суммируемых в открытом множестве  $\Omega$  функций  $f_1, f_2, \dots, f_k, \dots$ . Если для всякого  $\varepsilon > 0$  существует такое натуральное число  $N = N(\varepsilon)$ , что при  $m, n > N(\varepsilon)$  имеет место неравенство

$$\int_{\Omega} |f_m - f_n| dv < \varepsilon,$$

то последовательность  $\{f_k\}$  называется *сходящейся в себе*. Справедлива

**Теорема 23.** Для всякой сходящейся в себе последовательности  $f_1, f_2, \dots, f_k, \dots$  существует суммируемая функция  $f_0$ , называемая обобщенным пределом последовательности  $\{f_k\}$  и обладающая свойством:

$$\int_{\Omega} |f_k - f_0| dv \rightarrow 0 \quad \text{при} \quad k \rightarrow \infty.$$

Доказательству этой теоремы мы предположим небольшое замечание. Пусть  $f_1, f_2$  — суммируемые функции. Тогда функция

$$f_3 = \max(f_1, f_2)$$

также является суммируемой. В самом деле,

$$\max(f_1, f_2) = f_1 + (f_2 - f_1)^+.$$

Но из суммируемости  $f_2$  и  $f_1$  следует суммируемость их разности  $f_2 - f_1$  и положительной части этой разности. Очевидно, что функция

$$\max(f_1, f_2, \dots, f_m),$$

где  $f_1, f_2, \dots, f_m$  — суммируемые функции, также является суммируемой.

Докажем теперь теорему 23. Рассмотрим подпоследовательность  $\{f_{N_k}\}$ , выбранную из последовательности  $\{f_k\}$  таким образом, что

$$\int_{\Omega} |f_{N_k} - f_{N_{k+1}}| dv < \frac{1}{2^k} \quad \text{при} \quad k_1 > k.$$

Обозначим  $f_{N_k}$  через  $\psi_k$ . Докажем, что последовательность  $\psi_k$  почти всюду сходится к некоторой суммируемой функции  $f_0$ . С этой целью изучим  $\overline{\lim} \psi_k$  и  $\underline{\lim} \psi_k$ . Пусть

$$\chi_s^{(j)} \max(\psi_j, \psi_{j+1}, \dots, \psi_{j+s}).$$

Зафиксируем пока  $j$  и рассмотрим последовательность

$$\chi_1^{(j)}, \chi_2^{(j)}, \dots, \chi_s^{(j)}, \dots$$

Она является неубывающей последовательностью суммируемых функций. С другой стороны,

$$\psi_j \leq \chi_s^{(j)} \leq \psi_j + |\psi_{j+1} - \psi_j| + |\psi_{j+2} - \psi_{j+1}| + \dots + |\psi_{j+s} - \psi_{j+s-1}|,$$

и, значит,

$$0 \leq \int_{\Omega} \chi_s^{(j)} dv - \int_{\Omega} \psi_j dv \leq \int_{\Omega} \left\{ \sum_{k=j+1}^{j+s} |\psi_k - \psi_{k-1}| \right\} dv \leq \sum_{k=j}^{j+s-1} \frac{1}{2^k} < \frac{1}{2^{j-1}}.$$

Следовательно, на основании леммы 8 последовательность  $\{\chi_s^{(j)}\}$  имеет почти всюду своим пределом некоторую суммируемую функцию  $\chi_0^{(j)}$ , причем  $\chi_0^{(j)} \geq \psi_j$  и

$$0 \leq \int_{\Omega} \chi_0^{(j)} dv - \int_{\Omega} \psi_j dv \leq \frac{1}{2^{j-1}}.$$

Рассмотрим теперь последовательность  $\chi_0^{(1)}, \chi_0^{(2)}, \dots, \chi_0^{(k)}, \dots$ . Она будет невозрастающей, ибо  $\chi_s^{(j)} \leq \chi_s^{(j-1)}$ , откуда  $\chi_0^{(j)} \leq \chi_0^{(j-1)}$ . Интегралы от  $\psi_j$  равномерно ограничены снизу, так как

$$\int_{\Omega} \psi_j dv \geq \int_{\Omega} \psi_0 dv - \sum_{k=1}^j \int_{\Omega} |\psi_k - \psi_{k-1}| dv \geq \int_{\Omega} \psi_0 dv - \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2^k} = \int_{\Omega} \psi_0 dv - 1.$$

Следовательно, ограничены снизу интегралы от  $\chi_0^{(j)}$ . В силу той же леммы 8 последовательность  $\chi_0^{(j)}$  почти всюду сходится к некоторой предельной функции  $f_0$  и при этом

$$\lim_{j \rightarrow \infty} \int_{\Omega} \chi_0^{(j)} dv - \int_{\Omega} f_0 dv = \lim_{j \rightarrow \infty} \int_{\Omega} |\chi_0^{(j)} - f_0| dv = 0.$$

Согласно лемме о наибольшем и наименьшем пределе последовательности имеем

$$f_0 = \lim \psi_k.$$

Покажем теперь, что  $f_0$  удовлетворяет требованию нашей теоремы. Мы имеем

$$\int_{\Omega} |\psi_j - f_0| dv \leq \int_{\Omega} |\psi_j - \chi_0^{(j)}| dv + \int_{\Omega} |\chi_0^{(j)} - f_0| dv.$$

Оба слагаемых в правой части последнего неравенства сколь угодно малы при достаточно большом  $j$ . Отсюда

$$\int_{\Omega} |\psi_j - f_0| dv < \varepsilon \text{ при } j > J(\varepsilon).$$

Повторяя дословно те же рассуждения для функции

$$f_0^* = \lim \psi_k,$$

получим:

$$\int_{\Omega} |\psi_i - f_0^*| dv < \varepsilon$$

и, значит,

$$\int_{\Omega} |f_0 - f_0^*| dv \leq \int_{\Omega} |\psi_j - f_0| dv + \int_{\Omega} |\psi_j - f_0^*| dv < 2\varepsilon.$$

Следовательно,

$$\int_{\Omega} |f_0 - f_0^*| dv = 0,$$

и функции  $f_0$ ,  $f_0^*$  совпадают почти всюду. Отсюда следует, что последовательность  $\psi_k$  имеет предел почти всюду.

Наконец, для любой функции первоначальной последовательности  $f_k$  будем иметь

$$\int_{\Omega} |f_k - f_0| dv \leq \int_{\Omega} |f_k - \psi_j| dv + \int_{\Omega} |\psi_j - f_0| dv.$$

Следовательно, каково бы ни было  $\varepsilon > 0$ , можно указать натуральное число  $N(\varepsilon)$  таким образом, чтобы при  $k > N(\varepsilon)$  имело место неравенство

$$\int_{\Omega} |f_k - f_0| dv < \varepsilon,$$

что и требовалось доказать.

Ряд

$$\sum_{k=1}^{\infty} u_k(P) \quad (\text{VI.10})$$

мы будем называть *сходящимся в смысле Лебега*, если существует суммируемая функция  $u$ , обладающая тем свойством, что

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \int_{\Omega} \left| u - \sum_{k=1}^N u_k \right| dv = 0.$$

Сходимость в смысле Лебега влечет, очевидно, возможность предельного перехода под знаком интеграла. Ряд (VI.10) мы будем называть *сходящимся в себе в смысле Лебега*, если

$$\int_{\Omega} \left| \sum_{k=m}^{m+p} u_k \right| dv < \varepsilon \quad \text{при} \quad m > N(\varepsilon).$$

Теорема 23 может быть переформулирована для рядов следующим образом: *ряд, сходящийся в себе в смысле Лебега, сходится в смысле Лебега к некоторой предельной функции.*

Сходящийся в себе ряд можно умножить почленно на любую измеримую ограниченную функцию, и при этом его сходимость, очевидно, сохранится.

**Т е о р е м а 24.** *Члены сходящейся в себе последовательности  $f_1, f_2, \dots, f_k, \dots$  имеют равномерно абсолютно непрерывные интегралы Лебега. Иными словами, каково бы ни было  $\varepsilon > 0$ , можно указать такое число  $\delta(\varepsilon)$ , что как только мера открытого множества  $\Omega_\delta$  меньше  $\delta$ , то для всех функций  $f_k$  будет справедливо неравенство*

$$\left| \int_{\Omega_\delta} f_k dv \right| < \varepsilon.$$

Докажем эту теорему. Пусть дано положительное число  $\varepsilon$ . Выберем  $N$  таким образом, чтобы при  $k > N$ ,  $m \geq N$  имело место неравенство

$$\int_{\Omega} |f_k - f_m| dv < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Для любой  $f_k$  из функций  $f_1, f_2, \dots, f_N$  в силу абсолютной непрерывности интеграла Лебега мы можем указать такое  $\delta_k$ , что

$$\int_{\Omega_1} |f_k| dv < \frac{\varepsilon}{2},$$

как только  $m\Omega_1 < \delta_k$ . Возьмем в качестве  $\delta(\varepsilon)$  наименьшее из чисел  $\delta_1, \delta_2, \dots, \delta_N$ . Тогда при  $k \leq N$  утверждение теоремы будет выполнено в силу выбора  $\delta(\varepsilon)$ , а для  $k > N$  выполнение его доказывается следующей оценкой:

$$\left| \int_{\Omega_1} f_k dv \right| \leq \int_{\Omega_1} |f_k - f_N| dv + \int_{\Omega_1} |f_N| dv < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon,$$

что и требовалось доказать.

**Т е о р е м а 25.** Для того чтобы последовательность  $\{f_k\}$  была сходящейся в себе в смысле Лебега в открытом множестве  $\Omega$ , следовательно, имела предел в смысле Лебега, достаточно, чтобы выполнялись два условия:

1. Последовательность  $\{f_k\}$  сходится почти всюду к некоторой предельной функции  $f_0$ .

2. Последовательность  $\{f_k\}$  обладает равномерно абсолютно непрерывными интегралами.

**Д о к а з а т е л ь с т в о.** В силу теоремы 19 существуют замкнутые множества  $F_\delta$  с мерой, сколь угодно близкой к мере  $\Omega$ , на которых сходимость равномерна. Выберем  $\delta > 0$  столь малым, чтобы иметь

$$\int_{\Omega_1} |f_k| dv < \frac{\varepsilon}{3},$$

как только  $m\Omega_1 < \delta$ . Далее, найдем такое  $N$ , что на множестве  $F_\delta$  будет иметь место неравенство

$$|f_k - f_m| < \frac{\varepsilon}{3m\Omega},$$

как только  $k, m > N$ . Тогда при  $k > N$  и  $m > N$  будем иметь

$$\begin{aligned} \int_{\Omega} |f_k - f_m| dv &= \int_{\Omega - F_\delta} |f_k - f_m| dv + \int_{F_\delta} |f_k - f_m| dv \leq \\ &\leq \int_{\Omega - F_\delta} |f_k| dv + \int_{\Omega - F_\delta} |f_m| dv + \int_{F_\delta} |f_k - f_m| dv < \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} = \varepsilon. \end{aligned}$$

Значит, последовательность  $\{f_k\}$  сходится в себе, что и требовалось доказать.

**С л е д с т в и е.** Если последовательность суммируемых функций  $f_1, f_2, \dots, f_k, \dots$  сходится почти всюду в открытом множестве  $\Omega$  к предельной функции  $f_0$  и если функции  $f_k$  по абсолютной величине не превосходят некоторую суммируемую функцию  $\psi$ , то существует интеграл

$$\int_{\Omega} f_0 dv$$

и имеет место равенство

$$\int_{\Omega} f_0 dv = \lim_{k \rightarrow \infty} \int_{\Omega} f_k dv. \quad (\text{VI.11})$$

В самом деле, из неравенства  $|f_k| < \psi$  вытекает равномерная абсолютная непрерывность интегралов последовательности  $\{f_k\}$  и, значит, ее сходимость в смысле Лебега. Очевидно, предел ее в смысле Лебега должен почти всюду совпадать с  $f_0$ . Возможность перехода к пределу под знаком интеграла, как мы уже отмечали, есть следствие сходимости в смысле Лебега.

## § 8. Теорема Лебега—Фубини

**Теорема Лебега—Фубини.** Пусть в кубе  $\Omega_0$  ( $0 < x_i < 1, 0 < y_j < 1$ ),  $i = 1, 2, \dots, n$ ;  $j = 1, 2, \dots, m$ , задана суммируемая функция  $f(x_1, x_2, \dots, x_n, y_1, \dots, y_m)$  от  $n + m$  независимых переменных. Рассмотрим некоторое измеримое множество  $E$  их  $\Omega_0$  и пусть  $E(y_1, \dots, y_m)$  будет сечение этого множества многообразием

$$y_1 = \text{const}, \quad y_2 = \text{const}, \quad \dots, \quad y_m = \text{const},$$

т. е. множество точек, имеющих те же координаты

$$x_1, x_2, \dots, x_n,$$

что и точки  $(x_1, \dots, x_n, y_1, \dots, y_m)$  из  $E$  при фиксированных  $y_1, \dots, y_m$ . Пусть  $E_y$  будет проекция  $E$  на многообразие  $y_1, \dots, y_m$ , т. е. множество всех точек, координаты  $y_1, \dots, y_m$  которых таковы же, как у каких-либо точек из  $E$ .

Определим в кубе  $0 < y_j < 1$  функцию

$$\psi^{(E)}(y_1, \dots, y_m) = \begin{cases} 0 & \text{вне } E_y, \\ \int_{E(y_1, \dots, y_m)} f dx_1 \dots dx_n & \text{в } E_y. \end{cases} \quad (\text{VI.12})$$

Тогда:

а) Интегралы в правой части (VI.12) существуют почти для всех значений  $y_1, \dots, y_m$  (т. е. для всех, кроме, быть может, точек некоторого множества меры нуль).

б) Функция  $\psi^{(E)}(y_1, \dots, y_m)$  есть суммируемая функция от переменных  $y_1, \dots, y_m$ .

$$\text{в) } \int_E f dx_1 \dots dx_n dy_1 \dots dy_m = \int_{0 < y_j < 1} \psi^{(E)}(y_1, \dots, y_m) dy_1 \dots dy_m. \quad (\text{VI.13})$$

Без ограничения общности можно считать  $f$  положительной. Докажем эту теорему сначала для случая, когда  $E$  есть открытое множество  $\Omega$ , а функция  $f$  непрерывна в  $\Omega$ . Построим систему  $\Phi_h$  сеточных множеств, исчерпывающих  $\Omega$ . Очевидна формула:

$$\int_{\Phi_h} f dx_1 \dots dx_n dy_1 \dots dy_m = \int_{0 < y_j < 1} \psi^{(\Phi_h)}(y_1, \dots, y_m) dy_1 \dots dy_m. \quad (\text{VI.14})$$

Последовательность  $\psi^{(\Phi_h)}(y_1, \dots, y_m)$  есть неубывающая при  $h \rightarrow 0$  последовательность измеримых функций, таких, что

$$0 < \int_{y_j < 1} \psi^{(\Phi_h)}(y_1, \dots, y_m) dy_1 \dots dy_m \leq \int_{\Omega} f dx_1 \dots dx_n dy_1 \dots dy_m.$$

На основании леммы 8 эта последовательность имеет почти всюду предел  $\psi'(y_1, \dots, y_m)$ , так, что

$$\lim_{h \rightarrow 0} \psi^{(\Phi_h)}(y_1, \dots, y_m) = \psi'(y_1, \dots, y_m)$$

и

$$\lim_{h \rightarrow 0} \int_{0 < y_j < 1} \psi^{(\Phi_h)}(y_1, \dots, y_m) dy_1 \dots dy_m = \int_{0 < y_j < 1} \psi'(y_1, \dots, y_m) dy_1 \dots dy_m.$$

По  $\Phi_h(y_1, \dots, y_m)$  образуют исчерпывающую систему многогранников для  $\Omega(y_1, \dots, y_m)$ , ибо любая точка  $\Omega(y_1, \dots, y_m)$  попадет в один из  $\Phi_h(y_1, \dots, y_m)$ , следовательно,

$$\psi'(y_1, \dots, y_m) = \psi^{(\Omega)}(y_1, \dots, y_m).$$

Переходя к пределу в (VI.14), получим наше утверждение.

**З а м е ч а н и е.** Пусть мы рассматриваем систему областей  $\Omega_1 \supset \Omega_2 \supset \dots \supset \Omega_k \supset \dots$  таких, что

$$\lim_{k \rightarrow \infty} m\Omega_k = 0.$$

Тогда почти для всех  $y_1, \dots, y_m$  будем иметь:  $m\Omega_k(y_1, \dots, y_m) \rightarrow 0$  при  $k \rightarrow \infty$ .

В самом деле, по доказанному:

$$m\Omega_k = \int_{0 < y_j < 1} m\Omega_k(y_1, \dots, y_m) dy_1 \dots dy_m.$$

Последовательность функций  $m\Omega_k(y_1, \dots, y_m) = \psi_k(y_1, \dots, y_m)$  монотонна и ограничена; следовательно, она имеет предел во всех точках

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \psi_k = \psi_0(y_1, \dots, y_m).$$

На основании леммы 8 мы можем перейти к пределу под знаком интеграла:

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_{0 < y_j < 1} \psi_k dy_1 \dots dy_m = \int_{0 < y_j < 1} \psi_0 dy_1 \dots dy_m = \lim_{k \rightarrow \infty} m\Omega_k = 0.$$

Следовательно,  $\psi_0 = 0$  почти всюду. Наше утверждение доказано.

Рассмотрим теперь случай, когда  $E$  есть замкнутое множество  $F$ , на котором  $f$  непрерывна. Этот случай приводится к предыдущему, если распространить  $f$  на весь куб  $\Omega_0$  и рассмотреть открытое множество  $\Omega = \Omega_0 - F$ . Очевидно,

$$\begin{aligned} \int_F f dx_1 \dots dx_n dy_1 \dots dy_m &= \\ &= \int_{\Omega_0} f dx_1 \dots dx_n dy_1 \dots dy_m - \int_{\Omega} f dx_1 \dots dx_n dy_1 \dots dy_m. \quad (\text{VI.15}) \end{aligned}$$

С другой стороны,

$$\psi^{(F)} + \psi^{(\Omega)} = \psi^{(\Omega_0)}$$

и, значит,

$$\begin{aligned} \int_{0 < y_j < 1} \psi^{(F)} dy_1 \dots dy_m = \\ = \int_{0 < y_j < 1} \psi^{(\Omega_0)} dy_1 \dots dy_m - \int_{0 < y_j < 1} \psi^{(\Omega)} dy_1 \dots dy_m. \end{aligned} \quad (\text{VI.16})$$

Подставляя в правую часть (VI.15) представление  $(m + n)$ -кратных интегралов через функции  $\psi^{(\Omega_0)}$  и  $\psi^{(\Omega)}$  и пользуясь формулой (VI.16), получим нашу теорему для этого случая.

Рассмотрим, наконец, случай, когда  $E$  есть открытое множество  $\Omega$ , а  $f$  — произвольная суммируемая функция. Общий случай измеримого множества  $E$  можно легко свести к этому случаю.

Построим исчерпывающую систему замкнутых множеств  $F_k$  для функции  $f$ . По доказанному

$$\int_{F_k} f dx_1 \dots dx_n dy_1 \dots dy_m = \int_{0 < y_j < 1} \psi^{(F_k)} dy_1 \dots dy_m. \quad (\text{VI.17})$$

Последовательность  $\psi^{(F_k)}$  есть возрастающая последовательность измеримых функций, таких, что

$$\int_{0 < y_j < 1} \psi^{(F_k)} dy_1 \dots dy_m \leq \int_{\Omega} f dx_1 \dots dx_n dy_1 \dots dy_m.$$

На основании леммы 8 она имеет почти всюду конечный предел  $\psi'$ , такой, что

$$\lim \psi^{(F_k)} = \psi', \quad \lim_{k \rightarrow \infty} \int_{0 < y_j < 1} \psi^{(F_k)} dy_1 \dots dy_m = \int_{0 < y_j < 1} \psi' dy_1 \dots dy_m.$$

Докажем, что

$$\psi' = \psi^{(\Omega)}.$$

С этой целью установим, что  $F_k(y_1, y_2, \dots, y_m)$  образуют исчерпывающую систему для  $\Omega(y_1, y_2, \dots, y_m)$  почти для всех  $y_1, \dots, y_m$ .

В самом деле, мера  $\Omega - F_k$  сколь угодно мала при достаточно большом  $k$ . Следовательно, в силу замечания на стр. 125 почти для всех  $y_1, \dots, y_m$

$$\lim_{k \rightarrow \infty} m[\Omega(y_1, y_2, \dots, y_m) - F_k(y_1, y_2, \dots, y_m)] = 0.$$

Значит  $F_k(y_1, y_2, \dots, y_m)$  действительно образуют исчерпывающую систему для  $\Omega(y_1, y_2, \dots, y_m)$  почти для всех  $y_1, \dots, y_m$  и, значит,  $\psi' = \psi^{(\Omega)}$ .

Предельный переход в формуле (VI.17) доказывает теорему Лебега—Фубини.

З а м е ч а н и е. Если функция

$$f(x_1, \dots, x_n, y_1, \dots, y_m)$$

измерима,  $f \geq 0$  и если, кроме того, функция  $\psi^{(E)}$  существует и суммируема, т. е. утверждение а) теоремы Лебега—Фубини выполняется и правая часть

формулы (VI.13) имеет смысл, то функция  $f$  будет суммируемой и, следовательно, теорема Лебега—Фубини справедлива в полном объеме. Тогда имеет смысл и левая часть формулы (VI.13), которая равна правой.

Это почти очевидно. В самом деле, если бы оказалось, что функция  $f$  не суммируема, то интегралы

$$\int_F f dx_1 \dots dx_n dy_1 \dots dy_m,$$

взятые по замкнутым множествам, на которых она непрерывна, могли бы быть сделаны как угодно большими. Пусть интеграл, стоящий в правой части (VI.13), равен  $A$ . Выберем замкнутое множество  $F$  так, чтобы иметь

$$\int_F f dx_1 \dots dx_n dy_1 \dots dy_m > A + 1.$$

Построим функцию

$$f_1 = \xi(P) f(P),$$

где  $\xi$  — характеристическая функция множества  $F$ . Тогда  $\psi_1^{(E)}$  существует и суммируема, причем

$$\int_{0 < y_j < 1} \psi_1^{(E)} dy_1 dy_2 \dots dy_m > A + 1.$$

С другой стороны, очевидно,

$$\psi_1^{(E)} \leq \psi^{(E)},$$

и, значит,

$$\int_{0 < y_j < 1} \psi_1^{(E)} dy_1 dy_2 \dots dy_m \leq \int_{0 < y_j < 1} \psi^{(E)} dy_1 dy_2 \dots dy_m = A.$$

Получившееся противоречие говорит о том, что наше предположение неверно.

Из теоремы Лебега—Фубини вытекает еще одно очевидное следствие, заслуживающее быть отмеченным: в повторном интеграле от суммируемой функции можно менять порядок интегрирования.

---

# ИНТЕГРАЛЫ, ЗАВИСЯЩИЕ ОТ ПАРАМЕТРА

## § 1. Интегралы, равномерно сходящиеся при данном значении параметра

Пусть в замкнутой области  $D$  переменных  $x_1, \dots, x_n$  задана функция  $F(x_1, \dots, x_n, \lambda)$ , зависящая от параметра  $\lambda$ , значения которого изменяются в промежутке

$$a \leq \lambda \leq b.$$

Рассмотрим интеграл

$$\psi(\lambda) = \int \dots \int_D F(x_1, \dots, x_n, \lambda) dx_1 \dots dx_n. \quad (\text{VII.1})$$

Этот интеграл будем считать существующим в смысле Лебега. Иными словами, мы предполагаем, что функция  $F(x_1, \dots, x_n, \lambda)$  как функция точки  $(x_1, \dots, x_n)$  в  $n$ -мерном пространстве станет непрерывной, если мы исключим из замкнутой области некоторое открытое множество точек  $\sigma$  сколь угодно малой меры [в приложениях мы по большей части будем рассматривать случай, когда  $F(x_1, \dots, x_n, \lambda)$  разрывна в точках, принадлежащих некоторым многообразиям меньшего числа измерений: в изолированных точках, на конечном числе поверхностей, линий и т. п.] и что

$$\begin{aligned} \int \dots \int_D F(x_1, \dots, x_n, \lambda) dx_1 \dots dx_n = \\ = \lim_{D \rightarrow \sigma} \int \dots \int F(x_1, \dots, x_n, \lambda) dx_1 \dots dx_n \end{aligned}$$

по какому бы способу ни уменьшалось открытое множество  $\sigma$ , лишь бы мера его стремилась к нулю.

Мы будем говорить, что интеграл (VII.1) *сходится равномерно* при  $\lambda = \lambda_0$ , если для любого  $\epsilon > 0$  можно указать такое число  $h(\epsilon)$  и такую часть  $\sigma(\epsilon)$  области  $D$ , что

1. Функция  $F(x_1, \dots, x_n, \lambda)$  непрерывна по  $x_1, x_2, \dots, x_n, \lambda$  на замкнутом множестве  $D - \sigma(\epsilon)$  при  $|\lambda - \lambda_0| \leq h(\epsilon)$ .

2. Интеграл

$$\int_{\sigma(\epsilon)} \dots \int |F(x_1, x_2, \dots, x_n, \lambda)| dx_1 dx_2 \dots dx_n$$

меньше  $\epsilon$  для всех значений  $\lambda$  из промежутка  $\lambda_0 - h(\epsilon) \leq \lambda \leq \lambda_0 + h(\epsilon)$ .

3. Область  $D - \sigma(\epsilon)$  ограничена (это условие не нужно, если область  $D$  ограничена).

**Л е м м а 1.** *Равномерно сходящийся при  $\lambda = \lambda_0$  интеграл есть функция от  $\lambda$ , непрерывная в этой точке.*

В самом деле,

$$\begin{aligned} & \left| \int_D \dots \int F(x_1, \dots, x_n, \lambda_1) dx_1 \dots dx_n - \right. \\ & \quad \left. - \int_D \dots \int F(x_1, \dots, x_n, \lambda_0) dx_1 \dots dx_n \right| \leq \\ & \leq \left| \int_{D-\sigma} \dots \int [F(x_1, \dots, x_n, \lambda_1) - F(x_1, \dots, x_n, \lambda_0)] dx_1 \dots dx_n \right| + \\ & \quad + \left| \int_{\sigma} \dots \int F(x_1, \dots, x_n, \lambda_1) dx_1 \dots dx_n \right| + \\ & \quad + \left| \int_{\sigma} \dots \int F(x_1, \dots, x_n, \lambda_0) dx_1 \dots dx_n \right| \leq \\ & \leq \int_{D-\sigma} \dots \int |F(x_1, \dots, x_n, \lambda_1) - F(x_1, \dots, x_n, \lambda_0)| dx_1 \dots dx_n + \\ & \quad + \int_{\sigma} \dots \int |F(x_1, \dots, x_n, \lambda_1)| dx_1 \dots dx_n + \\ & \quad + \int_{\sigma} \dots \int |F(x_1, \dots, x_n, \lambda_0)| dx_1 \dots dx_n, \end{aligned}$$

Выбрав  $\sigma(\epsilon)$  и  $h(\epsilon)$  такими, чтобы второе и третье слагаемые каждое порознь были меньше  $\frac{\epsilon}{3}$ , а затем, взяв  $|\lambda_1 - \lambda_0|$  столь малым, чтобы для всех  $x_1, \dots, x_n$ , принадлежащих области  $D - \sigma$ , имело место неравенство <sup>1)</sup>

$$|F(x_1, \dots, x_n, \lambda_1) - F(x_1, \dots, x_n, \lambda_0)| < \frac{\epsilon}{3(D-\sigma)},$$

<sup>1)</sup> Это возможно, так как непрерывная на ограниченном замкнутом множестве функция равномерно непрерывна.

где  $D - \sigma$  означает меру (объем) области  $D - \sigma$ , мы получим:

$$\left| \int_D \dots \int F(x_1, \dots, x_n, \lambda_1) dx_1 \dots dx_n - \right. \\ \left. - \int_D \dots \int F(x_1, \dots, x_n, \lambda) dx_1 \dots dx_n \right| < \varepsilon.$$

Лемма доказана.

Интеграл (VII.1), равномерно сходящийся при любом  $\lambda$  из некоторого промежутка, будет непрерывной функцией от  $\lambda$  в этом промежутке.

Если во всем этом промежутке можно указать одно и то же  $\sigma(\varepsilon)$ , не зависящее от  $\lambda$ , то интеграл будет равномерно сходящимся во всем промежутке в том смысле, как это обычно определяют в анализе.

В некоторых случаях удобно соответственным образом обобщить понятие о равномерной сходимости интеграла при данном значении параметра на случай, когда параметром служит какая-нибудь точка  $P$  с координатами  $(\tilde{x}_1, \tilde{x}_2, \dots, \tilde{x}_n)$  в пространстве  $n$ -измерений.

Рассмотрим интеграл:

$$\int_D \dots \int F(x_1, \dots, x_n, P) dx_1 \dots dx_n. \quad (\text{VII.2})$$

Мы будем говорить, что этот интеграл *равномерно сходится* в точке  $P_0$ , если для каждого  $\varepsilon > 0$  можно указать такую окрестность  $h(\varepsilon)$  точки  $P_0$  и такую часть  $\sigma(\varepsilon)$  области  $D$ , что:

1. Функция  $F$  непрерывна, когда  $P$  находится в окрестности  $h(\varepsilon)$  точки  $P_0$ , а точка  $Q$  с координатами  $(x_1, \dots, x_n)$  — на замкнутом множестве  $D - \sigma(\varepsilon)$ .

2. Интеграл  $\int_D \dots \int |F(x_1, \dots, x_n, P)| dx_1 \dots dx_n$  меньше  $\varepsilon$  для всех  $P$  из  $h(\varepsilon)$ .

3. Область  $D - \sigma$  ограничена.

Для этого случая также имеет место

**Л е м м а 2.** *Равномерно сходящийся при  $P = P_0$  интеграл есть функция от  $P$ , непрерывная в точке  $P_0$ .*

Доказательство является повторением рассуждений предыдущей леммы.

Часто применим следующий достаточный признак равномерной сходимости. Пусть функция  $F(x_1, x_2, \dots, x_n, P)$ , заданная в ограниченной области  $D$ , удовлетворяет условию

$$|F(x_1, \dots, x_n, P)| < \frac{A}{r^{n-\alpha}},$$

где  $\alpha > 0$  и  $A$  — некоторая постоянная. Через  $r$  обозначено расстояние от точки  $P(x_1, x_2, \dots, x_n)$  до точки  $Q$  с координатами  $(x_1, \dots, x_n)$ . Предполагается, что везде, кроме точек, где  $P$  совпадает с  $Q$ ,  $F$  непрерывно зависит от  $x_1, x_2, \dots, x_n, \tilde{x}_1, \tilde{x}_2, \dots, \tilde{x}_n$ .

Легко установить равномерную сходимость интеграла

$$\int_D \dots \int F(x_1, \dots, x_n, P) dx_1 \dots dx_n$$

в любой точке  $P_0$ , лежащей внутри  $D$ . Для этого достаточно взять за  $\sigma$  шар такого радиуса  $\rho$ , описанный вокруг  $P_0$  (рис. 10), чтобы

$$\int_{r \leq 2\rho} \dots \int \frac{A}{r^{n-\alpha}} dx_1 \dots dx_n < \varepsilon,$$

а за  $h(\varepsilon)$  — шар радиуса  $\rho_1 < \rho$ . В самом деле, при этом <sup>1)</sup>

$$\begin{aligned} \left| \int_{\sigma} \dots \int F(x_1, \dots, x_n, P) dx_1 \dots dx_n \right| &\leq \int_{\sigma} \dots \int |F| dx_1 \dots dx_n < \\ &< \int_{r \leq 2\rho} \dots \int \frac{A}{r^{n-\alpha}} dx_1 \dots dx_n < \varepsilon. \end{aligned}$$

Очевидно, что в  $D - \sigma$  и на ее границе для точек  $P$  из окрестности  $h(\varepsilon)$  функция  $F$  будет непрерывной функцией своих аргументов.

## § 2. Производная по параметру от несобственных интегралов

Пусть мы имеем интеграл

$$\psi(\lambda) = \int_D \dots \int F(x_1, x_2, \dots, x_n, \lambda) dx_1 dx_2 \dots dx_n$$

по области  $D$ , не зависящей от параметра  $\lambda$ . В анализе часто

<sup>1)</sup> Очевидно, что шар радиуса  $r \leq 2\rho$  с центром в точке  $P$  будет содержать шар  $\sigma$  с центром  $P_0$  (рис. 10), если точка  $P$  отстоит от точки  $P_0$  не более чем на  $\rho_1 < \rho$

приводится формула

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial \lambda} \int_D \dots \int F(x_1, x_2, \dots, x_n, \lambda) dx_1, dx_2 \dots dx_n = \\ = \int_D \dots \int \frac{\partial F}{\partial \lambda} dx_1 dx_2 \dots dx_n = \Phi(\lambda), \end{aligned}$$

справедливая в том случае, когда интеграл в правой части — собственный. Нам полезно будет избавиться от этого предположения. Справедлива

**Т е о р е м а.** Пусть

а) Функция  $F(x_1, \dots, x_n, \lambda)$  есть первообразная по  $\lambda$  функция для  $f(x_1, \dots, x_n, \lambda)$  в области  $D$  переменных  $x_1, x_2, \dots, x_n$  при  $a \leq \lambda \leq b$ , т. е.

$$F(x_1, \dots, x_n, \lambda) - F(x_1, \dots, x_n, a) = \int_a^\lambda f(x_1, \dots, x_n, \lambda) d\lambda$$

при всех  $x_1, x_2, \dots, x_n$  из  $D$ , кроме, быть может, некоторого множества меры нуль. (По большей части это множество будет состоять из отдельных точек, линий или поверхностей.)

б) Функция  $f$  — суммируемая функция  $n+1$  переменного  $(x_1, \dots, x_n, \lambda)$ , т. е.  $(n+1)$ -мерный интеграл

$$\int_a^\lambda \int_D \dots \int f(x_1, x_2, \dots, x_n, \lambda) dx_1 \dots dx_n d\lambda$$

существует при  $a \leq \lambda \leq b$ .

в) Функция

$$\Phi(\lambda) = \int_D \dots \int f(x_1, x_2, \dots, x_n, \lambda) dx_1 \dots dx_n$$

непрерывна при  $\lambda = \lambda_0$ .

Тогда справедлива формула

$$\begin{aligned} \frac{\partial \Phi(\lambda)}{\partial \lambda} \Big|_{\lambda=\lambda_0} = \frac{\partial}{\partial \lambda} \int_D \dots \int F(x_1, \dots, x_n, \lambda) dx_1 \dots dx_n \Big|_{\lambda=\lambda_0} = \\ = \int_D \dots \int f(x_1, \dots, x_n, \lambda_0) dx_1 \dots dx_n, \end{aligned}$$

Доказательство этой теоремы не представляет труда. По определению

$$\begin{aligned} \frac{\partial \psi}{\partial \lambda} \Big|_{\lambda = \lambda_0} &= \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \int_D \dots \int [F(x_1, \dots, x_n, \lambda_0 + h) - F(x_1, \dots, x_n, \lambda_0)] dx_1 \dots dx_n, \end{aligned}$$

Интеграл, стоящий в правой части, равен на основании теоремы Лебега—Фубини (лекция VI) об изменении порядка интегрирования  $(n+1)$ -мерному интегралу

$$\int_{\lambda_0 < \lambda < \lambda_0 + h} \dots \int_D f dx_1 dx_2 \dots dx_n d\lambda,$$

а этот последний интеграл представляется в виде

$$\int_{\lambda_0}^{\lambda_0 + h} \left( \int_D \dots \int f dx_1 dx_2 \dots dx_n \right) d\lambda.$$

Пользуясь свойством неопределенных интегралов Лебега в точке непрерывности подинтегральной функции (см. лекция VI, теорема 16), имеем:

$$\frac{\partial \psi}{\partial \lambda} \Big|_{\lambda = \lambda_0} = \varphi(\lambda_0),$$

что и требовалось доказать.

Нам часто придется пользоваться этой теоремой для тех или иных интегралов. Мы дадим несколько простейших признаков выполнения основного условия (б) этой теоремы.

Условие (а) обычно проверяется без труда.

**П р и з н а к 1.** Условия (б) и (в) теоремы 1 (VII) выполнены, если интеграл

$$\int_D \dots \int f(x_1, x_2, \dots, x_n, \lambda) dx_1 dx_2 \dots dx_n$$

равномерно сходится в замкнутом промежутке

$$a \leq \lambda \leq b,$$

Доказательства этого признака мы не приводим. Читатели легко проведут его сами.

**П р и з н а к 2.** Если функция  $f(x_1, x_2, \dots, x_n, \lambda)$  ( $n \geq 2$ ) непрерывна по всем своим аргументам везде, за исключением

гладкой непрерывной по  $\lambda$  линии:

$$x_1 = a_1(\lambda), \quad x_2 = a_2(\lambda), \quad \dots, \quad x_n = a_n(\lambda), \quad (\text{VII.3})$$

$$a \leq \lambda \leq b,$$

и в окрестности этой линии удовлетворяет неравенству

$$|f(x_1, x_2, \dots, x_n, \lambda)| \leq A\rho^{-n+\varepsilon},$$

где

$$\rho = \min_{a \leq \lambda \leq b} \sqrt{\sum_{i=1}^n [x_i - a_i(\lambda)]^2}, \quad \varepsilon > 0,$$

и если область  $D$  ограничена, то условие (б) выполнено.

Выделим из  $(n+1)$ -мерной области

$$\begin{cases} D, \\ a \leq \lambda \leq b \end{cases}$$

линию (VII.3) с помощью области  $\sigma_0$ , в точках которой  $\rho < \rho_0$ , где  $\rho_0$  — постоянная. Интеграл

$$\int \dots \int_{\substack{D \\ a \leq \lambda \leq b}} |f(x_1, x_2, \dots, x_n, \lambda)| dx_1 \dots dx_n d\lambda \quad (\text{VII.4})$$

будет сходящимся, если существует предел интеграла

$$\int \dots \int_{\substack{D \\ a \leq \lambda \leq b}} |f(x_1, x_2, \dots, x_n, \lambda)| dx_1 \dots dx_n d\lambda \quad \text{при } \rho_0 \rightarrow 0.$$

Этот предел существует, если при  $\rho_0 \rightarrow 0$  интеграл

$$\int \dots \int_{\sigma_0} |f(x_1, x_2, \dots, x_n, \lambda)| dx_1 \dots dx_n d\lambda$$

стремится к нулю равномерно относительно  $\lambda$ .

Мы имеем:

$$\begin{aligned} \int \dots \int_{\sigma_0} |f(x_1, x_2, \dots, x_n, \lambda)| dx_1 dx_2 \dots dx_n d\lambda &\leq \\ &\leq \int_a^b d\lambda \int \dots \int_{0 < \rho \leq \rho_0} A\rho^{-n+\varepsilon} dx_1 \dots dx_n. \end{aligned}$$

Но

$$\int \dots \int_{0 < \rho \leq \rho_0} \rho^{-n+\varepsilon} dx_1 \dots dx_n = c_n \rho_0^\varepsilon;$$

отсюда ясна сходимость исследуемого интеграла, а также равномерная по параметру  $\lambda$  сходимость интеграла

$$\int_D \dots \int f(x_1, \dots, x_n, \lambda) dx_1 \dots dx_n.$$

**П р и з н а к 3.** Если область  $D$  не ограничена, то, кроме особенности, рассмотренной в признаке 2, нужно оценить поведение функции на бесконечности.

Сходимость интеграла (VII.4) обеспечена, если

$$|f(x_1, x_2, \dots, x_n, \lambda)| \leq A r^{-n-\varepsilon},$$

где

$$\varepsilon > 0 \text{ и } r = \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2}.$$

Читатель легко докажет справедливость этого признака.

---

## ЛЕКЦИЯ VIII

### УРАВНЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ТЕПЛА

#### § 1. Фундаментальное решение

После того как мы рассмотрели некоторые задачи для уравнений с двумя независимыми переменными, мы переходим к уравнениям со многими независимыми переменными.

Рассмотрим прежде всего уравнение

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = \frac{1}{a^2} \frac{\partial u}{\partial t} + f(x, y, z, t), \quad (\text{VIII.1})$$

определяющее температуру в точках некоторого однородного изотропного тела.

Замена переменного  $t$  по формуле

$$t_1 = a^2 t$$

позволяет избавиться от коэффициента  $a^2$ . Поэтому мы будем при дальнейшем изложении считать  $a^2$  равным единице. Обозначая, как и прежде, сумму вторых частных производных через  $\Delta u$ , запишем уравнение распространения тепла в виде

$$\Delta u = \frac{\partial u}{\partial t} + f(x, y, z, t). \quad (\text{VIII.1}')$$

Это уравнение мы и будем решать.

Мы рассмотрим здесь задачу о распространении тепла в неограниченной среде.

Будем решать для уравнения (VIII.1') задачу Коши, т. е. задачу об интегрировании уравнения (VIII.1') при начальном условии

$$u|_{t=0} = \varphi(x, y, z). \quad (\text{VIII.2})$$

Это условие, как мы указывали в лекции II, означает, что в начальный момент времени распределение температур в теле известно,

При этом существенную роль будет играть одно частное решение однородного уравнения теплопроводности, называемое *фундаментальным*.

Рассмотрим функцию

$$v = \frac{1}{8\pi^{\frac{3}{2}} (t_0 - t)^{\frac{3}{2}}} e^{-\frac{r^2}{4(t_0 - t)}}, \quad (\text{VIII.3})$$

где

$$r = \sqrt{(x_0 - x)^2 + (y_0 - y)^2 + (z_0 - z)^2}.$$

Докажем несколько лемм относительно этой функции.

**Л е м м а 1.** *Функция  $v$  удовлетворяет уравнению*

$$\Delta_0 v - \frac{\partial v}{\partial t_0} = 0, \quad \Delta v + \frac{\partial v}{\partial t} = 0. \quad (\text{VIII.4})$$

(Здесь  $\Delta_0 v$  обозначает  $\frac{\partial^2 v}{\partial x_0^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial y_0^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial z_0^2}$ .)

В самом деле, дифференцирование дает

$$\frac{\partial^2 v}{\partial x_0^2} = -\frac{1}{16\pi^{\frac{3}{2}} (t_0 - t)^{\frac{5}{2}}} e^{-\frac{r^2}{4(t_0 - t)}} + \frac{(x_0 - x)^2}{32\pi^{\frac{3}{2}} (t_0 - t)^{\frac{7}{2}}} e^{-\frac{r^2}{4(t_0 - t)}},$$

и аналогичные выражения для производных по  $y_0$  и  $z_0$ , откуда

$$\Delta_0 v = \left( \frac{-3}{16\pi^{\frac{3}{2}} (t_0 - t)^{\frac{5}{2}}} + \frac{r^2}{32\pi^{\frac{3}{2}} (t_0 - t)^{\frac{7}{2}}} \right) e^{-\frac{r^2}{4(t_0 - t)}},$$

и далее

$$\frac{\partial v}{\partial t_0} = \left( \frac{-3}{16\pi^{\frac{3}{2}} (t_0 - t)^{\frac{5}{2}}} + \frac{r^2}{32\pi^{\frac{3}{2}} (t_0 - t)^{\frac{7}{2}}} \right) e^{-\frac{r^2}{4(t_0 - t)}},$$

что доказывает выполнение первого из уравнений (VIII.4). Второе получается из первого, если заметить, что функция зависит только от разностей  $(x_0 - x)$ ,  $(y_0 - y)$ ,  $(z_0 - z)$ ,  $(t_0 - t)$ , и, значит,

$$\frac{\partial^2 v}{\partial x_0^2} = \frac{\partial^2 v}{\partial x^2}, \quad \frac{\partial v}{\partial t_0} = -\frac{\partial v}{\partial t}.$$

**Л е м м а 2.** *При  $t_0 > t$  имеет место равенство*

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} v \, dx \, dy \, dz = 1.$$

В самом деле, вводя полярные координаты  $r$ ,  $\theta$  и  $\varphi$ , пользуясь симметрией  $v$  и интегрируя по частям, получим:

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} v \, dx \, dy \, dz &= \int_0^{\infty} r^2 \, dr \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi} v \sin \theta \, d\theta \, d\varphi = \\ &= \int_0^{\infty} \frac{r^2}{2\pi^{\frac{1}{2}} (t_0 - t)^{\frac{3}{2}}} e^{-\frac{r^2}{4(t_0 - t)}} \, dr = \frac{-1}{\pi^{\frac{1}{2}} (t_0 - t)^{\frac{3}{2}}} \int_0^{\infty} r \, d(e^{-\frac{r^2}{4(t_0 - t)}}) = \\ &= \frac{1}{\pi^{\frac{1}{2}} (t_0 - t)^{\frac{3}{2}}} \int_0^{\infty} e^{-\frac{r^2}{4(t_0 - t)}} \, dr = \frac{1}{\pi^{\frac{1}{2}}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{r^2}{4(t_0 - t)}} d\frac{r}{2(t_0 - t)^{\frac{1}{2}}} = \\ &= \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-z^2} \, dz. \end{aligned}$$

На основании хорошо известной формулы имеем:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-z^2} \, dz = \sqrt{\pi}, \quad (\text{VIII.5})$$

откуда и вытекает наша лемма <sup>1)</sup>.

**Л е м м а 3.** Рассмотрим интеграл, взятый по какой-либо конечной области  $\Omega$ :

$$f(t_0 - t, x_0, y_0, z_0) = \iiint_{\Omega} v \, dx \, dy \, dz.$$

При  $t_0 - t \rightarrow 0$  этот интеграл стремится к единице, если точка  $(x_0, y_0, z_0)$  лежит внутри области  $\Omega$ , и к нулю, если точка  $(x_0, y_0, z_0)$  лежит вне этой области.

Сделаем замену независимых переменных, полагая

$$x - x_0 = \sqrt{t_0 - t} x_1; \quad y - y_0 = \sqrt{t_0 - t} y_1; \quad z - z_0 = \sqrt{t_0 - t} z_1.$$

<sup>1)</sup> Доказательство формулы (VIII.5) можно, например, провести так:

$$\begin{aligned} \left( \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-z^2} \, dz \right)^2 &= \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} \, dx \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-y^2} \, dy = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-(x^2 + y^2)} \, dx \, dy = \\ &= \int_0^{\infty} r e^{-r^2} \, dr \int_0^{2\pi} d\theta = \pi \int_0^{\infty} e^{-r^2} d(r^2) = -\pi e^{-r^2} \Big|_0^{\infty} = \pi. \end{aligned}$$

Следовательно:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-z^2} \, dz = \sqrt{\pi}.$$

При этом

$$f(t_0 - t, x_0, y_0, z_0) = \frac{1}{8\pi^{\frac{3}{2}}} \iiint_{\Omega_1} e^{-\frac{x_1^2 + y_1^2 + z_1^2}{4}} dx_1 dy_1 dz_1,$$

где область интегрирования  $\Omega_1$  в переменных  $x_1, y_1, z_1$  получается из области  $\Omega$  переменных  $x, y, z$  преобразованием подобия с коэффициентом подобия  $\frac{1}{\sqrt{t_0 - t}}$  из вершины  $(x_0, y_0, z_0)$  с последующим переносом начала координат в точку  $(x_0, y_0, z_0)$ . При стремлении  $t_0 - t$  к нулю эта область будет неограниченно расширяться. Если точка  $(x_0, y_0, z_0)$  лежит внутри области  $\Omega$ , то область  $\Omega_1$  будет расширяться во все стороны, в пределе охватывая все пространство. На основании предыдущей леммы заключаем, что в этом случае предел интеграла  $f(t_0 - t, x_0, y_0, z_0)$  будет равен единице.

Если, наоборот, точка  $(x_0, y_0, z_0)$  лежит вне области  $\Omega$ , то область  $\Omega_1$  при  $t_0 - t \rightarrow 0$  будет расширяться, удаляясь при этом от начала координат так, что расстояние от нее до начала координат в системе  $x_1, y_1, z_1$  будет возрастать неограниченно. В силу сходимости интеграла от  $v$  по бесконечному пространству, установленной в предыдущей лемме, предел интеграла  $f(t_0 - t, x_0, y_0, z_0)$  в этом случае равен нулю. Лемма доказана.

**Л е м м а 4.** Пусть  $F(x, y, z)$  — произвольная непрерывная и ограниченная в некоторой области  $\Omega$  функция (в частности,  $\Omega$  может совпадать со всем пространством). Тогда

$$\lim_{\xi \rightarrow 0} \frac{1}{8\pi^{\frac{3}{2}} \xi^{\frac{3}{2}}} \iiint_{\Omega} e^{-\frac{r^2}{4\xi}} F(x, y, z) dx dy dz = F(x_0, y_0, z_0), \quad (\text{VIII.6})$$

если точка  $(x_0, y_0, z_0)$  принадлежит области  $\Omega$ . В формуле (VIII.6) стремление к пределу равномерное по отношению к  $(x_0, y_0, z_0)$  во всякой конечной области  $\Omega_1$ , лежащей внутри  $\Omega$  вместе со своей границей. Здесь предполагается, что  $\xi$  стремится к нулю, оставаясь положительным.

Для доказательства составим разность

$$\begin{aligned} & \frac{1}{8\pi^{\frac{3}{2}} \xi^{\frac{3}{2}}} \iiint_{\Omega} e^{-\frac{r^2}{4\xi}} F(x, y, z) dx dy dz - \\ & - F(x_0, y_0, z_0) \frac{1}{8\pi^{\frac{3}{2}} \xi^{\frac{3}{2}}} \iiint_{\Omega} e^{-\frac{r^2}{4\xi}} dx dy dz = \\ & = \frac{1}{8\pi^{\frac{3}{2}} \xi^{\frac{3}{2}}} \iiint_{\Omega} e^{-\frac{r^2}{4\xi}} [F(x, y, z) - F(x_0, y_0, z_0)] dx dy dz. \quad (\text{VIII.7}) \end{aligned}$$

Второй член этой разности стремится к  $F(x_0, y_0, z_0)$  в силу леммы 3 и притом равномерно. Для того чтобы доказать лемму 4, достаточно показать, что эта разность во всякой области  $\Omega_1(x_0, y_0, z_0)$  равномерно стремится к нулю при  $\xi \rightarrow 0$ .

Выделим точку  $(x_0, y_0, z_0)$  шаром малого радиуса  $\delta$ . Пусть  $\delta$  достаточно мало, так что при  $r \leq \delta$

$$|F(x, y, z) - F(x_0, y_0, z_0)| < \frac{\varepsilon}{2},$$

причем это неравенство выполняется равномерно для всех точек  $(x_0, y_0, z_0)$  области  $\Omega_1$ .

Оценим разность (VIII.7), разбив интеграл в правой части на два слагаемых, соответственно распространенных на шар  $r \leq \delta$  и на его внешность. Мы получим:

$$\begin{aligned} \iiint_{\Omega} v [F(x, y, z) - F(x_0, y_0, z_0)] dx dy dz = \\ = \iiint_{r \leq \delta} v [F(x, y, z) - F(x_0, y_0, z_0)] dx dy dz + \\ + \iiint_{r \geq \delta} v [F(x, y, z) - F(x_0, y_0, z_0)] dx dy dz. \quad (\text{VIII.8}) \end{aligned}$$

Оценим первый из интегралов, входящих в (VIII.8):

$$\begin{aligned} \left| \iiint_{r \leq \delta} v [F(x, y, z) - F(x_0, y_0, z_0)] dx dy dz \right| \leq \\ \leq \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\varepsilon}{2} v dx dy dz = \frac{\varepsilon}{2}. \end{aligned}$$

Далее, в силу ограниченности  $F$  существует такая постоянная  $M$ , что

$$|F| \leq M,$$

и, следовательно,

$$\begin{aligned} \left| \frac{1}{8\pi^{\frac{3}{2}} \xi^{\frac{3}{2}}} \iiint_{r \geq \delta} e^{-\frac{r^2}{4\xi}} [F(x, y, z) - F(x_0, y_0, z_0)] dx dy dz \right| \leq \\ \leq \frac{2M}{8\pi^{\frac{3}{2}} \xi^{\frac{3}{2}}} \iiint_{r \geq \delta} e^{-\frac{r^2}{4\xi}} dx dy dz, \end{aligned}$$

Заменяя переменные в последнем интеграле, полагаем  $x = \sqrt{\xi} x_1$ ,  $y = \sqrt{\xi} y_1$ ,  $z = \sqrt{\xi} z_1$ ; тогда  $r_1^2 = \frac{r^2}{\xi}$ , и мы имеем:

$$\frac{2M}{8\pi^{\frac{3}{2}}} \int_{r_1 \geq \frac{\delta}{\sqrt{\xi}}} \int \int e^{-\frac{r_1^2}{4}} dx_1 dy_1 dz_1 = \frac{M}{\sqrt{\pi}} \int_{\frac{\delta}{\sqrt{\xi}}}^{\infty} r_1^2 e^{-\frac{r_1^2}{4}} dr_1.$$

При достаточно малом  $\xi$  этот интеграл меньше, чем  $\frac{\varepsilon}{2}$ , в силу сходимости интеграла

$$\int_0^{\infty} r_1^2 e^{-\frac{r_1^2}{4}} dr_1.$$

Отсюда и следует наша лемма.

З а м е ч а н и е. Вместо интеграла (VIII.6) можно рассмотреть более общий интеграл:

$$\Phi(x_0, y_0, z_0, \xi) = \frac{1}{8\pi^{\frac{3}{2}} \xi^{\frac{3}{2}}} \int \int \int_{\Omega} e^{-\frac{r^2}{4\xi}} F(x, y, z, \xi) dx dy dz, \quad (\text{VIII.9})$$

в котором подынтегральная функция  $F(x, y, z, \xi)$  зависит от параметра  $\xi$ , непрерывна и ограничена при положительных значениях  $\xi$ :

$$|F(x, y, z, \xi)| < M.$$

Пусть

$$\lim_{\xi \rightarrow +0} F(x, y, z, \xi) = F(x, y, z), \quad (\text{VIII.10})$$

причем  $F(x, y, z, \xi)$  стремится к  $F(x, y, z)$  равномерно в любой ограниченной области  $\Omega_1$ , лежащей вместе с границей внутри  $\Omega$ . Тогда

$$\lim_{\xi \rightarrow +0} \Phi(x_0, y_0, z_0, \xi) = F(x_0, y_0, z_0)$$

во всякой внутренней точке  $(x_0, y_0, z_0)$ .

В самом деле, рассмотрим разность

$$\begin{aligned} \Phi(x_0, y_0, z_0, \xi) - \frac{1}{8\pi^{\frac{3}{2}} \xi^{\frac{3}{2}}} \int \int \int_{\Omega} e^{-\frac{r^2}{4\xi}} F(x, y, z) dx dy dz = \\ = \frac{1}{8\pi^{\frac{3}{2}} \xi^{\frac{3}{2}}} \int \int \int_{\Omega} e^{-\frac{r^2}{4\xi}} [F(x, y, z, \xi) - F(x, y, z)] dx dy dz. \end{aligned}$$

Разбивая этот интеграл на две части — на интеграл по шару  $(x-x_0)^2+(y-y_0)^2+(z-z_0)^2 \leq \delta$ , который мы обозначим через  $\sigma$ , и интеграл по внешности этого шара, получим при достаточно малом  $\xi$ :

$$\left| -\frac{1}{8\pi^{\frac{3}{2}}\xi^{\frac{3}{2}}} \int \int \int_{\sigma} e^{-\frac{r^2}{4\xi}} [F(x, y, z, \xi) - F(x, y, z)] dx dy dz \right| \leq \\ \leq \varepsilon \frac{1}{8\pi^{\frac{3}{2}}\xi^{\frac{3}{2}}} \int \int \int_{\sigma} e^{-\frac{r^2}{4\xi}} dx dy dz < \varepsilon,$$

где  $\varepsilon$  — любое наперед заданное положительное число.

Далее,

$$\left| -\frac{1}{8\pi^{\frac{3}{2}}\xi^{\frac{3}{2}}} \int \int \int_{\Omega-\sigma} e^{-\frac{r^2}{4\xi}} [F(x, y, z, \xi) - F(x, y, z)] dx dy dz \right| \leq \\ \leq \frac{M}{4\pi^{\frac{3}{2}}\xi^{\frac{3}{2}}} \int \int \int_{\Omega-\sigma} e^{-\frac{r^2}{4\xi}} dx dy dz.$$

Последнее выражение стремится к нулю (см. оценку в лемме 4). Следовательно,

$$\lim_{\xi \rightarrow +0} \Phi(x_0, y_0, z_0, \xi) = \lim_{\xi \rightarrow +0} \left[ \frac{1}{8\pi^{\frac{3}{2}}\xi^{\frac{3}{2}}} \int \int \int_{\Omega} e^{-\frac{r^2}{4\xi}} F(x, y, z) dx dy dz \right];$$

но последний предел в силу леммы 4 равен  $F(x_0, y_0, z_0)$ . Наше замечание доказано.

## § 2. Решение задачи Коши

Перейдем к решению уравнения (VIII.1'). Пусть при  $t > 0$  задана некоторая функция  $u$ , имеющая непрерывные производные до 2-го порядка включительно по пространственным координатам и производную 1-го порядка по времени. Пусть как  $u$ , так и ее первые производные ограничены во всем пространстве.

Применим формулу Грина (V.16) к функциям  $u, v$  для значений  $t$  из полуинтервала  $0 \leq t < t_0$ , причем за область интегрирования возьмем шар  $\Omega$ , ограниченный сферой  $S$ . Мы получим:

$$\int \int \int_{\Omega} (u \Delta v - v \Delta u) d\Omega = \int \int_S \left( v \frac{\partial u}{\partial n} - u \frac{\partial v}{\partial n} \right) dS. \quad (\text{VIII.11})$$

Далее, формула

$$\int_0^{t_0} \left\{ \iiint_{\Omega} \left( u \frac{\partial v}{\partial t} + v \frac{\partial u}{\partial t} \right) d\Omega \right\} dt = \left[ \iiint_{\Omega} uv d\Omega \right]_{+0}^{t_0-0},$$

как легко проверить, справедлива для любых функций  $u$  и  $v$ , обладающих тем свойством, что интегралы

$$\iiint_{\Omega} uv d\Omega \quad \text{и} \quad \iiint_{\Omega} \left( u \frac{\partial v}{\partial t} + v \frac{\partial u}{\partial t} \right) d\Omega$$

есть непрерывные функции  $t$  в промежутке  $0 < t < t_0$ .

Сопоставляя эту формулу с (VIII.11), получим:

$$\begin{aligned} \int_0^{t_0} \left\{ \iiint_{\Omega} \left[ u \left( \Delta v + \frac{\partial v}{\partial t} \right) - v \left( \Delta u - \frac{\partial u}{\partial t} \right) \right] d\Omega \right\} dt = \\ = \left[ \iiint_{\Omega} uv d\Omega \right]_{+0}^{t_0-0} + \int_0^{t_0} \left\{ \iint_S \left( v \frac{\partial u}{\partial n} - u \frac{\partial v}{\partial n} \right) dS \right\} dt. \quad (\text{VIII.12}) \end{aligned}$$

Подставляя в тождество (VIII.12), справедливое при любых  $u$  и  $v$ , вместо  $u$  искомое решение уравнения (VIII.1') и считая, что  $v$  есть частное решение уравнения теплопроводности, определенное формулой (VIII.3), мы в силу (VIII.2) и (VIII.4) будем иметь:

$$\begin{aligned} \int_0^{t_0} \left\{ \iint_S \left( v \frac{\partial u}{\partial n} - u \frac{\partial v}{\partial n} \right) dS \right\} dt + \left[ \iiint_{\Omega} uv d\Omega \right]_{+0}^{t_0-0} = \\ = - \int_0^{t_0} \left\{ \iiint_{\Omega} v f(x, y, z, t) d\Omega \right\} dt. \quad (\text{VIII.13}) \end{aligned}$$

Отметим, что интеграл вида:  $\int_0^{t_0} \left\{ \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} v F(x, y, z, t) d\Omega \right\} dt$

абсолютно сходится, если  $F(x, y, z, t)$  — непрерывная ограниченная функция. В самом деле,

$$\begin{aligned} \int_0^{t_0} \left\{ \iiint_{\Omega} |v F(x, y, z, t)| d\Omega \right\} dt \leq \\ \leq \int_0^{t_0} \left\{ \iiint_{\Omega} \max |F(x, y, z, t)| v d\Omega \right\} dt \leq \max |F(x, y, z, t)| t_0. \end{aligned}$$

Мы будем пока предполагать, что  $f(x, y, z, t)$  и  $\varphi(x, y, z)$  — непрерывные ограниченные функции.

Предположим еще, что решение  $u(x, y, z, t)$  при  $t \rightarrow t_0$  стремится к своим начальным значениям равномерно во всякой ограниченной области.

Перейдем к пределу в формуле (VIII.13), устремляя радиус шара  $\Omega$  к бесконечности. Интеграл по поверхности  $S$  при этом обратится в нуль, так как по предположению решение  $u$  таково, что как  $u$ , так и  $\frac{\partial u}{\partial n}$  ограничены, а  $e^{-\frac{r^2}{4t}}$  стремится к нулю быстрее любой степени  $r$  при  $r \rightarrow \infty$ .

Мы получим, очевидно:

$$\begin{aligned} \left[ \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} uv \, dx \, dy \, dz \right]_{+0}^{t_0-0} = \\ = - \int_0^{t_0} \left\{ \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} v f(x, y, z, t) \, dx \, dy \, dz \right\} dt. \end{aligned}$$

В силу замечания к лемме 4

$$\lim_{t \rightarrow t_0} \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} uv \, dx \, dy \, dz = u(x_0, y_0, z_0, t_0);$$

непрерывность этого интеграла при  $t = 0$  очевидна; поэтому

$$\begin{aligned} u(x_0, y_0, z_0, t_0) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(x, y, z) v \Big|_{t=0} dx \, dy \, dz - \\ - \int_0^{t_0} \left\{ \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} v f(x, y, z, t) \, dx \, dy \, dz \right\} dt. \quad (\text{VIII.14}) \end{aligned}$$

Формула (VIII.14) дает выражение для решения нашей задачи. При выводе этой формулы мы предполагали, что решение задачи существует. Поэтому нам необходимо проверить, будет ли функция  $u$ , определяемая формулой (VIII.14), в самом деле удовлетворять уравнению (VIII.2) и начальному условию.

Полезно заметить, что уравнение (VIII.2), решенное нами для  $t > 0$ , при начальном условии, заданном для  $t = 0$ , может совсем не иметь решения для  $t < 0$ . Во всяком случае решение (VIII.14), вообще говоря, при этом перестанет иметь смысл.

Переходя к доказательству, установим сначала, что функция  $u$ , заданная формулой (VIII.14), имеет непрерывные производные до

некоторого определенного порядка. В самом деле, заменяя переменные интегрирования:

$$\xi = x - x_0, \quad \eta = y - y_0, \quad \zeta = z - z_0, \quad \tau = t_0 - t,$$

формулу (VIII.14) можно переписать так:

$$\begin{aligned} u(x_0, y_0, z_0, t_0) = & \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} v(\xi, \eta, \zeta, t_0) \varphi(x_0 + \xi, y_0 + \eta, z_0 + \zeta) d\xi d\eta d\zeta - \\ & - \int_0^{t_0} \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} v(\xi, \eta, \zeta, \tau) f(x_0 + \xi, y_0 + \eta, z_0 + \zeta, t_0 - \tau) d\xi d\eta d\zeta d\tau, \end{aligned}$$

где

$$v(\xi, \eta, \zeta, \tau) = \frac{1}{8\pi^{\frac{3}{2}} \tau^{\frac{3}{2}}} e^{-\frac{\xi^2 + \eta^2 + \zeta^2}{4\tau}}.$$

Эту формулу, как доказывается в курсах анализа, можно дифференцировать по параметрам по крайней мере столько же раз, сколько ограниченных производных имеют функции  $f$  и  $\varphi$ , ибо интегралы от производных подинтегральной функции сходятся равномерно. Мы будем предполагать, что функции  $f$  и  $\varphi$  обладают необходимым числом непрерывных, ограниченных производных.

При  $f(x, y, z, t) = 0$  формула (VIII.14) дает:

$$\begin{aligned} u_1(x_0, y_0, z_0, t_0) = & \frac{1}{8\pi^{\frac{3}{2}}} \frac{1}{t_0^{\frac{3}{2}}} \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{r^2}{4t_0}} \varphi(x, y, z) dx dy dz, \quad (\text{VIII.15}) \end{aligned}$$

где через  $u_1$  обозначено решение уравнения

$$\Delta_0 u_1 - \frac{\partial u_1}{\partial t_0} = 0,$$

удовлетворяющее условию

$$u_1|_{t_0=0} = \varphi(x_0, y_0, z_0).$$

Из леммы 4 следует, что правая часть есть функция, которая равномерно во всякой ограниченной области стремится к  $\varphi(x_0, y_0, z_0)$  при  $t_0 \rightarrow 0$ . Кроме того, нетрудно убедиться, что интеграл этот можно сколько угодно раз дифференцировать

по переменным  $x_0, y_0, z_0, t_0$ , если только  $t_0 > 0$ . Получим:

$$\Delta_0 u_1(x_0, y_0, z_0, t_0) - \frac{\partial u_1(x_0, y_0, z_0, t_0)}{\partial t_0} = \\ = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \left( \Delta_0 v - \frac{\partial v}{\partial t_0} \right) \varphi(x, y, z) dx dy dz. \quad (\text{VIII.16})$$

На основании леммы 1 из л. VIII видим, что  $u_1(x_0, y_0, z_0, t_0)$  удовлетворяет уравнению (VIII.1') при  $f(x_0, y_0, z_0, t_0) = 0$ , что и требовалось доказать. Единственность ограниченного гладкого решения, т. е. решения, обладающего нужным числом непрерывных производных, вытекает прямо из тех рассуждений, которые привели нас к формуле (VIII.14). Так, формула (VIII.14) при  $f = 0$  дает решение задачи.

Остается показать, что второе слагаемое в формуле (VIII.14), то есть функция

$$u_2(x_0, y_0, z_0, t_0) = - \int_0^{t_0} \left\{ \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} v f(x, y, z, t) dx dy dz \right\} dt,$$

удовлетворяет уравнению (VIII.1) и условию  $u_2|_{t_0=0} = 0$ . Отсюда будет следовать, что функция  $u$  удовлетворяет уравнению (VIII.1) и начальному условию (VIII.2).

Введем вспомогательную функцию  $w$ , определив ее при  $t_0 > t$  равенством

$$w(x_0, y_0, z_0, t_0, t) = - \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} v f(x, y, z, t) dx dy dz. \quad (\text{VIII.17})$$

Функция  $w(x_0, y_0, z_0, t_0, t)$  удовлетворяет уравнению

$$\Delta_0 w - \frac{\partial w}{\partial t_0} = 0 \quad (\text{VIII.18})$$

и условию

$$w|_{t=t_0} = -f(x_0, y_0, z_0, t_0).$$

Функция  $u_2(x_0, y_0, z_0, t_0)$  может быть выражена через  $w$  соотношением

$$u_2(x_0, y_0, z_0, t_0) = \int_0^{t_0} w(x_0, y_0, z_0, t_0, t) dt.$$

По построению очевидно, что

$$u_2(x_0, y_0, z_0, 0) = 0.$$

Составим выражение

$$\Delta_0 u_2 - \frac{\partial u_2}{\partial t_0}. \quad (\text{VIII.19})$$

Дифференцируя  $u_2$  под знаком интеграла по  $x_0, y_0, z_0$ , получим:

$$\Delta_0 u_2 = \int_0^{t_0} \Delta_0 w(x_0, y_0, z_0, t_0, t) dt.$$

Далее,

$$\frac{\partial u_2}{\partial t_0} = w(x_0, y_0, z_0, t_0, t)|_{t=t_0} + \int_0^{t_0} \frac{\partial w(x_0, y_0, z_0, t_0, t)}{\partial t_0} dt,$$

откуда

$$\Delta_0 u_2 - \frac{\partial u_2}{\partial t_0} = f(x_0, y_0, z_0, t_0),$$

что и требовалось доказать.

Вопрос о корректности постановки рассмотренной задачи Коши сразу решается анализом формулы (VIII.14).

Очевидно, что малые изменения  $\varphi$  или  $f$  мало влияют на решение.

Имеет место непрерывная зависимость порядка  $(0,0)$  (см. лекцию II, § 2).

Пока что отметим одно важное обстоятельство.

Если свободный член уравнения (VIII.1) равен нулю (это означает отсутствие источников тепла), то решение задачи Коши, рассмотренное нами, есть функция, непрерывно дифференцируемая сколько угодно раз по  $x_0, y_0, z_0$ , вне зависимости от того, будет ли иметь производные функции  $\varphi$  или нет.

Эта гладкость решений существенно отличает уравнение распространения тепла, например, от уравнения колебаний струны, а значит, и от волнового уравнения.

В самом деле, уже решение Даламбера

$$u = \varphi(x - at)$$

уравнения колебаний струны может быть не дифференцируемо более двух раз по  $x$  и  $t$ . Эта же функция является решением и волнового уравнения с двумя и тремя независимыми переменными, так как, очевидно,  $\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = 0$ . Следовательно, решения этих уравнений также не более гладки, чем начальные условия.

Мы разобрали решение уравнения (VIII.1') в пространстве трех измерений. Совершенно аналогично можно было бы рассмотреть уравнение

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = \frac{\partial u}{\partial t} + f(x, y, t) \quad (\text{VIII.20})$$

или

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \frac{\partial u}{\partial t} + f(x, t). \quad (\text{VIII.21})$$

Не останавливаясь на рассуждениях, которые в этих случаях полностью совпадают с рассуждениями для трехмерного случая, мы приведем окончательные результаты.

Для уравнения (VIII.20) основное (фундаментальное) решение будет иметь вид:

$$v = \frac{1}{4\pi(t_0 - t)} e^{-\frac{r^2}{t_0 - t}}, \quad (\text{VIII.22})$$

где  $r^2 = (x - x_0)^2 + (y - y_0)^2$ , и решение уравнения (VIII.20) при условии

$$u|_{t=0} = \Phi(x, y)$$

имеет вид:

$$\begin{aligned} u(x_0, y_0, t_0) = & \frac{1}{4\pi t_0} \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{r^2}{4t_0}} \Phi(x, y) dx dy - \\ & - \frac{1}{4\pi} \int_0^{t_0} \left\{ \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{t_0 - t} e^{-\frac{r^2}{4(t_0 - t)}} f(x, y, z) dx dy \right\} dt. \end{aligned} \quad (\text{VIII.23})$$

Точно так же для уравнения (VIII.21) основное решение будет иметь вид:

$$v = \frac{1}{2\sqrt{\pi} \sqrt{t_0 - t}} e^{-\frac{(x - x_0)^2}{4(t_0 - t)}},$$

а решение уравнения (VIII.21) при условии  $u|_{t=0} = \Phi(x)$  будет иметь вид:

$$\begin{aligned} u(x_0, t_0) = & \frac{1}{2\sqrt{\pi} \sqrt{t_0}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{(x - x_0)^2}{4t_0}} \Phi(x) dx - \\ & - \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^{t_0} \frac{1}{\sqrt{t_0 - t}} \left\{ \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{(x - x_0)^2}{4(t_0 - t)}} f(x, t) dx \right\} dt. \end{aligned} \quad (\text{VIII.24})$$

Проверить справедливость всех этих формул мы предоставляем читателю.

# ЛЕКЦИЯ IX

## УРАВНЕНИЯ ЛАПЛАСА И ПУАССОНА

### § 1. Теорема максимума

Мы видели, что целый ряд вопросов математической физики сводится к решению тех или иных уравнений эллиптического типа. Мы займемся сейчас простейшими такими уравнениями: *уравнением Лапласа*

$$\Delta u(x, y, z) = 0 \quad (\text{IX.1})$$

*и уравнением Пуассона*

$$\Delta u(x, y, z) = -4\pi\rho(x, y, z). \quad (\text{IX.2})$$

Всякая функция, имеющая непрерывные вторые производные и удовлетворяющая в некоторой области уравнению Лапласа, называется *гармонической функцией* в этой области.

Прежде чем переходить к решению задач, связанных с этими уравнениями, мы изучим некоторые общие свойства, которыми обладают решения этих уравнений.

Справедлива следующая лемма.

**Л е м м а 1.** *Если функция  $\rho(x, y, z)$  положительна в точке  $(x_0, y_0, z_0)$ , лежащей внутри области, где определено уравнение (IX.2), то решение этого уравнения не может достигать минимума в этой точке.*

В самом деле, если бы в этой точке функция  $u(x, y, z)$ , удовлетворяющая уравнению (IX.2), достигала бы минимума, то  $u(x, y, z)$  достигала бы минимума в этой точке по каждому переменному в отдельности.

Но тогда все первые производные от  $u$  должны были бы быть равными нулю в этой точке, а вторые производные по каждому переменному — неотрицательными. Следовательно, сумма вторых производных должна была бы быть также неотрицательной, что противоречит условию

$$\rho(x_0, y_0, z_0) > 0.$$

Лемма доказана.

**С л е д с т в и е.** Если  $\rho(x, y, z)$  отрицательна в точке  $(x_0, y_0, z_0)$ , то и  $(x, y, z)$  в этой точке не может достигать максимума.

Доказывается переменной знака  $\rho$  и  $u$ .

**Т е о р е м а 1.** Гармоническая функция, заданная в некоторой области  $\Omega$  и непрерывная вплоть до границы  $S$ , нигде внутри  $\Omega$  не может принимать значений больших, чем наибольшее ее значение на границе, или меньших, чем наименьшее ее значение на границе.

В самом деле, пусть

$$u(x_0, y_0, z_0) > u_S + \varepsilon,$$

где  $u_S$  есть значение  $u$  в произвольной точке границы области.

Тогда функция

$$v = u + \eta r^2,$$

где  $r^2 = (x-x_0)^2 + (y-y_0)^2 + (z-z_0)^2$ , а  $\eta$  — некоторая положительная постоянная, будет при достаточно малом  $\eta$  принимать в точке  $(x_0, y_0, z_0)$  значение все еще большее, чем  $\max v_S$ .

В самом деле,  $v(x_0, y_0, z_0) = u(x_0, y_0, z_0)$  и по предположению  $u(x_0, y_0, z_0) > u_S + \varepsilon = v_S + \varepsilon - \eta r^2$ . Выбрав  $\eta$  настолько малым, чтобы иметь во всей области  $\Omega$

$$\varepsilon - \eta r^2 > \frac{\varepsilon}{2},$$

мы получим:

$$v(x_0, y_0, z_0) > v_S + \frac{\varepsilon}{2}.$$

Следовательно,  $v$  будет достигать максимума где-то внутри области. Но

$$\Delta v = 6\eta.$$

Это противоречит лемме 1.

Вторая часть теоремы доказывается заменой  $u$  на  $-u$ .

Позднее мы убедимся, что гармоническая функция, принимающая внутри области значение, равное ее максимальному или минимальному значению на границе, есть постоянная.

**С л е д с т в и е 1.** Гармоническая функция, равная нулю на границе некоторой конечной области, тождественно равна нулю во всей области.

Отсюда вытекает, что две гармонические функции, принимающие одинаковые значения в точках границы области, совпадают и всюду внутри области. В самом деле, их разность есть гармоническая функция, равная нулю на границе и, следовательно, тождественно равная нулю во всей области.

**С л е д с т в и е 2.** Если последовательность функций  $u_n$ , гармонических в области  $\Omega$  и непрерывных вплоть до границы, сходится

равномерно на границе  $S$  этой области, то она сходится равномерно во всей замкнутой области.

Это вытекает из того, что разность

$$|u_{n_1} - u_{n_2}|, \text{ где } n_1 > N \text{ и } n_2 > N,$$

будучи сколь угодно малой на границе (при достаточно большом  $N$ ), будет малой и внутри. Признак Коши дает нам равномерную сходимость  $u_n$  во всей замкнутой области, что и требовалось доказать.

## § 2. Фундаментальное решение. Формула Грина

Для того чтобы исследовать более глубоко свойства гармонических функций, докажем еще несколько вспомогательных лемм.

**Л е м м а 2. Функция**

$$\frac{1}{r} = \frac{1}{\sqrt{(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2 + (z-z_0)^2}}$$

удовлетворяет уравнению Лапласа

$$\Delta \frac{1}{r} = 0 \quad (\text{IX.3})$$

везде, кроме точки  $x = x_0$ ,  $y = y_0$ ,  $z = z_0$ , где  $\frac{1}{r}$  обращается в бесконечность.

В самом деле,

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 \frac{1}{r}}{\partial x^2} &= -\frac{1}{r^3} + \frac{3(x-x_0)^2}{r^5}, \\ \frac{\partial^2 \frac{1}{r}}{\partial y^2} &= -\frac{1}{r^3} + \frac{3(y-y_0)^2}{r^5}, \\ \frac{\partial^2 \frac{1}{r}}{\partial z^2} &= -\frac{1}{r^3} + \frac{3(z-z_0)^2}{r^5}, \end{aligned}$$

откуда и вытекает (IX.3).

**Л е м м а 3.** Если функция  $u$  непрерывна, имеет непрерывные производные 1-го и 2-го порядков везде в области  $\Omega$ , причем первые производные непрерывны вплоть до границы, а вторые производные непрерывны внутри области, то имеет место формула:

$$\iiint_{\Omega} \frac{1}{r} \Delta u d\Omega = \iint_S \left( u \frac{\partial \frac{1}{r}}{\partial n} - \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial n} \right) dS - 4\pi u(x_0, y_0, z_0). \quad (\text{IX.4})$$

Здесь  $\frac{\partial}{\partial n}$ , как обычно, обозначает производную по внутренней нормали к поверхности  $S$ . Граница  $S$  области  $\Omega$  удовлетворяет

условиям § 1 лекции I, то есть является кусочно-гладкой и пересекается с любой прямой, параллельной какой-либо из осей координат, или в конечном числе точек или по конечному числу целых отрезков.

Будем сначала предполагать, что  $u$  всюду, вплоть до границы  $S$  области  $\Omega$ , имеет непрерывные производные 2-го порядка. Для доказательства вырежем из области  $\Omega$  шар  $\omega$  радиуса  $\varepsilon$  с центром в точке  $(x_0, y_0, z_0)$  и применим к оставшейся области формулу Грина. Тогда

$$\begin{aligned} \iint_{\Omega} \frac{1}{r} \Delta u \, d\Omega &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \iint_{\Omega} \iint_{\omega} \frac{1}{r} \Delta u \, d\Omega = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \iint_{\Omega} \iint_{\omega} \left( \frac{1}{r} \Delta u - u \Delta \frac{1}{r} \right) d\Omega = \\ &= \iint_S \left( u \frac{\partial \frac{1}{r}}{\partial n} - \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial n} \right) dS + \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \iint_{\sigma} \left( u \frac{\partial \frac{1}{r}}{\partial n} - \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial n} \right) dS, \quad (\text{IX.5}) \end{aligned}$$

где  $\sigma$  — поверхность шара  $\omega$ .

Нетрудно видеть, что на поверхности  $\sigma$

$$\frac{\partial \frac{1}{r}}{\partial n} = \frac{d \frac{1}{r}}{dr} = -\frac{1}{r^2} = -\frac{1}{\varepsilon^2},$$

и, следовательно,

$$\begin{aligned} \iint_{\sigma} u \frac{\partial \frac{1}{r}}{\partial n} dS &= -\frac{1}{\varepsilon^2} \iint_{\sigma} u dS = \\ &= -\frac{1}{\varepsilon^2} \iint_{\sigma} u(x_0, y_0, z_0) dS - \frac{1}{\varepsilon^2} \iint_{\sigma} \eta dS, \end{aligned}$$

где  $\eta$  равномерно в  $\omega$  стремится к нулю при  $\varepsilon \rightarrow 0$ :

$|\eta| < \delta(\varepsilon)$ , причем  $\delta(\varepsilon) \rightarrow 0$ , если  $\varepsilon \rightarrow 0$ ;

$$\iint_{\sigma} u(x_0, y_0, z_0) dS = 4\pi\varepsilon^2 u(x_0, y_0, z_0); \quad \left| \iint_{\sigma} \eta dS \right| \leq \delta(\varepsilon) 4\pi\varepsilon^2.$$

В силу ограниченности  $\frac{\partial u}{\partial n}$  имеем  $\left| \frac{\partial u}{\partial n} \right| < k$ , и, следовательно,

$$\left| \iint_{\sigma} \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial n} dS \right| \leq \frac{1}{\varepsilon} \iint_{\sigma} k dS \leq 4\pi k \varepsilon$$

и

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \iint_{\sigma} \left( \frac{\partial \frac{1}{r}}{\partial n} u - \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial n} \right) dS = -4\pi u(x_0, y_0, z_0).$$

Подставляя это выражение в (IX.5), получим требуемую формулу (IX.4).

Для того чтобы избавиться от предположения о том, что вторые производные от  $u$  непрерывны вплоть до границы, заменим область  $\Omega$  областью  $\Omega_1$ , лежащей вместе с границей внутри  $\Omega$ . Применяя сначала формулу (IX.4) к области  $\Omega_1$  и переходя затем к пределу при  $\Omega_1 \rightarrow \Omega$ , получим требуемый результат. Формула (IX.4) выведена в предположении, что точка  $(x_0, y_0, z_0)$  принадлежит области  $\Omega$ . Если же точка  $(x_0, y_0, z_0)$  лежит вне  $\Omega$ , то формула (IX.4) записывается так:

$$\iiint_{\Omega} \frac{1}{r} \Delta u \, d\Omega = \iint_S \left( u \frac{\partial}{\partial n} \frac{1}{r} - \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial n} \right) dS. \quad (\text{IX.6})$$

В этом легко убедиться, повторив весь вывод и заметив, что при этом не придется вводить интеграл по области  $\sigma$ . Название *формулы Грина* часто относят к формулам (IX.4) и (IX.6).

Весь вывод, проведенный нами, без труда переносится и на случай, когда в области имеется конечное число точек разрыва производных, удовлетворяющих условиям теоремы.

Легко заметить аналогию между формулой Грина (IX.4) и сходной формулой (VIII.14), выведенной нами для уравнения теплопроводности. Роль рассмотренного там фундаментального решения уравнения теплопередачи играет здесь функция  $\frac{1}{r}$ , которую называют *фундаментальным решением* уравнения Лапласа.

### § 3. Потенциалы объема, простого слоя и двойного слоя

Если бы нам были известны, из каких-либо соображений, значения  $u$ ,  $\Delta u$  и  $\frac{\partial u}{\partial n}$ , входящие в формулу Грина (IX.4):

$$\Delta u = -4\pi\rho, \quad \text{и} \quad \left. u \right|_S = f_1, \quad \left. \frac{\partial u}{\partial n} \right|_S = f_2,$$

то формула Грина дала бы нам явное представление для неизвестной функции  $u$ :

$u(x_0, y_0, z_0) =$

$$= \iiint_{\Omega} \frac{\rho}{r} \, dx \, dy \, dz + \frac{1}{4\pi} \iint_S \frac{\partial}{\partial n} \frac{1}{r} f_1 \, dS - \frac{1}{4\pi} \iint_S \frac{1}{r} f_2 \, dS. \quad (\text{IX.7})$$

Однако мы не можем задать произвольно  $f_1$  и  $f_2$ , и поэтому формула (IX.7) не дает возможности строить решение уравнения (IX.2) по произвольным предельным значениям на границе его самого и его нормальной производной, подобно тому, как мы

делали это при решении задачи о колебании струны. Мы дадим особые названия интегралам, стоящим в правой части этой формулы.

Интеграл  $\iiint_{\Omega} \frac{\rho}{r} dx dy dz$  мы будем называть *ньютоновым потенциалом*, а функцию  $\rho$  — *плотностью* этого потенциала. Аналогично  $\iint_S \frac{f_2}{r} dS$  мы назовем *потенциалом простого слоя* с плотностью  $f_2$ ,

а  $\iint_S f_1 \frac{\partial}{\partial n} \frac{1}{r} dS$  — *потенциалом двойного слоя* с плотностью  $f_1$ .

Ньютонов потенциал имеет очень простой физический смысл.

Представим себе некоторую массу, распределенную в объеме  $\Omega$  с плотностью  $\rho$ . Подсчитаем притяжение этой массой материальной точки. По закону Ньютона масса  $m$ , расположенная в точке  $(x, y, z)$ , притягивает единичную массу, расположенную в точке  $(x_0, y_0, z_0)$  с силой  $F$ , направленной к точке  $(x, y, z)$  и равной  $\frac{m}{r^2}$ . Иначе говоря,

$$F = \text{grad}_0 U, \text{ где } U = \frac{m}{r} = \frac{m}{\sqrt{(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2 + (z-z_0)^2}}.$$

Функция  $U$ , градиент которой равен притягивающей силе, называется *потенциалом силы тяжести*. Поэтому  $\frac{m}{r}$  можно называть ньютоновым потенциалом материальной точки  $(x, y, z)$  с массой  $m$ .

Разбивая весь объем  $\Omega$  на малые элементы и заменяя влияние массы  $\rho \Delta\Omega$ , сосредоточенной в каждом таком объеме, влиянием равной массы, сосредоточенной в некоторой средней точке, мы получим выражение для силы  $F$ , действующей на единичную массу, сосредоточенную в точке  $(x_0, y_0, z_0)$ , в виде

$$F = \sum \text{grad}_0 \frac{1}{r_{\xi}} \rho \Delta\Omega,$$

где  $\text{grad}_0 \frac{1}{r_{\xi}}$  является значением  $\text{grad}_0 \frac{1}{r}$  в некоторой средней точке объема  $\Delta\Omega$ .

Переходя к пределу, получим:

$$F = \iiint_{\Omega} \rho \text{grad}_0 \frac{1}{r} d\Omega, \quad F_y = \iiint_{\Omega} \rho \frac{y - y_0}{r^3} d\Omega, \\ F_x = \iiint_{\Omega} \rho \frac{x - x_0}{r^3} d\Omega, \quad F_z = \iiint_{\Omega} \rho \frac{z - z_0}{r^3} d\Omega.$$

Пусть  $\rho(x, y, z)$  — непрерывная функция. Величины  $F_x, F_y, F_z$  представляются равномерно сходящимися интегралами и в силу

теоремы § 2 (VII) суть производные соответственно по  $x_0, y_0, z_0$  от функции  $U = \iiint_{\Omega} \frac{\rho}{r} d\Omega$ , и, следовательно,

$$F = \text{grad}_0 U.$$

Таким образом,  $U$  оказывается потенциалом тяготения массы, распределенной с плотностью  $\rho$  в объеме  $\Omega$ .

Ту же интерпретацию допускает и потенциал простого слоя. Это есть потенциал тяготения масс, распределенных на поверхности  $S$ , создаваемый в точках вне поверхности. Если  $f_2$  — плотность этих масс, то, заменяя действие каждого куска  $\Delta S$  поверхности в точке  $(x_0, y_0, z_0)$  через  $\text{grad}_0 \frac{1}{r_\varepsilon} f_2 \Delta S$ , где  $\text{grad}_0 \frac{1}{r_\varepsilon}$  обозначает значение  $\text{grad}_0 \frac{1}{r}$  в некоторой средней точке, суммируя по всем  $\Delta S$  и переходя к пределу, получим для силы тяготения в точке  $(x_0, y_0, z_0)$  выражение  $F = \text{grad}_0 U$ ,  $U = \iint_S \frac{f_2}{r} dS$ , что и требовалось доказать.

Мы считали  $\rho$  и  $f_2$  плотностью масс, тяготеющих по закону Ньютона, но так же можно было бы провести вывод выражения для электрического потенциала, создаваемого зарядами, притягивающимися по закону Кулона, или магнитного потенциала.

Перейдем к выяснению геометрического смысла потенциала двойного слоя, для чего представим этот интеграл в несколько иной форме. Рассмотрим некоторую, вообще говоря, незамкнутую поверхность  $S$ . Возьмем некоторую точку  $O$  и построим вокруг этой точки сферу  $C$  радиуса 1.

Допустим, что поверхность  $S$  двусторонняя, и назовем одну из ее сторон внутренней, а другую внешней и тем самым определим направление внутренней нормали во всех точках поверхности.

Пусть эта поверхность разбита на конечное число кусков таким образом, чтобы каждый кусок или встречался с радиус-векторами, проведенными из точки  $O$ , не больше, чем в одной точке, или же являлся куском конической поверхности с вершиной в точке  $O$ .

Для каждого такого куска знак косинуса угла между внутренней нормалью и радиус-вектором, проведенным из  $O$ , будет постоянным. Пусть эти куски будут  $S_1, S_2, \dots, S_k$ . Проведем радиус-векторы в каждую точку куска  $S_l$ . Эти радиусы в пересечении со сферой  $C$  образуют на ней область  $C_l$  (рис. 11).

Площадь этой области мы будем называть телесным углом, под которым внутренняя поверхность куска  $S_l$  видна из

точки  $O$ , и обозначать  $\omega_{S_i}$ . Мы будем считать этот телесный угол положительным, если радиус-векторы, направленные из  $O$  в точку  $S_i$ , пересекаются с внутренней нормалью под тупым углом, т. е. если наблюдатель, стоящий в точке  $O$ , действительно видит внутреннюю поверхность, и будем считать, что этот угол отрицателен, если наблюдатель видит внешнюю поверхность, и угол между радиус-вектором из точки  $O$  и внутренней нормалью  $S_i$  — острый.

Для кусков конических поверхностей с вершиной в точке  $O$  телесный угол примем равным нулю,




Рис. 11

Телесный угол для куска  $S_i$  будет, очевидно, в полярных координатах с вершиной в точке  $O$  записываться так:

$$\omega_{S_i} = - \iint_{S_i} \text{sign} [\cos (r, n)] \sin \theta \, d\theta \, d\varphi, \quad (\text{IX.8})$$

где  $\text{sign} [\cos (r, n)]$  обозначает знак косинуса угла между радиус-вектором  $r$  и внутренней нормалью  $n$ .

Для всей поверхности  $S$  мы определим телесный угол  $\omega$ , под которым видна ее внутренняя сторона из начала, как сумму соответственных телесных углов для всех кусков  $S_i$ .

Этот угол будет выражаться интегралом

$$\omega_S = - \iint_S \text{sign} [\cos (r, n)] \sin \theta \, d\theta \, d\varphi,$$

Мы можем теперь сформулировать нашу лемму.

**Л е м м а 4.** *Имеет место формула*

$$\omega_S = \iint_S \frac{\partial}{\partial n} \frac{1}{r} \, dS. \quad (\text{IX.9})$$

Для доказательства заметим, что  $\omega_S$  зависит только от контура, ограничивающего поверхность  $S$ , и не меняется при любых дефор-

мациях поверхности  $S$ , лишь бы контур  $l$  оставался неизменным и поверхность  $S$  в процессе ее деформации не проходила через точку  $O$ .

Интеграл (IX.9) также не зависит от поверхности  $S$  при указанных деформациях. В самом деле, разность интегралов

$$\iint_{S_1} \frac{\partial \frac{1}{r}}{\partial n} dS - \iint_{S_2} \frac{\partial \frac{1}{r}}{\partial n} dS,$$

где  $S_1$  и  $S_2$  имеют общий контур, есть интеграл по замкнутой поверхности  $S$ .

Так как, по предположению, точка  $O$  находится вне области, ограниченной поверхностью  $S$ , по формуле Грина (IX.6), полагая  $u = 1$ , имеем:

$$\iint_S \frac{\partial \frac{1}{r}}{\partial n} dS = 0.$$

Чтобы убедиться теперь в справедливости (IX.9), достаточно показать совпадение  $\omega_S$  и интеграла (IX.9) для какогонибудь одного типа поверхности  $S$ , ограниченной контуром  $l$ .

Возьмем, например, поверхность, состоящую из куска сферы  $C$  и куска  $L$  конической поверхности, составленной радиус-векторами, проходящими через начало и контур  $l$ . Для обоих этих кусков справедливость (IX.9) очевидна, ибо на  $L$  имеет место

равенство  $\frac{\partial \frac{1}{r}}{\partial n} = 0$  вместе с равенством нулю телесного угла, а на  $C$

$$\frac{\partial \frac{1}{r}}{\partial n} = + \frac{d \frac{1}{r}}{dr} \operatorname{sign} [\cos (r, n)] = - \operatorname{sign} [\cos (r, n)],$$

и поэтому

$$\frac{\partial \frac{1}{r}}{\partial n} dS = - \operatorname{sign} [\cos (r, n)] \sin \theta d\theta d\varphi.$$

Можно было бы установить справедливость (IX.9) и просто непосредственной выкладкой.

На основании совпадения интегралов (IX.8) и (IX.9) по любой поверхности легко заключаем, что

$$- \operatorname{sign} [\cos (r, n)] \sin \theta d\theta d\varphi = \frac{\partial \frac{1}{r}}{\partial n} dS.$$

Мы будем обозначать иногда выражение

$$\frac{\partial}{\partial n} \frac{1}{r} dS \quad (\text{IX.10})$$

через  $d\omega$  и называть  $d\omega$  элементом телесного угла.

С помощью обозначения (IX.10) потенциалу двойного слоя можно дать представление

$$\iint_S f_1 d\omega. \quad (\text{IX.11})$$

Отсюда следует, что если плотность  $f_1$  потенциала двойного слоя равна единице, то этот потенциал выражает телесный угол, под которым видна поверхность  $S$  из точки  $(x_0, y_0, z_0)$ .

---

# НЕКОТОРЫЕ ОБЩИЕ СЛЕДСТВИЯ ИЗ ФОРМУЛЫ ГРИНА

## § 1. Теорема о среднем арифметическом

Формула Грина (IX.4) в случае, когда  $u$  — гармоническая функция, принимает вид:

$$u(x_0, y_0, z_0) = \frac{1}{4\pi} \int_S \left( u \frac{\partial \frac{1}{r}}{\partial n} - \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial n} \right) dS. \quad (\text{X.1})$$

Эта формула, как мы видели, справедлива всегда, если функция  $u$  имеет производные первого порядка, непрерывные вплоть до границы, и производные второго порядка, непрерывные внутри области.

Правая часть формулы (X.1) представляет собой сумму потенциалов простого и двойного слоя.

Их свойства будут подробно исследованы в дальнейшем. Покажем сейчас, что каждый из них есть гармоническая функция везде вне поверхности  $S$ .

В самом деле, если точка  $(x_0, y_0, z_0)$  не лежит на этой поверхности, то потенциалы простого и двойного слоя можно дифференцировать, и притом сколько угодно раз, по переменным  $x_0, y_0, z_0$  под знаком интеграла. Поскольку  $\frac{1}{r}$  есть гармоническая функция

этих переменных, ибо, как мы видели,  $\Delta_0 \frac{1}{r} = 0$ , то и потенциал простого слоя и потенциал двойного слоя будут гармоническими функциями вне  $S$ . Покажем, что они будут аналитическими функциями. Функцию  $\frac{1}{r}$  вблизи некоторой точки  $x_0^*, y_0^*, z_0^*$  можно разложить в ряд по степеням  $x_0 - x_0^*, y_0 - y_0^*, z_0 - z_0^*$ , равномерно сходящийся при достаточно малых по абсолютной величине значениях этих разностей.

В самом деле,

$$\begin{aligned} \frac{1}{r} &= \frac{1}{\sqrt{(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2 + (z-z_0)^2}} = \\ &= \frac{1}{\sqrt{[(x-x_0^*) - (x_0 - x_0^*)]^2 + [(y-y_0^*) - (y_0 - y_0^*)]^2 + [(z-z_0^*) - (z_0 - z_0^*)]^2}} = \\ &= \left\{ [(x-x_0^*)^2 + (y-y_0^*)^2 + (z-z_0^*)^2] \times \right. \\ &\times \left[ 1 - 2 \frac{(x-x_0^*)(x_0 - x_0^*) + (y-y_0^*)(y_0 - y_0^*) + (z-z_0^*)(z_0 - z_0^*)}{(x-x_0^*)^2 + (y-y_0^*)^2 + (z-z_0^*)^2} + \right. \\ &\quad \left. \left. + \frac{(x_0 - x_0^*)^2 + (y_0 - y_0^*)^2 + (z_0 - z_0^*)^2}{(x-x_0^*)^2 + (y-y_0^*)^2 + (z-z_0^*)^2} \right] \right\}^{-\frac{1}{2}}. \end{aligned}$$

Разлагая это выражение в ряд по формуле бинома Ньютона, легко убедиться в том, что этот ряд будет равномерно сходиться при значениях  $(x_0 - x_0^*)^2 + (y_0 - y_0^*)^2 + (z_0 - z_0^*)^2$ , достаточно малых по сравнению с минимумом выражения

$$(x - x_0^*)^2 + (y - y_0^*)^2 + (z - z_0^*)^2,$$

когда точка  $(x, y, z)$  пробегает поверхность  $S$ .

Интегрируя этот ряд почленно, убеждаемся, что функции

$$v = \frac{1}{4\pi} \iint_S \frac{\partial u}{\partial n} \frac{1}{r} dS \text{ и } w = \frac{1}{4\pi} \iint_S u \frac{\partial}{\partial n} \frac{1}{r} dS$$

допускают такое разложение и, следовательно, являются аналитическими функциями  $x_0, y_0, z_0$  везде, кроме поверхности  $S$ .

Пусть  $u$  — гармоническая функция в шаре, непрерывная с первыми производными вплоть до границы.

Применим формулу Грина (X.1) к шару радиуса  $h$ , описанному вокруг точки  $(x_0, y_0, z_0)$ , поверхность которого мы также обозначим буквой  $S$ . Мы получим:

$$u(x_0, y_0, z_0) = \frac{1}{4\pi} \iint_S \left( \frac{1}{h^2} u - \frac{1}{h} \frac{\partial u}{\partial n} \right) dS.$$

Но при любой замкнутой поверхности  $S_1$

$$\iint_{S_1} \frac{\partial u}{\partial n} dS = - \iiint_{\Omega_1} \Delta u \, dx \, dy \, dz = 0,$$

где  $\Omega_1$  — объем, ограниченный поверхностью  $S_1$ , а функция  $u$  гармонична внутри  $\Omega_1$  и имеет непрерывные производные вплоть до границы.

Первое равенство следует из (I.2), так как  $\frac{\partial u}{\partial n} = (\text{grad } u)_n$ , а  $\Delta u = \text{div}(\text{grad } u)$ ; второе очевидно,

Следовательно,

$$u(x_0, y_0, z_0) = \frac{1}{4\pi h^2} \iint_S u \, dS = \frac{1}{4\pi} \int_0^\pi d\vartheta \int_0^{2\pi} u(R, \vartheta, \varphi) \sin \vartheta \, d\varphi, \quad (X.2)$$

где  $\vartheta$  и  $\varphi$  — сферические координаты.

Отсюда следует

**Теорема 1.** *Значение гармонической функции в центре некоторого шара равно среднему арифметическому ее значений на поверхности этого шара.*

Свойство гармонических функций, доказанное нами, вполне характеризует этот класс функций. Справедлива следующая

**Теорема 2.** *Если функция  $u(x, y, z)$ , непрерывная в области  $\Omega$ , обладает тем свойством, что ее значение в центре любого шара, лежащего целиком внутри  $\Omega$ , равно среднему арифметическому ее значений на поверхности шара, то эта функция имеет непрерывные производные 2-го порядка и*

$$\Delta u = 0,$$

т. е.  $u(x, y, z)$  есть гармоническая функция.

Доказательство этой теоремы мы проведем позднее. Пока укажем некоторые свойства функций, удовлетворяющих условию теоремы 2.

**Лемма 1.** *Непрерывная функция  $u(x, y, z)$ , обладающая тем свойством, что ее значения в центре любого шара, заключенного в области ее определения, равны среднему арифметическому ее значений на поверхности шара, не может иметь внутри области ни минимума, ни максимума, если она не сводится к постоянной.*

В самом деле, если бы в какой-либо точке  $P_0$  внутри области  $\Omega$  функция  $u$  принимала максимальное значение, то среднее арифметическое ее значений на поверхности любой достаточно малой сферы  $\sigma$  с центром в точке  $P_0$  могло равняться  $u(P_0)$  только в том случае, если бы везде на поверхности  $\sigma$  функция  $u$  равнялась своему максимальному значению. Это означало бы, что функция  $u$  постоянна на шаре  $\sigma$ . Но если функция  $u$  постоянна на любом шаре, окружающем какую-нибудь точку, где она принимает максимальное значение, то она, как легко видеть, должна быть постоянной всюду в области  $\Omega$ . Действительно, соединим точку  $P_0$  с произвольной внутренней точкой  $P$  при помощи какой-либо гладкой кривой  $l$ , лежащей целиком внутри  $\Omega$ . При этом минимум расстояния от произвольной точки линии  $l$  до точек границы области, существующий в силу теоремы Вейерштрасса, будет положительным. Следовательно, существует такое положительное число  $\eta$ , что шар радиуса  $\eta$ , описанный вокруг любой точки

линии  $l$ , будет лежать целиком внутри  $\Omega$ . На линии  $l$  можно указать конечное число точек  $P_0, P_1, P_2, \dots, P_n = P$ , обладающих тем свойством, что каждая последующая лежит внутри шара радиуса  $\eta$ , описанного вокруг предыдущей. Пользуясь доказанным свойством постоянства  $u$  на любой внутренней сфере, окружающей всякую точку, где  $u$  принимает максимальное значение, и переходя последовательно от одной вершины ломаной к другой, получим:

$$u(P) = u(P_0).$$

**Л е м м а 2.** Если функция  $u(x, y, z)$ , удовлетворяющая условию предыдущей леммы, обращается в нуль на границе некоторой области  $\Omega$ , то она тождественно равна нулю в этой области.

В самом деле, если бы функция  $u$  принимала в области  $\Omega$  значения, отличные от нуля, то она принимала бы наибольшее или наименьшее значение внутри области, не будучи постоянной, что невозможно в силу леммы 1.

**Л е м м а 3.** Если функция  $u(x, y, z)$ , удовлетворяющая условиям леммы 1, на какой-нибудь замкнутой поверхности  $S$  совпадает с гармонической функцией  $u_0$ , то она совпадает с этой гармонической функцией всюду внутри области, ограниченной  $S$ , и, значит, сама является гармонической.

Действительно, разность  $u - u_0$  будет в свою очередь удовлетворять условиям леммы 1, так как ему удовлетворяют порознь  $u$  и  $u_0$ . С другой стороны, эта разность обращается в нуль на  $S$ . По предыдущей лемме  $u - u_0 = 0$  везде в области  $\Omega$ .

В дальнейшем мы покажем, что какова бы ни была непрерывная функция  $f(S)$ , заданная на поверхности шара, существует гармоническая функция  $u$ , непрерывная в замкнутом шаре и равная  $f(S)$  в точках границы. Отсюда будет непосредственно следовать теорема 2. В самом деле, для всякой внутренней сферы  $\sigma$  в области  $\Omega$  существует функция  $u_0$ , гармоническая внутри сферы  $\sigma$  и принимающая на ней такие же значения, что и  $u$ . В силу леммы 3  $u$  совпадает с  $u_0$ . Значит,  $u$  гармонична во всяком внутреннем шаре и, тем самым, во всякой внутренней точке  $\Omega$ , что и требовалось доказать.

Из формулы (X.2) вытекает следующая теорема:

**Т е о р е м а 3.** Если последовательность  $\{v_n\}$  функций, гармонических в области  $\Omega$ , сходится равномерно в этой области к предельной функции  $v$ , то этот предел есть в свою очередь гармоническая функция.

В самом деле, если каждая из функций  $v_n$  удовлетворяет равенству

$$v_n(x_0, y_0, z_0) = \frac{1}{4\pi h^2} \iint_S v_n dS,$$

где  $S$  — сфера радиуса  $r = \sqrt{(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2 + (z-z_0)^2} = h$ , то этому же равенству удовлетворяет и предельная функция. Следовательно,  $v$  — гармоническая функция в  $\Omega$ , что и требовалось доказать. Отсюда следует, между прочим, что если гармоническая функция  $v(x, y, z, \lambda)$  непрерывно зависит от параметра  $\lambda$  на конечном отрезке  $a \leq \lambda \leq b$ , то и интеграл от  $v$  по параметру  $\lambda$ , взятый по этому отрезку, также представляет собой гармоническую в области  $\Omega$  функцию.

## § 2. Поведение гармонической функции вблизи особой точки

Пусть функция  $u$  имеет особую точку в области  $\Omega$ , но в окрестности этой особой точки является гармонической. Исследуем ее поведение вблизи такой особой точки. Для простоты предположим, что этой точкой служит начало координат. Преобразуем функцию  $u$  к полярным координатам, тогда  $u = u(R, \vartheta, \varphi)$ .

**Л е м м а 4.** Если функция  $u(x, y, z)$  удовлетворяет неравенствам:

$$|u| \leq \frac{A}{R^n}, \quad \left| \frac{\partial u}{\partial R} \right| \leq \frac{A}{R^{n+1}},$$

где  $A$  — постоянная, а  $R = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ , и является гармонической функцией в  $\Omega$  всюду за исключением начала координат, то функция  $u(x, y, z)$  в  $\Omega$  допускает представление

$$u(x_0, y_0, z_0) = \sum_{m=0}^{n-1} \sum_{i+j+k=m} a_{ijk} \frac{\partial^m \frac{1}{R_0}}{\partial x_0^i \partial y_0^j \partial z_0^k} + u^*(x_0, y_0, z_0), \quad (X.3)$$

где  $u^*$  — функция, гармоническая во всей области  $\Omega$ , включая точку  $(0, 0, 0)$ .

(В случае  $n = 0$  первое слагаемое в правой части (X.3) отсутствует.)

Доказательство этого факта следует непосредственно из формулы Грина (X.1). Окружив точку  $(0, 0, 0)$  настолько малой сферой  $\sigma$  с центром в начале, что точка  $(x_0, y_0, z_0)$  лежит вне ее, получим:

$$u(x_0, y_0, z_0) = \frac{1}{4\pi} \int_S \left( \frac{\partial}{\partial n} \frac{1}{r} u - \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial n} \right) dS + \frac{1}{4\pi} \int_{\sigma} \left( \frac{\partial}{\partial n} \frac{1}{r} u - \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial n} \right) dS.$$

Вблизи точки  $x = 0, y = 0, z = 0$  функцию  $\frac{1}{r}$  по формуле Маклорена можно представить в виде

$$\frac{1}{r} = \frac{1}{R_0} + \sum_{m=1}^{n-1} \sum_{i+j+k=m} \frac{1}{i!j!k!} x^i y^j z^k \frac{\partial^m \frac{1}{r}}{\partial x^i \partial y^j \partial z^k} \bigg|_0 + R_n,$$

где значения производных берутся в точке  $x = y = z = 0$ ,  $R_0 = \sqrt{x_0^2 + y_0^2 + z_0^2}$  и  $|R_n| < CR^n$ ;  $C$  — постоянная. Пользуясь тем, что

$$\left. \frac{\partial^m \frac{1}{r}}{\partial x^i \partial y^j \partial z^k} \right|_0 = (-1)^m \frac{\partial^m \frac{1}{R_0}}{\partial x_0^i \partial y_0^j \partial z_0^k},$$

получим:

$$\frac{1}{r} = \frac{1}{R_0} + \sum_{m=1}^{n-1} \sum_{i+j+k=m} \frac{(-1)^m}{i!j!k!} x^i y^j z^k \frac{\partial^m \frac{1}{R_0}}{\partial x_0^i \partial y_0^j \partial z_0^k} + R_n. \quad (\text{X.4})$$

Аналогично  $\frac{\partial \frac{1}{r}}{\partial n}$  также представляется линейной комбинацией производных от  $\frac{1}{R_0}$  по  $x_0, y_0, z_0$  до порядка  $n-1$  с коэффициентами, не зависящими от  $x_0, y_0, z_0$ , и остатком  $R'_n$ , для которого справедливо неравенство  $|R'_n| < C_1 R^{n-1}$ . Это следует из того, что производные от  $\frac{1}{r}$  по  $x, y, z$  отличаются лишь знаком от производных по  $x_0, y_0, z_0$ , а для этих производных искомое представление очевидно. Но

$$\frac{\partial}{\partial n} = \cos(n, x) \frac{\partial}{\partial x} + \cos(n, y) \frac{\partial}{\partial y} + \cos(n, z) \frac{\partial}{\partial z},$$

где  $\cos(n, x), \cos(n, y), \cos(n, z)$  не зависят от  $x_0, y_0, z_0$  и ограничены.

Отсюда получим:

$$\begin{aligned} u(x_0, y_0, z_0) &= \frac{1}{4\pi} \iint_S \left( \frac{\partial \frac{1}{r}}{\partial n} u - \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial n} \right) dS + \frac{a_0^{(\sigma)}}{R_0} + \\ &+ \sum_{m=1}^{n-1} \sum_{i+j+k=m} a_{ijk}^{(\sigma)} \frac{\partial^m \frac{1}{R_0}}{\partial x_0^i \partial y_0^j \partial z_0^k} + \frac{1}{4\pi} \iint_{\sigma} (R'_n u - R_n \frac{\partial u}{\partial n}) dS, \end{aligned}$$

где  $a_{ijk}^{(\sigma)}$  — некоторые числа.

Перейдем к пределу, когда  $\sigma$  стягивается в точку  $x = y = z = 0$ . Предел интеграла, взятого по  $\sigma$ , будет в силу условий леммы равен нулю, а первое слагаемое правой части есть гармоническая функция от  $x_0, y_0, z_0$ , не зависящая от  $\sigma$  (сумма потенциалов простого и двойного слоя).

Отсюда следует, что и сумма

$$\frac{a_0^{(\sigma)}}{R_0} + \sum_{m=1}^{n-1} \sum_{i+j+k=m} a_{ijk}^{(\sigma)} \frac{\partial^m \frac{1}{R_0}}{\partial x_0^i \partial y_0^j \partial z_0^k}$$

должна стремиться к некоторому пределу  $\Phi(x_0, y_0, z_0) = \Phi(P_0)$ . Докажем, что этот предел должен выражаться в виде

$$\frac{a_0}{R_0} + \sum_{m=1}^{n-1} \sum_{i+j+k=m} a_{ijk} \frac{\partial^m}{\partial x_0^i \partial y_0^j \partial z_0^k} \frac{1}{R_0}.$$

Для этого достаточно доказать следующую лемму:

**Л е м м а 5.** Пусть  $\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_k$  — некоторые функции от  $x_1, x_2, \dots, x_n$  ( $k$  — конечное число). Если линейная комбинация этих функций с переменными коэффициентами, не зависящими от  $x_1, x_2, \dots, x_n$ :

$$\varphi^{(m)} = \sum_{i=1}^k y_i^{(m)} \varphi_i(x_1, \dots, x_n),$$

сходится при  $m \rightarrow 0$ , то ее предел  $\varphi^{(0)}$  есть снова линейная комбинация тех же функций  $\varphi_i$ .

В самом деле, функция  $\varphi^{(m)}$  не может, очевидно, принимать независимые произвольные значения во всем пространстве, так как, приписывая ей какое-либо значение в некоторой точке  $P_0^{(s)}$ , мы получим некоторое линейное уравнение, которому должны удовлетворять числа  $y_i^{(m)}$ .

Число таких линейно независимых уравнений не больше, чем  $k$ ; поэтому можно указать  $N$  таких точек  $P_0^{(1)}, \dots, P_0^{(N)}$  ( $N \leq k$ ), что значение функции  $\varphi^{(m)}$  в любой точке  $P$  определяется вполне через эти значения:

$$\varphi^{(m)}(P) = \sum_{s=1}^N \varphi^{(m)}(P_0^{(s)}) \psi_s(P), \quad (\text{X.5})$$

где  $\psi_s(P)$  — линейные комбинации  $\varphi_i$  с числовыми коэффициентами.

Обратно, всякая функция, удовлетворяющая уравнению (X.5), представима в виде линейной комбинации  $\varphi_i$ .

Отсюда следует лемма. Если перейти к пределу в равенстве (X.5), то мы видим, что  $\varphi^{(0)}$  должна удовлетворять уравнению

$$\varphi^{(0)}(P) = \sum_{s=1}^N \varphi^{(0)}(P_0^{(s)}) \psi_s(P),$$

и, значит,  $\varphi^{(0)}$  есть линейная комбинация  $\varphi_i(P)$ , что и требовалось доказать.

Лемма 5, а вместе с тем и лемма 4 доказаны.

**Т е о р е м а 4.** Представление (X.3) имеет место, если удовлетворено неравенство

$$|u| \leq \frac{A}{R^n}.$$

Введем вместо  $u(R, \vartheta, \varphi)$  вспомогательную функцию

$$v(R, \vartheta, \varphi) = \frac{1}{R^{n+1}} \int_0^R u(R_1, \vartheta, \varphi) R_1^n dR_1; \quad (\text{X.6})$$

интеграл в правой части сходится. Его можно представить в виде

$$\begin{aligned} v(R, \vartheta, \varphi) &= \frac{1}{R^{n+1}} \int_0^1 u(R\xi, \vartheta, \varphi) R^n \xi^n d(R\xi) = \\ &= \int_0^1 u(R\xi, \vartheta, \varphi) \xi^n d\xi = \int_0^1 u(\xi x, \xi y, \xi z) \xi^n d\xi. \end{aligned}$$

Как легко убедиться непосредственным дифференцированием, подынтегральное выражение в последнем интеграле является гармонической функцией переменных  $(x, y, z)$ ; отсюда следует, согласно теореме 3 из § 1, что и  $v$  является гармонической функцией.

Очевидно,

$$\frac{\partial v(R, \vartheta, \varphi)}{\partial R} = -\frac{n+1}{R^{n+2}} \int_0^R u(R_1, \vartheta, \varphi) R_1^n dR_1 + \frac{u(R, \vartheta, \varphi)}{R}. \quad (\text{X.7})$$

Из формул (X.6) и (X.7) следует:

$$\begin{aligned} |v| &\leq \frac{1}{R^{n+1}} \int_0^R A dR_1 = \frac{A}{R^n}, \\ \left| \frac{\partial v}{\partial R} \right| &\leq \frac{n+1}{R^{n+2}} \int_0^R A dR_1 + \frac{A}{R^{n+1}} = \frac{A(n+2)}{R^{n+1}}. \end{aligned}$$

Следовательно, функция  $v$  удовлетворяет всем условиям леммы 4, и  $v$  представима в виде

$$v = \frac{a_0}{R_0} + \sum_{m=1}^{n-1} a_{ijk} \frac{\partial^m \frac{1}{R_0}}{\partial x_0^i \partial y_0^j \partial z_0^k} + w(R_0, \vartheta, \varphi),$$

где  $w$  — гармоническая в окрестности начала координат функция.

Функция  $u$  может быть получена из  $v$  с помощью простых выкладок:

$$\begin{aligned} u(R, \vartheta, \varphi) &= \frac{1}{R^n} \frac{\partial}{\partial R} [R^{n+1} v(R, \vartheta, \varphi)] = \\ &= (n+1) v(R, \vartheta, \varphi) + x \frac{\partial v}{\partial x} + y \frac{\partial v}{\partial y} + z \frac{\partial v}{\partial z}. \end{aligned}$$

Принимая во внимание, что  $\psi_{ijk} = \frac{\partial^m}{\partial x^i \partial y^j \partial z^k} \frac{1}{R}$  есть однородная функция измерения  $-(m+1)$ , следовательно, по теореме Эйлера об однородных функциях

$$x \frac{\partial \psi_{ijk}}{\partial x} + y \frac{\partial \psi_{ijk}}{\partial y} + z \frac{\partial \psi_{ijk}}{\partial z} = -(m+1) \psi_{ijk},$$

и замечая, что выражение  $x \frac{\partial w}{\partial x} + y \frac{\partial w}{\partial y} + z \frac{\partial w}{\partial z}$  при гармонической функции  $w$  является гармонической функцией (это легко проверить непосредственным дифференцированием), убеждаемся в справедливости нашей теоремы.

**С л е д с т в и е.** Если в окрестности начала координат функция  $u(x, y, z)$  ограничена и является гармонической везде, кроме, быть может, начала, то ее можно превратить в гармоническую, выбрав соответственным образом  $u(0, 0, 0)$ .

Функция  $u$  в окрестности начала совпадает с гармонической функцией  $u^*$ . Следовательно, она может не быть гармонической лишь потому, что  $u(0, 0, 0)$  не равно  $u^*(0, 0, 0)$ ; отсюда и вытекает наше утверждение. Очевидно, что роль начала координат может играть любая точка.

### § 3. Поведение гармонической функции на бесконечности. Взаимно сопряженные точки

Функция  $\frac{1}{r}$  может быть преобразована к некоторому виду, весьма удобному в дальнейшем. Займемся этим преобразованием:

$$\frac{1}{r} = \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2 - 2(xx_0 + yy_0 + zz_0) + x_0^2 + y_0^2 + z_0^2}} = \\ = \frac{1}{RR_0} \frac{1}{\sqrt{\frac{1}{R^2} - 2\frac{xx_0 + yy_0 + zz_0}{R^2 R_0^2} + \frac{1}{R_0^2}}},$$

где

$$R^2 = x^2 + y^2 + z^2, \quad R_0^2 = x_0^2 + y_0^2 + z_0^2.$$

Отсюда

$$\frac{1}{r} = \frac{1}{RR_0} \frac{1}{\sqrt{\left(\frac{x}{R} - \frac{x_0}{R_0}\right)^2 + \left(\frac{y}{R} - \frac{y_0}{R_0}\right)^2 + \left(\frac{z}{R} - \frac{z_0}{R_0}\right)^2}}.$$

Обозначим:

$$\frac{x}{R} = \xi, \quad \frac{y}{R} = \eta, \quad \frac{z}{R} = \zeta, \\ \frac{x_0}{R_0} = \xi_0, \quad \frac{y_0}{R_0} = \eta_0, \quad \frac{z_0}{R_0} = \zeta_0.$$

Точку  $(\xi, \eta, \zeta)$  мы будем называть сопряженной с точкой  $(x, y, z)$  относительно единичной сферы. Нетрудно видеть, что

$$P^2 = \xi^2 + \eta^2 + \zeta^2 = \frac{1}{R^2},$$

$$x = \frac{\xi}{P^2}, \quad y = \frac{\eta}{P^2}, \quad z = \frac{\zeta}{P^2}.$$

Таким образом, свойство сопряженности является взаимным: если точка  $(\xi, \eta, \zeta)$  является сопряженной для точки  $(x, y, z)$ , то, наоборот, точка  $(x, y, z)$  является сопряженной для точки  $(\xi, \eta, \zeta)$ .

Точка, сопряженная с данной, лежит на луче, проходящем через начало и данную точку, на расстоянии от начала, обратном расстоянию данной.

Обозначая

$$\rho = \sqrt{(\xi - \xi_0)^2 + (\eta - \eta_0)^2 + (\zeta - \zeta_0)^2},$$

$$\sqrt{\xi^2 + \eta^2 + \zeta^2} = P,$$

$$\sqrt{\xi_0^2 + \eta_0^2 + \zeta_0^2} = P_0,$$

получим:

$$\frac{1}{r} = \frac{1}{RR_0} \frac{1}{\rho} = \frac{PP_0}{\rho}. \quad (X.8)$$

Из этой формулы вытекает важная для применений

**Т е о р е м а 5.** Если функция  $u(R, \vartheta, \varphi)$  — гармоническая в некоторой области  $\Omega$  переменных  $R, \vartheta, \varphi$ , то и функция

$$\frac{1}{P} u\left(\frac{1}{P}, \vartheta, \varphi\right) = v(P, \vartheta, \varphi)$$

также гармоническая в соответствующей области  $\Omega_1$  переменных  $P, \vartheta, \varphi$ , получаемой из области  $\Omega$  заменой  $P = \frac{1}{R}$ . Иными словами,  $\frac{1}{P} u\left(\frac{1}{P}, \vartheta, \varphi\right)$  есть гармоническая функция от  $\xi, \eta, \zeta$ .

В самом деле, по формуле Грина (X.1) всякая гармоническая функция  $u(x, y, z)$  представляется суммой потенциалов простого и двойного слоя

$$u(R_0, \vartheta_0, \varphi_0) = \iint_S \mu \frac{\partial}{\partial n} \frac{1}{r} dS + \iint_S v \frac{1}{r} dS,$$

где

$$\mu = \frac{1}{4\pi} u \Big|_S, \quad \text{а} \quad v = -\frac{1}{4\pi} \frac{\partial u}{\partial n} \Big|_S.$$

Следовательно,

$$\frac{1}{P_0} u = R_0 u = \int_S \mu \frac{\partial \frac{R_0}{r}}{\partial n} dS + \int_S v \frac{R_0}{r} dS; \quad (X.9)$$

по  $\frac{R_0}{r} = \frac{1}{R_0}$  есть гармоническая функция  $\xi_0, \eta_0, \zeta_0$ , а значит, интегралы (X.9) — также гармонические функции этих переменных, что и требовалось доказать.

**С л е д с т в и е 1.** Если гармоническая вне некоторого шара функция удовлетворяет неравенству

$$|u| < AR^{n-1}, \quad (X.10)$$

то эта функция представима в виде

$$u = a_0 + \sum_{m=1}^{n-1} a_{ijk} R^{2m+1} \frac{\partial^{i+j+k}}{\partial x^i \partial y^j \partial z^k} \frac{1}{R} + u^*, \quad i+j+k=m, \quad (X.11)$$

где  $u^*$  — гармоническая функция, стремящаяся к нулю на бесконечности.

В самом деле, если для  $u$  имеет место неравенство (X.10), то для функции  $v(P, \vartheta, \varphi) = \frac{1}{P} u\left(\frac{1}{P}, \vartheta, \varphi\right)$  имеет место оценка

$$|v| < \frac{A}{P^n}.$$

Но по доказанной ранее теореме 4 из лекции X

$$v(P, \vartheta, \varphi) = \frac{a_0}{P} + \sum_{m=1}^{n-1} a_{ijk} \frac{\partial^m}{\partial \xi^i \partial \eta^j \partial \zeta^k} \frac{1}{P} + v^*(P, \vartheta, \varphi). \quad (X.12)$$

Функция  $\frac{\partial^m}{\partial \xi^i \partial \eta^j \partial \zeta^k} \frac{1}{P}$  есть однородная функция измерения —  $(m+1)$  от  $\xi, \eta, \zeta$ . Следовательно,

$$P^{m+1} \frac{\partial^m}{\partial \xi^i \partial \eta^j \partial \zeta^k} \frac{1}{P}$$

есть однородная функция нулевого измерения от  $\xi, \eta, \zeta$  и зависит только от отношений этих величин. Но  $\xi, \eta, \zeta$

пропорциональны  $x, y, z$ ; следовательно,

$$P^{m+1} \frac{\partial^m \frac{1}{P}}{\partial \xi^i \partial \eta^j \partial \zeta^k} = R^{m+1} \frac{\partial^m \frac{1}{R}}{\partial x^i \partial y^j \partial z^k},$$

откуда

$$\frac{\partial^m \frac{1}{P}}{\partial \xi^i \partial \eta^j \partial \zeta^k} = R^{2m+2} \frac{\partial^m \frac{1}{R}}{\partial x^i \partial y^j \partial z^k}. \quad (X.13)$$

Подставляя (X.13) в (X.12) и пользуясь тем, что  $u = \frac{1}{R} v$ , получим (X.11). Наше утверждение доказано.

Из формулы (X.11) вытекает одно важное следствие.

**С л е д с т в и е 2.** *Функция  $u(x, y, z)$ , гармоническая вне шара и ограниченная там, стремится на бесконечности к определенному пределу.*

---

## ЛЕКЦИЯ XI

### УРАВНЕНИЕ ПУАССОНА В НЕОГРАНИЧЕННОЙ СРЕДЕ. НЬЮТОНОВ ПОТЕНЦИАЛ

Переходим к исследованию уравнения Пуассона в неограниченной среде.

**Л е м м а 1.** *Функция, гармоническая во всем пространстве и стремящаяся к нулю на бесконечности, есть тождественный нуль.*

В самом деле, применяя теорему 1 лекции IX к сколь угодно большому шару, видим, что в любой точке пространства значение нашей гармонической функции сколь угодно мало. Отсюда и вытекает справедливость леммы.

**С л е д с т в и е 1.** *Решение уравнения Пуассона*

$$\Delta v = -4\pi\rho(x, y, z) \quad (XI.1)$$

*в неограниченном пространстве, стремящемся к нулю на бесконечности, единственно.*

В самом деле, если  $v_1$  и  $v_2$  — два таких решения, то их разность

$$v_1 - v_2$$

есть гармоническая функция, стремящаяся к нулю на бесконечности. По предыдущему она — тождественный нуль.

**С л е д с т в и е 2.** (Теорема Лиувилля.) *Гармоническая функция, ограниченная во всем пространстве, равна постоянной.*

В самом деле, по следствию 2 теоремы 5 предыдущей лекции эта функция на бесконечности стремится к некоторому пределу  $c$ . Разность  $u - c$ , являясь гармонической функцией, будет стремиться на бесконечности к нулю и, следовательно, будет равна нулю везде, т. е.  $u = c$  всюду, что и требовалось доказать.

Переходим теперь к решению уравнения Пуассона (XI.1) в неограниченном пространстве.

Пусть функция  $\rho(x, y, z)$  интегрируема и удовлетворяет неравенствам

$$\left. \begin{aligned} |\rho(x, y, z)| &< \frac{A}{R^{2+\alpha}}, \text{ если } R \geq 1, \\ |\rho(x, y, z)| &< A, \text{ если } R < 1, \end{aligned} \right\} \quad (XI.2)$$

где

$$R = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \text{ и } \alpha > 0.$$

Без ограничения общности можно считать  $\alpha < 1$ , ибо в противном случае замена  $\alpha$  на  $\alpha_1 < \alpha$  только ослабит неравенство (XI.2).

При выполнении условий (XI.2) решение уравнения (XI.1) легко построить с помощью формулы Грина (IX.4). Пусть  $u(x_0, y_0, z_0)$  — решение (XI.1), стремящееся к нулю на бесконечности. Взяв произвольный объем  $\Omega$ , ограниченный поверхностью  $S$ , мы имеем на основании этой формулы:

$$\begin{aligned} u(x_0, y_0, z_0) = & -\frac{1}{4\pi} \iiint_{\Omega} (-4\pi\rho) \frac{1}{r} dx dy dz + \\ & + \frac{1}{4\pi} \iint_S \frac{\partial}{\partial n} \frac{1}{r} u dS - \frac{1}{4\pi} \iint_S \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial n} dS = \\ = & \iiint_{\Omega} \frac{\rho}{r} dx dy dz + \frac{1}{4\pi} \iint_S \frac{\partial}{\partial n} \frac{1}{r} u dS - \frac{1}{4\pi} \iint_S \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial n} dS, \quad (\text{XI.3}) \end{aligned}$$

где  $r$ , как обычно, — расстояние между точкой  $(x, y, z)$  и точкой  $(x_0, y_0, z_0)$ .

Возьмем за объем  $\Omega$  шар радиуса  $R$  с центром в начале координат и устремим  $R$  к бесконечности. При этом первое слагаемое правой части (XI.3) будет стремиться к определенному пределу, так как в силу условий (XI.2) объемный интеграл сходится. Сумма двух других слагаемых представляет некоторую гармоническую функцию. Мы покажем далее, что предел первого слагаемого дает решение поставленной задачи. В силу доказанной единственности решения отсюда будет следовать, что сумма второго и третьего слагаемых стремится к нулю.

Докажем, что функция

$$u(x_0, y_0, z_0) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\rho}{r} dx dy dz, \quad (\text{XI.4})$$

где тройной интеграл распространен на все пространство, действительно удовлетворяет уравнению (XI.1) и поставленным условиям.

Функция (XI.4) называется *ньютонovým потенциалом*, а  $\rho(x, y, z)$  — его плотностью, как это было уже определено в § 3 (IX).

Прежде всего займемся исследованием условия на бесконечности. Оценивая (XI.4), будем иметь:

$$|u(x_0, y_0, z_0)| \leq A \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{r R^{2-\alpha}} dx dy dz.$$

Переходя к оценке последнего интеграла, заметим, что величина его зависит только от  $R_0 = \sqrt{x_0^2 + y_0^2 + z_0^2}$ , и если положить  $x_0 = R_0$ ,  $y_0 = 0$ ,  $z_0 = 0$ , то она не изменится. В самом деле, очевидно, этот интеграл не меняется при повороте координатных осей, и можно выбрать эти координатные оси так, чтобы ось  $OX$  проходила через точку  $(x_0, y_0, z_0)$ . Делая теперь замену переменных

$$x = R_0 \xi, \quad y = R_0 \eta, \quad z = R_0 \zeta,$$

приведем его к виду

$$A \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{R_0^3 d\xi d\eta d\zeta}{R_0^{3+\alpha} P^{2+\alpha} P_1} = \frac{A}{R_0^\alpha} \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{d\xi d\eta d\zeta}{P_1 P^{2+\alpha}},$$

где  $P = \sqrt{\xi^2 + \eta^2 + \zeta^2}$ ,  $P_1 = \sqrt{(\xi - 1)^2 + \eta^2 + \zeta^2}$ . Последний интеграл сходится, ибо: 1) при  $P \rightarrow \infty$  подынтегральное выражение убывает, как  $\frac{1}{P^{2+\alpha}}$ ; 2) вблизи  $P = 0$  особенность порядка  $\frac{1}{P^{2+\alpha}}$  интегрируема; 3) вблизи  $P_1 = 0$  особенность порядка  $\frac{1}{P_1}$  интегрируема.

Обозначая

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{d\xi d\eta d\zeta}{P_1 P^{2+\alpha}} = k,$$

получим:

$$|u(x_0, y_0, z_0)| \leq \frac{Ak}{R_0^\alpha},$$

что и доказывает стремление к нулю функции  $u$  на бесконечности. Докажем, что  $u$  имеет непрерывные производные, которые получаются дифференцированием под знаком интеграла. Например,

$$\frac{\partial u}{\partial x_0} = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \rho \frac{\partial}{\partial x_0} \frac{1}{r} dx dy dz.$$

Дифференцирование под знаком интеграла, очевидно, выполнимо, так как полученный интеграл равномерно по  $x_0$  сходится. В самом деле,

$$\frac{\partial}{\partial x_0} \frac{1}{r} = \frac{x - x_0}{r^3} \quad \text{и} \quad \left| \frac{\partial}{\partial x_0} \frac{1}{r} \right| \leq \frac{1}{r^2},$$

откуда и следует сходимость (см. признак § 1 из л. VII). Одновременно доказано существование непрерывных первых производных у ньютонова потенциала. Для того чтобы доказать

существование и непрерывность вторых производных, необходимо наложить некоторые новые ограничения на функцию  $\rho(x, y, z)$ . Именно, мы положим, что эта функция имеет непрерывные производные 1-го порядка. Это ограничение не является существенным, но замена его другим, более слабым, потребовала бы больших усилий.

Функцию  $\rho$  всегда можно разбить на два слагаемых  $\rho_1, \rho_2$  так, чтобы в окрестности данной точки  $(x_0, y_0, z_0)$  функция  $\rho_2$  была бы тождественно равна нулю, а функция  $\rho_1$  была бы равна тождественно нулю в некоторой окрестности бесконечности, т. е. везде вне некоторой области  $D$ . При этом можно добиться того, что  $\rho_1$  и  $\rho_2$  в свою очередь будут иметь непрерывные производные 1-го порядка. Тогда

$$u(x_0, y_0, z_0) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\rho_1}{r} dx dy dz + \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\rho_2}{r} dx dy dz.$$

Ввиду того, что  $\rho_2 \equiv 0$  в окрестности точки  $(x_0, y_0, z_0)$ , мы можем из второго интеграла исключить эту окрестность и тогда дифференцировать его по параметру 2 раза, получая равномерно сходящиеся интегралы. Займемся первым интегралом. Мы будем иметь, например:

$$\frac{\partial}{\partial x_0} \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\rho_1}{r} dx dy dz = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \rho_1 \frac{x - x_0}{r^3} dx dy dz.$$

Вводя новые переменные  $x = x_0 + \xi, y = y_0 + \eta, z = z_0 + \zeta$ , мы получим:

$$\frac{\partial}{\partial x_0} \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\rho_1}{r} dx dy dz = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\xi \rho_1(x_0 + \xi, y_0 + \eta, z_0 + \zeta) d\xi d\eta d\zeta}{V(\xi^2 + \eta^2 + \zeta^2)^{3/2}},$$

и очевидно, что по параметрам  $x_0, y_0, z_0$  этот последний интеграл дифференцировать можно. Это следует из того, что интегралы от производных будут сходиться равномерно.

Нам остается доказать, что ньютонов потенциал удовлетворяет уравнению Пуассона.

Возьмем функцию  $\psi(x_0, y_0, z_0)$ , равную нулю везде, кроме некоторого шара  $S$  с центром в точке  $(x_0, y_0, z_0)$ , и имеющую непрерывные производные нескольких порядков. Тогда по формуле Грина (IX.4), замечая, что вне шара  $S$  функции  $\psi$  и  $\frac{\partial \psi}{\partial n}$  равны нулю, получим:

$$\psi(x_0, y_0, z_0) = -\frac{1}{4\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\Delta \psi(x, y, z)}{r} dx dy dz.$$

Умножая обе части на  $\rho(x_0, y_0, z_0)$  и интегрируя по  $x_0, y_0, z_0$ , будем иметь:

$$\begin{aligned}
 & \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \psi(x_0, y_0, z_0) \rho(x_0, y_0, z_0) dx_0 dy_0 dz_0 = \\
 & = -\frac{1}{4\pi} \underbrace{\int_{-\infty}^{+\infty} \dots \int_{-\infty}^{+\infty}}_{6 \text{ раз}} \frac{\Delta \psi(x, y, z) \rho(x_0, y_0, z_0)}{r} dx dy dz dx_0 dy_0 dz_0 = \\
 & = -\frac{1}{4\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \Delta \psi(x, y, z) \left( \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\rho}{r} dx_0 dy_0 dz_0 \right) dx dy dz = \\
 & = -\frac{1}{4\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} u(x, y, z) \Delta \psi(x, y, z) dx dy dz. \quad (\text{XI.5})
 \end{aligned}$$

Последний интеграл можно преобразовать, используя то, что при достаточно большой области  $D$

$$\iiint_D u \Delta \psi dx dy dz = \iiint_D \psi \Delta u dx dy dz.$$

Сопоставляя последнее равенство с (XI.5), приходим к заключению, что

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \psi(x, y, z) [\Delta u + 4\pi\rho] dx dy dz = 0.$$

Из произвольности  $\psi(x, y, z)$  вытекает

$$\Delta u = -4\pi\rho,$$

что и требовалось доказать.

# РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ ДИРИХЛЕ ДЛЯ ШАРА

Задача Дирихле для уравнения Лапласа, с которой мы познакомились в лекции II, есть задача об определении гармонической функции внутри области, если известны ее значения на границе. Можно ставить задачу Дирихле не только для уравнения Лапласа, но и для других уравнений эллиптического типа, понимая тогда под задачей Дирихле задачу об отыскании решения данного уравнения в данной области, принимающего заданные значения на границе области. В настоящей лекции мы будем заниматься решением задачи Дирихле для шара, поставленной для уравнения Пуассона  $\Delta u = \rho$ .

Рассмотрим внутри области  $\Omega$ , ограниченной поверхностью  $S$ , точку  $(x_0, y_0, z_0)$ . Как мы видели, функция  $\frac{1}{r}$ , где

$$r = \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2},$$

есть решение уравнения Лапласа.

Применяя формулу Грина (IX.4) к  $\frac{1}{r}$  и некоторому решению  $u$  уравнения Пуассона  $\Delta u = \rho$ , получим:

$$u(x_0, y_0, z_0) =$$

$$= \frac{1}{4\pi} \iint_S \left( \frac{\partial}{\partial n} \frac{1}{r} u - \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial n} \right) dS - \frac{1}{4\pi} \iiint_{\Omega} \frac{\rho}{r} dx dy dz. \quad (\text{XII.1})$$

Если бы мы построили такую гармоническую всюду в  $\Omega$  функцию  $g(x, y, z; x_0, y_0, z_0)$ , что  $g|_S = \frac{1}{r}|_S$ , то, применяя формулу Грина к  $u$  и  $g$ , имели бы

$$\begin{aligned} \frac{1}{4\pi} \iiint_{\Omega} (g \Delta u - u \Delta g) dx dy dz &= \frac{1}{4\pi} \iiint_{\Omega} g \rho dx dy dz = \\ &= \frac{1}{4\pi} \iint_S \left( \frac{\partial g}{\partial n} u - g \frac{\partial u}{\partial n} \right) dS. \quad (\text{XII.2}) \end{aligned}$$

Складывая (XII.1) и второе равенство (XII.2) и учитывая значения  $g$  на  $S$ , получим:

$$u(x_0, y_0, z_0) = - \int \int \int_{\Omega} \left( \frac{1}{4\pi r} - \frac{g}{4\pi} \right) \rho \, dx \, dy \, dz + \\ + \int \int_S \frac{\partial}{\partial n} \left( \frac{1}{4\pi r} - \frac{g}{4\pi} \right) u \, dS. \quad (\text{XII.3})$$

Обозначая

$$\frac{1}{4\pi r} - \frac{g}{4\pi} = G(x, y, z; x_0, y_0, z_0), \quad (\text{XII.4})$$

имеем:

$$u(x_0, y_0, z_0) = - \int \int \int_{\Omega} G \rho \, d\Omega + \int \int_S \frac{\partial G}{\partial n} u \, dS.$$

Функция  $G$  называется *функцией Грина*; таким образом, в предположении, что решение поставленной задачи Дирихле существует, формула

$$u(x_0, y_0, z_0) = - \int \int \int_{\Omega} G \rho \, d\Omega + \int \int_S \frac{\partial G}{\partial n} f(S) \, dS \quad (\text{XII.5})$$

дает это решение в явном виде, если известна функция Грина.

Функция Грина принимает на границе  $\Omega$  значение нуль и представляет сумму функции  $\frac{1}{r}$  и гармонической всюду в области функции  $g$ . Очевидно, что она определяется однозначно.

Перейдем теперь к решению задачи Дирихле для шара. В этом случае можно построить функцию Грина в явном виде.

Положим<sup>1)</sup>

$$r_1 = \sqrt{(x - \xi_0)^2 + (y - \eta_0)^2 + (z - \zeta_0)^2}.$$

Если точка  $(x, y, z)$  лежит на сфере радиуса единица, то  $x = \xi$ ,  $y = \eta$ ,  $z = \zeta$ . В силу (X.8) на сфере  $R = 1$  будем иметь:

$$\frac{1}{R_0 r_1} \Big|_{R=1} = \frac{1}{r} \Big|_{R=1}.$$

Функция  $\frac{1}{R_0 r_1}$  есть, очевидно, гармоническая по переменным  $x, y, z$  функция внутри шара  $R < 1$ . Следовательно,  $g = \frac{1}{R_0 r_1}$ .

Отсюда

$$G = \frac{1}{4\pi r} - \frac{1}{4\pi R_0 r_1},$$

<sup>1)</sup> Координаты  $\xi, \eta, \zeta$  введены на стр. 167.

где

$$R_0 = \sqrt{x_0^2 + y_0^2 + z_0^2}, \quad r = \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2},$$

$$r_1 = \sqrt{\left(x - \frac{x_0}{R_0^2}\right)^2 + \left(y - \frac{y_0}{R_0^2}\right)^2 + \left(z - \frac{z_0}{R_0^2}\right)^2} =$$

$$= \frac{1}{R_0} \sqrt{R^2 R_0^2 - 2(x x_0 + y y_0 + z z_0) + 1}.$$

Следовательно,

$$G(x, y, z; x_0, y_0, z_0) = \frac{1}{4\pi} \left[ \frac{1}{r} - \frac{1}{\sqrt{R^2 R_0^2 - 2(x x_0 + y y_0 + z z_0) + 1}} \right].$$

Как мы видим, функция  $G$  оказалась симметрической функцией относительно аргументов  $(x, y, z)$  и  $(x_0, y_0, z_0)$ . Следовательно, как функция  $x_0, y_0, z_0$  она также является гармонической, если  $r \neq 0$ .

Проверим теперь, что формула (XII.5) действительно дает решение задачи Дирихле для шара. Наше доказательство будет состоять из двух частей. Мы докажем отдельно, что первое слагаемое правой части формулы (XII.5) представляет собой решение уравнения Пуассона, равное нулю на границе  $S$  области  $\Omega$ , а второе слагаемое — решение уравнения Лапласа, принимающее на  $S$  заданные значения  $f(S)$ . Начнем с доказательства первого утверждения.

Докажем, что функция

$$u_1(x_0, y_0, z_0) = - \iiint_{\Omega} G \rho \, dx \, dy \, dz \quad (\text{XII.6})$$

обращается в нуль на границе и удовлетворяет уравнению Пуассона. Для этого нужно оценить величину функции Грина  $G(x, y, z; x_0, y_0, z_0)$ . Покажем, что имеет место неравенство

$$0 < G < \frac{1}{r}. \quad (\text{XII.7})$$

Установим прежде всего, что  $G > 0$ . Окружим внутреннюю точку  $(x_0, y_0, z_0)$  малой сферой  $\sigma$  и будем рассматривать функцию  $G$  в области  $\Omega'$ , заключенной между сферой  $\sigma$  и сферой  $S$ . В этой области  $G$  — гармоническая функция. Если сфера  $\sigma$  достаточно мала, то на ней  $G$  будет положительна, так как первое слагаемое сколь угодно велико, а второе — ограничено. На сфере  $S$  функция  $G$  по определению равна нулю. Следовательно,  $G$  неотрицательна везде на границе  $\Omega'$ , а на части границы  $\Omega'$  положительна. По принципу минимума она положительна всюду в  $\Omega'$ .

Для доказательства второго неравенства (XII.7) достаточно убедиться в том, что функция  $g$  положительна. Это следует из

того, что она принимает на границе  $\Omega$  положительные значения и гармонична в  $\Omega$ .

Из неравенства (XII.7) следует, что интеграл сходится равномерно в точке  $(x_0, y_0, z_0)$  по признаку § 1 лекции VII; следовательно, он представляет собой непрерывную функцию. Значение ее, если  $(x_0, y_0, z_0)$  является точкой границы, есть нуль, следовательно, интеграл (XII.6) стремится к нулю, если  $(r_0, y_0, z_0)$  стремится к точке границы.

Пусть точка  $(x_0, y_0, z_0)$  лежит внутри шара; запишем интеграл (XII.6) в виде

$$u_1(x_0, y_0, z_0) = -\frac{1}{4\pi} \iiint_{\Omega} \frac{\rho}{r} dx dy dz + \frac{1}{4\pi} \iiint_{\Omega} \rho g dx dy dz.$$

Первое слагаемое есть ньютонов потенциал и, следовательно, применение к нему оператора Лапласа дает  $\rho$ . Второе слагаемое есть гармоническая функция, так как

$$\Delta_0 \left[ \frac{1}{4\pi} \iiint_{\Omega} \rho g dx dy dz \right] = \frac{1}{4\pi} \iiint_{\Omega} \rho \Delta_0 g dx dy dz = 0.$$

(Мы обозначили здесь оператор Лапласа через  $\Delta_0$ , чтобы подчеркнуть, что производные берутся по аргументам  $x_0, y_0, z_0$ .) Следовательно, формула (XII.6) дает нужное нам решение уравнения Пуассона.

Переходя ко второй части доказательства, полезно преобразовать формулу (XII.5). Обозначим через  $\gamma$  угол, составленный радиус-векторами точек  $(x_0, y_0, z_0)$  и  $(x, y, z)$ . Тогда расстояние  $r$ , как сторона треугольника, противолежащая углу  $\gamma$ , выразится в виде

$$r = \sqrt{R^2 + R_0^2 - 2RR_0 \cos \gamma};$$

аналогично  $r_1$  выразится при этом в виде

$$r_1 = \sqrt{R^2 + \frac{1}{R_0^2} - 2 \frac{R}{R_0} \cos \gamma},$$

а функция Грина будет иметь вид

$$\begin{aligned} G &= \frac{1}{4\pi} \left[ \frac{1}{\sqrt{R^2 + R_0^2 - 2RR_0 \cos \gamma}} - \frac{1}{\sqrt{R^2 R_0^2 - 2RR_0 \cos \gamma + 1}} \right], \\ \frac{\partial G}{\partial n} \Big|_{R=1} &= - \frac{\partial G}{\partial R} \Big|_{R=1} = \\ &= \frac{1}{4\pi} \left[ \frac{R - R_0 \cos \gamma}{(R^2 + R_0^2 - 2RR_0 \cos \gamma)^{3/2}} - \frac{RR_0^2 - R_0 \cos \gamma}{(R^2 R_0^2 - 2RR_0 \cos \gamma + 1)^{3/2}} \right]_{R=1} = \\ &= \frac{1}{4\pi} \frac{1 - R_0^2}{(1 - 2R_0 \cos \gamma + R_0^2)^{3/2}}. \end{aligned}$$

Для исследования второго слагаемого, стоящего в правой части (XII.5), рассмотрим формулу (XII.5) в случае уравнения Лапласа ( $\rho \equiv 0$ ). Первое слагаемое при этом обратится в нуль. Решение задачи Дирихле, если оно существует, запишется в виде

$$u_2(x_0, y_0, z_0) = \frac{1}{4\pi} \int_S \frac{1 - R_0^2}{(1 - 2R_0 \cos \gamma + R_0^2)^{3/2}} f(S) dS, \quad (\text{XII.8})$$

где  $f(S)$  — заданные значения  $u(x_0, y_0, z_0)$  на единичной сфере. Эта формула носит название *формулы Пуассона*.

Мы получили в явном виде решение задачи Дирихле для шара единичного радиуса. Формула (XII.8) дает возможность легко получить решение и для шара произвольного радиуса  $P$ . Введем функцию

$$\begin{aligned} v(R_0, \vartheta_0, \varphi_0) &= u\left(\frac{R_0}{P}, \vartheta_0, \varphi_0\right) = \\ &= \frac{1}{4\pi} \int_S \frac{1 - \left(\frac{R_0}{P}\right)^2}{\left[1 - 2\frac{R_0}{P} \cos \gamma + \left(\frac{R_0}{P}\right)^2\right]^{3/2}} f(S) \sin \vartheta d\vartheta d\varphi. \end{aligned}$$

Заменяя  $P^2 \sin \vartheta d\vartheta d\varphi$  через  $dS$ , окончательно получим:

$$v(x_0, y_0, z_0) = \frac{1}{4\pi} \int_S \frac{P^2 - R_0^2}{(P^2 - 2PR_0 \cos \gamma + R_0^2)^{3/2} P} f(S) dS. \quad (\text{XII.9})$$

Нам надо доказать, что функция  $v(x_0, y_0, z_0)$  принимает на границе значения  $f(S)$  и является гармонической функцией. Формула (XII.9), как это следует из самого способа ее получения, справедлива в частном случае, когда  $f(S) \equiv 1$  и когда решение задачи Дирихле, очевидно, существует (оно тождественно равно 1). Таким образом, имеет место равенство

$$\frac{1}{4\pi} \int_S \frac{P^2 - R_0^2}{P(P^2 - 2PR_0 \cos \gamma + R_0^2)^{3/2}} dS = 1.$$

Пусть  $S_0$  — некоторая точка сферы  $S$ . Составим разность  $v(x_0, y_0, z_0) - f(S_0) =$

$$= \frac{1}{4\pi} \int_S \frac{P^2 - R_0^2}{P(P^2 - 2PR_0 \cos \gamma + R_0^2)^{3/2}} [f(S) - f(S_0)] dS.$$

Мы покажем, что эта разность стремится к нулю, когда точка  $(x_0, y_0, z_0)$  стремится к  $S_0$ . Это доказательство почти совпадает с тем, которое мы уже проводили, рассматривая уравнение теплопроводности.

Окружим точку  $S_0$  малым шаром радиуса  $\eta$ , причем выберем  $\eta$  столь малым, чтобы на всех тех точках поверхности, которые

попадут внутрь этого шара, в силу непрерывности  $f$ , имело место неравенство

$$|f(S) - f(S_0)| < \varepsilon,$$

где  $\varepsilon$  — заданное положительное число. Обозначим через  $\sigma$  часть поверхности  $S$ , заключенную внутри шара радиуса  $\eta$  с центром в  $S_0$ . Написанная выше разность может быть представлена в виде

$$v(x_0, y_0, z_0) - f(S_0) =$$

$$= \frac{1}{4\pi} \iint_{S-\sigma} \frac{P^2 - R_0^2}{P(P^2 - 2PR_0 \cos \gamma + R_0^2)^{3/2}} [f(S) - f(S_0)] dS + \\ + \frac{1}{4\pi} \iint_{\sigma} \frac{P^2 - R_0^2}{P(P^2 - 2PR_0 \cos \gamma + R_0^2)^{3/2}} [f(S) - f(S_0)] dS = I_1 + I_2.$$

Будучи непрерывной, функция  $f(S)$  ограничена на  $S$ , т. е.  $|f(S)| < M$ , где  $M$  — некоторое число. Последнее слагаемое, обозначенное нами через  $I_2$ , оценивается очевидным образом:

$$|I_2| = \frac{1}{4\pi} \left| \iint_{\sigma} \frac{P^2 - R_0^2}{P(P^2 - 2PR_0 \cos \gamma + R_0^2)^{3/2}} [f(S) - f(S_0)] dS \right| \leq \\ \leq \frac{1}{4\pi} \cdot \frac{\varepsilon}{2} \iint_{\sigma} \frac{P^2 - R_0^2}{P(P^2 - 2PR_0 \cos \gamma + R_0^2)^{3/2}} dS < \\ < \frac{\varepsilon}{2} \cdot \frac{1}{4\pi} \iint_S \frac{P^2 - R_0^2}{P(P^2 - 2PR_0 \cos \gamma + R_0^2)^{3/2}} dS = \frac{\varepsilon}{2}.$$

Первое слагаемое  $I_1$  допускает следующую оценку:

$$|I_1| \leq 2M \cdot \frac{1}{4\pi} \iint_{S-\sigma} \frac{P^2 - R_0^2}{P(P^2 - 2PR_0 \cos \gamma + R_0^2)^{3/2}} dS = \\ = \frac{M}{2\pi} \iint_{S-\sigma} \frac{(P - R_0)(P + R_0)}{P[(P - R_0)^2 + 2PR_0(1 - \cos \gamma)]^{3/2}} dS.$$

Таким образом,  $|I_1|$  может быть сколь угодно малым, если точку  $(x_0, y_0, z_0)$  взять достаточно близкой к  $S_0$ . В самом деле, при этом  $1 - \cos \gamma$  везде вне  $\sigma$  будет больше некоторого положительного числа. Значит, знаменатель подинтегральной функции ограничен снизу, а числитель может быть сделан сколь угодно малым.

Следовательно,  $|I_1| < \frac{\varepsilon}{2}$  и  $|v(x_0, y_0, z_0) - f(S_0)| < \varepsilon$ , что и требовалось доказать. Гармоничность функции  $v(x_0, y_0, z_0)$  следует из того, что при  $R_0 < P$  функция  $G$ , а значит и  $\frac{\partial G}{\partial n}$  является гармонической функцией переменных  $x_0, y_0, z_0$ .

Поставим теперь еще одну задачу, так называемую *внешнюю* задачу Дирихле для шара; требуется определить функцию  $u$ , удовлетворяющую вне шара уравнению  $\Delta u = \rho$ , принимающую на сфере  $S$  заданные значения и стремящуюся к нулю на бесконечности. Решение такой задачи, очевидно, единственно.

Пусть  $r$ , как прежде, обозначает расстояние от точки  $(x, y, z)$  до точки  $(x_0, y_0, z_0)$ , лежащей вне шара, и пусть  $r_1$  — расстояние до сопряженной точки.

Тогда гармоническая функция  $g$  вне шара, принимающая на шаре значения  $\frac{1}{r} \Big|_S$ , будет аналогично прежнему иметь вид

$$\frac{1}{R_0 r_1}.$$

Если предположить сначала, что на бесконечности функция  $u$  убывает, как  $\frac{1}{R^\alpha}$ , где  $\alpha > 0$ , первые ее производные убывают как  $\frac{1}{R^{\alpha+1}}$ , а вторые — как  $\frac{1}{R^{\alpha+2}}$ , то нетрудно получить, аналогично прежнему, формулу

$$u(x_0, y_0, z_0) = - \iiint_{\Omega} G \rho \, dx \, dy \, dz + \iint_S \frac{\partial G}{\partial n} u \, dS,$$

где

$$G = \frac{1}{4\pi r} - \frac{1}{4\pi R_0 r_1}.$$

В написанной формуле производная функция под знаком интеграла взята по внешней нормали по отношению к шару. Она является внутренней нормалью по отношению к области, в которой рассматривается задача.

Снова ограничиваясь, прежде всего, случаем, когда  $u|_S = 0$ , видим, что решение уравнения  $\Delta u = \rho$  с однородными условиями имеет вид

$$u = - \iiint_{\Omega} G \rho \, dx \, dy \, dz. \quad (\text{XII.10})$$

Мы будем иметь, проводя опять замену переменных:

$$G = \frac{1}{4\pi} \left[ \frac{1}{\sqrt{R^2 + R_0^2 - 2RR_0 \cos \gamma}} - \frac{1}{\sqrt{R^2 + R_0^2 - 2RR_0 \cos \gamma + 1}} \right],$$

$$\frac{\partial G}{\partial n} \Big|_S = \frac{\partial G}{\partial R} \Big|_{R=1} = \frac{R_0^2 - 1}{(R_0^2 - 2R_0 \cos \gamma + 1)^{3/2}}.$$

Мы проверим, что формула (XII.10) дает решение поставленной задачи, если  $\rho$  обращается в нуль тождественно вне некоторой ограниченной области. Читателю предоставляется анализ общего случая, когда, например,  $|\rho| < \frac{A}{R^{2+\alpha}}$ .

Переходим к доказательству. Как и прежде, формула, выражающая значение  $u(x_0, y_0, z_0)$ , распадается на два слагаемых, из которых первое представляет собой решение уравнения Пуассона с условием обращения решения в нуль на границе области, а второе является решением уравнения Лапласа, принимающим на границе заданные для  $u$  значения. Мы проверим справедливость этого утверждения только для первого слагаемого, так как для второго слагаемого проверка ничем не отличается от предыдущего случая.

Но это утверждение очевидно. В самом деле, при достаточно большом  $R_0$  имеем оценки:

$$|G| \leq \frac{M}{R_0}, \quad \left| \frac{\partial G}{\partial n} \right| \leq \frac{M}{R_0}, \quad \left| \frac{\partial}{\partial x_0} \frac{\partial G}{\partial n} \right| \leq \frac{M}{R_0^2}. \quad (\text{XII.11})$$

Первое из этих неравенств и дает оценку для  $u$ :

$$|u| \leq \iint_{\Omega} \max |\rho| \frac{M}{R_0} d\Omega = 4\pi \frac{\max |\rho| M}{R_0}.$$

Выполнение уравнения  $\Delta u = \rho$  доказывается, как прежде; так же доказывается и обращение в нуль  $u$  на границе.

Из тех же оценок (XII.11) немедленно вытекает еще одно следствие.

*Если гармоническая вне шара радиуса 1 функция стремится к нулю на бесконечности, то можно указать такую постоянную  $M$ , что*

$$|u| \leq \frac{M}{R_0}; \quad \left| \frac{\partial u}{\partial x} \right| \leq \frac{M}{R_0^2}, \quad \left| \frac{\partial u}{\partial y} \right| \leq \frac{M}{R_0^2}, \quad \left| \frac{\partial u}{\partial z} \right| \leq \frac{M}{R_0^2}. \quad (\text{XII.12})$$

В самом деле, такая функция должна по теореме единственности совпадать с функцией

$$u_1 = \iint_S \frac{\partial G}{\partial n} u|_S dS,$$

которая, как мы видели выше, есть гармоническая функция, равная нулю на бесконечности и принимающая на  $S$  те же

значения, что и  $u$ . Значит:

$$|u| \leq \iint_S \left| \frac{\partial G}{\partial n} \right| |u| dS \leq \max_S |u|_S \frac{M}{R_0} 4\pi;$$

$$\left| \frac{\partial u}{\partial x_0} \right| \leq \iint_S \left| \frac{\partial}{\partial x_0} \left( \frac{\partial G}{\partial n} \right) \right| |u| dS \leq \max_S |u|_S \frac{M}{R_0^2} 4\pi \text{ и т. д.}$$

Наше утверждение доказано. Легко заменить в теореме, доказанной нами, единичный шар шаром произвольного радиуса при помощи преобразования переменных. Тогда мы получим следующую теорему:

**Т е о р е м а 1.** Для всякой функции  $u$ , гармонической в окрестности бесконечно удаленной точки и стремящейся к нулю при  $R \rightarrow \infty$ , существует такое число  $M$ , что имеют место неравенства (XII.12).

---

# ЗАДАЧИ ДИРИХЛЕ И НЕЙМАНА ДЛЯ ПОЛУПРОСТРАНСТВА

Мы встретились уже с постановкой двух основных задач теории уравнения Лапласа, а именно, с задачами Дирихле и Неймана.

Напомним, что задача Дирихле для уравнения Лапласа состоит в определении функции  $v$  в области  $\Omega$  с границей  $S$ , удовлетворяющей уравнению

$$\Delta u = 0 \quad (\text{XIII.1})$$

и граничным условиям

$$u|_S = f_1(S). \quad (\text{XIII.2})$$

Задача Неймана состоит в отыскании решения уравнения (XIII.1), удовлетворяющего условию

$$\frac{\partial u}{\partial n} \Big|_S = f_2(S). \quad (\text{XIII.3})$$

Функции  $f_1(S)$  и  $f_2(S)$  мы предположим непрерывными.

Примем за  $\Omega$  область  $z > 0$ ; поверхностью  $S$  будет служить плоскость  $XOY$ . Докажем, что в такой области решение задачи Дирихле, ограниченное всюду, единственно, а решение задачи Неймана определяется с точностью до произвольной постоянной.

Для того чтобы решение задачи Неймана также было единственным, достаточно потребовать еще, например, чтобы  $u(x, y, z)$  стремилось к нулю, когда точка  $(x, y, z)$  стремится к бесконечности, т. е.  $|u(x, y, z)| < \varepsilon$ , если  $x^2 + y^2 + z^2 > R(\varepsilon)$ .

Пусть, например, задача Дирихле имеет какие-нибудь два решения  $u_1$  и  $u_2$ . При этом разность  $v = u_1 - u_2$  будет гармонической функцией, обращающейся в нуль при  $z = 0$ . Определим  $v$  для отрицательных значений  $z$  нечетным образом:

$$v(x, y, z) = -v(x, y, -z).$$

Докажем, что эта функция будет теперь гармонической во всем пространстве, включая и плоскость  $z = 0$ .

Построим сферу  $\sigma$  произвольного радиуса с центром на плоскости  $z = 0$  и определим функцию  $v_1$ , гармоническую внутри

шара, ограниченного этой сферой, и принимающую на поверхности сферы значения

$$v_1|_{\sigma} = v|_{\sigma}. \quad (\text{XIII.4})$$

Легко видеть, что  $v_1$  будет равна нулю при  $z = 0$ . В самом деле, функция

$$w_1(x, y, z) = \frac{1}{2} [v_1(x, y, z) + v_1(x, y, -z)]$$

будет гармонической и принимает на сфере  $\sigma$  значения нуль; следовательно,  $w_1(x, y, 0) = 0$ . Но

$$w_1(x, y, 0) = v_1(x, y, 0).$$

Плоскость  $z = 0$  рассекает наш шар на два полушара. Функция  $v_1$  на границе каждого из них совпадает с  $v$ ; на поверхности  $\sigma$  это следует из (XIII.4), а на части плоскости  $z = 0$  обе эти функции равны нулю. Следовательно,  $v = v_1$  и, значит, функция  $v$  имеет все производные всюду внутри шара  $\sigma$  и гармонична в нем. Так как положение центра шара  $\sigma$  произвольно, то  $v$  будет гармонической во всем пространстве.

Поскольку по условию  $v$  ограничена во всем пространстве, то в силу теоремы Лиувилля (лекция XI) она тождественно равна некоторой постоянной. Эта постоянная может быть только нулем, так как  $v = 0$  при  $z = 0$ .

Докажем единственность решения второй из рассматриваемых задач.

Пусть  $u_1$  и  $u_2$  — два решения задачи Неймана для полупространства. Тогда функция  $v = u_1 - u_2$  удовлетворяет условиям:

$$1) \quad \Delta v = 0 \quad \text{при } z > 0,$$

$$2) \quad \left. \frac{\partial v}{\partial z} \right|_{z=0} = 0.$$

Кроме того, функция  $v$  ограничена во всем верхнем полупространстве ввиду ограниченности  $u_1$  и  $u_2$ .

Определим для отрицательных  $z$  функцию  $v$  с помощью формулы

$$v(x, y, z) = v(x, y, -z).$$

Докажем, что определенная таким образом функция  $v$  будет гармонической всюду, включая плоскость  $z = 0$ .

Рассмотрим производную

$$\frac{\partial v}{\partial z} = w(x, y, z).$$

Это будет функция, гармоническая в верхнем и в нижнем полупространстве, удовлетворяющая условиям:

$$w(x, y, z) = -w(x, y, -z), \quad w(x, y, 0) = 0,$$

и, следовательно, как мы только что доказали, гармоническая во всем пространстве.

При этом функция

$$\omega(x, y, z) = \int_z^{z+1} \frac{\partial v(x, y, z)}{\partial z} dz = v(x, y, z+1) - v(x, y, z)$$

также будет гармонической во всем пространстве. Это легко проверить непосредственным дифференцированием.

Отсюда следует, что функция  $v(x, y, z)$  — также гармоническая во всем пространстве. В самом деле, она могла бы не быть гармонической только на плоскости  $z = 0$ . Но

$$v(x, y, z) = v(x, y, z+1) - \omega(x, y, z). \quad (\text{XIII.5})$$

Правая часть (XIII.5) гармонична на этой плоскости, следовательно, гармонична и левая.

Ввиду ограниченности  $v$  во всем пространстве по теореме Лиувилля имеем:

$$v = \text{const.}$$

Следовательно, решение задачи Неймана единственно с точностью до постоянного слагаемого, что и требовалось доказать.

Переходим к явному решению задач Дирихле и Неймана.

Предположим, что рассматриваемая нами гармоническая функция удовлетворяет условиям:

$$|u| \leq \frac{\mu}{R^\alpha}; \quad \left| \frac{\partial u}{\partial x} \right| \leq \frac{\mu}{R^{1+\alpha}}, \quad \left| \frac{\partial u}{\partial y} \right| \leq \frac{\mu}{R^{1+\alpha}}, \quad \left| \frac{\partial u}{\partial z} \right| \leq \frac{\mu}{R^{1+\alpha}},$$

где  $R = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ ,  $\alpha > 0$ , а  $\mu$  — постоянная.

После того как явное решение задач будет нами получено, надобность в этом предположении отпадет.

Применим к функции  $u$  формулу Грина (IX.4), выбрав за объем  $\Omega$  полушар с центром в начале координат

$$R \leq A, \quad z \geq 0.$$

Так как  $\Delta u = 0$ , то

$$u(x_0, y_0, z_0) = \frac{1}{4\pi} \iint_S \left( u \frac{\partial \frac{1}{r}}{\partial n} - \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial n} \right) dS,$$

где

$$r = \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2}.$$

Поверхность  $S$  состоит из куска  $S_1$  плоскости  $z = 0$  и из поверхности  $S_2$  полусферы  $R = A$ . Устремляя  $A$  к бесконечности, видим, что

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \iint_{S_2} \left( u \frac{\partial \frac{1}{r}}{\partial n} - \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial n} \right) dS = 0.$$

В самом деле,

$$\begin{aligned} \left| \iint_{S_2} u \frac{\partial \frac{1}{r}}{\partial n} dS \right| &\leq \frac{1}{(A - R_0)^2} \iint_{S_2} |u| dS \leq \frac{4\pi\mu A^2}{(A - R_0)^2 A^2}, \\ \left| \iint_{S_2} \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial n} dS \right| &\leq \frac{1}{A - R_0} \iint_{S_2} \left| \frac{\partial u}{\partial n} \right| dS \leq \frac{4\pi\mu A}{(A - R_0) A^2}, \end{aligned}$$

где

$$R_0 = \sqrt{x_0^2 + y_0^2 + z_0^2}.$$

Поэтому

$$\begin{aligned} u(x_0, y_0, z_0) &= \lim_{A \rightarrow \infty} \frac{1}{4\pi} \iint_{S_1} \left( u \frac{\partial \frac{1}{r}}{\partial n} - \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial n} \right) dS = \\ &= \frac{1}{4\pi} \iint_{z=0} \left( u \frac{\partial \frac{1}{r}}{\partial n} - \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial n} \right) dS. \end{aligned} \quad (\text{XIII.6})$$

Рассмотрим вместе с  $(x_0, y_0, z_0)$  еще точку  $(x_0, y_0, -z_0)$  и пусть  $r_1 = \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z + z_0)^2}$ . В верхней полуплоскости  $\frac{1}{r_1}$  — гармоническая функция, так же, как и  $u$ . Поэтому

$$\iiint_{\Omega} \left( \frac{1}{r_1} \Delta u - u \Delta \frac{1}{r_1} \right) dx dy dz = 0,$$

и, следовательно,

$$\iint_{S_1 + S_2} \left( u \frac{\partial \frac{1}{r_1}}{\partial n} - \frac{1}{r_1} \frac{\partial u}{\partial n} \right) dS = 0.$$

Переходя к пределу, когда  $A$  стремится к бесконечности, и пользуясь теми же оценками, что и при выводе формулы (XIII.6), получим:

$$\iint_{z=0} \left( u \frac{\partial \frac{1}{r_1}}{\partial n} - \frac{1}{r_1} \frac{\partial u}{\partial n} \right) dS = 0.$$

Заметим теперь, что на плоскости  $z = 0$  имеют место равенства  $r_1 = r$  и  $\frac{\partial \frac{1}{r_1}}{\partial n} = -\frac{\partial \frac{1}{r}}{\partial n}$  (радиус-векторы  $r_1$  и  $r$  симметричны относительно плоскости  $z = 0$ ), откуда

$$\iint_{z=0} \left( u \frac{\partial \frac{1}{r}}{\partial n} + \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial n} \right) dS = 0. \quad (\text{XIII.7})$$

Складывая (XIII.6) и (XIII.7), получаем:

$$u(x_0, y_0, z_0) = \frac{1}{2\pi} \iint_{z=0} u \frac{\partial \frac{1}{r}}{\partial n} dS = \frac{1}{2\pi} \iint_{z=0} f_1(s) \frac{\partial \frac{1}{r}}{\partial n} dS. \quad (\text{XIII.8})$$

Вычитая (XIII.7) из (XIII.6), будем иметь:

$$u(x_0, y_0, z_0) = -\frac{1}{2\pi} \iint_{z=0} \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial n} dS = -\frac{1}{2\pi} \iint_{z=0} \frac{1}{r} f_2(S) dS. \quad (\text{XIII.9})$$

Проверим теперь, что формулы (XIII.8) и (XIII.9) действительно дают решения задач Дирихле и Неймана.

Мы будем предполагать, что  $f_1(S) = f_1(x, y)$  и  $f_2(S) = f_2(x, y)$  — непрерывные функции, удовлетворяющие неравенствам:

$$|f_1(x, y)| \leq M, \quad |f_2(x, y)| \leq \frac{M}{\rho^{1+\alpha}}, \quad (\text{XIII.10})$$

где  $\rho = \sqrt{x^2 + y^2}$ ,  $\alpha > 0$ , а  $M$  — постоянная. Без ограничения общности можно считать  $\alpha < 1$ .

Убедимся сначала, что интегралы, стоящие в правых частях этих равенств, действительно удовлетворяют уравнению Лапласа; это вытекает из того, что везде при  $z_0 > 0$  их можно дифференцировать по  $x_0, y_0, z_0$  под знаком интеграла. Так, например:

$$\Delta_0 \iint_{z=0} \frac{\partial \frac{1}{r}}{\partial n} f_1(S) dS = \iint_{z=0} f_1(S) \frac{\partial}{\partial n} \left[ \Delta_0 \left( \frac{1}{r} \right) \right] dS = 0;$$

так же точно доказываем, что правая часть (XIII.9) удовлетворяет уравнению. Оценим поведение правой части (XIII.8) и (XIII.9) при  $R_0 = \sqrt{x_0^2 + y_0^2 + z_0^2} \rightarrow \infty$ .

Начнем с оценки интеграла (XIII.8). Покажем, что этот интеграл является ограниченным. В самом деле, имеем:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\partial \frac{1}{r}}{\partial n} f_1(x, y) dx dy = - \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{z_0}{r^3} f_1(x, y) dx dy.$$

Сходимость интеграла в правой части при условии (XIII.10) очевидна. Имеем, далее:

$$\begin{aligned} \left| - \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{z_0}{r^3} f_1(x, y) dx dy \right| &\leq M \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{z_0}{r^3} dx dy = \\ &= M \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\partial}{\partial n} \frac{1}{r} dx dy. \end{aligned}$$

Но последний интеграл равен телесному углу, под которым плоскость  $z = 0$  видна из точки  $(x_0, y_0, z_0)$  и, следовательно, равен  $2\pi$ .

Таким образом получаем оценку

$$\left| \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\partial}{\partial n} \frac{1}{r} f_1(x, y) dx dy \right| \leq 2\pi M.$$

Следовательно, интеграл (XIII.8) представляет собой ограниченную функцию переменных  $x_0, y_0, z_0$ .

Переходя к оценке функции  $u(x_0, y_0, z_0)$ , определяемой формулой (XIII.9), докажем сначала следующую лемму.

**Л е м м а.** Если  $0 \leq \vartheta \leq 1$ , то справедливо неравенство

$$x^2 - 2\vartheta x + 1 \geq \frac{1}{2}(x-1)^2.$$

В самом деле,

$$2\vartheta x \leq 2x \text{ при } x \geq 0, \quad 2\vartheta x \leq 0 \text{ при } x \leq 0.$$

Следовательно,

$$2\vartheta x \leq x + |x|$$

и

$$x^2 - 2\vartheta x + 1 \geq x^2 - x + 1 - |x|.$$

Но  $|x| \leq \frac{1}{2} + \frac{x^2}{2}$  (это следует из неравенства  $|ab| \leq \frac{a^2}{2} + \frac{b^2}{2}$ ) и, значит,

$$x^2 - 2\vartheta x + 1 \geq \frac{x^2}{2} - x + \frac{1}{2} = \frac{1}{2}(x-1)^2.$$

Для того чтобы оценить интеграл (XIII.9) в точке  $x_0 = \rho_0, y_0 = 0, z_0$  (оценка в этой точке благодаря симметрии даст все, что нужно), мы положим:

$$\sqrt{\rho_0^2 + z_0^2} = R_0, \quad \frac{x}{R_0} = \xi, \quad \frac{y}{R_0} = \eta, \quad \frac{\rho_0}{R_0} = \theta.$$

При этом

$$\begin{aligned} \left| \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{r} f_2(x, y) dx dy \right| &\leq \\ &\leq \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{x^2 - 2x\rho_0 + y^2 + z_0^2 + \rho_0^2}} \frac{M}{V(x^2 + y^2)^{1+\alpha}} dx dy = \\ &= \frac{M}{R_0^\alpha} \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{V\xi^2 - 2\xi\theta + 1 + \eta^2} \frac{1}{V(\xi^2 + \eta^2)^{1+\alpha}} d\xi d\eta. \end{aligned}$$

Благодаря лемме имеем:

$$\frac{1}{V\xi^2 - 2\xi\theta + 1 + \eta^2} \leq \frac{1}{V\frac{(\xi-1)^2}{2} + \frac{\eta^2}{2}} = \frac{V\sqrt{2}}{V(\xi-1)^2 + \eta^2},$$

откуда

$$\begin{aligned} \left| \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{r} f_2(x, y) dx dy \right| &\leq \\ &\leq \frac{MV\sqrt{2}}{R_0^\alpha} \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{V(\xi-1)^2 + \eta^2} \frac{1}{V(\xi^2 + \eta^2)^{1+\alpha}} d\xi d\eta. \end{aligned}$$

Последний интеграл абсолютно сходится около всех трех особенностей: 1)  $\xi = 1, \eta = 0$ ; 2)  $\xi = 0, \eta = 0$  и 3)  $\xi = \infty, \eta = \infty$ . Обозначая его через  $N$ , имеем:

$$\left| \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{r} f_2(x, y) dx dy \right| \leq \frac{MN\sqrt{2}}{R_0^\alpha}.$$

Следовательно, функция  $u(x_0, y_0, z_0)$  обращается в нуль на бесконечности, что и требовалось доказать.

Для того чтобы убедиться в том, что мы получили решения задач Дирихле и Неймана, нам остается проверить, что условия при  $z = 0$  также выполнены. Для этого достаточно установить, что

$$\lim_{z_0 \rightarrow 0} \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{z_0}{r^3} f_i(x, y) dx dy = f_i(x_0, y_0) \quad (i=1, 2),$$

ибо так выражаются и предельное значение решения задачи Дирихле и предельные значения нормальной производной решения задачи Неймана.

Окружим точку  $(x_0, y_0)$  кружком  $c$  так, что внутри  $c$

$$|f_1(x, y) - f_1(x_0, y_0)| < \frac{\varepsilon}{6\pi};$$

оставшуюся после выделения  $c$  часть плоскости  $x, y$  обозначим  $c'$ . Так как функции  $f_1(x, y)$  ограничены, то пусть

$$|f_1(x, y)| \leq L.$$

Возьмем  $z_0$  настолько малым, чтобы телесный угол  $\omega_c$ , под которым виден круг  $c$  из точки  $(x_0, y_0, z_0)$ , был бы больше, чем

$$2\pi - \frac{\varepsilon}{3L},$$

а следовательно, угол, под которым видно  $c'$ , меньше, чем  $\frac{\varepsilon}{3L}$  (сумма этих углов есть  $2\pi$ ). Тогда

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{r^3}^{z_0} f_1(x, y) dx dy &= \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\partial}{\partial n} \frac{1}{r} f_1(x, y) dx dy = \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f_1(x, y) d\omega = \\ &= \int_c \int f_1(x_0, y_0) d\omega + \int_c \int [f_1(x, y) - f_1(x_0, y_0)] d\omega + \int_{c'} \int f_1(x, y) d\omega; \\ \left| 2\pi f_1(x_0, y_0) - \int_c \int f_1(x_0, y_0) d\omega \right| &\leq \left| f_1(x_0, y_0) \right| \left| 2\pi - 2\pi + \frac{\varepsilon}{3L} \right| \leq \frac{\varepsilon}{3}; \\ \left| \int_c \int [f_1(x, y) - f_1(x_0, y_0)] d\omega \right| &\leq \int_c \int \frac{\varepsilon}{6\pi} d\omega \leq \frac{\varepsilon}{3}; \\ \left| \int_{c'} \int f_1(x, y) d\omega \right| &\leq L \int_{c'} \int d\omega \leq \frac{\varepsilon}{3}, \end{aligned}$$

откуда

$$\left| \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{r^3}^{z_0} f_1(x, y) dx dy - 2\pi f_1(x_0, y_0) \right| \leq \varepsilon,$$

что и требовалось доказать.

# ЛЕКЦИЯ XIV

## ВОЛНОВОЕ УРАВНЕНИЕ И ЗАПАЗДЫВАЮЩИЕ ПОТЕНЦИАЛЫ

### § 1. Характеристики волнового уравнения

Рассмотрим волновое уравнение с четырьмя переменными

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} - \frac{1}{a^2} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = F(x, y, z, t) \quad (\text{XIV.1})$$

и займемся прежде всего его характеристиками.

Уравнение поверхностей характеристик будет иметь вид

$$\left(\frac{\partial \Phi}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial \Phi}{\partial y}\right)^2 + \left(\frac{\partial \Phi}{\partial z}\right)^2 - \frac{1}{a^2} \left(\frac{\partial \Phi}{\partial t}\right)^2 = 0, \quad (\text{XIV.2})$$

или

$$\left(\frac{\partial t}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial t}{\partial y}\right)^2 + \left(\frac{\partial t}{\partial z}\right)^2 = \frac{1}{a^2}. \quad (\text{XIV.2})$$

Рассмотрим в четырехмерном пространстве переменных  $(x, y, z, t)$  поверхность, определяемую уравнением

$$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2 - a^2(t - t_0)^2 = 0. \quad (\text{XIV.3})$$

Поверхность (XIV.3) называется *характеристическим коноидом*. Легко проверить непосредственно, что неявная функция, определяемая равенством (XIV.3), удовлетворяет уравнению (XIV.2'). Точка  $(x_0, y_0, z_0, t_0)$  является особой для поверхности (XIV.3). В этой точке поверхность не имеет касательной плоскости, так как в ней отношение  $\cos(n, x) : \cos(n, y) : \cos(n, z) : \cos(n, t)$  становится неопределенным. По аналогии с поверхностями в трехмерном пространстве эту точку называют конической.

Для случая уравнения колебаний мембраны уравнение такой характеристической поверхности имеет вид

$$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 - a^2(t - t_0)^2 = 0$$

Это есть уравнение конуса с вершиной в точке  $(x_0, y_0, t_0)$  в трехмерном пространстве  $x, y, t$ .

Представим уравнение (XIV.3) в виде

$$t = t_0 \pm \frac{r}{a}, \quad (\text{XIV.4})$$

где

$$r = \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2}.$$

В зависимости от выбора знака в (XIV.4), мы получим уравнение верхней или нижней половин коноида. Мы используем нижнюю половину, т. е. часть, определенную уравнением

$$t = t_0 - \frac{r}{a}.$$

## § 2. Метод Кирхгофа для решения задачи Коши

Идея метода Кирхгофа решения задачи Коши для волнового уравнения такова же, как и идея приведенного выше решения первой краевой задачи для гиперболических уравнений (V, § 1) по методу последовательных приближений. Строится характеристический коноид с вершиной в данной точке  $(x_0, y_0, z_0, t_0)$ . Как было выяснено в лекции III, значения функции  $u$  и ее производных на этом коноиде связаны некоторым уравнением в частных производных, зависящим уже от трех переменных и вытекающим из (XIV.2) в силу волнового уравнения. После подробного рассмотрения оказывается, что это обстоятельство позволяет просто выразить значение неизвестной функции в вершине коноида через известные данные, подобно тому как в лекции IV значение функции  $\frac{\partial u}{\partial \eta}$  в некоторой точке на характеристике  $\xi = \text{const}$  было нами выражено через значение ее в любой другой точке той же характеристики при помощи квадратуры.

Приступим к изучению метода. Для того чтобы получить искомое соотношение на характеристическом коноиде, мы поступим таким же образом, как это было сделано в лекции III, § 4. Преобразуем уравнение (XIV.1) к новым независимым переменным:

$$x_1 = x, \quad y_1 = y, \quad z_1 = z$$

и

$$t_1 = t - t_0 + \frac{r}{a}.$$

Обозначим еще

$$u\left(x_1, y_1, z_1, t_1 + t_0 - \frac{r}{a}\right) = u_1(x_1, y_1, z_1, t_1)$$

аналогично и для других функций.

При этом <sup>1)</sup>

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial u_1}{\partial x_1} + \frac{\partial u_1}{\partial t_1} \frac{x_1 - x_0}{ra},$$

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial u_1}{\partial t_1},$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = \frac{\partial^2 u_1}{\partial t_1^2},$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 u_1}{\partial x_1^2} + 2 \frac{\partial^2 u_1}{\partial x_1 \partial t_1} \frac{x_1 - x_0}{ra} + \frac{\partial^2 u_1}{\partial t_1^2} \frac{(x_1 - x_0)^2}{r^2 a^2} + \left( \frac{1}{ra} - \frac{(x_1 - x_0)^2}{r^3 a} \right) \frac{\partial u_1}{\partial t_1},$$

и наше уравнение переходит в уравнение

$$\frac{\partial^2 u_1}{\partial x_1^2} + \frac{\partial^2 u_1}{\partial y_1^2} + \frac{\partial^2 u_1}{\partial z_1^2} + \frac{2}{a} \frac{\partial}{\partial r} \left( \frac{\partial u_1}{\partial t_1} \right) + \frac{2}{ra} \frac{\partial u_1}{\partial t_1} +$$

$$+ \left[ \left( \frac{x_1 - x_0}{ra} \right)^2 + \left( \frac{y_1 - y_0}{ra} \right)^2 + \left( \frac{z_1 - z_0}{ra} \right)^2 - \frac{1}{a^2} \right] \frac{\partial^2 u_1}{\partial t_1^2} = F_1(x_1, y_1, z_1, t_1),$$

где через  $\frac{\partial}{\partial r}$  обозначено выражение

$$\frac{x_1 - x_0}{r} \frac{\partial}{\partial x_1} + \frac{y_1 - y_0}{r} \frac{\partial}{\partial y_1} + \frac{z_1 - z_0}{r} \frac{\partial}{\partial z_1}.$$

Оператор  $\frac{\partial}{\partial r}$  обозначает производную, взятую по направлению радиуса  $r$ , проведенного из точки  $(x_0, y_0, z_0)$  в данную точку  $(x_1, y_1, z_1)$ . В самом деле,

$$\frac{x_1 - x_0}{r} = \cos(x, r), \quad \frac{y_1 - y_0}{r} = \cos(y, r), \quad \frac{z_1 - z_0}{r} = \cos(z, r).$$

Так как  $\left( \frac{x_1 - x_0}{ar} \right)^2 + \left( \frac{y_1 - y_0}{ar} \right)^2 + \left( \frac{z_1 - z_0}{ar} \right)^2 - \frac{1}{a^2} = 0$ , то наше уравнение запишется в виде

$$\Delta u_1 + \frac{2}{ar} \frac{\partial}{\partial r} \left[ r \frac{\partial u_1}{\partial t_1} \right] = F_1(x_1, y_1, z_1, t_1),$$

или

$$\frac{1}{r} \Delta u_1 + \frac{2}{ar^2} \frac{\partial}{\partial r} \left[ r \frac{\partial u_1}{\partial t_1} \right] = \frac{1}{r} F_1(x_1, y_1, z_1, t_1). \quad (\text{XIV.5})$$

Равенство (XIV.5) позволяет сразу построить некоторое частное решение волнового уравнения, имеющее важное значение. Пусть  $F_1 = 0$ . При этом функция  $u_1 = \frac{\Phi(t_1)}{r}$ , где  $\Phi_1$  — произвольная, дважды дифференцируемая функция, даст нам решение уравнения (XIV.5) в силу того, что  $\frac{\partial u_1}{\partial t_1} = \frac{1}{r} \Phi'(t_1)$  и оба

<sup>1)</sup> Очевидно, при нашей замене  $r_1 = r$ , и далее мы всюду пишем  $r$ .

слагаемых левой части (XIV.5) обращаются в нуль. Подставляя вместо  $t_1$  его выражение через  $x, y, z$  и  $t$ , получим:

$$u = \frac{1}{r} \Phi \left( t - t_0 + \frac{r}{a} \right).$$

В данном случае параметр  $t_0$  является несущественным, и мы можем взять решение в виде

$$u = \frac{1}{r} \Phi_1 \left( t + \frac{r}{a} \right).$$

Легко проверить, что

$$u = \frac{1}{r} \Phi_3 \left( -t + \frac{r}{a} \right)$$

будет также решением волнового уравнения, так как волновое уравнение не меняется при замене  $t$  на  $-t$ . Положив  $\Phi_3 \left( -t + \frac{r}{a} \right) = \Phi_2 \left( t - \frac{r}{a} \right)$ , получим, складывая оба частных решения:

$$u = \frac{1}{r} \left[ \Phi_1 \left( t + \frac{r}{a} \right) + \Phi_2 \left( t - \frac{r}{a} \right) \right]. \quad (\text{XIV.6})$$

Формула (XIV.6) по своему внешнему виду напоминает формулу Даламбера для решения уравнения колебаний струны. Решения, даваемые этой функцией, носят название *сферических волн*. Первое слагаемое представляет собой волну постоянной формы, сходящуюся к точке  $r = 0$ . По мере приближения этой волны к своему центру амплитуда ее растет.

Второе слагаемое представляет собой волну постоянной формы, распространяющуюся от точки  $r = 0$  на бесконечность. Эта волна также отличается от рассмотренных волн в струне тем, что ее амплитуда убывает на бесконечности, как  $\frac{1}{r}$ .

Если  $\Phi_1$  и  $\Phi_2$  отличны от нуля лишь на конечном промежутке изменения своего аргумента, то в каждой точке пространства до вступления сферических волн и после их прохождения функция  $u$  становится равной нулю, т. е. воцаряется покой.

Как мы далее увидим, роль этих решений для волнового уравнения сходна с той ролью, которую играет функция  $\frac{1}{r}$  для уравнения Лапласа.

Проинтегрируем обе части уравнения (XIV.5) по некоторой области  $\Omega$  пространства  $x_1, y_1, z_1$ , содержащей внутри себя точку  $(x_0, y_0, z_0)$ . Границу области  $\Omega$  обозначим  $S$ . Для удобства выделим из этой области точку  $(x_0, y_0, z_0)$  при помощи малой сферы  $\sigma$  радиуса  $\varepsilon$ , а впоследствии перейдем к пределу при  $\varepsilon \rightarrow 0$ . Шаровой объем, ограниченный сферой  $\sigma$ , обозначим буквой  $\tau$ .

Мы получим:

$$\begin{aligned} \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \iiint_{\Omega - \tau} \left[ \frac{1}{r} \Delta u_1 + \frac{2}{ar^2} \frac{\partial}{\partial r} \left( r \frac{\partial u_1}{\partial t_1} \right) \right] dx_1 dy_1 dz_1 = \\ = \iiint_{\Omega} \frac{1}{r} F_1(x_1, y_1, z_1, t_1) dx_1 dy_1 dz_1. \quad (\text{XIV.7}) \end{aligned}$$

Прежде чем переходить к пределу в левой части, мы несколько преобразуем ее.

На основании формулы Грина (IX.4) имеем:

$$\begin{aligned} \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \iiint_{\Omega - \tau} \frac{1}{r} \Delta u_1 dx_1 dy_1 dz_1 = \iiint_{\Omega} \frac{1}{r} \Delta u_1 dx_1 dy_1 dz_1 = \\ = -4\pi u_1(x_0, y_0, z_0, t - t_0) + \iint_S \left( u_1 \frac{\partial \frac{1}{r}}{\partial n} - \frac{1}{r} \frac{\partial u_1}{\partial n} \right) dS; \quad (\text{XIV.8}) \end{aligned}$$

так как  $t_1$  при  $x_1 = x_0, y_1 = y_0, z_1 = z_0$  равняется  $t - t_0$ .

Далее, вводя полярные координаты:

$$dx_1 dy_1 dz_1 = r^2 \sin \vartheta d\vartheta d\varphi dr,$$

будем иметь:

$$\begin{aligned} I_{\varepsilon} &\equiv \iiint_{\Omega - \tau} \frac{2}{ar^2} \frac{\partial}{\partial r} \left[ r \frac{\partial u_1}{\partial t_1} \right] dx_1 dy_1 dz_1 = \\ &= \frac{2}{a} \iiint_{\Omega - \tau} \frac{\partial}{\partial r} \left[ r \frac{\partial u_1}{\partial t_1} \right] \sin \vartheta d\vartheta d\varphi dr = \\ &= \frac{2}{a} \iint_{S + \sigma} r \frac{\partial u_1}{\partial t_1} [-\operatorname{sign} \cos(r, n)] \sin \vartheta d\vartheta d\varphi = \frac{2}{a} \iint_{S + \sigma} r \frac{\partial u_1}{\partial t_1} d\omega, \end{aligned}$$

где через  $\omega$  обозначен телесный угол [см. (IX.8)]. Продолжая преобразования, получим:

$$I_{\varepsilon} = \frac{2}{a} \iint_{S + \sigma} r \frac{\partial u_1}{\partial t_1} \frac{\partial \frac{1}{r}}{\partial n} dS = -\frac{2}{a} \iint_{S + \sigma} \frac{1}{r} \frac{\partial r}{\partial n} \frac{\partial u_1}{\partial t_1} dS.$$

Предел  $\iint_{\sigma} \frac{1}{r} \frac{\partial r}{\partial n} \frac{\partial u_1}{\partial t_1} dS$ , очевидно, равен нулю, если  $\frac{\partial u_1}{\partial t_1}$  ограничено. В самом деле,  $\frac{\partial r}{\partial n}$  ограничено, и интеграл меньше, чем

$$\frac{M}{\varepsilon} \iint_{\sigma} dS = 4\pi \varepsilon M,$$

где  $M$  — некоторая постоянная; следовательно,

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} I_{\varepsilon} = -\frac{2}{a} \int_S \int \frac{1}{r} \frac{\partial r}{\partial n} \frac{\partial u_1}{\partial t_1} dS. \quad (\text{XIV.9})$$

Формулы (XIV.7), (XIV.8) и (XIV.9) дают:

$$\begin{aligned} -4\pi u_1(x_0, y_0, z_0, t-t_0) + \int_S \int \left( u_1 \frac{\partial \frac{1}{r}}{\partial n} - \frac{1}{r} \frac{\partial u_1}{\partial n} - \frac{2}{ra} \frac{\partial r}{\partial n} \frac{\partial u_1}{\partial t_1} \right) dS = \\ = \iiint_{\Omega} \frac{1}{r} F_1(x_1, y_1, z_1, t_1) dx_1 dy_1 dz_1. \end{aligned}$$

Положим теперь  $t_1 = 0$ , тогда  $t = t_0 - \frac{r}{a}$ ; если, кроме того,

$x_1 = x_0, y_1 = y_0, z_1 = z_0$ , то  $t = t_0$ ; поэтому

$$\begin{aligned} u_1(x_0, y_0, z_0, 0) &= u(x_0, y_0, z_0, t_0), \\ F_1(x_1, y_1, z_1, 0) &= F\left(x, y, z, t_0 - \frac{r}{a}\right) \end{aligned}$$

и наша формула запишется так:

$$\begin{aligned} u(x_0, y_0, z_0, t_0) &= \frac{1}{4\pi} \int_S \int \left( u_1 \frac{\partial \frac{1}{r}}{\partial n} - \frac{1}{r} \frac{\partial u_1}{\partial n} - \frac{2}{ra} \frac{\partial r}{\partial n} \frac{\partial u_1}{\partial t_1} \right) \Big|_{t_1=0} dS - \\ &- \frac{1}{4\pi} \iiint_{\Omega} \frac{1}{r} F\left(x, y, z, t_0 - \frac{r}{a}\right) dx dy dz. \quad (\text{XIV.10}) \end{aligned}$$

Формула (XIV.10) называется *формулой Кирхгофа*; как мы сейчас увидим, она позволяет найти решение задачи Коши для волнового уравнения.

Эта формула весьма напоминает по своему внешнему виду формулу Грина, выведенную нами ранее. Если считать  $u_1, \frac{\partial u_1}{\partial n}, \frac{\partial u_1}{\partial t_1}$  заданными на поверхности  $S$ , то правая часть (XIV.10) будет представлять собой известную функцию. В правой части этой формулы находятся интегралы, которые принято называть *запаздывающими потенциалами*. Поясним это название на примере последнего интеграла

$$\frac{1}{4\pi} \iiint_{\Omega} \frac{1}{r} F\left(x, y, z, t_0 - \frac{r}{a}\right) dx dy dz. \quad (\text{XIV.11})$$

В таком виде этот интеграл отличается от ньютонова потенциала только тем, что функция  $F$  входит не с аргументом  $t_0$ , а с «запаздывающим» аргументом  $t_0 - \frac{r}{a}$ .

Переходим к решению задачи Коши, т. е. к решению уравнения (XIV.1) при условиях:

$$\left. \begin{aligned} u|_{t=0} &= \Phi_0(x, y, z), \\ \frac{\partial u}{\partial t}|_{t=0} &= \Phi_1(x, y, z). \end{aligned} \right\} \quad (\text{XIV.12})$$

За поверхность  $S$  примем поверхность  $t_0 - \frac{r}{a} = 0$ ; тогда на ней  $t = 0$  при  $t_1 = 0$ .

Область, ограниченная  $S$ , есть шар радиуса  $at_0$  вокруг точки  $(x_0, y_0, z_0)$  и, следовательно, к ней применима формула (XIV.10). При  $t = 0$  условия (XIV.12) определяют все производные первого порядка от  $u$  и, следовательно, от  $u_1$ . Мы будем иметь:

$$\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial t}|_{t=0} &= \frac{\partial u_1}{\partial t_1}|_{t=0} = \Phi_1(x, y, z); \\ \frac{\partial u_1}{\partial n} &= \frac{\partial u_1}{\partial x_1} \cos(n, x) + \frac{\partial u_1}{\partial y_1} \cos(n, y) + \frac{\partial u_1}{\partial z_1} \cos(n, z) = \\ &= \left( \frac{\partial u}{\partial x} - \frac{1}{a} \frac{\partial u}{\partial t} \frac{\partial r}{\partial x} \right) \cos(n, x) + \left( \frac{\partial u}{\partial y} - \frac{1}{a} \frac{\partial u}{\partial t} \frac{\partial r}{\partial y} \right) \cos(n, y) + \\ &\quad + \left( \frac{\partial u}{\partial z} - \frac{1}{a} \frac{\partial u}{\partial t} \frac{\partial r}{\partial z} \right) \cos(n, z) = \frac{\partial u}{\partial n} - \frac{1}{a} \frac{\partial u}{\partial t} \frac{\partial r}{\partial n} \end{aligned}$$

и, следовательно,

$$\frac{\partial u_1}{\partial n}|_{t=0} = \frac{\partial \Phi_0}{\partial n} - \frac{1}{a} \Phi_1(x, y, z) \frac{\partial r}{\partial n},$$

и окончательно

$$\begin{aligned} u(x_0, y_0, z_0, t_0) &= \frac{1}{4\pi} \int \int_{r=at_0} \left( \Phi_0 \frac{\partial \frac{1}{r}}{\partial n} - \frac{1}{r} \frac{\partial \Phi_0}{\partial n} - \frac{1}{ar} \frac{\partial r}{\partial n} \Phi_1 \right) dS - \\ &\quad - \frac{1}{4\pi} \int \int \int_{r \leq at_0} \frac{1}{r} F(x, y, z, t_0 - \frac{r}{a}) dx dy dz. \quad (\text{XIV.13}) \end{aligned}$$

Формула (XIV.13) дает явное выражение для значения неизвестной функции в любой точке  $(x_0, y_0, z_0)$  в произвольный момент времени  $t_0 > 0$ . Тем самым доказывается единственность решения задачи Коши для волнового уравнения, если только такое решение существует. Мы покажем, далее, что полученная нами функция удовлетворяет уравнению и начальным условиям, а также проверим корректность постановки задачи Коши.

Формуле (XIV.13) для случая  $F = 0$  можно дать еще одно выражение, которое называется *формулой Пуассона* и часто встречается в литературе.

Обозначим через  $T_\rho \{ \psi \}$  среднее арифметическое значений функции  $\psi$  на сфере радиуса  $\rho$ , описанной вокруг точки  $(x_0, y_0, z_0)$ :

$$T_\rho \{ \psi \} = \frac{1}{4\pi} \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \psi(\rho, \vartheta, \varphi) \sin \vartheta \, d\vartheta \, d\varphi,$$

где  $\rho, \vartheta, \varphi$  суть полярные координаты с началом в точке  $(x_0, y_0, z_0)$ , связанные с декартовыми прямоугольными координатами посредством формул

$$\begin{aligned} x &= x_0 + \rho \sin \vartheta \cos \varphi; \\ y &= y_0 + \rho \sin \vartheta \sin \varphi; \\ z &= z_0 + \rho \cos \vartheta; \\ 0 &\leq \varphi \leq 2\pi; \\ 0 &\leq \vartheta \leq \pi. \end{aligned}$$

Пользуясь этим обозначением, можно переписать формулу (XIV.13) в следующем виде (формула Пуассона):

$$u(x_0, y_0, z_0, t_0) = t_0 T_{at_0} \{ \varphi_1 \} + \frac{\partial}{\partial t_0} [t_0 T_{at_0} \{ \varphi_0 \}].$$

Проверим это. В самом деле, на поверхности  $\rho = at_0$  мы имеем:

$$\begin{aligned} \frac{\partial \rho}{\partial n} &= -\frac{\partial \rho}{\partial \rho} = -1, \\ dS &= a^2 t_0^2 \sin \vartheta \, d\vartheta \, d\varphi, \end{aligned}$$

и, следовательно,

$$-\frac{1}{4\pi} \int \int_{\rho=at_0} \frac{1}{a\rho} \frac{\partial \rho}{\partial n} \varphi_1 \, dS = \frac{t_0}{4\pi} \int \int_{\rho=at_0} \varphi_1(\rho, \vartheta, \varphi) \sin \vartheta \, d\vartheta \, d\varphi.$$

Далее,

$$\frac{\partial \varphi_0}{\partial n} = -\frac{\partial \varphi_0}{\partial \rho}, \quad \frac{\partial \frac{1}{\rho}}{\partial n} = \frac{1}{\rho^2} \frac{\partial \rho}{\partial n} = -\frac{1}{a^2 t_0^2},$$

откуда после несложных выкладок получим:

$$\begin{aligned} \frac{1}{4\pi} \int \int_{\rho=at_0} \left( \varphi_0 \frac{\partial \frac{1}{\rho}}{\partial n} - \frac{1}{\rho} \frac{\partial \varphi_0}{\partial n} \right) dS &= \\ &= \frac{1}{4\pi} \int \int_{\rho=at_0} \varphi_0 \sin \vartheta \, d\vartheta \, d\varphi + t_0 \frac{\partial}{\partial t_0} \frac{1}{4\pi} \int \int_{\rho=at_0} \varphi_0 \sin \vartheta \, d\vartheta \, d\varphi, \end{aligned}$$

что и требовалось доказать.

Отметим некоторые важные следствия из формулы (XIV.13),

Представим себе, что внешних возмущающих сил нет, т. е.  $F=0$ , а начальное возмущение при  $t=0$  сосредоточено в некоторой ограниченной области  $\omega$ . Будем исследовать поведение решения в некоторой точке  $(x_0, y_0, z_0)$ , лежащей вне области  $\omega$ . Пусть расстояние от области  $\omega$  до точки  $(x_0, y_0, z_0)$  равно  $\delta$ . При  $t_0 < \frac{\delta}{a}$  сфера  $S$ , уравнение которой  $r = at_0$ , будет лежать вся вне  $\omega$ , и поэтому результат подстановки такого значения  $t_0$  в правую часть (XIV.13) дает нуль. При  $t_0 \geq \frac{\delta}{a}$  функция  $u$  начнет изменяться до тех пор, пока  $S$  пересекает область  $\omega$ . Затем при  $t_0 = \frac{D}{a}$ , где  $D$  — наибольшее

удаление точки области  $\omega$  от точки  $(x_0, y_0, z_0)$ ,  $u$  станет опять равным нулю и таким и останется. Чем дальше точка  $(x_0, y_0, z_0)$  от области  $\omega$ , тем позднее дойдет туда возмущение и тем позднее оно пройдет мимо этой точки. В каждый данный момент  $t_0$  мы можем построить поверхность  $S_1$ , отделяющую точки, до которых возмущение еще не дошло, от тех, куда это возмущение уже докатилось. Эту поверхность называют *передним фронтом волны*.




Рис. 12

Другая поверхность,  $S_2$ , отделяет точки, в которых возмущение еще имеется, от тех, в которых колебание прекратилось. Эта поверхность называется *задним фронтом волны*.

Наличием заднего фронта волны объясняется тот факт, что звук, издаваемый каким-либо источником, не затухает постепенно в данной точке пространства, а прекращается сразу после прохождения волны. Если бы это обстоятельство не имело места, звуки сливались бы друг с другом, как звуки рояля, на котором нажата и не отпущена педаль.

На рис. 12 изображены передний и задний фронты волны, возникшей из возмущения в ограниченной области  $\omega$ .

Переходим к доказательству корректности постановки задачи Коши.

Если вместо функций  $\varphi_0$  и  $\varphi_1$  мы подставим в формулу (XIV.13) другие  $\varphi_0^*$  и  $\varphi_1^*$ , такие, что

$$|\varphi_0 - \varphi_0^*| < \varepsilon, \quad \left| \frac{\partial \varphi_0}{\partial x} - \frac{\partial \varphi_0^*}{\partial x} \right| < \varepsilon, \quad \left| \frac{\partial \varphi_0}{\partial y} - \frac{\partial \varphi_0^*}{\partial y} \right| < \varepsilon, \quad \left| \frac{\partial \varphi_0}{\partial z} - \frac{\partial \varphi_0^*}{\partial z} \right| < \varepsilon, \\ |\varphi_1 - \varphi_1^*| < \varepsilon,$$

то решение  $u^*$  задачи Коши, как это вытекает из формулы (XIV.13), для новых начальных данных будет мало отличаться от решения для старых, ибо

$$|u^* - u| =$$

$$= \frac{1}{4\pi} \left| \int_{r=a t_0} \int \left[ (\Phi_0^* - \Phi_0) \frac{\partial}{\partial n} \frac{1}{r} - \frac{1}{r} \left( \frac{\partial \Phi_0^*}{\partial n} - \frac{\partial \Phi_0}{\partial n} \right) - \frac{1}{ar} \frac{\partial r}{\partial n} (\Phi_1^* - \Phi_1) \right] dS \right| \leq M\varepsilon,$$

где  $M$  — некоторая постоянная, зависящая только от  $t_0$ .

Следовательно, решение  $u$  зависит от функции  $\Phi_0$  непрерывно порядка  $(1, 0)$  и от функции  $\Phi_1$  непрерывно порядка  $(0, 0)$  в смысле лекции II.

Докажем теперь, что полученное нами решение действительно удовлетворяет уравнению.

Прежде всего заметим, что доказательство достаточно провести для того случая, когда  $\Phi_0$  и  $\Phi_1$  тождественно равны нулю, так как мы сможем тогда установить существование решения для любых дважды непрерывно дифференцируемых функций  $\Phi_0$  и  $\Phi_1$ . В самом деле, если мы докажем, что решение при нулевых начальных условиях существует, то мы установим тем самым существование решения уравнения

$$\Delta w - \frac{1}{a^2} \frac{\partial^2 w}{\partial t^2} = F - \Delta v + \frac{1}{a^2} \frac{\partial^2 v}{\partial t^2}$$

при условиях

$$w \Big|_{t=0} = \frac{\partial w}{\partial t} \Big|_{t=0} = 0,$$

где  $v$  — произвольная функция.

Если  $v$  удовлетворяет условиям

$$v \Big|_{t=0} = \Phi_0, \quad \frac{\partial v}{\partial t} \Big|_{t=0} = \Phi_1,$$

а такие функции, очевидно, существуют, например  $v = \Phi_0 + t\Phi_1$ , то отсюда следует существование функции  $u = w + v$ , удовлетворяющей условиям Коши и волновому уравнению (XIV.1). Если же решение этой последней задачи существует, то оно выражается формулой (XIV.13).

Полагая в формуле (XIV.13)  $\Phi_0 = \Phi_1 = 0$ , получим:

$$u(x_0, y_0, z_0, t_0) = -\frac{1}{4\pi} \int_{r \leq a t_0} \int \int \frac{1}{r} F(x, y, z, t_0 - \frac{r}{a}) dx dy dz. \quad (\text{XIV.14})$$

Покажем, что функция  $u(x_0, y_0, z_0, t_0)$ , даваемая формулой (XIV.14), действительно удовлетворяет уравнению. Непосредственная проверка этого обстоятельства потребовала бы громоздких выкладок, и мы предпочтем избрать другой путь.

Мы докажем одно важное интегральное тождество, равносильное в некотором смысле волновому уравнению для функции  $u$ , определяемой формулой (XIV.14).

Рассмотрим произвольную функцию  $\psi(x_0, y_0, z_0, t_0)$ , обращающуюся в нуль везде кроме некоторого шара  $s$  в четырехмерном пространстве с центром в точке  $(x_0, y_0, z_0, t_0)$  и имеющую везде несколько непрерывных производных.

Эта функция удовлетворяет некоторому уравнению:

$$\Delta\psi - \frac{1}{a^2} \frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} = \Phi, \quad (\text{XIV.15})$$

где  $\Phi$  вычисляется непосредственным дифференцированием.

Согласно нашему предположению

$$\psi|_{t=T} = 0, \quad \frac{\partial \psi}{\partial t}|_{t=T} = 0$$

при достаточно большом  $T$ . При этом функция  $\psi$ , как решение задачи Коши для уравнения (XIV.15), представляется для  $t < T$  формулой

$$\begin{aligned} \psi(x_0, y_0, z_0, t_0) = \\ = -\frac{1}{4\pi} \int \int \int_{r \leq a(T-t_0)} \frac{1}{r} \Phi\left(x, y, z, t_0 + \frac{r}{a}\right) dx dy dz. \end{aligned} \quad (\text{XIV.16})$$

(Этой формулы мы не выводили, но она сразу получается, если заменить сначала в уравнении  $t$  на  $T - t^*$  и, преобразовав данные, написать решение уравнения, а потом вернуться от переменного  $t^*$  к переменному  $t$ .)

В формуле (XIV.16) мы могли бы и не ставить пределов интегрирования, так как при

$$r \geq a(T - t_0)$$

функция  $\Phi\left(x, y, z, t_0 + \frac{r}{a}\right)$ , очевидно, обращается в нуль, ибо

$$t_0 + \frac{r}{a} \geq T.$$

Пусть

$$F(x_0, y_0, z_0, t_0) = 0$$

при  $t_0 < 0$ .

Умножим функцию  $\psi(x_0, y_0, z_0, t_0)$  на  $F(x_0, y_0, z_0, t_0)$  и проинтегрируем по всему пространству. Мы будем иметь:

$$\begin{aligned} & \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \psi(x_0, y_0, z_0, t_0) F(x_0, y_0, z_0, t_0) dx_0 dy_0 dz_0 dt_0 = \\ & = -\frac{1}{4\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} F(x_0, y_0, z_0, t_0) \times \\ & \times \left\{ \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{r} \Phi\left(x, y, z, t_0 + \frac{r}{a}\right) dx dy dz \right\} dx_0 dy_0 dz_0 dt_0. \end{aligned}$$

Последний интеграл можно записать в виде

$$\begin{aligned} & -\frac{1}{4\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{r} \Phi\left(x, y, z, t_0 + \frac{r}{a}\right) \times \\ & \times F(x_0, y_0, z_0, t_0) dx dy dz dx_0 dy_0 dz_0 dt_0. \end{aligned}$$

В самом деле, подинтегральная функция отлична от нуля в ограниченной области своих независимых переменных. Если  $\frac{r}{a}$  или  $t_0$  достаточно велико, то  $t_0 + \frac{r}{a}$  также будет большим, так как  $t_0 > 0$ . Заменим переменные, полагая  $t_0 + \frac{r}{a} = t$ .

Тогда справедлива формула

$$\begin{aligned} & \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \psi(x_0, y_0, z_0, t_0) F(x_0, y_0, z_0, t_0) dx_0 dy_0 dz_0 dt_0 = \\ & = -\frac{1}{4\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \Phi(x, y, z, t) \times \\ & \times \left\{ \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{r} F\left(x_0, y_0, z_0, t - \frac{r}{a}\right) dx_0 dy_0 dz_0 \right\} dx dy dz dt. \end{aligned}$$

В самом деле, внутренний интеграл имеет смысл, ибо подинтегральная функция при фиксированных  $x, y, z, t$  отлична от нуля

лишь в ограниченной области. Отсюда

$$\begin{aligned} & \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \psi(x, y, z, t) F(x, y, z, t) dx dy dz dt = \\ & = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \left( \Delta \psi - \frac{1}{a^2} \frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} \right) u(x, y, z, t) dx dy dz dt, \quad (\text{XIV.17}) \end{aligned}$$

где

$$u(x, y, z, t) = -\frac{1}{4\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{r} F\left(x_0, y_0, z_0, t - \frac{r}{a}\right) dx_0 dy_0 dz_0.$$

Тождество (XIV.17) и есть то основное интегральное тождество, которому удовлетворяет функция  $u$ . Мы покажем, что если  $u$  имеет непрерывные производные 2-го порядка, то она удовлетворяет уравнению (XIV.1). В самом деле, оператор

$$\Delta - \frac{1}{a^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2},$$

как нетрудно видеть, является самосопряженным [см. § 2 (V)]. Поэтому интеграл

$$\begin{aligned} & \iiint_{\Omega} \int \left[ u \left( \Delta \psi - \frac{1}{a^2} \frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} \right) - \psi \left( \Delta u - \frac{1}{a^2} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} \right) \right] dx dy dz dt = \\ & = \iiint_{\Omega} \int \left( \frac{\partial P_x}{\partial x} + \frac{\partial P_y}{\partial y} + \frac{\partial P_z}{\partial z} + \frac{\partial P_t}{\partial t} \right) dx dy dz dt \end{aligned}$$

преобразуется в интеграл, взятый на поверхности  $S$ , ограничивающей объем  $\Omega$  [см. (V.15)].

Если взять объем  $\Omega$  достаточно большим, так чтобы на поверхности  $S$  функции  $\psi$  и все ее первые производные равнялись нулю, то правая часть последнего равенства обратится в нуль, и мы получим:

$$\begin{aligned} & \iiint_{\Omega} \int u \left( \Delta \psi - \frac{1}{a^2} \frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} \right) dx dy dz dt = \\ & = \iiint_{\Omega} \int \psi \left( \Delta u - \frac{1}{a^2} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} \right) dx dy dz dt, \end{aligned}$$

отсюда на основании (XIV.17)

$$\iiint_{\Omega} \int \psi(x, y, z, t) \left[ \Delta u - \frac{1}{a^2} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - F \right] dx dy dz dt = 0.$$

Последний интеграл обращается в нуль при любых  $\psi$ , откуда

$$\Delta u - \frac{1}{a^2} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = F.$$

Тем самым доказано, что функция  $u$  удовлетворяет уравнению.

Нам остается доказать, что  $u = 0$ ,  $\frac{\partial u}{\partial t_0} = 0$  при  $t_0 = 0$ . Обращение в нуль  $u$  есть непосредственное следствие формулы (XIV.14). Для того чтобы доказать, что  $\frac{\partial u}{\partial t_0} = 0$  при  $t_0 = 0$ , заменим переменные в интеграле, стоящем в правой части (XIV.14), полагая

$$x = x_0 + at_0\xi, \quad y = y_0 + at_0\eta, \quad z = z_0 + at_0\zeta;$$

тогда

$$r = \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2} = at_0\rho,$$

где

$$\rho = \sqrt{\xi^2 + \eta^2 + \zeta^2}.$$

В новых переменных

$$u(x_0, y_0, z_0, t_0) = -\frac{a^2 t_0^2}{4\pi} \int_0^1 \int \int \frac{1}{\rho} F[x_0 + at_0\xi, y_0 + at_0\eta, z_0 + at_0\zeta, t_0(1-\rho)] d\xi d\eta d\zeta.$$

Правую часть можно дифференцировать по  $t_0$  под знаком интеграла. После того, положив  $t_0 = 0$ , имеем:

$$\left. \frac{\partial u}{\partial t_0} \right|_{t_0=0} = 0.$$

Предполагая ограниченность производных 1-го порядка от  $F$ , обоснование законности дифференцирования под знаком интеграла см. в § 2 лекции VII.

Мы намеренно не останавливались здесь на вопросе о том, сколько непрерывных производных необходимо иметь в начальных данных для того, чтобы наши формулы дали решение задачи, обладающее нужным числом непрерывных производных. Как мы увидим далее, этот вопрос не имеет существенного значения, если воспользоваться понятием обобщенного решения волнового уравнения, которое будет дано нами ниже.

Сделаем еще одно важное замечание.

Как мы видели, решение уравнения колебаний струны было столь же гладким, как и начальные условия, т. е. допускало столько же непрерывных производных, сколько их было у функций, стоящих в начальных условиях.

Решение уравнения теплопроводности оказывалось более гладким, чем начальные условия.

Решение волнового уравнения в этом смысле отличается от рассмотренных задач. Оно является, вообще говоря, менее гладким, чем начальные условия. Это видно хотя бы из того, что значение функции  $u$  выражается в формуле Кирхгофа через интеграл от нормальной производной  $\frac{\partial u}{\partial n} \Big|_{t=0}$ .

Значение производной порядка  $k$ , удовлетворяющей тому же уравнению, связано, таким образом, с начальными значениями производных порядка  $k + 1$  от начальных данных.

Мы разобрали в этой лекции только задачу Коши в случае, когда начальные данные относятся к поверхности  $t = 0$ . Однако тот же самый метод позволяет строить решение задачи Коши и в общем случае, когда начальные данные заданы на гиперповерхности  $t = \psi(x, y, z)$ , а также решение задачи, аналогичной первой краевой задаче для гиперболических уравнений на плоскости.

Подробный разбор этих задач мы предоставляем читателю.

---

# СВОЙСТВА ПОТЕНЦИАЛОВ ПРОСТОГО И ДВОЙНОГО СЛОЯ

## § 1. Общие замечания

Для того чтобы рассмотреть задачи Дирихле и Неймана кроме шара и полупространства еще и для других областей, мы должны будем изучить в отдельности поведение интегралов

$$I_1 = \iint_S \frac{\partial}{\partial n} \frac{1}{r} f_1(S) dS \quad \text{и} \quad I_2 = \iint_S \frac{f_2(S) dS}{r}, \quad (\text{XV.1})$$

которые встречались нам уже неоднократно. Как мы упоминали выше, интеграл  $I_2$  называется *потенциалом простого слоя*, а функция  $f_2(S)$  — его плотностью. Интеграл  $I_1$  называется *потенциалом двойного слоя*, а  $f_1(S)$  — его плотностью. Функции  $f_2(S)$  и  $f_1(S)$  будем предполагать непрерывными.

Мы будем называть поверхность  $S$  гладкой в смысле Ляпунова, или просто *поверхностью Ляпунова*, если будут выполнены следующие условия:

- а) Поверхность  $S$  имеет везде касательную плоскость.
- б) Вокруг каждой точки  $P_0$  поверхности можно описать такой шар радиуса  $h$ , не зависящего от  $P_0$ , внутрь которого попадет лишь участок  $\Sigma$  поверхности  $S$ , встречающий прямые, параллельные нормали  $\mathbf{n}_0$  в точке  $P_0$ , не более чем один раз.
- в) Если  $P_1$  и  $P_2$  — две точки поверхности, а  $\mathbf{n}_1$  и  $\mathbf{n}_2$  — единичные векторы, направленные по внешней нормали к поверхности  $S$  в этих точках, то вектор  $\mathbf{n}_1 - \mathbf{n}_2$  удовлетворяет неравенству

$$|\mathbf{n}_1 - \mathbf{n}_2| \leq A r^\delta,$$

где  $A$  и  $\delta$  — постоянные числа;  $0 < \delta \leq 1$ , а  $r$  обозначает расстояние между точками  $P_1$  и  $P_2$ .

г) Телесный угол  $\omega_\sigma$ , под которым любая часть  $\sigma$  поверхности  $S$  видна из произвольной точки  $P_0$ , ограничен:

$$|\omega_\sigma| \leq K,$$

(Если прямые, выходящие из  $P_0$ , встречаются поверхность  $S$  неоднократно, то, взяв за  $\sigma$  множество таких кусков  $S$ , которые видны с положительной стороны, мы можем получить  $\omega_\sigma > 4\pi$  и вообще сколь угодно большое число. Поэтому такое ограничение существенно.)

Мы рассмотрим сначала случай, когда  $S$  — конечная, гладкая в смысле Ляпунова, замкнутая поверхность. Пусть  $\Omega$  — область, заключенная внутри  $S$ .

Займемся более детальным исследованием характера интегралов, входящих в выражения потенциалов простого и двойного слоя.

Исследуем поведение этих интегралов вблизи некоторой точки поверхности  $P$ . Для удобства выберем систему координат таким образом, чтобы исследуемая точка поверхности  $P$  попала в начало, касательная плоскость в этой точке совпала с плоскостью  $XOY$ , а ось  $OZ$  — с направлением внутренней нормали. Пусть локальное уравнение поверхности  $S$  будет

$$z = \xi(x, y),$$

тогда

$$\xi(0, 0) = \frac{\partial \xi(0, 0)}{\partial x} = \frac{\partial \xi(0, 0)}{\partial y} = 0.$$

## § 2. Свойства потенциала двойного слоя

Рассмотрим прежде всего потенциал двойного слоя:

$$w(x_0, y_0, z_0) = \iint_S f_1(S) \frac{\partial \frac{1}{r}}{\partial n} dS. \quad (\text{XV.2})$$

Выражение  $\frac{\partial \frac{1}{r}}{\partial n}$ , очевидно, представляет собой функцию двух переменных точек: точки  $(x_0, y_0, z_0)$ , занимающей произвольное положение в пространстве, и точки  $(x, y, z)$ , расположенной на поверхности  $S$ . Производная берется по направлению внутренней нормали к поверхности  $S$  в точке  $(x, y, z)$ .

Докажем несколько простых предложений, касающихся этого потенциала.

**Л е м м а 1.** Обозначим через  $\varphi$  угол, составленный направлением нормали в произвольной точке поверхности  $S$ , с радиус-вектором, проведенным из этой точки в точку  $(x_0, y_0, z_0)$ . Тогда потенциал двойного слоя может быть представлен в виде

$$w(x_0, y_0, z_0) = \iint_S f_1(S) \frac{\cos \varphi}{r^2} dS. \quad (\text{XV.3})$$

Докажем формулу (XV.3). Очевидно, косинусы углов, составленных радиус-вектором, проведенным из точки  $(x, y, z)$  в точку  $(x_0, y_0, z_0)$  с осями координат, будут соответственно равны

$$\frac{x_0 - x}{r}, \quad \frac{y_0 - y}{r}, \quad \frac{z_0 - z}{r}.$$

Следовательно,

$$\cos \varphi = \frac{x_0 - x}{r} \cos(n, x) + \frac{y_0 - y}{r} \cos(n, y) + \frac{z_0 - z}{r} \cos(n, z) = -\frac{\partial r}{\partial n}.$$

Лемма доказана.

**Л е м м а 2.** Потенциал двойного слоя сохраняет смысл, если точка  $P_0(x_0, y_0, z_0)$  совпадает с точкой  $Q_0$ , лежащей на поверхности.

Для доказательства этого утверждения мы подставим в формулу (XV.3)  $x_0 = y_0 = z_0 = 0$ .

Выделим из поверхности  $S$  участок  $S_1$ , содержащий начало, так чтобы  $z$  на  $S_1$  была однозначной функцией от  $x$  и  $y$ . Оставшаяся часть  $S_2$  не влияет на сходимость интеграла.

Интеграл при этом будет иметь вид

$$\begin{aligned} w_{S_1} &= \iint_{S_1} f_1(S) \frac{\cos \varphi}{r^2} dS = \\ &= - \iint_{S_1} f_1(S) \left( \frac{x}{r^3} \cos(n, x) + \frac{y}{r^3} \cos(n, y) + \frac{z}{r^3} \cos(n, z) \right) dS. \end{aligned}$$

Оценим величину

$$-\frac{\cos \varphi}{r^2} = \frac{x}{r^3} \cos(n, x) + \frac{y}{r^3} \cos(n, y) + \frac{z}{r^3} \cos(n, z).$$

Мы имеем:

$$\cos(n, x) = \mathbf{n}\mathbf{i}, \quad \cos(n, y) = \mathbf{n}\mathbf{j}, \quad \cos(n, z) = \mathbf{n}\mathbf{k},$$

где  $\mathbf{i}$ ,  $\mathbf{j}$ ,  $\mathbf{k}$  суть единичные векторы, направленные по координатным осям. Далее  $\mathbf{n}_0 = \mathbf{k}$ , и поэтому

$$\begin{aligned} \cos(n, x) &= \mathbf{n}\mathbf{i} = (\mathbf{n} - \mathbf{n}_0)\mathbf{i}, \\ \cos(n, y) &= \mathbf{n}\mathbf{j} = (\mathbf{n} - \mathbf{n}_0)\mathbf{j}, \\ \cos(n, z) &= \mathbf{n}\mathbf{k} = (\mathbf{n} - \mathbf{n}_0)\mathbf{k} + \mathbf{n}_0\mathbf{k} = 1 + (\mathbf{n} - \mathbf{n}_0)\mathbf{k}, \end{aligned}$$

откуда, используя условия гладкости Ляпунова, имеем:

$$\begin{aligned} |\cos(n, x)| &< Ar^{\delta}, \\ |\cos(n, y)| &< Ar^{\delta}, \\ |\cos(n, z)| &> 1 - Ar^{\delta}. \end{aligned} \tag{XV.4}$$

Оценим еще величину  $z$ .

Обозначим  $C_3$  шар, определяемый неравенством

$$Ar^3 \leq \frac{1}{3}.$$

Покажем, что для точек  $z(x, y)$  поверхности  $S$ , попавших внутрь указанного шара, выполнено неравенство

$$|z| \leq \rho, \quad (\text{XV.5})$$

где

$$\rho = \sqrt{x^2 + y^2}.$$

Как известно из курса дифференциальной геометрии,

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{\cos(n, x)}{\cos(n, z)}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{\cos(n, y)}{\cos(n, z)},$$

откуда

$$\left| \frac{\partial z}{\partial x} \right| \leq \frac{Ar^3}{1 - Ar^3}; \quad \left| \frac{\partial z}{\partial y} \right| \leq \frac{Ar^3}{1 - Ar^3}.$$

Таким образом, для точек поверхности, лежащих внутри или на границе шара  $C_3$ , получим

$$\left| \frac{\partial z}{\partial x} \right| \leq \frac{3}{2} Ar^3; \\ \left| \frac{\partial z}{\partial y} \right| \leq \frac{3}{2} Ar^3.$$

Обозначим луч, начинающийся в начале координат и проходящий через точку  $P(x, y)$  плоскости  $xOy$ , через  $OP$ . Проведем плоскость через ось  $z$  и прямую  $OP$ . Пересечение ее с шаром  $Ar^3 \leq \frac{1}{3}$  есть круг, пересечение с поверхностью — некоторая линия (рис. 13). Самую левую<sup>1)</sup>




Рис. 13

из тех точек на луче  $OP$ , которые являются проекциями точек пересечения поверхности  $S$  со сферой  $Ar^3 = \frac{1}{3}$ , обозначим  $Q$ .

По теореме о конечных приращениях

$$z(x, y) = x \frac{\partial z}{\partial x} \Big|_{\xi, \eta} + y \frac{\partial z}{\partial y} \Big|_{\xi, \eta},$$

<sup>1)</sup> Самая левая точка существует, так как рассматриваемое множество замкнуто; очевидно, она не совпадает с  $Q$ .

где  $(\xi, \eta)$  — некоторая точка, лежащая на отрезке, соединяющем начало координат с точкой  $(x, y)$  на плоскости  $xOy$ .

Если точка  $(x, y)$  лежит на отрезке  $OQ$ , то точка  $(\xi, \eta)$  также лежит на этом отрезке и точка  $(\xi, \eta, z(\xi, \eta))$  лежит внутри или на границе рассматриваемого шара. Поэтому в этой точке справедливы неравенства для  $\left| \frac{\partial z}{\partial x} \right|$  и  $\left| \frac{\partial z}{\partial y} \right|$ , выписанные выше.

Учитывая это, получим

$$|z(x, y)| \leq \frac{3}{2} Ar^{\delta} (|x| + |y|) \leq 3Apr^{\delta} \leq \rho.$$

Если точка  $P(x, y)$  лежит вне отрезка  $OQ$ , но соответствующая точка поверхности лежит внутри рассматриваемого шара, то неравенство (XV.5) и по-прежнему выполнено:

$$|z(P)| < |z(Q)| \leq OQ < OP = \rho.$$

Неравенство (XV.5) доказано.

Для точек поверхности, лежащих внутри указанного шара  $Ar^{\delta} < \frac{1}{3}$ , справедливы неравенства

$$\rho \leq r \leq 2\rho.$$

Левая часть очевидна, а правая следует из того, что

$$r = \sqrt{\rho^2 + z^2} \leq \sqrt{2\rho^2} \leq 2\rho.$$

Это позволяет уточнить неравенства (XV.4) и (XV.5). Имеем:

$$\left. \begin{aligned} |z| &\leq 3A2^{\delta}\rho^{1+\delta} \leq 6A\rho^{1+\delta}, \\ |\cos(n, x)| &\leq 2^{\delta}A\rho^{\delta} \leq 2A\rho^{\delta}, \\ |\cos(n, y)| &\leq 2A\rho^{\delta}, \\ |\cos(n, z)| &> 1 - 2A\rho^{\delta} > \frac{1}{3}. \end{aligned} \right\} \quad (\text{XV.5}')$$

Подставляя эти оценки в выражение для  $\frac{\cos \varphi}{r^2}$ , получим:

$$\left| \frac{\cos \varphi}{r^2} \right| < 2A\rho^{-2+\delta} + 2A\rho^{-2+\delta} + 6A\rho^{-2+\delta} < \frac{10A}{\rho^{2-\delta}}. \quad (\text{XV.6})$$

Интеграл по той части  $S'$  поверхности  $S$ , которая попала внутрь шара  $Ar^{\delta} < \frac{1}{3}$ , можно записать в виде

$$\iint_{S'} f_1(S) \frac{\cos \varphi}{r^2} dS = \iint_{\sigma'} f_1(S) \frac{\cos \varphi}{r^2} \frac{1}{\cos(n, z)} dx dy,$$

где  $\sigma'$  — проекция  $S'$  на плоскость  $xOy$ .

В силу (XV.5') и (XV.6)

$$\left| f_1(S) \frac{\cos \varphi}{r^2} \frac{1}{\cos(n, z)} \right| \leq \frac{30 \cdot A \cdot M}{\rho^{2-\delta}}, \quad (*)$$

$M = \max_S |f_1(S)|$ , откуда следует существование первого интеграла в правой части равенства

$$\iint_S f_1(S) \frac{\cos \varphi}{r^2} dS = \iint_{S'} f_1(S) \frac{\cos \varphi}{r^2} dS + \iint_{S-S'} f_1(S) \frac{\cos \varphi}{r^2} dS.$$

Поскольку существование второго интеграла не вызывает сомнений, лемма доказана.

**З а м е ч а н и е 1.** Потенциал двойного слоя является непрерывной функцией точки  $P_0$ ,  $P_0 \equiv Q_0$ , когда  $Q_0(x_0, y_0, z_0)$  движется по поверхности.

Для доказательства от интегрирования по  $S'$  перейдем к интегрированию по  $\sigma'$  и заметим, что оценка (\*), быть может, с большим постоянным множителем в правой части, будет справедлива не только для точки  $Q_0$ , совпадающей с началом координат, но и для всех достаточно близких к началу точек, причем в этом случае  $\rho = \sqrt{(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2}$ . Таким образом, применим признак равномерной сходимости интеграла (§ 1 л. VII), и из леммы 2 лекции VII следует справедливость доказываемого замечания.

Как мы сейчас установим,  $w$  есть разрывная функция, которая претерпевает разрыв непрерывности при переходе через поверхность  $S$ . Обозначим через  $w_0$  величину потенциала двойного слоя, если вместо  $x_0, y_0, z_0$  в формулу (XV.3) подставлена точка поверхности  $S$ ;  $w_0$  есть функция точки поверхности.

**Т е о р е м а 1.** *Функция  $w$  имеет пределы при стремлении  $(x_0, y_0, z_0)$  к поверхности  $S$  извне и изнутри, причем эти пределы различны. Если предел значений  $w$  извне обозначить через  $w_e$ , а предел значений  $w$  изнутри — через  $w_i$ , то имеют место формулы*

$$\left. \begin{aligned} w_e &= -2\pi f_1(S) + w_0, \\ w_i &= 2\pi f_1(S) + w_0. \end{aligned} \right\} \quad (\text{XV.7})$$

Для доказательства формул (XV.7) рассмотрим  $w$ . Мы будем иметь:

$$\begin{aligned} w(P) &= \iint_S [f_1(S) - f_1(P_0)] \frac{\partial}{\partial n} \frac{1}{r} dS + \iint_S f_1(P_0) \frac{\partial}{\partial n} \frac{1}{r} dS = \\ &= w_1(P) + w_2(P), \end{aligned} \quad (\text{XV.8})$$

где через  $P_0$  обозначена какая-нибудь фиксированная точка поверхности  $S$ . Первое слагаемое в формуле (XV.8), обозначенное

через  $w_1(P)$ , есть непрерывная функция в точке  $P_0$ . Это следует из равномерной сходимости интеграла в этой точке [см. § 1 (VII)], которую легко установить. В самом деле, окружим точку  $P_0$  областью  $\sigma(\varepsilon)$ , столь малой, чтобы иметь

$$|f_1(S) - f_1(P_0)| < \varepsilon,$$

где  $S$  — точка, принадлежащая области  $\sigma(\varepsilon)$ .

Тогда для любой точки  $P$ , лежащей в некоторой окрестности  $h(\varepsilon)$  точки  $P_0$ , будем иметь:

$$\left| \iint_{\sigma} [f_1(S) - f_1(P_0)] \frac{\partial \frac{1}{r}}{\partial n} dS \right| \leq \varepsilon \iint_{\sigma} \left| \frac{\partial \frac{1}{r}}{\partial n} \right| dS = \varepsilon \iint_{\sigma_1} d\omega - \varepsilon \iint_{\sigma_2} d\omega,$$

причем  $r$  — расстояние между точкой  $P$ , принадлежащей окрестности  $h(\varepsilon)$  точки  $P_0$ , и точкой  $S$  на поверхности  $\sigma$ ; через  $\sigma_1$  обозначена часть  $\sigma$ , которая видна из точки  $P$  под положительным телесным углом, а через  $\sigma_2$  — та часть  $\sigma$ , которая видна из  $P$  под отрицательным телесным углом. При достаточной гладкости поверхности  $S$  и во всяком случае для поверхности Ляпунова в силу условия г) оба интеграла

$$\iint_{\sigma_1} d\omega \quad \text{и} \quad \iint_{\sigma_2} d\omega$$

будут ограничены<sup>1)</sup>. Этого достаточно для непрерывности  $w_1$  в точке  $P_0$ . Второе слагаемое формулы (XV.8) легко вычисляется:

$$w_2(P) = \iint_S f_1(P_0) \frac{\partial \frac{1}{r}}{\partial n} dS = f_1(P_0) \iint_S d\omega = f_1(P_0) \omega_S(P),$$

где  $\omega_S(P)$  — величина телесного угла, под которым видна поверхность  $S$  из точки  $P$ .

Пусть  $w_{2e}$ ,  $w_{2i}$ ,  $w_0$  обозначают соответственно пределы  $w_2$  извне и изнутри и значение  $w$  при подстановке вместо точки  $P$  точки  $P_0$  поверхности  $S$ . Чтобы разобраться в этих величинах, нам остается изучить поведение  $\omega_S(P)$  при переходе через поверхность  $S$  в точке  $P_0$ .

Пусть точка  $P$  пересекает поверхность  $S$ , двигаясь изнутри наружу. Пока  $P$  находится внутри области, ограниченной по-

<sup>1)</sup> В более подробных курсах теории потенциала, например Гюнтер, Теория потенциала и ее применение к основным задачам математической физики, Гостехиздат, 1953, выясняются те условия для поверхности, при

которых ограниченность  $\iint_S \left| \frac{\partial \frac{1}{r}}{\partial n} \right| dS$  имеет место.

верхностью  $S$ ,  $\omega_S(P) = 4\pi$ . Как только  $P$  пересекла поверхность  $S$  и оказалась вне ее,  $\omega_S(P) = 0$ . Следовательно, функция  $\omega_S(P)$  терпит разрыв непрерывности при переходе через поверхность  $S$ . Остается определить значение  $\omega_S(P)$ , когда  $P$  есть точка  $P_0$  поверхности  $S$ . С этой целью окружим точку  $P_0$  малой сферой  $\sigma$  радиуса  $\eta$  и рассмотрим линию  $l$ , по которой сфера  $\sigma$  пересекается с поверхностью  $S$ . Линия  $l$  разделяет поверхность сферы на две части,  $\sigma_1$  — внутреннюю по отношению к  $S$ , и  $\sigma_2$  — внешнюю. Эта же линия делит поверхность  $S$  на две части — внешнюю по отношению к  $\sigma$  часть  $S_1$  и внутреннюю  $S_2$ . Внешняя часть  $S_1$  вместе с  $\sigma_1$  образует замкнутую поверхность, вне которой находится точка  $P_0$ . Следовательно, телесный угол, под которым видна поверхность  $S_1$  из точки  $P_0$ , равен углу, под которым видна из  $P_0$  часть сферы  $\sigma_1$ .

Для того чтобы вычислить телесный угол, под которым видна из точки  $P_0$  поверхность  $S$ , достаточно определить угол, под которым видна поверхность  $S_1$ , и перейти к пределу, устремляя радиус  $\eta$  сферы  $\sigma$  к нулю. По предыдущему, это равносильно нахождению предела угла, под которым видна из  $P_0$  часть  $\sigma_1$  сферы  $\sigma$ . Нетрудно доказать, что этот предел равен  $2\pi$ . Пересечем сферу  $\sigma$  плоскостью, касательной к  $S$  в точке  $P_0$ . По доказанному выше, расстояние от точек линии  $l$  до касательной плоскости не превосходит  $6A\eta^{1+\delta}$ . Таким образом, линия  $l$  целиком находится внутри сферического пояса на сфере  $\sigma$ , определенного неравенством  $|z| \leq 6A\eta^{1+\delta}$ .

Построим на  $\sigma$  географическую систему координат, взяв за полярную ось нормаль к  $S$  в точке  $P_0$ . В этих координатах пояс, внутри которого заведомо заключена линия  $l$ , ограничен параллелями  $\alpha_0$  южной широты и  $\alpha_0$  северной широты, где

$$\alpha_0 = \arcsin \frac{6A\eta^{1+\delta}}{\eta} = \arcsin 6A\eta^{\delta}.$$

Угол  $\alpha_0$ , очевидно, стремится к нулю. Следовательно,  $\sigma_1$  стремится к поверхности полусферы и, значит, телесный угол, под которым  $\sigma_1$  видна из  $P_0$ , стремится к  $2\pi$ . Итак,  $\omega_S(P_0) = 2\pi$ , если  $P_0$  лежит на поверхности  $S$ .

Отсюда

$$(\omega_S)_e = -2\pi + (\omega_S)_0, \quad (\omega_S)_i = 2\pi + (\omega_S)_0.$$

При этом для  $w_2$  будем иметь:

$$w_{2e} = -2\pi f_1(P_0) + (w_2)_0; \quad w_{2i} = 2\pi f_1(P_0) + (w_2)_0.$$

Из непрерывности  $w_1$  и формулы (XV.8) сразу следует (XV.7). Так как  $P_0$  — произвольная точка поверхности  $S$ , то наша теорема доказана.

**З а м е ч а н и е 2.** Из непрерывности  $w_1(P)$  и того, что  $w_2(P)$  при фиксированном  $P_0$  есть постоянная внутри и вне  $\Omega$  функция, следует, что потенциал двойного слоя можно непрерывно по совокупности переменных продолжить из  $\Omega$  на  $S$ , а также извне  $\Omega$  на  $S$ .

### § 3. Свойства потенциала простого слоя

Подобно предыдущему исследуем потенциал простого слоя

$$v(P_0) = \iint_S \frac{1}{r} f_2(S) dS. \quad (\text{XV.9})$$

Заметим, что при непрерывной функции  $f_2(S)$  функция  $v(P_0)$  непрерывна всюду, включая поверхность  $S$ . Чтобы убедиться в этом, опишем около произвольной точки  $P_0$  сферу радиуса  $\eta$ , выбранного так же, как для оценки (XV.6). Часть поверхности  $S$ , попавшую внутрь сферы, обозначим  $S'$ .

Разобьем интеграл (XV.9) на два, по поверхности  $S'$  и по поверхности  $S - S'$ . Непрерывная зависимость от параметра  $P_0$  второго интеграла очевидна; покажем непрерывность первого интеграла.

Проведем касательную плоскость в какой-либо точке поверхности  $S'$  и примем ее за плоскость  $xOy$ . Тогда

$$\iint_{S'} \frac{1}{r} f_2(S) dS = \iint_{S'} \frac{1}{r} f_2(S) \frac{1}{\cos(n, z)} dx dy.$$

Во всех точках  $S'$  имеем  $\cos(n, z) > \frac{1}{3}$ , откуда

$$\left| \frac{1}{r} f_2(S) \frac{1}{\cos(n, z)} \right| < \frac{3M}{r} \leq \frac{3M}{\sqrt{(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2}}.$$

В силу признака равномерной сходимости и леммы 2 из § 1 лекции VII, непрерывность  $v(P_0)$  доказана.

Отметим, что первая производная потенциала простого слоя по любому направлению  $v$  непрерывно зависит от  $P_0$  в каждой точке  $\tilde{P}$ , не лежащей на поверхности  $S$ . Действительно, формально дифференцируя равенство (XV.9), получим:

$$\frac{\partial v(P_0)}{\partial v} = \iint_S \frac{\partial}{\partial v} \left( \frac{1}{r} \right) f_2(S) dS.$$

Правая часть этого равенства непрерывна, так как подинтегральная функция ограничена и непрерывно зависит от  $P_0$  в окрестности точки  $\tilde{P}$ . По этой же причине законно дифференцирование под знаком интеграла.

Перейдем к исследованию поведения производных потенциала простого слоя вблизи поверхности  $S$ . Выберем произвольную точку  $Q_0$  на поверхности  $S$  и обозначим направление внутренней нормали в этой точке через  $n^*$ . Производная по этому направлению в точке  $P_0$ , не лежащей на поверхности, будет

$$\frac{\partial v(P_0)}{\partial n^*} = \iint_S \frac{\partial}{\partial n^*} \left( \frac{1}{r} \right) f_2(S) dS. \quad (*)$$

Но

$$\frac{\partial}{\partial n^*} \left( \frac{1}{r} \right) = -\frac{1}{r^2} \frac{\partial r}{\partial n^*} = -\frac{1}{r^2} \cos \psi_0,$$

где  $\psi_0$  — угол между радиус-вектором  $r$ , проведенным из  $P$  в  $P_0$ , и направлением  $n^*$  нормали в точке  $Q_0$ . В самом деле, введем систему координат, начало которой поместим в точке  $Q_0$ , а ось  $z$  направим по  $n^*$ . Тогда

$$\frac{\partial r}{\partial n^*} = \frac{\partial r}{\partial z_0} = \frac{z_0 - z}{r} = \cos \psi_0.$$

Это позволяет написать

$$\frac{\partial v(P_0)}{\partial n^*} = - \iint_S f_2(S) \frac{\cos \psi_0}{r^2} dS. \quad (\text{XV.10})$$

Докажем два утверждения.

**Л е м м а 3.** *Интеграл*

$$- \iint_S f_2(S) \frac{\cos \psi_0}{r^2} dS,$$

стоящий в правой части формулы (XV.10), сохраняет смысл также в том случае, если точка  $P_0$  тождественно совпадает с точкой  $Q_0$  на поверхности, и является непрерывной функцией точки  $Q_0$  на этой поверхности.

Действительно, для точек поверхности  $P$ , расположенных достаточно близко к точке  $P_0 = Q_0$  (0, 0, 0), имеем в силу (XV.5')

$$\left| \frac{\cos \psi_0}{r^2} \right| = \left| \frac{z}{r^3} \right| < \frac{6A}{\rho^{2-\delta}}.$$

Это неравенство аналогично (XV.6) и позволяет доказать лемму 3 точно так же, как было доказано замечание 1 к лемме 2 в предыдущем параграфе.

Будем обозначать интеграл, о котором говорится в лемме 3 и который вычислен для точки  $P_0 \equiv Q_0$ , лежащей на поверхности  $S$ , через  $\frac{\partial v}{\partial n_0}$ :

$$\frac{\partial v}{\partial n_0} = \iint_S \frac{\partial}{\partial n^*} \frac{1}{r} f_2(S) dS.$$

Обозначим через  $\frac{\partial v(P_0)}{\partial n_i}$  и  $\frac{\partial v(P_0)}{\partial n_e}$  соответственно предельные

значения нормальной производной при приближении точки  $P$  к точке поверхности  $P_0$  по нормали изнутри  $S$  и извне  $S$ .

**Т е о р е м а 2.** При непрерывной функции  $f_2$  имеют место следующие формулы:

$$\left. \begin{aligned} \frac{\partial v}{\partial n_e} &= 2\pi f_2(P_0) + \frac{\partial v}{\partial n_0}, \\ \frac{\partial v}{\partial n_i} &= -2\pi f_2(P_0) + \frac{\partial v}{\partial n_0}. \end{aligned} \right\} \quad (\text{XV.11})$$

Для доказательства мы сравним  $\frac{\partial v}{\partial z_0}$  с потенциалом  $w$  двойного слоя с плотностью  $-f_2(S)$ .

Составим

$$\frac{\partial v}{\partial z_0} - w = \iint_S f_2(S) \frac{\cos \varphi - \cos \psi_0}{r^2} dS. \quad (\text{XV.12})$$

Мы докажем, что эта разность непрерывна по  $z_0$  в точке  $(0, 0, 0)$ .

В самом деле,

$$\frac{\cos \varphi - \cos \psi_0}{r^2} = -\frac{x - x_0}{r^3} \cos(n, x) - \frac{y - y_0}{r^3} \cos(n, y) - \frac{z - z_0}{r^3} [\cos(n, z) - 1].$$

Пусть точка  $x_0, y_0, z_0$  движется по нормали к поверхности, т. е.  $x_0 = y_0 = 0$ .

При этом

$$\frac{\cos \varphi - \cos \psi_0}{r^2} = -\frac{x \cos(n, x)}{r^3} - \frac{y \cos(n, y)}{r^3} - \frac{z - z_0}{r^3} [\cos(n, z) - 1].$$

Пользуясь оценками (XV.5'), имеем:

$$\begin{aligned} |x \cos(n, x)| &\leq A_1 \rho^{1+\delta}; & |y \cos(n, y)| &< A_1 \rho^{1+\delta}, \\ |1 - \cos(n, z)| &< A_1 \rho^\delta, \end{aligned}$$

где  $A_1$  — постоянная.

Замечая еще, что

$$|z - z_0| < r = \sqrt{x^2 + y^2 + (z - z_0)^2},$$

мы получаем:

$$\left| \frac{\cos \varphi - \cos \psi_0}{r^2} \right| \leq \frac{2A_1 \rho^{1+\delta}}{r^3} + \frac{A_1 \rho^\delta}{r^2} \leq \frac{3A_1}{\rho^{2-\delta}}.$$

Окружим точку  $P_0 = Q_0$  сферой  $\sigma$  малого радиуса и часть поверхности, попавшую внутрь  $\sigma$ , обозначим  $S'$ . Разобьем интеграл (XV.12) на сумму интегралов по поверхностям  $S'$  и  $S - S'$ . Перейдем в первом интеграле к интегрированию по области  $\sigma'$  плоскости  $x, y$ , на которую проектируется  $S'$ . В силу приведенной оценки и признака равномерной сходимости из § 1 лекции VII, интеграл по  $\sigma'$  равномерно сходится относительно параметра  $z_0$  и является

непрерывной функцией от  $z_0$  в точке  $x_0 = y_0 = z_0 = 0$ . Отсюда следует, что интеграл (XV.12) также непрерывен по  $z_0$  в этой точке.

Следовательно,

$$\left(\frac{\partial v}{\partial z_0} - w\right)_{z_0=+0} = \left(\frac{\partial v}{\partial z_0} - w\right)_{z_0=-0} = \left(\frac{\partial v}{\partial z_0} - w\right)_{z_0=0}.$$

Пользуясь теоремой 1 настоящей лекции, отсюда сразу получаем формулы (XV.11).

**З а м е ч а н и е 3.** Отметим еще одно важное обстоятельство. Оценка величины  $\frac{\cos \varphi - \cos \psi_0}{r^2}$  является равномерной по отношению к точке поверхности  $S$ . Поэтому производная  $\frac{\partial v}{\partial z_0}$  будет стремиться к своему предельному значению равномерно по всей поверхности  $S$ .

**Т е о р е м а 3.** Для любой ограниченной функции  $f_2(S)$  функция  $\frac{\partial v}{\partial n_0}$  непрерывна.

Достаточно заметить, что при доказательстве леммы 3, как и замечания к лемме 2, была использована лишь ограниченность функции  $f_2(S)$ .

**Т е о р е м а 4.** Пусть плотность простого слоя удовлетворяет условию

$$|f_2(P_1) - f_2(P_2)| < K r_s^{\delta_1}, \quad (\text{XV.13})$$

где  $K$  и  $\delta_1 > 0$  — некоторые постоянные,  $P_1$  и  $P_2$  — две произвольные точки на поверхности и  $r_s$  — расстояние между  $P_1$  и  $P_2$ . Фиксируем какую-нибудь точку  $Q_0$  на поверхности и проведем касательную плоскость и нормаль в этой точке.

При сделанных предположениях потенциал имеет производную первого порядка во всех точках нормали, кроме, быть может, самой точки  $Q_0$ , по любому направлению, параллельному касательной плоскости. Эта производная непрерывно изменяется вдоль нормали всюду, кроме, быть может, точки  $Q_0$ , где она имеет устранимый разрыв.

По-прежнему выберем начало координат в точке  $Q_0$ , за плоскость  $xOy$  примем касательную плоскость и ось  $x$  направим по тому направлению, вдоль которого вычисляется исследуемая производная.

Вычислим эту производную  $\frac{\partial v}{\partial x_0}$  в некоторой точке  $P_0(0, 0, z_0)$ ,  $z_0 \neq 0$ , лежащей на нормали. Она записывается в виде интеграла

$$\frac{\partial v}{\partial x_0} = \iint_S \frac{x}{r^3} f_2(S) dS$$

и непрерывна в точке  $P_0$ .

Для доказательства теоремы достаточно показать, что этот интеграл, зависящий от параметра  $z_0$ , сходится равномерно при  $z_0 = 0$ , если подходящим образом определить его значение при  $z = z_0$ , когда он может не существовать.

Построим вокруг оси  $z$  цилиндр радиуса и высоты  $h$  такой, что в точках куска  $S^*$  поверхности  $S$ , попавшего внутрь этого цилиндра в окрестности  $Q_0$ , нормаль к  $S$  образует угол с осью  $z$ , не превосходящий  $\frac{\pi}{4}$ .

Выбрав  $h$  настолько малым, чтобы цилиндр попал внутрь шара  $C_3$  (см. стр. 211), будем иметь

$$|z| \leq \rho.$$

Пусть  $r^* = \sqrt{x^2 + y^2 + z_0^2}$ . Рассмотрим интеграл

$$\iint_{S^*} f_2(Q_0) \frac{x}{r^{*3}} \cos(n, z) dS.$$

Этот интеграл, очевидно, равен нулю для всех значений  $z_0$ , кроме  $z_0 = 0$ , для которого он не сходится, ибо его можно переписать в виде

$$f_2(Q_0) \iint_{x^2 + y^2 \leq h^2} \frac{x}{V(x^2 + y^2 + z_0^2)^3} dx dy,$$

где под интегралом стоит нечетная функция от  $x$ . При  $z_0 = 0$  можно также доопределить его нулем.

Очевидно, задача свелась к доказательству того, что интеграл

$$\iint_{S^*} x \left( \frac{f_2(S)}{r^3} \right) dS$$

или

$$\iint_{S^*} x \left( \frac{f_2(S)}{r^3} - \frac{f_2(Q_0) \cos(n, z)}{r^{*3}} \right) dS \quad (\text{XV.14})$$

равномерно сходится при  $z_0 = 0$ . Это легко доказать. В самом деле, имеем:

$$\begin{aligned} \frac{f_2(S)}{r^3} - \frac{f_2(Q_0)}{r^{*3}} \cos(n, z) &= \\ &= \frac{f_2(S) - f_2(Q_0)}{r^3} + \frac{f_2(Q_0) [1 - \cos(n, z)]}{r^3} + f_2(Q_0) \cos(n, z) \left( \frac{1}{r^3} - \frac{1}{r^{*3}} \right). \end{aligned}$$

Оценим порознь каждое из слагаемых правой части этой формулы.

Мы имеем:  $r = \sqrt{x^2 + y^2 + (z - z_0)^2} \geq \rho$ ;  $r^* > \rho$ ;

$$r_3 = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \leq \sqrt{2}\rho,$$

$$\left| \frac{f_2(S) - f_2(Q_0)}{r^3} \right| \leq \frac{K r_3^{\delta_1}}{r^3} \leq \frac{K_1}{\rho^{3-\delta_1}}.$$

Из (XV.4) следует:

$$\left| \frac{f_2(Q_0) [1 - \cos(n, z)]}{r^3} \right| \leq |f_2(Q_0)| A \frac{\rho^\delta}{r^3} \leq \frac{K_2}{\rho^{3-\delta}}.$$

Далее,

$$\left| \frac{1}{r^3} - \frac{1}{r^{*3}} \right| = |r - r^*| \left\{ \frac{1}{r^3 r^*} + \frac{1}{r^2 r^{*2}} + \frac{1}{r r^{*3}} \right\}.$$

Разность векторов  $\mathbf{r}$  и  $\mathbf{r}^*$  представляет собой отрезок длины  $z$ . Поэтому в силу (XV.5)

$$|r - r^*| = |z| \leq K_3 \rho^{1+\delta}.$$

Пользуясь этим, имеем:

$$\left| \frac{1}{r^3} - \frac{1}{r^{*3}} \right| \leq K_3 \rho^{1+\delta} \left\{ \frac{1}{r^3 r^*} + \frac{1}{r^2 r^{*2}} + \frac{1}{r r^{*3}} \right\} \leq K_4 \frac{1}{\rho^{3-\delta}}.$$

Возвращаясь к интегралу (XV.14), мы видим, что он может быть переписан в виде

$$\iint_{x^2 + y^2 \leq h^2} \frac{z}{\cos(n, z)} \left( \frac{f_2(S)}{r^3} - \frac{f_2(Q_0) \cos(n, z)}{r^{*3}} \right) dx dy. \quad (\text{XV.15})$$

Подинтегральная функция в этом интеграле не превосходит

$$\sqrt{2}\rho \left( \frac{K_1 + K_2 + K_4}{\rho^{3-\delta}} \right) = \frac{K_5}{\rho^{2-\delta}},$$

независимо от  $z_0$  (а также от направления  $x$ ). Следовательно, по признаку § 1 из лекции VII интеграл сходится равномерно относительно  $z_0$  в точке  $z_0 = 0$  и является поэтому непрерывной функцией при  $z_0 = 0$ . Теорема доказана.

Рассмотрим градиент функции  $v$  в точке  $P_0 \neq Q_0$ , лежащей на нормали. Представим его в виде суммы двух векторов, один из которых направлен по нормали, а другой параллелен касательной плоскости в точке  $Q_0$ :

$$\text{grad } v(P_0) = \frac{\partial v(P_0)}{\partial n} \bar{k} + (\text{grad } v)_\tau,$$

где через  $\bar{k}$  обозначен единичный вектор в направлении внутренней нормали.

**З а м е ч а н и е 4.** Из доказательства теоремы 4 следует, что вектор  $(\text{grad } v)_\tau$  стремится к определенному пределу

$$\lim_{P_0 \rightarrow Q_0} \iint_S \left( \text{grad } \frac{1}{r} \right)_\tau f_2(S) dS,$$

когда  $P_0$  стремится к  $Q_0$  по нормали изнутри или извне области  $\Omega$ , и что стремление это имеет место равномерно относительно точки  $Q_0$  на поверхности.

**Т е о р е м а 5.** В предположениях теоремы 4 вектор  $\text{grad } v$  имеет непрерывные предельные значения  $(\text{grad } v)_i$  и  $(\text{grad } v)_e$  на поверхности  $S$ , к которым стремится равномерно, когда точка  $P$  стремится к  $Q_0$  соответственно изнутри или извне области  $\Omega$ .

Рассмотрим для определенности случай, когда точка  $P$  стремится к  $Q_0$  изнутри области  $\Omega$ .

Действительно: из теорем 3 и 4 следует, что при стремлении точки  $P_0$  по нормали к точке  $Q_0$ , лежащей на поверхности  $S$ , вектор  $\text{grad } v$  стремится к некоторому предельному значению, которое мы обозначим  $(\text{grad } v)_i$ . По отношению к точке  $Q_0$  эта сходимость имеет место равномерно. Отсюда в силу того, что поверхность Ляпунова имеет непрерывно меняющуюся касательную плоскость и в силу условия б) (стр. 208) следует, что векторная функция  $(\text{grad } v)_i$  есть непрерывная функция точки  $Q_0$ .

Покажем, что и при стремлении точки  $P$  к точке  $Q_0$  по любому пути изнутри области  $\Omega$  предел  $\text{grad } v$  будет существовать и будет равен  $(\text{grad } v)_i$ , причем стремление к этому пределу будет равномерным.

Значение  $\text{grad } v$  в некоторой точке  $P_0$ , лежащей внутри шара радиуса  $\eta$  с центром в точке  $Q_0$ , будет мало отличаться от значения  $(\text{grad } v)_i$  в какой-либо точке  $Q_1$ , находящейся на поверхности  $S$  и ближайшей к  $P_0$  (очевидно, что  $P_0$  лежит на нормали в точке  $Q_1$ ), а значение  $(\text{grad } v)_i$  в точке  $Q_1$  в свою очередь будет мало отличаться от значения  $(\text{grad } v)_i$  в точке  $Q_0$  ввиду непрерывности функции  $(\text{grad } v)_i$  на поверхности  $S$ .

Дословно так же доказывается утверждение теоремы о предельном значении векторной функции  $\text{grad } v$  при стремлении точки  $P_0$  к точке  $Q_0$  извне области  $\Omega$ .

**С л е д с т в и е.** Функция  $v$  имеет непрерывные производные первого порядка вплоть до границы всюду внутри, а также всюду вне области  $\Omega$ .

Достаточно заметить, что частная производная первого порядка по какому-либо направлению равна проекции вектора  $\text{grad } v$  на это направление.

**Т е о р е м а 6.** Если плотность  $v(Q)$  потенциала простого слоя есть непрерывная функция точки поверхности  $Q$ , то значе-

ния  $\frac{\partial v}{\partial n_0}$  как функция точки поверхности удовлетворяют условию (XV.13) теоремы 4.

Для доказательства рассмотрим разность

$$\Delta(Q_1, Q_2) = \frac{\partial v}{\partial n_0} \Big|_{Q_1}^{Q_2} = \iint_S v(Q) \left[ \left( \mathbf{n}_1, \frac{\mathbf{r}_1}{r_1} \right) - \left( \mathbf{n}_2, \frac{\mathbf{r}_2}{r_2} \right) \right] dS,$$

где  $\mathbf{r}_1$  и  $\mathbf{r}_2$  — векторы, соединяющие точку  $Q$  с точками  $Q_1$  и  $Q_2$ , а  $\mathbf{n}_1$  и  $\mathbf{n}_2$  — единичные векторы внутренней нормали в  $Q_1$  и  $Q_2$ . Окружим точку  $Q_1$  шаром  $C_\eta$  радиуса  $\eta = (r[Q_1, Q_2])^\delta$ , где  $0 < \delta < 1$ . Точки  $Q_1$  и  $Q_2$  мы предположим настолько близкими, чтобы  $r(Q_1, Q_2) < 1$  и чтобы радиус  $\eta$  был меньше  $h$  — радиуса шара Ляпунова.

Пусть  $\sigma$  — часть поверхности  $S$ , попавшая внутрь шара  $C_\eta$ . Интеграл в выражении искомой разности разобьем на три слагаемых:

$$\begin{aligned} \Delta(Q_1, Q_2) = & \iint_\sigma v(Q) \left( \mathbf{n}_1, \frac{\mathbf{r}_1}{r_1} \right) dS - \iint_\sigma v(Q) \left( \mathbf{n}_2, \frac{\mathbf{r}_2}{r_2} \right) dS + \\ & + \iint_{S-\sigma} v(Q) \left[ \left( \mathbf{n}_1, \frac{\mathbf{r}_1}{r_1} \right) - \left( \mathbf{n}_2, \frac{\mathbf{r}_2}{r_2} \right) \right] dS. \end{aligned}$$

Оценим каждое слагаемое порознь. Как мы видели (стр. 217), в системе координат с центром в  $Q_1$  и осью  $z_1$ , направленной по  $\mathbf{n}_1$ , подинтегральное выражение в первом из интегралов не превосходит  $M\rho_1^{-2+\delta} dx dy$ , где  $\rho_1 = \sqrt{x_1^2 + y_1^2}$ , а  $\delta$  — постоянная Ляпунова. В области интегрирования первого интеграла всюду  $\rho_1 \leq \eta$  и, следовательно, первое слагаемое не больше, чем

$$C_1 \int_0^\eta \rho^{-1+\delta} d\rho = C_2 \rho^\delta \Big|_0^\eta = C_2 [r(Q_1, Q_2)]^{\delta\theta}.$$

Аналогично оценивается и второе слагаемое. Действительно, если начало координат поместить в  $Q_2$  и ось  $z_2$  направить по нормали, то будем иметь

$$\rho_2 = \sqrt{x_2^2 + y_2^2} \leq r(Q, Q_2) \leq r(Q, Q_1) + r(Q_1, Q_2) \leq 2[r(Q_1, Q_2)]^\delta.$$

Осталось оценить третье слагаемое. Мы имеем

$$\left( \mathbf{n}_1, \frac{\mathbf{r}_1}{r_1} \right) - \left( \mathbf{n}_2, \frac{\mathbf{r}_2}{r_2} \right) = \left( \mathbf{n}_1 - \mathbf{n}_2, \frac{\mathbf{r}_1}{r_1} \right) - \mathbf{n}_2 \left( \frac{\mathbf{r}_1}{r_1} - \frac{\mathbf{r}_2}{r_2} \right).$$

Далее, в силу б) стр. 208,

$$\left| \left( \mathbf{n}_1 - \mathbf{n}_2, \frac{\mathbf{r}_1}{r_1} \right) \right| \leq C_3 [r(Q_1, Q_2)]^\delta \frac{1}{r_1^2}.$$

Разность  $\frac{r_1}{r_1^3} - \frac{r_2}{r_2^3}$  есть разность значений векторной функции  $\frac{\mathbf{r}}{r^3}$  в точках  $Q_1$  и  $Q_2$ . Считая, что точка  $\frac{\mathbf{r}}{r^3}$  пробегает отрезок, соединяющий точки  $Q_1$  и  $Q_2$ , можем оценить эту разность по формуле конечных приращений, принимая за независимое переменное длину отрезка прямой, соединяющей эти точки:

$$\left| \frac{r_1}{r_1^3} - \frac{r_2}{r_2^3} \right| = \left| \frac{d}{dl} \frac{\mathbf{r}}{r^3} \right| r(Q_1, Q_2).$$

Оценивая производную, получим

$$\left| \frac{d}{dl} \frac{\mathbf{r}}{r^3} \right| \leq C_4 \frac{1}{r^3},$$

откуда

$$\left| \left( \mathbf{n}_2, \frac{r_1}{r_1^3} - \frac{r_2}{r_2^3} \right) \right| \leq C_4 \frac{1}{r^3} r(Q_1, Q_2).$$

Поскольку вне  $\sigma$  имеем

$$\frac{1}{r^3} = \frac{1}{r_1^3} \cdot \frac{r_1^3}{r^3} \leq \frac{1}{r_1^3} \cdot \frac{[r + r(Q_1, Q_2)]^3}{r^3} \leq \frac{C_5}{r_1^3},$$

получим окончательно

$$\left| \left( \mathbf{n}_2, \frac{r_1}{r_1^3} - \frac{r_2}{r_2^3} \right) \right| \leq C_6 \frac{1}{r_1^3} r(Q_1, Q_2).$$

Легко убедиться в том, что интеграл

$$\iint_{S-\sigma} \frac{dS}{r_1^2}$$

ограничен.

Далее

$$\iint_{S-\sigma} \frac{dS}{r_1^3} = \iint_{r_1 \geq h} \frac{dS}{r_1^3} + \iint_{h \geq r_1 \geq \eta} \frac{dS}{r_1^3},$$

где  $h$  — радиус шара Ляпунова.

Первый интеграл в этой сумме ограничен, а внутри сферы Ляпунова имеем  $\frac{dS}{r_1^3} \leq C \rho^{-2} d\rho d\varphi$  (см. стр. 212). Поэтому

$$\left| \iint_{h \geq r_1 \geq \eta} \frac{dS}{r_1^3} \right| \leq C_7 |\rho^{-1}|_h^\eta \leq C_8 [r(Q_1, Q_2)]^{-\theta},$$

Собирая полученные оценки, будем иметь

$$\begin{aligned} |\Delta(Q_1, Q_2)| &\leq A_1 [r(Q_1, Q_2)]^{\delta_0} + A_2 [r(Q_1, Q_2)]^{\delta} + \\ &\quad + A_3 r(Q_1, Q_2) + A_4 [r(Q_1, Q_2)]^{1-\theta}, \end{aligned}$$

что и доказывает наше утверждение.

#### § 4. Правильная нормальная производная

В дальнейшем нам придется применять формулу Грина к гармоническим функциям, представленным в виде потенциалов простого или двойного слоя. Для того чтобы иметь возможность это делать, мы должны наложить дополнительные ограничения на поверхность  $S$ .

Сделаем прежде всего одно важное замечание. Формула Грина (V. 16) была получена нами в предположении непрерывности первых производных от функций  $u$  и  $v$  вплоть до границы и интегрируемости  $\Delta u$  и  $\Delta v$  внутри области.

Допустим, что наша поверхность  $S$  такова, что функции, которыми она задана в параметрическом представлении:

$$x = x(\lambda, \mu), \quad y = y(\lambda, \mu), \quad z = z(\lambda, \mu), \quad (\text{XV.16})$$

допускают непрерывные производные по параметрам до второго порядка включительно.

В каждой точке этой поверхности построим нормаль  $n$  и отложим на этой нормали отрезок постоянной длины  $\zeta$ . Геометрическое место концов этих отрезков описывается уравнениями

$$x_1 = x + \zeta \cos nx, \quad y_1 = y + \zeta \cos ny, \quad z_1 = z + \zeta \cos nz.$$

Это множество точек образует некоторую поверхность  $S_1$ , которую можно назвать поверхностью, параллельной поверхности  $S$ .

Легко убедиться в том, что поверхность  $S_1$  имеет непрерывно меняющуюся касательную плоскость. Для этого рассмотрим уравнение поверхности  $S$  в параметрической форме (XV. 16). Составляющие вектора нормали  $n_x(\lambda, \mu)$ ,  $n_y(\lambda, \mu)$ ,  $n_z(\lambda, \mu)$  непрерывно дифференцируемы один раз по  $\lambda$  и  $\mu$ . Подставляя эти выражения в уравнения для  $x_1$ ,  $y_1$ ,  $z_1$ , получим параметрическое представление для  $S_1$ , которое, очевидно, будет допускать непрерывные производные первого порядка по  $\lambda$  и  $\mu$  и, значит, поверхность  $S_1$  будет иметь непрерывно изменяющуюся касательную плоскость.

Предположим, что функции  $u$  и  $v$  таковы, что функции  $\Delta u$  и  $\Delta v$  непрерывны внутри области  $\Omega$ . Пусть  $u$  и  $v$  имеют непрерывную нормальную производную на любой поверхности  $S_1$ , «параллельной»  $S$  и лежащей внутри нее.

Предположим еще, что нормальные производные  $\frac{\partial u}{\partial n} \Big|_{S_1}$  и  $\frac{\partial v}{\partial n} \Big|_{S_1}$ , определенные на поверхности  $S_1$ , равномерно стремятся к непрерывным предельным функциям  $\varphi_1(S)$  и  $\varphi_2(S)$ . Эти функции мы будем называть *нормальными производными* от  $u$  и  $v$  на поверхности  $S$  и обозначать через  $\frac{\partial u}{\partial n} \Big|_S$  и  $\frac{\partial v}{\partial n} \Big|_S$ .

Мы будем говорить в этом случае, что функции  $u$  и  $v$  обладают *правильными нормальными производными*.

**Т е о р е м а 7.** Если  $u$  и  $v$  — две гармонические в области  $\Omega$  функции, допускающие правильные нормальные производные, то для них имеет место формула Грина

$$\int_S \left( u \frac{\partial v}{\partial n} - v \frac{\partial u}{\partial n} \right) dS = 0.$$

Доказательство этой теоремы очевидно. Достаточно применить формулу Грина к поверхности  $S_1$ , «параллельной» данной поверхности  $S$ , и затем перейти к пределу при стремлении  $S_1$  к  $S$ .

Из теоремы 2, леммы 3 и замечания 3 настоящей лекции вытекает, что при непрерывной плотности  $f_2(S)$  потенциал простого слоя обладает правильной нормальной производной.

## § 5. Нормальная производная потенциала двойного слоя

Для потенциала двойного слоя мы получим условие существования правильной нормальной производной в виде следующей теоремы:

**Т е о р е м а Л я п у н о в а.** Для того чтобы решение уравнения Лапласа

$$\Delta u = 0$$

в области  $\Omega$ , ограниченной поверхностью  $S$ , удовлетворяющее условию

$$u|_S = f(S)$$

(решение задачи Дирихле), допускало правильную нормальную производную, необходимо и достаточно, чтобы потенциал двойного слоя  $W$ , образованный с помощью функции  $f(S)$ :

$$W = \frac{1}{4\pi} \int_S f \frac{\partial}{\partial n} \frac{1}{r} dS,$$

имел правильную нормальную производную как извне, так и изнутри и чтобы эти нормальные производные совпадали.

Докажем эту теорему. Рассмотрим функцию  $w(P_0)$ :

$$w(P_0) = \begin{cases} u - W, & \text{если } P_0 \text{ внутри } \Omega; \\ -W, & \text{если } P_0 \text{ вне } \Omega. \end{cases}$$

Функция  $w(P_0)$  будет гармонической как внутри области  $\Omega$ , так и вне ее. Можно доказать, что она непрерывна во всем пространстве, кроме поверхности  $S$ , где она имеет устранимый разрыв. Это следует из теоремы 1 этой лекции и того, что скачок функции  $w(P_0)$  при переходе через поверхность  $S$ , как легко

видеть, равняется

$$u(P_0)|_S - f(S) = 0.$$

Если функция  $u(P_0)$  допускает правильную нормальную производную  $\frac{\partial u}{\partial n}$ , то функция  $w(P_0)$  будет совпадать с потенциалом простого слоя

$$-\frac{1}{4\pi} \iint_S \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial n} dS.$$

Действительно, при этом в силу формул Грина (IX.4) и (IX.6) имеем:

$$\frac{1}{4\pi} \iint_S f \frac{\partial \frac{1}{r}}{\partial n} dS - \frac{1}{4\pi} \iint_S \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial n} dS = \begin{cases} u(P_0), & \text{если } P_0 \text{ внутри } \Omega, \\ 0, & \text{если } P_0 \text{ вне } \Omega, \end{cases}$$

откуда

$$-\frac{1}{4\pi} \iint_S f \frac{\partial \frac{1}{r}}{\partial n} dS = \begin{cases} u(P_0) + \frac{1}{4\pi} \iint_S \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial n} dS, & \text{если } P_0 \text{ внутри } \Omega; \\ -\frac{1}{4\pi} \iint_S \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial n} dS, & \text{если } P_0 \text{ вне } \Omega. \end{cases}$$

Таким образом, потенциал двойного слоя  $W$  представляется в виде суммы двух функций, обладающих правильной нормальной производной с обеих сторон поверхности  $S$  и, следовательно, сам обладает с обеих сторон  $S$  правильной нормальной производной. Скачок этой производной, как следует из теоремы 2 настоящей лекции, равен нулю. Следовательно, предельные значения нормальной производной извне и изнутри совпадают.

Мы доказали необходимость условия теоремы. Покажем теперь достаточность этого условия. Прежде всего заметим, что если будет существовать непрерывная правильная внешняя нормальная производная от функции  $W$ , то функцию  $w$  можно рассматривать вне  $\Omega$  как решение задачи Неймана с заданными непрерывными значениями внешней нормальной производной:

$$\frac{\partial u}{\partial n} \Big|_S = - \frac{\partial W}{\partial n} \Big|_S.$$

Но решение такой задачи, как будет показано в лекции XIX независимо от доказываемого утверждения, представимо в виде потенциала простого слоя  $V^*$  с непрерывной плотностью  $\nu(S)$ . Такой потенциал будет совпадать везде с функцией  $w(P_0)$ , ибо

их разность  $V^*(P_0) - w(P_0)$  является гармонической в  $\Omega$  функцией, непрерывна во всем пространстве и тождественно равна нулю вне  $\Omega$ .

Значит, внутри будет существовать правильная нормальная производная  $\frac{\partial w}{\partial n_0}$ . Но внутри области  $\Omega$  имеем:

$$\frac{\partial u}{\partial n} = \frac{\partial W}{\partial n} + \frac{\partial w}{\partial n}.$$

Из существования правильных нормальных производных от  $w$  и  $W$  следует, что существует правильная нормальная производная от  $u$ , что и требовалось доказать.

## § 6. Поведение потенциалов на бесконечности

Последнее важное свойство потенциалов простого и двойного слоев, которое мы сейчас разберем, — это их поведение на бесконечности.

Мы докажем, что если поверхность  $S$  ограничена, потенциал простого слоя убывает на бесконечности, по крайней мере как  $\frac{1}{R_0}$ , а потенциал двойного слоя, по крайней мере как  $\frac{1}{R_0^2}$ , где  $R_0 = \sqrt{x_0^2 + y_0^2 + z_0^2}$ .

В самом деле, очевидно, что при достаточно большом  $R_0$  получим:

$$\begin{aligned} r &= \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2} = \\ &= \sqrt{(x_0^2 + y_0^2 + z_0^2) - 2(xx_0 + yy_0 + zz_0) + (x^2 + y^2 + z^2)} = \\ &= \sqrt{x_0^2 + y_0^2 + z_0^2} \sqrt{1 - \frac{2(xx_0 + yy_0 + zz_0) - (x^2 + y^2 + z^2)}{(x_0^2 + y_0^2 + z_0^2)}} \geq \\ &\geq R_0 \sqrt{1 - \frac{2RR_0 - R^2}{R_0^2}} \geq \frac{1}{2} R_0. \end{aligned}$$

Значит,

$$\begin{aligned} |v| &= \left| \iint_S \frac{1}{r} f_2(S) dS \right| \leq \frac{2}{R_0} \iint_S |f_2(S)| dS, \\ |w| &= \left| \iint_S \frac{\cos \varphi}{r^2} f_1(S) dS \right| \leq \frac{4}{R_0^2} \iint_S |f_1(S)| dS, \end{aligned}$$

что и требовалось доказать.

# СВЕДЕНИЕ ЗАДАЧ ДИРИХЛЕ И НЕЙМАНА К ИНТЕГРАЛЬНЫМ УРАВНЕНИЯМ

## § 1. Постановка задач и единственность их решений

Пусть  $S$  — замкнутая, достаточно гладкая поверхность. Обозначим через  $\Omega_1$  объем, ограниченный этой поверхностью, а через  $\Omega_2$  — бесконечную область, внешнюю по отношению к  $S$ , также ограниченную поверхностью  $S$ .

Рассмотрим четыре задачи:

1. Внутренняя задача Дирихле. Найти функцию  $u$ , гармоническую в  $\Omega_1$ , при условии

$$u|_S = f_1(S).$$

2. Внешняя задача Дирихле. Найти функцию  $u$ , гармоническую в  $\Omega_2$ , при условиях:

а)  $u|_S = f_1(S),$

б)  $\lim_{R \rightarrow \infty} u = 0.$

3. Внутренняя задача Неймана. Найти функцию  $u$ , гармоническую в  $\Omega_1$ , при условии

$$\frac{\partial u}{\partial n} \Big|_S = f_2(S).$$

4. Внешняя задача Неймана. Найти функцию  $u$ , гармоническую в  $\Omega_2$ , при условиях:

а)  $\frac{\partial u}{\partial n} \Big|_S = f_2(S),$

б)  $\lim_{R \rightarrow \infty} u = 0.$

Прежде чем намечать пути решения этих задач, займемся их исследованием.

**Теорема 1.** *Решение задачи Дирихле, внутренней или внешней, единственно.*

Доказательство совершенно очевидно. Оно вытекает из принципа максимума. Разность двух решений в случае внутренней

задачи будет гармонической функцией, равной нулю на  $S$ ; в случае внешней задачи разность двух решений будет равна нулю на  $S$  и на бесконечности. Следовательно, разность решений не может принимать внутри области ни положительных, ни отрицательных значений, ибо иначе она достигла бы там своего положительного максимума или своего отрицательного минимума, что невозможно. Значит, в обоих случаях разность решений равна нулю.

**Теорема 2.** *Решение внешней задачи Пеймана, имеющее непрерывные вплоть до границы производные 1-го порядка, единственно, решение внутренней задачи определено с точностью до произвольной постоянной.*

Относительно поверхности  $S$  достаточно предполагать, что она удовлетворяет условиям Ляпунова. Рассмотрим сначала внутреннюю задачу. С помощью формулы Грина, которая применима при сделанных предположениях, преобразуем интеграл:

$$\begin{aligned} \iint_S v \frac{\partial v}{\partial n} dS &= \\ &= - \iiint_{\Omega_1} \left[ \frac{\partial}{\partial x} \left( v \frac{\partial v}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left( v \frac{\partial v}{\partial y} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left( v \frac{\partial v}{\partial z} \right) \right] dx dy dz = \\ &= - \iiint_{\Omega_1} \left[ v \Delta v + \left( \frac{\partial v}{\partial x} \right)^2 + \left( \frac{\partial v}{\partial y} \right)^2 + \left( \frac{\partial v}{\partial z} \right)^2 \right] dx dy dz. \end{aligned}$$

Если теперь  $v$  — гармоническая функция и  $\frac{\partial v}{\partial n}$  обращается в нуль на контуре, то

$$\iiint_{\Omega_1} \left[ \left( \frac{\partial v}{\partial x} \right)^2 + \left( \frac{\partial v}{\partial y} \right)^2 + \left( \frac{\partial v}{\partial z} \right)^2 \right] dx dy dz = 0,$$

и, значит,

$$\frac{\partial v}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y} = \frac{\partial v}{\partial z} = 0.$$

Отсюда следует, что  $v$  — постоянная.

Пусть теперь  $u_1, u_2$  — два решения внутренней задачи Неймана. Их разность  $v$  является гармонической функцией, нормальная производная которой на границе области равна нулю. По доказанному такая функция есть постоянная. Теорема доказана для случая внутренней задачи.

Внутренняя задача Неймана разрешима не всегда. Необходимым и достаточным условием ее разрешимости является равенство

$$\iint_S f_2(S) dS = 0,$$

Необходимость этого условия очевидным образом вытекает из формулы Грина (V. 16), если положить  $v \equiv 1$ . Достаточность мы установим в лекции XIX.

Для рассмотрения внешней задачи возьмем сферу  $\Sigma$  радиуса  $A$ , где  $A$  — достаточно большое число, и пусть  $\Omega_3$  — объем, заключенный между  $\Sigma$  и  $S$ . По предыдущему

$$\begin{aligned} \iint_{\Sigma} v \frac{\partial v}{\partial n} dS + \iiint_{\Omega_3} v \frac{\partial v}{\partial n} dS = \\ = - \iiint_{\Omega_3} \left[ v \Delta v + \left( \frac{\partial v}{\partial x} \right)^2 + \left( \frac{\partial v}{\partial y} \right)^2 + \left( \frac{\partial v}{\partial z} \right)^2 \right] dx dy dz. \end{aligned}$$

Если  $v$  — гармоническая функция, стремящаяся к нулю на бесконечности, и притом такая, что  $\frac{\partial v}{\partial n} \Big|_S = 0$ , то левая часть последнего равенства сколь угодно мала. В самом деле, в силу теоремы 1 лекции XII на  $\Sigma$  имеем:

$$|v| \leq \frac{M}{A}, \quad \left| \frac{\partial v}{\partial n} \right| \leq \frac{M}{A^2}$$

и

$$\left| \iint_{\Sigma} v \frac{\partial v}{\partial n} dS \right| \leq \frac{M^2}{A^3} \iint_{\Sigma} dS = 4\pi \frac{M^2}{A}.$$

Значит,

$$\iiint_{\Omega_3} \left[ \left( \frac{\partial v}{\partial x} \right)^2 + \left( \frac{\partial v}{\partial y} \right)^2 + \left( \frac{\partial v}{\partial z} \right)^2 \right] dx dy dz < \varepsilon$$

при любом  $\varepsilon > 0$ , что возможно лишь при условии

$$\frac{\partial v}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y} = \frac{\partial v}{\partial z} = 0.$$

Значит,  $v$  есть постоянная. Но эта постоянная может быть только нулем, так как иначе она не стремилась бы к нулю на бесконечности. Разность двух решений внешней задачи Неймана есть поэтому нуль, и решение задачи Неймана единственно.

**З а м е ч а н и е.** Утверждение теоремы 2 останется справедливым, если ослабить ограничения на первые производные от функции  $v$ , но зато усилить ограничения на поверхность  $S$ , а именно, предположить, что поверхность удовлетворяет условиям параграфа 4 л. XV и что решение имеет правильную нормальную производную.

Действительно, при доказательстве теоремы 2 мы пользовались лишь применимостью формулы Грина, но она применима и при сделанных в замечании предположениях.

Можно было бы показать, что единственность решения задачи Неймана имеет место и в более широких предположениях.

## § 2. Интегральные уравнения для поставленных задач

Полученные нами в предыдущей лекции свойства потенциалов позволяют решать задачи Дирихле и Неймана для любых областей, ограниченных достаточно гладкими поверхностями, приведением их к интегральным уравнениям.

В самом деле, пусть мы хотим найти, например, решение внутренней задачи Дирихле. Будем предполагать, что искомая функция  $u$  есть потенциал двойного слоя  $w$  с неизвестной пока плотностью  $\mu(S)$ :

$$u = w = \iint_S \frac{\mu(S_1) \cos \varphi}{r^2} dS_1.$$

Как известно, потенциал двойного слоя есть гармоническая функция. Мы должны подчинить  $w$  тому условию, чтобы ее предельное значение изнутри равнялось  $f_1(S)$ :

$$w_i = f_1(S).$$

Из равенств (XV.7) имеем:

$$w_i = 2\pi\mu(S) + w_0 = 2\pi\mu(S) + \iint_S \frac{\mu(S_1) \cos \varphi}{r^2} dS_1,$$

где  $r$  — расстояние между двумя точками  $S$  и  $S_1$  нашей поверхности. Таким образом, для  $\mu(S)$  получим уравнение

$$\mu(S) = \frac{f_1(S)}{2\pi} - \frac{1}{2\pi} \iint_S \frac{\mu(S_1) \cos \varphi}{r^2} dS_1. \quad (\text{XVI.1})$$

Если для сокращения письма обозначить  $\frac{1}{2\pi} f_1(S)$  через  $F_1(S)$ , а  $\frac{1}{2\pi} \frac{\cos \varphi}{r^2}$  — через  $K(S, S_1)$  (это последнее выражение есть, очевидно, функция двух точек,  $S$  и  $S_1$ , на поверхности), то мы придем к уравнению

$$\mu(S) = F_1(S) - \iint_S K(S, S_1) \mu(S_1) dS_1. \quad (\text{XVI.2})$$

Интегральные уравнения такого вида называются *интегральными уравнениями типа Фредгольма 2-го рода*. К изучению таких уравнений мы вскоре перейдем.

Так же точно можно свести и задачу Дирихле для внешней области, ограниченной поверхностью  $S$ , т. е. для бесконечной области, границей которой служит  $S$ , опять к уравнению Фредгольма 2-го рода.

В самом деле, отыскивая решение снова в виде потенциала двойного слоя из условия  $w_e = f_1(S)$ , получим, аналогично прежнему, для неизвестной плотности  $\mu(S)$

$$w_e = -2\pi\mu(S) + w_0,$$

откуда

$$\mu(S) = -\frac{f_1(S)}{2\pi} + \frac{1}{2\pi} \iint_S \frac{\mu(S_1) \cos \varphi}{r^2} dS_1;$$

обозначая  $-\frac{f_1(S)}{2\pi}$  через  $\Phi_1(S)$ , получим:

$$\mu(S) = \Phi_1(S) + \iint_S K(S, S_1) \mu(S_1) dS_1. \quad (\text{XVI.3})$$

Это уравнение есть уравнение того же типа и рода, что и предыдущее.

К интегральным уравнениям приводятся также внутренние и внешние задачи Неймана.

Будем искать решение внутренней задачи Неймана в виде потенциала простого слоя

$$u = v = \iint_S \frac{v(S_1)}{r} dS_1.$$

Аналогично прежнему

$$\frac{\partial v}{\partial n_i} = -2\pi v(S) + \frac{\partial v}{\partial n_0} = f_2(S),$$

откуда

$$v(S) = -\frac{f_2(S)}{2\pi} + \frac{1}{2\pi} \iint_S \frac{v(S_1) \cos \psi_0}{r^2} dS_1. \quad (\text{XVI.4})$$

Угол  $\psi_0$  получается из угла  $\varphi$  заменой положения точки  $S$  на  $S_1$ . Поэтому, полагая  $-\frac{f_2(S)}{2\pi} = F_2(S)$ , получим для  $v(S)$  уравнение

$$v(S) = F_2(S) + \iint_S K(S_1, S) v(S_1) dS_1. \quad (\text{XVI.5})$$

Наконец, если искать решение внешней задачи Неймана в виде потенциала простого слоя  $v$ , будем иметь:

$$\frac{\partial v}{\partial n_e} = 2\pi v(S) + \iint_S v(S_1) \frac{\cos \psi_0}{r^2} dS_1 = f_2(S)$$

или

$$v(S) = \frac{f_2(S)}{2\pi} - \frac{1}{2\pi} \int_S \frac{v(S_1) \cos \psi_0}{r^2} dS_1.$$

Полагая

$$\frac{f_2(S)}{2\pi} = \Phi_2(S),$$

получим для  $v(S)$  уравнение

$$v(S) = \Phi_2(S) - \iint_S K(S_1, S) v(S_1) dS_1. \quad (\text{XVI.6})$$

Если нам удастся найти функции  $\mu$  и  $v$ , удовлетворяющие уравнениям (XVI.2), (XVI.3), (XVI.5) или (XVI.6), то соответствующие задачи математической физики будут решены.

---

# УРАВНЕНИЯ ЛАПЛАСА И ПУАССОНА НА ПЛОСКОСТИ

## § 1. Фундаментальное решение

Мы разобрали довольно подробно уравнения Лапласа и Пуассона в пространстве. На практике часто бывает, что функция  $u$  не зависит от одного из переменных, например  $z$ ; тогда

$$\frac{\partial u}{\partial z} = \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = 0.$$

При этом уравнения переходят в уравнения с двумя независимыми переменными. Те же самые задачи, которые мы ставили для пространства, мы можем теперь ставить на плоскости  $XOY$  для уравнения

$$\Delta u = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = \rho(x, y),$$

где  $\rho(x, y)$  может иногда равняться нулю тождественно.

Рассмотрим некоторые свойства таких двумерных задач, отличающие их от трехмерного случая.

Совершенно так же, как и в пространстве, легко доказать, что функция, гармоническая в некоторой области  $D$  плоскости  $XOY$ , достигает своего максимального и минимального значений на контуре этой области. Отсюда следует, в силу прежних рассуждений, единственность решения задачи Дирихле для любой ограниченной области. Однако, как мы увидим далее, задача Дирихле для неограниченной области в прежней постановке смысла не имеет. Ставить вопрос об отыскании гармонической функции, равной нулю на бесконечности, здесь не имеет смысла. Дело в том, что решения, обращающегося в нуль на бесконечности, вообще говоря, не существует, и вопрос о единственности такого решения лишен содержания.

Аналогично леммам, доказанным нами в лекции IX, мы имеем здесь две другие леммы.

**Л е м м а 1.** *Функция  $\ln \frac{1}{r} = -\ln r$ ,  $r = \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2}$ , есть гармоническая функция переменных  $x$  и  $y$ .*

В самом деле,

$$\begin{aligned}-\frac{\partial^2 \ln r}{\partial x^2} &= -\frac{1}{r^2} + \frac{2(x-x_0)^2}{r^4}, \\ -\frac{\partial^2 \ln r}{\partial y^2} &= -\frac{1}{r^2} + \frac{2(y-y_0)^2}{r^4},\end{aligned}$$

откуда

$$\Delta \ln \frac{1}{r} = 0.$$

**Л е м м а 2.** Для любой непрерывной со своими производными 2-го порядка функции имеет место формула

$$\begin{aligned}u(x_0, y_0) &= -\frac{1}{2\pi} \iint_D \ln \frac{1}{r} \Delta u \, dx \, dy + \\ &+ \frac{1}{2\pi} \int_s \left( u \frac{\partial \ln \frac{1}{r}}{\partial n} - \ln \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial n} \right) ds, \quad (\text{XVII.1})\end{aligned}$$

где  $D$  — некоторая область, содержащая внутри себя точку  $(x_0, y_0)$ , а  $s$  — контур этой области. Здесь через  $\frac{\partial}{\partial n}$  обозначена производная по направлению внутренней нормали к контуру  $s$ .

Если точка  $(x_0, y_0)$  лежит вне области  $D$ , то формула (XVII.1) заменяется другой:

$$-\frac{1}{2\pi} \iint_D \ln \frac{1}{r} \Delta u \, dx \, dy + \frac{1}{2\pi} \int_s \left( u \frac{\partial \ln \frac{1}{r}}{\partial n} - \ln \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial n} \right) ds = 0. \quad (\text{XVII.2})$$

Доказательство этой леммы вполне аналогично доказательству леммы 3 из лекции IX, и мы не будем его приводить.

Так же, как и раньше, можно доказать, что если функция  $u$  имеет начало координат особой точкой и в окрестности начала является гармонической, причем удовлетворяет неравенству

$$|u| \leq \frac{A}{R^n},$$

где  $R = \sqrt{x^2 + y^2}$ , то ее можно представить в виде

$$u = \sum_{m=0}^n \sum_{i+j=m} a_{ij} \frac{\partial^m \ln \frac{1}{R}}{\partial x^i \partial y^j} + u^*, \quad (\text{XVII.3})$$

где  $u^*$  — гармоническая функция во всей области, включая начало координат.

Справедливы теоремы:

**Т е о р е м а 1.** Если  $u(R, \vartheta)$  — гармоническая функция, то и  $v(R, \vartheta) = u\left(\frac{1}{R}, \vartheta\right)$  гармонична. (Здесь  $R$  и  $\vartheta$  — полярные координаты на плоскости.)

**Т е о р е м а 2.** Если  $u(R, \vartheta)$  гармонична при больших значениях  $R$  и удовлетворяет неравенству

$$|u| \leq AR^n,$$

то ее можно представить в виде

$$u = \sum_{m=1}^n \sum_{i+j=m} a_{ij} R^{2m} \frac{\partial^m \ln \frac{1}{R}}{\partial x^i \partial y^j} + u^*,$$

где  $u^*$  ограничена.

## § 2. Основные задачи

Задача о нахождении решения уравнения Пуассона

$$\Delta u = \rho(x, y)$$

на всей плоскости, обращающегося в нуль на бесконечности, для уравнения с двумя переменными, вообще говоря, неразрешима,

и мы не будем ее касаться. Заметим, что интеграл  $\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \rho \ln \frac{1}{r} dx dy$ ,

распространенный по всей плоскости (если  $\rho$  отлично от нуля лишь в конечной области, то область будет фактически конечной), есть все же частное решение уравнения Пуассона, но, вообще говоря, неограниченно растущее на бесконечности. Этот интеграл называется *логарифмическим потенциалом распределенных масс*.

Задача Дирихле для полуплоскости при некоторых ограничениях на граничную функцию, имеет решение в классе функций, обращающихся в нуль на бесконечности. Пусть функция  $f_1(x)$  удовлетворяет неравенству

$$|f_1(x)| < \frac{A}{x^\alpha}, \quad \text{где } \alpha > 0.$$

Решение уравнения

$$\Delta u = 0$$

при условии

$$u|_{y=0} = f_1(x),$$

обращающиеся в нуль на бесконечности, имеет вид

$$\begin{aligned} u(x_0, y_0) &= \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\partial \ln \frac{1}{r}}{\partial n} f_1(x) dx = \\ &= \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\cos \varphi}{r} f_1(x) dx = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} f_1(x) d\omega(x; x_0, y_0), \end{aligned}$$

где  $\varphi$  — угол, образуемый радиус-вектором, проведенным из точки  $(x, 0)$  в точку  $(x_0, y_0)$  с направлением нормали к границе области в точке  $(x, 0)$ .

Доказательство читатель легко проведет сам.

Задача Неймана для полуплоскости не только равных нулю на бесконечности, но даже и просто ограниченных решений не имеет.

Если записать решение этой задачи формально в виде интеграла, который можно считать потенциалом<sup>1)</sup> простого слоя на плоскости [ср. (XIII.9)],

$$-\frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \ln \frac{1}{r} f_2(x) dx,$$

то этот интеграл будет неограниченно возрастать при удалении точки  $(x_0, y_0)$  на бесконечность.

Мы не будем рассматривать эту задачу.

Задача Дирихле для круга решается приемом, аналогичным прежнему.

Если точка  $(x_1, y_1)$  — сопряженная по отношению к точке  $(x_0, y_0)$ , т. е.

$$x_1 = \frac{x_0}{x_0^2 + y_0^2}, \quad y_1 = \frac{y_0}{x_0^2 + y_0^2},$$

то на круге радиуса 1 попрежнему  $r = R_0 r_1$ , где

$$r = \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2},$$

$$r_1 = \sqrt{(x - x_1)^2 + (y - y_1)^2},$$

а  $R_0$  — радиус-вектор точки  $(x_0, y_0)$ .

Пусть  $(x_0, y_0)$  — внутренняя точка круга  $R \leq 1$ . Применяя формулу Грина к решению уравнения  $\Delta u = \rho$ , будем иметь:

$$\begin{aligned} u(x_0, y_0) &= -\frac{1}{2\pi} \iint_{R \leq 1} \rho \ln \frac{1}{r} dx dy + \\ &+ \frac{1}{2\pi} \int_{R=1} \left( u \frac{\partial \ln \frac{1}{r}}{\partial n} - \frac{\partial u}{\partial n} \ln \frac{1}{r} \right) dS. \end{aligned} \quad (\text{XVII.4})$$

<sup>1)</sup> Об этом потенциале, называемом логарифмическим, см. § 3 этой лекции.

Ввиду того, что  $(x_1, y_1)$  лежит вне круга, функция  $\ln \frac{1}{R_0 r_1}$  — гармоническая везде внутри, и в силу замечания, сделанного о формуле (XVIII.2), мы получим:

$$-\frac{1}{2\pi} \int \int_{R \leq 1} \rho \ln \frac{1}{R_0 r_1} dx dy + \\ + \frac{1}{2\pi} \int_{R=1} \left( u \frac{\partial \ln \frac{1}{R_0 r_1}}{\partial n} - \frac{\partial u}{\partial n} \ln \frac{1}{R_0 r_1} \right) dS = 0. \quad (\text{XVII.5})$$

Вычитая равенство (XVII.5) из (XVII.4) и обозначая

$$G(x, y, x_0, y_0) = \frac{1}{2\pi} \ln \frac{1}{R_0 r_1} - \frac{1}{2\pi} \ln \frac{1}{r},$$

получим формулу

$$u(x_0, y_0) = \int \int_{R \leq 1} \rho G(x, y, x_0, y_0) dx dy - \frac{1}{2\pi} \int_{R=1} u \frac{\partial G}{\partial n} ds. \quad (\text{XVII.6})$$

Функция Грина  $G$  — симметрическая функция точек  $(x, y)$  и  $(x_0, y_0)$ ; следовательно, она гармоническая по  $x_0, y_0$ . Очевидно, что она обращается в тождественный нуль по  $x, y$ , если  $(x_0, y_0)$  лежит на контуре.

Если задача отыскания решения уравнения Пуассона, удовлетворяющего условию

$$u|_s = f_1(s), \quad (\text{XVII.7})$$

разрешима, то решение должно иметь вид (XVII.6). В частном случае, когда

$$u|_s = 0,$$

решение задачи дается формулой

$$u(x_0, y_0) = \int \int_{R \leq 1} \rho G dx dy. \quad (\text{XVII.8})$$

Легко проверить, что функция  $u$ , выражаемая формулой (XVII.8), действительно является решением задачи.

В самом деле,

$$\int \int_{R \leq 1} \rho G dx dy = -\frac{1}{2\pi} \int \int_{R \leq 1} \rho \ln \frac{1}{r} dx dy + \frac{1}{2\pi} \int \int_{R \leq 1} \rho \ln \frac{1}{R_0 r_1} dx dy.$$

Можно показать, что первое слагаемое, являясь логарифмическим потенциалом распределенных масс, удовлетворяет уравнению

$$\Delta v = \rho,$$

а второе — гармоническая функция.

Следовательно, формула (XVII.8) дает решение уравнения Пуассона. Непосредственно видно, что это решение удовлетворяет условию  $u|_s = 0$ .

Преобразуем формулу (XVII.6), подставив в нее явное выражение функции  $G$ . В полярных координатах, заменяя  $x, y$  через  $R$  и  $\vartheta$ , а  $x_0, y_0$  — через  $R_0, \vartheta_0$ , получим для координат точки  $x_1, y_1$  выражения  $\frac{1}{R_0}, \vartheta_0$ .

При этом

$$\ln \frac{1}{r} = -\frac{1}{2} \ln [R^2 + R_0^2 - 2RR_0 \cos(\vartheta - \vartheta_0)],$$

$$\ln \frac{1}{R_0 r_1} = -\frac{1}{2} \ln [R^2 R_0^2 - 2RR_0 \cos(\vartheta - \vartheta_0) + 1].$$

Тогда функция Грина запишется в виде

$$G = \frac{1}{4\pi} \{ \ln [R^2 + R_0^2 - 2RR_0 \cos(\vartheta - \vartheta_0)] - \\ - \ln [R^2 R_0^2 - 2RR_0 \cos(\vartheta - \vartheta_0) + 1] \}$$

$$\text{и} \\ \left. \frac{\partial G}{\partial n} \right|_{R=1} = \\ = \frac{1}{2\pi} \left[ \frac{-R + R_0 \cos(\vartheta - \vartheta_0)}{R^2 + R_0^2 - 2RR_0 \cos(\vartheta - \vartheta_0)} - \frac{-RR_0^2 + R_0 \cos(\vartheta - \vartheta_0)}{R^2 R_0^2 - 2RR_0 \cos(\vartheta - \vartheta_0) + 1} \right]_{R=1} = \\ = \frac{1}{2\pi} \frac{1 - R_0^2}{R_0^2 - 2R_0 \cos(\vartheta - \vartheta_0) + 1}.$$

Решение задачи Дирихле для круга дается при этом формулой

$$u(R_0, \vartheta_0) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{+\pi} \frac{1 - R_0^2}{R_0^2 - 2R_0 \cos(\vartheta - \vartheta_0) + 1} f_1(\vartheta) d\vartheta.$$

Эта формула называется *формулой Пуассона*.

Так же, как и в пространственном случае, проверяется, что эта формула действительно дает решение поставленной задачи.

Аналогично решается задача Дирихле для внешности круга.

Эта задача ставится как задача отыскания функции  $u$ , гармонической вне круга  $R = 1$ , удовлетворяющей условию  $u|_s = f_1(s)$  и *ограниченной* на бесконечности. Это последнее условие существенно отличает задачу Дирихле для плоскости от задачи Дирихле в пространстве. Мы не будем останавливаться на решении этой задачи.

Формула, дающая решение этой задачи, будет иметь вид

$$u(R_0, \vartheta_0) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{+\pi} \frac{R_0^2 - 1}{R_0^2 - 2R_0 \cos(\vartheta - \vartheta_0) + 1} f_1(\vartheta) d\vartheta.$$

Из формулы Пуассона для гармонических функций внутри и вне круга следуют, почти без изменения в способе доказательства, все те же следствия, что и для пространственной задачи.

### § 3. Логарифмический потенциал

На функции двух переменных можно перенести также понятие о потенциалах.

Интеграл вида

$$v = \int_s \ln \frac{1}{r} \mu(s) ds$$

называется *логарифмическим потенциалом простого слоя*. Это — гармоническая функция вне и внутри области  $D$ , ограниченной контуром  $s$ . Функция эта непрерывна при переходе через  $s$ , а ее нормальная производная терпит разрыв непрерывности.

Если составить интеграл

$$\int_s \frac{\partial \ln \frac{1}{r}}{\partial n_0} \mu(s) ds,$$

где производные взяты при изменении  $x_0$  и  $y_0$ , то он оказывается имеющим смысл в случае, если точка  $(x_0, y_0)$  лежит на границе.

Обозначая его величину через  $\frac{\partial v}{\partial n} \Big|_0$ , получим:

$$\begin{aligned} \frac{\partial v}{\partial n} \Big|_e &= \pi \mu + \frac{\partial v}{\partial n} \Big|_0, \\ \frac{\partial v}{\partial n} \Big|_i &= -\pi \mu + \frac{\partial v}{\partial n} \Big|_0. \end{aligned}$$

Величину  $\frac{\partial v}{\partial n} \Big|_0$  можно представить в виде

$$\int_s \mu \frac{\cos \psi_0}{r} ds,$$

где  $\psi_0$  есть угол, составленный радиус-вектором, проведенным из точки  $(x, y)$  в точку  $(x_0, y_0)$ , с направлением нормали в этой последней точке. Функция  $\frac{\cos \psi_0}{r}$  есть ограниченная функция, если только линия  $s$  достаточно гладкая.

Логарифмический потенциал простого слоя, вообще говоря, не ограничен на бесконечности.

Интеграл вида

$$w = \int_s \frac{\partial \ln \frac{1}{r}}{\partial n} \mu(s) ds = \int_s \frac{\mu(s) \cos \varphi}{r} ds,$$

где  $\varphi$  — угол, составленный радиус-вектором, проведенным из точки  $(x, y)$  в точку  $(x_0, y_0)$ , с направлением нормали в точке  $(x, y)$ , называется *логарифмическим потенциалом двойного слоя*. Это — гармоническая функция как внутри, так и вне области  $D$ , ограниченной контуром  $s$ . На контуре  $s$  эта функция терпит разрыв непрерывности.

Если  $(x_0, y_0)$  лежит на контуре, который мы предполагаем достаточно гладким, то  $\frac{\cos \varphi}{r}$  — ограниченная функция, и интеграл  $w$  имеет смысл. Обозначая при этом его величину через  $w_0$ , будем иметь

$$\begin{aligned} w_e &= -\pi\mu + w_0, \\ w_i &= \pi\mu + w_0. \end{aligned}$$

Логарифмический потенциал двойного слоя равен нулю на бесконечности.

Аналогично пространственному случаю можно поставить задачи Дирихле и Неймана также и для плоскости. При этом, однако, будут некоторые особенности во внешних задачах.

Во внешней задаче Дирихле вместо обращения  $u$  в нуль на бесконечности нужно требовать ограниченности этой функции в окрестности бесконечно удаленной точки. При этом задача Дирихле получает определенное и единственное решение.

Во внешней задаче Неймана нужно попрежнему искать решение, равное нулю на бесконечности, но в отличие от прежнего эта задача уже не будет, вообще говоря, иметь решения.

Необходимое и достаточное условие существования такого решения будет:

$$\int_s f_2(s) ds = 0,$$

где  $f_2(s)$  — значения нормальной производной на контуре.

В этом смысле плоские задачи, внутренние и внешние, более сходны между собой, чем пространственные. Читателю будет полезно доказать эти утверждения самостоятельно.

Можно аналогично прежнему свести задачи Дирихле и Неймана к интегральным уравнениям. Мы также предоставляем сделать это читателю.

Для плоской задачи интегрирования уравнения Лапласа существует еще один чрезвычайно мощный метод, основанный на применении теории функций комплексного переменного. Мы укажем лишь сущность этого метода, не останавливаясь на нем подробно.

Рассмотрим какую-либо аналитическую функцию  $w(z) = u + iv$  комплексного переменного  $z = x + iy$ . Считая независимыми пере-

менными  $x$  и  $y$  и применяя оператор Лапласа к  $w$ , получим:

$$\Delta w = \frac{\partial^2 w}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 w}{\partial y^2} = w''(z) + i^2 w''(z) = 0.$$

Отсюда следует, что функция  $w(z)$  является гармонической функцией переменных  $x, y$ . Следовательно, ее действительная и мнимая части  $u(x, y)$  и  $v(x, y)$  порознь будут гармоническими в области аналитичности  $w(z)$ .

Введем новое независимое комплексное переменное  $\zeta = \xi + i\eta$ , положив

$$z = \psi(\zeta),$$

где  $\psi$  — какая-нибудь аналитическая функция. Тогда

$$x = x(\xi, \eta), \quad y = y(\xi, \eta). \quad (\text{XVII.9})$$

При этом аналитическая функция  $w(z)$  перейдет в аналитическую функцию переменного  $\zeta$ :

$$w^*(\zeta) \equiv w(\psi(\zeta)).$$

Следовательно, функции

$$\left. \begin{aligned} u^*(\xi, \eta) &= u(x(\xi, \eta), y(\xi, \eta)), \\ v^*(\xi, \eta) &= v(x(\xi, \eta), y(\xi, \eta)) \end{aligned} \right\}$$

будут снова гармоническими функциями переменных  $\xi, \eta$ .

Как доказывается в курсах теории функций комплексного переменного, формулы (XVII.9) осуществляют конформное отображение плоскости  $x, y$  на плоскость  $\xi, \eta$ , причем любое конформное отображение может быть получено таким образом. Из наших рассуждений следует вывод: гармоническая функция переменных  $x, y$  в некоторой области остается гармонической, если эту область подвергнуть конформному преобразованию.

Для любой односвязной области  $\Omega$  плоскости  $x, y$  мы получаем следующий метод решения задачи Дирихле. Найдем конформное отображение

$$x = x(\xi, \eta), \quad y = y(\xi, \eta),$$

переводящее область  $\Omega$  в круг. В теории функций комплексного переменного доказывается, что такое отображение существует. Функция  $u^*(\xi, \eta)$  должна быть гармонической в круге функцией, принимающей на границе заданные значения. Такую функцию можно построить при помощи формулы Пуассона. Возвращаясь к переменным  $x, y$ , получим решение нашей задачи.

## ЛЕКЦИЯ XVIII

### ТЕОРИЯ ИНТЕГРАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ

#### § 1. Общие замечания

Мы уже видели в прошлых лекциях, что решение некоторых задач математической физики приводится к решению уравнений вида

$$\varphi(P) = \int_D K(P, P_1) \varphi(P_1) dP_1 + f(P), \quad (\text{XVIII.1})$$

где  $D$  — некоторая область изменения точки  $P$  и точки  $P_1$ . Функция  $K(P, P_1)$  двух переменных точек из этой области называется *ядром*, а  $\varphi(P)$  является неизвестной функцией.

Область  $D$  предполагается лежащей в  $n$ -мерном пространстве, и пусть координаты точки  $P$  в этом пространстве будут  $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ , а точки  $P_1$  будут  $(x_1, x_2, \dots, x'_n)$ ; тогда ядро  $K(P, P_1)$  есть функция  $2n$  переменных  $(x_1, x_2, \dots, x_n, x'_1, x'_2, \dots, x'_n)$ , а функции  $\varphi(P)$  и  $f(P)$  являются функциями  $n$  переменных:  $\varphi(x_1, x_2, \dots, x_n)$  и  $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ , причем эти переменные изменяются так, что точки  $P(x_1, x_2, \dots, x_n)$  и  $P_1(x'_1, x'_2, \dots, x'_n)$  не выходят из области  $D$ .

В частности, если область  $D$  является одномерной и связной, тогда положение точки  $P$  определяется одной координатой  $x$ , и интегральное уравнение примет вид

$$\varphi(x) = \int_a^b K(x, x') \varphi(x') dx' + f(x).$$

К систематическому изучению уравнений вида (XVIII.1), называемых обычно *интегральными уравнениями Фредгольма 2-го рода*, мы сейчас и приступим.

Функции  $K$  и  $f$  мы будем считать вещественными. Другие ограничения, как-то: ограниченность, непрерывность и тому подобное, будем вводить по мере надобности.

Мы будем встречаться далее с уравнениями, могущими иметь не одно, а несколько решений. При этом во всем дальнейшем

мы не будем считать различными функции, которые являются эквивалентными, то есть принимают различные значения лишь на множестве меры нуль.

Так же, как и для всяких линейных уравнений, для интегральных уравнений типа Фредгольма имеет место

**Т е о р е м а 1.** *Общее решение уравнения (XVIII.1) имеет вид:*

$$\varphi(P) = \varphi_0(P) + \varphi^*(P),$$

где  $\varphi_0(P)$  есть некоторое частное решение уравнения (XVIII.1), а  $\varphi^*(P)$  представляет собою общее решение уравнения

$$\varphi(P) = \int_D K(P, P_1) \varphi(P_1) dP_1. \quad (\text{XVIII.2})$$

Уравнение (XVIII.2) мы будем называть *соответствующим однородным уравнением* для уравнения (XVIII.1).

Отсюда ясно, что если соответствующее однородное уравнение не имеет других решений, кроме тривиального  $\varphi^*(P) = 0$ , то уравнение (XVIII.1) не может иметь более одного решения.

## § 2. Метод последовательных приближений

Прежде всего изучим несколько простейших частных случаев, которые позволят нам перейти к более общей трактовке вопроса.

Вместо уравнения (XVIII.1) мы будем рассматривать уравнение более общего вида:

$$\varphi(P) = \lambda \int_D K(P, P_1) \varphi(P_1) dP_1 + f(P), \quad (\text{XVIII.3})$$

так называемое *уравнение с параметром*. Допустим, что область  $D$  изменения точки  $P$  ограничена; объем этой области будем обозначать также буквой  $D$ . Допустим, кроме того, что ядро  $K(P, P_1)$  представляет собою суммируемую функцию переменной пары точек  $(P, P_1)$  в пространстве  $2n$  переменных, причем справедливо еще неравенство

$$\int_D |K(P, P_1)| dP_1 \leq M,$$

где постоянная  $M$  не зависит от положения точки  $P$ .

В тех приложениях, которыми мы будем заниматься, функция  $K(P, P_1)$  будет иметь лишь конечное число таких многообразий меньшего числа измерений (точек, линий, поверхностей и т. д.), на которых она терпит разрыв. Если исключить эти многообразия вместе с окружающим их сколь угодно малым объемом, то функция  $K(P, P_1)$  будет непрерывна в оставшейся части области.



Для краткости условимся обозначать функцию

$$\psi(P) = \int_D K(P, P_1) f(P_1) dP_1$$

символом  $Af$ .

Как мы убедились, справедливо неравенство

$$|Af| \leq M \sup |f|.$$

Будем называть  $Af$  оператором над функцией  $f$ . Введем в рассмотрение степени оператора  $A$ :

$$A(Af) = A^2f, A(A^2f) = A^3f, \dots, A(A^{m-1}f) = A^mf.$$

Справедлива следующая очевидная формула:

$$A^{l+q}f = A^p(A^qf).$$

Формулы (XVIII.5) в этих обозначениях примут вид

$$\varphi_k(P) = A^k f. \quad (\text{XVIII.6})$$

При этом, как мы видели, имеет место оценка

$$|A^k f| \leq M^k \sup |f|. \quad (\text{XVIII.7})$$

Отметим одно важное свойство оператора  $A$ .

**Т е о р е м а 2.** Если некоторая последовательность ограниченных измеримых функций  $f_k$  равномерно сходится к предельной функции  $f_0$ :

$$f_0 = \lim_{k \rightarrow \infty} f_k,$$

то

$$Af_0 = \lim_{k \rightarrow \infty} Af_k,$$

причем последовательность  $Af_k$  также сходится равномерно.

В самом деле,

$$|Af_k - Af_0| = |A(f_k - f_0)| \leq M \sup |f_k - f_0|.$$

**С л е д с т в и е.** Если ряд

$$\sum_{k=1}^{\infty} u_k(P) = u(P)$$

сходится равномерно, то

$$Au(P) = \sum_{k=1}^{\infty} Au_k(P).$$

В наших новых обозначениях уравнение (XVIII.3) примет вид

$$\varphi - \lambda A\varphi = f,$$

или, полагая еще  $E\varphi \equiv \varphi$ , где  $E$  — тождественный или единичный оператор, запишем его в виде

$$(E - \lambda A)\varphi = f.$$

Подставляя в (XVIII.4) выражение для  $\varphi_k$  из (XVIII.6), мы получим, пока еще формально, равенство

$$\varphi(P) = f + \lambda A f + \lambda^2 A^2 f + \dots + \lambda^k A^k f + \dots \quad (\text{XVIII.8})$$

Члены ряда в правой части (XVIII.8), как это вытекает из оценок (XVIII.7), при  $|\lambda M| < 1$  будут по абсолютной величине меньше членов сходящегося числового ряда с положительными членами:

$$\sum_{k=0}^{\infty} |\lambda|^k M^k \sup |f| = \sup |f| \frac{1}{1 - |\lambda| M}.$$

Следовательно, при фиксированном  $\lambda$ , удовлетворяющем условию  $|\lambda| < \frac{1}{M}$ , ряд в (XVIII.8) сходится равномерно, и формула (XVIII.8) в самом деле определяет некоторую измеримую функцию  $\varphi(P)$ . При этом

$$|\varphi| \leq \sum_{k=0}^{\infty} |\lambda|^k M^k \sup |f| = \frac{\sup |f|}{1 - |\lambda| M}.$$

Проверим теперь, что полученная нами функция  $\varphi(P)$  является решением уравнения (XVIII.3). Подставляя выражение для  $\varphi$  из (XVIII.8) в левую часть уравнения (XVIII.3), получим:

$$(E - \lambda A) \left[ f + \sum_{k=1}^{\infty} \lambda^k A^k f \right].$$

Если мы покажем, что это выражение тождественно равно  $f$ , наше утверждение будет доказано. Ряд, стоящий в квадратных скобках, сходится равномерно. На основании теоремы 2 имеем:

$$\begin{aligned} (E - \lambda A) \left[ f + \sum_{k=1}^{\infty} \lambda^k A^k f \right] &= \\ &= f + \sum_{k=1}^{\infty} \lambda^k A^k f - \lambda A f - \sum_{k=1}^{\infty} \lambda^{k+1} A^{k+1} f = f. \quad (\text{XVIII.9}) \end{aligned}$$

Таким образом, мы доказали, что функция  $\varphi(P)$ , выражаемая формулой (XVIII.8), есть решение интегрального уравнения (XVIII.3). Легко доказать единственность ограниченного решения при условии  $|\lambda| M < 1$ . Для этого, предполагая интегральное

уравнение (XVIII.3) выполненным, применим к обеим частям этого уравнения оператор

$$E + \sum_{k=1}^{\infty} \lambda^k A^k,$$

понимаемый в следующем смысле:

$$\left(E + \sum_{k=1}^{\infty} \lambda^k A^k\right) f \equiv f + \sum_{k=1}^{\infty} \lambda^k A^k f.$$

Мы получим:

$$\left(E + \sum_{k=1}^{\infty} \lambda^k A^k\right) [(E - \lambda A) \varphi] = \left(E + \sum_{k=1}^{\infty} \lambda^k A^k\right) f.$$

Раскрывая скобки в левой части, получим:

$$\begin{aligned} \left(E - \sum_{k=1}^{\infty} \lambda^k A^k\right) (E - \lambda A) \varphi &= \\ &= \varphi + \sum_{k=1}^{\infty} \lambda^k A^k \varphi - \lambda A \varphi - \sum_{k=1}^{\infty} \lambda^{k+1} A^{k+1} \varphi = \varphi. \end{aligned} \quad (\text{XVIII.10})$$

Отсюда

$$\varphi = \left(E + \sum_{k=1}^{\infty} \lambda^k A^k\right) f.$$

Следовательно, решение должно выражаться формулой (XVIII.8) и является единственным. Если ввести обозначение

$$B = E - \lambda A,$$

то оператор

$$E + \sum_{k=1}^{\infty} \lambda^k A^k$$

естественно обозначить символом  $B^{-1}$ . При этом равенства (XVIII.9) и (XVIII.10) примут вид

$$BB^{-1}f = f, \quad (\text{XVIII.11})$$

$$B^{-1}Bf = f, \quad (\text{XVIII.12})$$

где  $f$  — любая измеримая ограниченная функция.

Эти формулы оправдывают нашу символику.

### § 3. Уравнение Вольтерра

В некоторых частных случаях ряд (XVIII.8) может оказаться сходящимся на всей плоскости комплексного переменного  $\lambda$ . Рассмотрим соответствующий пример. Пусть область  $D$  одного

переменного представляет собой полупрямую  $x > 0$ ,

$$\varphi(x) = \lambda \int_0^{\infty} K(x, y) \varphi(y) dy + f(x),$$

и пусть ядро  $K(x, y)$  обладает свойством:

$$K(x, y) \equiv 0 \quad \text{при } y > x,$$

и ограничено

$$|K(x, y)| \leq M.$$

Тогда уравнение примет вид

$$\varphi(x) = \lambda \int_0^x K(x, y) \varphi(y) dy + f(x).$$

Уравнения этого типа называются *уравнениями Вольтерра*.

Предполагая по-прежнему, что функция  $f$  ограничена постоянной  $L$  и измерима, оценим величину  $A^h f$ . Мы имеем:

$$|Af| = \left| \int_0^x K(x, y) f(y) dy \right| \leq \int_0^x LM dy = L \frac{Mx}{1},$$

$$|A^2 f| = \left| \int_0^x K(x, y) (Af) dy \right| \leq \int_0^x ML \frac{My}{1} dy = L \frac{M^2 x^2}{1 \cdot 2},$$

$$|A^3 f| = \left| \int_0^x K(x, y) (A^2 f) dy \right| \leq \int_0^x ML \frac{M^2 y^2}{1 \cdot 2} dy = L \frac{M^3 x^3}{1 \cdot 2 \cdot 3},$$

.....

$$|A^h f| \leq L \frac{M^h x^h}{h!}.$$

Следовательно, все члены ряда (XVIII.8)

$$f + \lambda Af + \lambda^2 A^2 f + \dots + \lambda^h A^h f + \dots$$

по абсолютной величине не превосходят соответствующих членов ряда

$$L + L \frac{\lambda M x}{1!} + L \frac{\lambda^2 M^2 x^2}{2!} + \dots + L \frac{\lambda^h M^h x^h}{h!} + \dots,$$

сходящегося на всей плоскости  $\lambda$ . Отсюда следует, что ряд (XVIII.8) при любом фиксированном  $x$  равномерно сходится в каждом конечном круге плоскости  $\lambda$  и представляет собою целую анали-

тическую функцию  $\lambda$ . При фиксированном  $\lambda$  он равномерно сходится на всяком конечном интервале значений  $x$ , а значит, по предыдущему, представляет собой единственное решение рассматриваемого интегрального уравнения.

#### § 4. Уравнения с вырожденным ядром

Рассмотрим еще один частный класс интегральных уравнений, теорию которого легко построить. Полученные при этом результаты окажутся справедливыми и в более общем случае.

Изучим интегральное уравнение (XVIII.3) в предположении, что его ядро имеет специальный вид:

$$K(P, P_1) = \sum_{l=1}^N \varphi_l(P) \psi_l(P_1). \quad (\text{XVIII.13})$$

Ядра вида (XVIII.13) называются *вырожденными*.

В соответствии с тем, что было сказано выше, условимся говорить, что система функций  $\varphi_1(P), \varphi_2(P), \dots, \varphi_N(P)$  *линейно независима*, если не существует таких постоянных  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_N$ , не равных одновременно нулю, для которых линейная комбинация

$$\alpha_1 \varphi_1(P) + \alpha_2 \varphi_2(P) + \dots + \alpha_N \varphi_N(P)$$

эквивалентна нулю. Систему функций  $\varphi_1(P), \varphi_2(P), \dots, \varphi_N(P)$ , а также систему  $\psi_1(P), \psi_2(P), \dots, \psi_N(P)$  мы можем считать линейно независимыми системами в области  $D$ , ибо в противном случае можно выразить одну или несколько функций через линейную комбинацию остальных, и мы придем к ядру такого же вида, но с меньшим числом слагаемых.

В дальнейшем, пока не сделано специальной оговорки, мы будем считать функции

$$\varphi_1, \dots, \varphi_N, \psi_1, \dots, \psi_N$$

ограниченными и имеющими лишь изолированные разрывы на конечном числе гладких поверхностей.

Уравнение (XVIII.3) с вырожденным ядром имеет вид:

$$\varphi(P) = \lambda \sum_{l=1}^N \varphi_l(P) \int_D \psi_l(P_1) \varphi(P_1) dP_1 + f(P), \quad (\text{XVIII.14})$$

и, следовательно, разность  $\varphi(P) - f(P)$  должна быть линейной комбинацией функций  $\varphi_l(P)$ ,  $l = 1, 2, \dots, N$ , с постоянными коэффициентами. Полагая  $\varphi(P) - f(P) = \lambda \sum_{h=1}^N \alpha_h \varphi_h(P)$  и подставляя это

выражение в уравнение (XVIII.14), получим:

$$\sum_{k=1}^N \alpha_k \varphi_k(P) = \lambda \sum_{l=1}^N \varphi_l(P) \int_D \sum_{k=1}^N \alpha_k \varphi_k(P_1) \psi_l(P_1) dP_1 + \\ + \sum_{l=1}^N \varphi_l(P) \int_D \psi_l(P_1) f(P_1) dP_1.$$

Так как функции  $\varphi_l(P)$  линейно независимы, то коэффициенты при одинаковых функциях должны быть одинаковыми в обеих частях уравнения, и мы получим систему уравнений

$$\alpha_l - \lambda \sum_{k=1}^N \alpha_k m_{lk} = f_l \quad (l = 1, 2, \dots, N), \quad (\text{XVIII.15})$$

где

$$m_{lk} = \int_D \varphi_k(P_1) \psi_l(P_1) dP_1, \quad (\text{XVIII.16})$$

$$f_l = \int_D f(P_1) \psi_l(P_1) dP_1. \quad (\text{XVIII.17})$$

Система (XVIII.15) равносильна интегральному уравнению (XVIII.14). Обозначим матрицу системы (XVIII.15) через  $M(\lambda)$ :

$$M(\lambda) = \begin{vmatrix} 1 - m_{11}\lambda & -m_{21}\lambda & \dots & -m_{N1}\lambda \\ -m_{12}\lambda & 1 - m_{22}\lambda & \dots & -m_{N2}\lambda \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ -m_{1N}\lambda & -m_{2N}\lambda & \dots & 1 - m_{NN}\lambda \end{vmatrix}.$$

Разрешимость нашей системы зависит от определителя  $\Delta(\lambda) = |M(\lambda)|$  этой матрицы.

Очевидно, при этом могут представиться два случая:

I.  $\Delta(\lambda) \neq 0$ ,

II.  $\Delta(\lambda) = 0$ .

В случае I имеем следующую теорему:

**Т е о р е м а 3.** Система (XVIII.15) при значениях  $\lambda$ , для которых  $\Delta(\lambda) \neq 0$ , однозначно разрешима при любых  $f_l$ , и уравнение (XVIII.14) разрешимо при любой функции  $f$ .

В частности, уравнение

$$\varphi(P) = \lambda \int_D K(P, P_1) \varphi(P_1) dP_1, \quad (\text{XVIII.18})$$

которое мы называли соответствующим однородным уравнением для (XVIII.3), имеет при этом только тривиальное решение.

Первое утверждение теоремы доказывается в курсах алгебры; второе непосредственно следует из первого.

В случае II при значениях, для которых  $\Delta(\lambda) = 0$ , система (XVIII.15) разрешима не при всяких  $f_l$ , а следовательно, уравнение (XVIII.3) — не при всяких  $f$ .

При этом однородная система

$$\alpha_l - \lambda \sum_{k=1}^N m_{lk} \alpha_k = 0 \quad (l = 1, 2, \dots, N) \quad (\text{XVIII.19})$$

имеет  $N - q$  линейно независимых решений, где  $q$  — ранг матрицы  $M(\lambda)$ .

Пусть эти решения будут

$$\alpha_1^{(s)}, \alpha_2^{(s)}, \dots, \alpha_N^{(s)} \quad (s = 1, 2, \dots, N - q).$$

Уравнение (XVIII.18) будет, очевидно, также иметь ровно  $N - q$  линейно независимых решений.

Известно, что в том случае, когда определитель системы равен нулю, неоднородная система может не иметь ни одного решения. Мы напомним некоторое необходимое и достаточное условие для разрешимости системы (XVIII.15).

В силу условия  $\Delta(\lambda) = 0$  левые части (XVIII.15) зависимы и, следовательно, можно составить линейные комбинации этих левых частей, обращающиеся в нуль тождественно. В самом деле, умножая уравнения (XVIII.15) соответственно на  $\beta_l$  и складывая, получим:

$$\begin{aligned} \sum_{l=1}^N \alpha_l \beta_l - \lambda \sum_{l=1}^N \sum_{k=1}^N m_{kl} \alpha_k \beta_l &= \sum_{k=1}^N \alpha_k \beta_k - \lambda \sum_{k=1}^N \sum_{l=1}^N m_{lk} \alpha_k \beta_l = \\ &= \sum_{k=1}^N \alpha_k \left[ \beta_k - \lambda \sum_{l=1}^N m_{lk} \beta_l \right] = \sum_{l=1}^N f_l \beta_l. \end{aligned}$$

Можно подобрать  $\beta_l$  так, что

$$\beta_k - \lambda \sum_{l=1}^N m_{lk} \beta_l = 0 \quad (k = 1, 2, \dots, N). \quad (\text{XVIII.20})$$

Определитель системы (XVIII.20) равен  $\Delta(\lambda) = 0$ . Как доказывается в курсах алгебры, число линейно независимых решений (XVIII.20) равно опять  $N - q$ . Пусть эти решения будут:  $\beta_1^{(s)}, \beta_2^{(s)}, \dots, \beta_N^{(s)}$ ;  $s = 1, 2, \dots, (N - q)$ .

Для разрешимости (XVIII.15) необходимо выполнение равенств

$$\sum_{l=1}^N f_l \beta_l^{(s)} = 0 \quad (s = 1, 2, \dots, N - q). \quad (\text{XVIII.21})$$

В курсах алгебры доказывается, что эти условия являются также и достаточными. Подобно тому как система (XVIII.15)

соответствовала уравнению (XVIII.3), а система (XVIII.19) — уравнению (XVIII.18), можно установить соответствие между системой (XVIII.20) и уравнением

$$\psi(P_1) = \lambda \int_D K(P, P_1) \psi(P) dP, \quad (\text{XVIII.22})$$

которое мы будем называть *однородным уравнением, союзным с уравнением (XVIII.18)*. Подставляя вместо  $K(P, P_1)$  его выражение и повторяя дословно предыдущие рассуждения, мы убеждаемся, что решение уравнения (XVIII.22) должно иметь вид:

$$\psi^{(s)}(P_1) = \sum_{l=1}^N \beta_l^{(s)} \psi_l(P_1), \quad (\text{XVIII.23})$$

где  $\beta_l^{(s)}$  — числа, удовлетворяющие (XVIII.20). Отсюда получаем теорему.

**Т е о р е м а 4.** *Однородное уравнение (XVIII.18) и союзное с ним уравнение (XVIII.22) имеют одинаковое число решений, линейно независимых между собой. Это число равняется  $r = N - q$ , где  $q$  — ранг матрицы  $M(\lambda)$ , а  $N$  — число слагаемых в вырожденном ядре (XVIII.13).*

Подчеркнем, что однородные уравнения (XVIII.18) и (XVIII.22) имеют нетривиальные решения только для тех значений  $\lambda$ , для которых определитель матрицы  $M(\lambda)$  обращается в нуль. Эти значения  $\lambda$  называются *собственными значениями* или *характеристическими числами* нашего уравнения, а число линейно независимых решений  $r = N - q$ , соответствующее данному характеристическому числу, называется его *рангом*.

Подставим в уравнения (XVIII.21) вместо  $f_l$  их выражения. Мы будем иметь:

$$\int_D f(P) \sum_{l=1}^N \beta_l^{(s)} \psi_l(P) dP = 0, \quad (\text{XVIII.24})$$

или

$$\int_D f(P) \psi^{(s)}(P) dP = 0, \quad s = 1, 2, \dots, N - q. \quad (\text{XVIII.25})$$

Очевидно, что (XVIII.24) и (XVIII.25) равносильны.

Будем называть две функции *ортogonalными*, если интеграл от их произведения по области  $D$  равен нулю. Таким образом мы доказали следующую теорему:

**Т е о р е м а 5.** *Необходимым и достаточным условием разрешимости уравнения (XVIII.14) в случае II, т. е. при  $\Delta(\lambda) = 0$ , является ортogonalность его свободного члена  $f$  ко всем решениям союзного однородного уравнения.*

Очевидно, что при этом общее решение уравнения (XVIII.14) имеет вид

$$\varphi(P) = \varphi^{(0)}(P) + \sum_{s=1}^{N-q} C_s \varphi^{(s)}(P), \quad (\text{XVIII.26})$$

где  $\varphi^{(0)}(P)$  — некоторое частное решение, а  $\varphi^{(s)}(P)$ ,  $s = 1, 2, \dots, (N - q)$  — частные решения однородного уравнения (XVIII.18).

Отметим, что условия (XVIII.25) независимы друг от друга: для любых чисел  $a_s$  можно указать такую функцию  $f(P)$ , чтобы выполнялись равенства

$$\int_D f(P) \psi^{(s)}(P) dP = a_s, \quad s = 1, 2, \dots, N - q. \quad (\text{XVIII.25}')$$

Чтобы показать это, заметим предварительно, что для любой заданной системы чисел  $f_l$  можно указать такую функцию  $f(P)$ , для которой выполняются равенства (XVIII.17).

Действительно, будем искать функцию  $f(P)$  в виде

$$f(P) = \sum_{i=1}^N \gamma_i \psi_i(P).$$

Помножим это равенство на  $\psi_l$  и проинтегрируем по области  $D$ . Получим систему уравнений для  $\gamma_i$ :

$$f_l = \sum_{i=1}^N \gamma_i \int_D \psi_i(P) \psi_l(P) dP, \quad l = 1, 2, \dots, N,$$

которая разрешима, так как ее определитель есть определитель Грама для системы линейно независимых функций  $\psi_i$  и потому положителен. Таким образом, разрешимость системы (XVIII.25') будет доказана, если мы докажем разрешимость системы:

$$\sum_{l=1}^N f_l \beta_l^{(s)} = a_s, \quad s = 1, 2, \dots, N - q. \quad (\text{XVIII.21}')$$

Последняя разрешима, так как благодаря линейной независимости систем чисел  $\beta_1^{(s)}, \beta_2^{(s)}, \dots, \beta_N^{(s)}$  ( $s = 1, 2, \dots, N - q$ ) ранг матрицы  $\|\beta_l^{(s)}\|$  системы уравнений (XVIII.21') равен  $N - q$ , т. е. числу уравнений и, следовательно, ранг основной матрицы системы равен рангу расширенной матрицы.

**З а м е ч а н и е.** Теорема 3 по существу следует из четвертой и пятой. В самом деле, если число линейно независимых решений у союзного уравнения и у соответствующего однородного уравнения равно нулю (решений у этих уравнений всегда одинаковое число), то условия ортогональности пропадают, и неоднородное уравнение будет однозначно разрешимо.

До сих пор мы рассматривали уравнения с вырожденным ядром, предполагая, что функции  $\varphi_l(P)$  и  $\psi_l(P)$  не содержат параметра  $\lambda$ .

Пусть теперь функции  $\varphi_l(P)$  и  $\psi_l(P)$  зависят еще от комплексного параметра  $\lambda$  и аналитичны в некоторой области  $\Omega$  изменения этого переменного.

Тогда определитель  $\Delta(\lambda)$  будет функцией от  $\lambda$ , также аналитической в этой области. Допустим, что он не обращается в нуль тождественно. Тогда внутри  $\Omega$  второй случай (т. е.  $\Delta(\lambda) = 0$ ) может иметь место только в изолированных точках, ибо  $\Delta(\lambda)$ , как функция аналитическая, может иметь только изолированные нули. Полученный результат сформулируем в виде теоремы.

**Т е о р е м а 6.** Если в уравнении с вырожденным ядром функции, из которых составлено это ядро, суть аналитические функции параметра  $\lambda$  в некоторой области  $\Omega$  плоскости  $\lambda$  и если хотя бы для одного значения  $\lambda$  уравнение однозначно разрешимо при любой правой части, то второй случай (т. е.  $\Delta(\lambda) = 0$ ) может иметь место только для изолированных точек области  $\Omega$ .

Теоремы 3, 4, 5 и 6, как мы увидим, остаются справедливыми не только для уравнений с вырожденным ядром, но и для более общих уравнений. Для более общего случая они называются соответственно 1-й, 2-й, 3-й, 4-й теоремами Фредгольма.

## § 5. Ядро специального вида. Теоремы Фредгольма

Разобрав решение интегральных уравнений в круге  $|\lambda| < \frac{1}{M}$ , а также уравнений с вырожденным ядром, переходим к анализу более общего случая. Пусть ядро уравнения (XVIII.3) имеет вид

$$K(P, P_1) = \sum_{l=1}^N \chi_l(P) \xi_l(P_1) + K_1(P, P_1), \quad (\text{XVIII.27})$$

где

$$\int_D |K_1(P, P_1)| dP_1 \leq M, \quad (\text{XVIII.28})$$

$$\int_D |K_1(P, P_1)| dP \leq M. \quad (\text{XVIII.29})$$

Уравнение (XVIII.3) примет при этом вид

$$\begin{aligned} \varphi(P) - \lambda \int_D K_1(P, P_1) \varphi(P_1) dP_1 = \\ = \lambda \sum_{l=1}^N \chi_l(P) \int_D \xi_l(P_1) \varphi(P_1) dP_1 + f(P). \end{aligned} \quad (\text{XVIII.30})$$

Будем рассматривать уравнение (XVIII.27) при значениях  $\lambda$ , удовлетворяющих условию  $|\lambda| < \frac{1}{M}$  ( $M$  имеет теперь иной смысл, чем в § 2). Введем опять символические обозначения

$$\varphi(P) - \lambda \int_D K_1(P, P_1) \varphi(P_1) dP_1 \equiv (E - \lambda A_1) \varphi \equiv B_1 \varphi,$$

$$\chi(P) + \sum_{k=1}^{\infty} \lambda^k A_1^k \chi \equiv B_1^{-1} \chi.$$

Воспользуемся также соответствующими обозначениями для союзного уравнения

$$\psi(P_1) - \lambda \int_D K_1(P, P_1) \psi(P) dP \equiv (E - \lambda A_1^*) \psi = B_1^* \psi,$$

Легко проверить, что если положить

$$B_1^{*-1} \xi(P_1) \equiv \xi(P_1) + \sum_{k=1}^{\infty} \lambda^k A_1^{*k} \xi(P_1),$$

то аналогично (XVIII.11) и (XVIII.12) получим:

$$B_1^* B_1^{*-1} \xi(P_1) \equiv \xi(P_1), \quad B_1^{*-1} B_1^* \psi(P_1) \equiv \psi(P_1).$$

Проверим еще две формулы, которыми мы будем пользоваться далее:

$$\int_D [B_1 \varphi(P)] \psi(P) dP = \int_D \varphi(P) [B_1^* \psi(P)] dP, \quad (\text{XVIII.31})$$

$$\int_D [B_1^{-1} \chi(P)] \xi(P) dP = \int_D \chi(P) [B_1^{*-1} \xi(P)] dP. \quad (\text{XVIII.32})$$

В самом деле,

$$\begin{aligned} \int_D \psi(P) [A_1 \varphi(P)] dP &= \int_D \psi(P) \left[ \int_D K_1(P, P_1) \varphi(P_1) dP_1 \right] dP = \\ &= \int_D \varphi(P_1) \left[ \int_D K_1(P, P_1) \psi(P) dP \right] dP_1 = \int_D \varphi(P_1) [A_1^* \psi(P_1)] dP_1. \end{aligned}$$

Отсюда непосредственно получаем:

$$\int_D \psi(P) \{[E - \lambda A_1] \varphi\} dP = \int_D \varphi(P) \{[E - \lambda A_1^*] \psi\} dP,$$

Так же доказывается и формула (XVIII.32).

Уравнение (XVIII.30) запишется при этом в виде

$$B_1 \varphi = \lambda \sum \chi_l(P) \int_D \xi_l(P_1) \varphi(P_1) dP_1 + f(P). \quad (\text{XVIII.33})$$

Введем новую неизвестную функцию, полагая  $B_1 \varphi(P) = \chi(P)$ , откуда  $\varphi(P) = B_1^{-1} \chi(P)$ . Подставляя в уравнение (XVIII.33) это выражение и пользуясь равенством (XVIII.32), получим:

$$\begin{aligned} \chi(P) &= \lambda \sum \chi_l(P) \int_D \xi_l(P_1) [B_1^{-1} \chi(P_1)] dP_1 + f(P) = \\ &= \lambda \sum \chi_l(P) \int_D [B_1^{*-1} \xi_l(P_1)] \chi(P_1) dP_1 + f(P). \end{aligned} \quad (\text{XVIII.34})$$

Таким образом, уравнение (XVIII.30) перешло в уравнение с вырожденным ядром (XVIII.34) для новой неизвестной функции  $\chi(P)$  с тем же свободным членом, а решение  $\varphi(P)$  уравнения (XVIII.30) — в решение  $\chi(P)$  уравнения (XVIII.34). Обратно, если  $\chi(P)$  есть решение уравнения (XVIII.34), то функция  $\varphi(P) = B_1^{-1} \chi(P)$  будет решением уравнения (XVIII.30). Для того чтобы убедиться в этом, достаточно подставить в (XVIII.34) вместо  $\chi(P)$  его выражение:  $\chi(P) = B_1 \varphi(P)$ .

Покажем, что из теорем 3, 4, 5 и 6, справедливых по доказанному для нового интегрального уравнения относительно  $\chi(P)$ , вытекает справедливость этих же теорем для первоначального уравнения (XVIII.30) при  $|\lambda| < \frac{1}{M}$ .

Составим союзное однородное уравнение для уравнения (XVIII.34)

$$\psi(P_1) - \lambda \sum B_1^{*-1} \xi_l(P_1) \int_D \chi_l(P) \psi(P) dP = 0. \quad (\text{XVIII.35})$$

Обозначим левую часть этого уравнения через  $\omega(P_1)$ . Функция  $\omega(P_1)$  обращается в нуль тогда и только тогда, когда

$$B_1^* \omega(P_1) = 0. \quad (\text{XVIII.36})$$

Это значит, что уравнение (XVIII.35) имеет все те же решения, что и уравнение (XVIII.36). Но

$$\begin{aligned} B_1^* \omega(P_1) &= B_1^* \psi(P_1) - \lambda \sum B_1^* B_1^{*-1} \xi_l(P_1) \int_D \chi_l(P) \psi(P) dP = \\ &= B_1^* \psi(P_1) - \lambda \sum \xi_l(P_1) \int_D \chi_l(P) \psi(P) dP, \end{aligned}$$

и, следовательно, уравнение (XVIII.36) есть союзное однородное уравнение для (XVIII.30). Таким образом, союзное однородное

уравнение для (XVIII.34) и союзное однородное уравнение для (XVIII.30) равносильны.

Пользуясь развитой нами теорией, мы можем установить все теоремы Фредгольма для исходного уравнения.

**2-я теорема Фредгольма.** Число  $q$  линейно независимых решений соответствующего однородного уравнения для уравнения (XVIII.30) и союзного с ним (XVIII.36) совпадает.

Достаточно установить совпадение числа линейно независимых решений у однородного уравнения, соответствующего уравнениям (XVIII.34) и (XVIII.36), эквивалентных рассматриваемым. Но число таких решений однородного уравнения, соответствующего (XVIII.34) и (XVIII.35), одинаково в силу теоремы 4, доказанной нами для уравнения с вырожденным ядром. Теорема доказана.

**3-я теорема Фредгольма.** Необходимое и достаточное условие разрешимости уравнения (XVIII.30) состоит в том, чтобы свободный член его был ортогонален ко всем решениям союзного однородного уравнения (XVIII.36):

$$\int_D f(P) \psi_i(P) dP = 0 \quad (i = 1, 2, \dots, q). \quad (\text{XVIII.37})$$

Заметим, что решения  $\psi_i(P)$  уравнения (XVIII.36) суть решения уравнения (XVIII.35), а свободный член (XVIII.30) и (XVIII.34) один и тот же. Поэтому условия (XVIII.37) выражают собою, как следует из теоремы 5, установленной для уравнений с вырожденным ядром, необходимые и достаточные условия разрешимости (XVIII.34).

Благодаря тому, что уравнения (XVIII.34) и (XVIII.30) разрешимы одновременно, условия (XVIII.37) будут необходимыми и достаточными условиями разрешимости (XVIII.30). Теорема доказана.

**1-я теорема Фредгольма.** Если уравнение (XVIII.30) разрешимо при любой функции  $f(P)$  в правой части, то решение его единственно, и значит, соответствующее однородное уравнение имеет только тривиальное решение. Наоборот, если однородное уравнение имеет только тривиальное решение, то уравнение разрешимо при любой функции  $f(P)$ .

Эта теорема, как отмечено выше, есть следствие 2-й и 3-й теорем Фредгольма.

В нашем случае теорема 6 имеет особенно простую формулировку:

**4-я теорема Фредгольма.** Характеристические значения  $\lambda$  не имеют предельных точек внутри круга  $|\lambda| < \frac{1}{M}$ .

Доказательство вытекает из того, что  $\lambda = 0$  не будет характеристическим числом для (XVIII.30), так как иных решений, кроме  $\chi(P) = f(P)$ , при этом значении  $\lambda$  не будет.

В силу теоремы 6 для вырожденных ядер, характеристические числа уравнения (XVIII.34), а значит, и уравнения (XVIII.30), не могут иметь предельных точек внутри круга  $|\lambda| < \frac{1}{M}$ , где регулярны функции, из которых составлено ядро. Теорема доказана.

Мы доказали четыре теоремы Фредгольма для тех интегральных уравнений, ядро которых представимо в виде (XVIII.27). В приложениях часто встречаются ядра такого типа, что они допускают аппроксимацию суммами вида

$$\sum_{l=1}^N \chi_l(P) \xi_l(P_1)$$

с любой степенью точности в том смысле, что число  $M$ , равное верхней грани интегралов

$$\int_D |K_1(P, P_1)| dP_1, \\ \int_D |K_1(P, P_1)| dP,$$

может быть как угодно мало.

Для ядер такого типа все теоремы Фредгольма справедливы в круге сколь угодно большого радиуса, и единственной предельной точкой для характеристических значений  $\lambda$  может служить  $\infty$ .

Докажем, что это обстоятельство будет иметь место, например, если выполнены следующие условия, очень часто встречающиеся в приложениях:

1) Область  $D$  представляет собой некоторое  $n$ -мерное многообразие в некотором  $k$ -мерном кубе  $\Omega_1: 0 \leq x_1 \leq 1, 0 \leq x_2 \leq 1, \dots, 0 \leq x_k \leq 1$  (или может быть взаимно однозначно и взаимно непрерывно отображена на такое многообразие).

2) Ядро  $K(P, P_1)$  есть функция, непрерывная в  $2n$ -мерном многообразии, и может быть непрерывно продолжена на  $2k$ -мерный куб  $\Omega_2$ :

$$0 \leq x_i \leq 1 \quad (i = 1, 2, \dots, k), \\ 0 \leq y_i \leq 1 \quad (i = 1, 2, \dots, k),$$

где через  $x_i$  обозначены координаты точки  $P$  в кубе  $\Omega_1$ , а через  $y_i$  — координаты точки  $P_1$  в том же кубе.

Очевидно, что оба эти условия будут выполнены, например, если область  $D$  есть поверхность в трехмерном пространстве и функция  $K(P, P_1)$  непрерывна при изменении  $P$  и  $P_1$  вдоль этой поверхности.

Переходим к доказательству нашего утверждения.

Согласно известной теореме Вейерштрасса о приближении непрерывных функций многочленами, функцию  $K(P, P_1)$ , непрерывную в замкнутом  $2k$ -мерном кубе, всегда можно представить приближенно с помощью многочленов от  $2k$  переменных с любой наперед заданной точностью. Но многочлен от  $x_i$ ,  $i = 1, 2, \dots, k$ , и  $y_i$ ,  $i = 1, 2, \dots, k$ , всегда может быть представлен в виде суммы произведений функций, зависящих только от  $x_1, \dots, x_k$ , на функции, зависящие только от  $y_1, \dots, y_k$ , что и требовалось доказать.

Из самого построения решения уравнения Фредгольма в нашем случае очевидно, что это решение будет аналитической функцией параметра  $\lambda$  на всей плоскости, за исключением особых точек, являющихся характеристическими значениями  $\lambda$  и лежащих изолированно.

## § 6. Обобщение результатов

Для того чтобы получить результаты, изложенные в § 5 настоящей лекции, нет надобности требовать, чтобы ядро  $K_1(P, P_1)$  удовлетворяло обоим условиям (XVIII.28) и (XVIII.29). Достаточно потребовать, чтобы было выполнено одно из них, например первое. Мы предположим, что выполнено условие (XVIII.28) и не будем делать никаких предположений относительно интеграла

$$\int_D |K_1(P, P_1)| dP.$$

Положим

$$\chi(P_1) = A^* \psi \equiv \int_D K_1(P, P_1) \psi(P) dP.$$

Докажем следующее основное свойство оператора  $A^*$ : если функция  $\psi(P)$  суммируема, то и функция  $\chi(P_1)$  суммируема, и при этом

$$\int_D |\chi(P_1)| dP_1 \leq M \int_D |\psi(P)| dP. \quad (\text{XVIII.38})$$

Для доказательства рассмотрим функцию  $2n$  переменных  $K_1(P, P_1) \psi(P)$ .

Эта функция измерима как произведение двух измеримых функций. Кроме того, она суммируема как функция  $2n$  переменных. В самом деле, справедливо очевидное неравенство

$$\int_D |\psi(P)| \left\{ \int_D |K_1(P, P_1)| dP_1 \right\} dP \leq M \int_D |\psi(P)| dP.$$

Повторный интеграл в левой части, очевидно, существует. На основании добавления к теореме Лебега—Фубини (лекция VI, § 7, стр. 124) существует двойной интеграл

$$\int_D \int_D |\Psi(P) K(P, P_1)| dP dP_1$$

и, следовательно, существует также двойной интеграл

$$\int_D \int_D \Psi(P) K_1(P, P_1) dP dP_1,$$

причем возможно изменение порядка интегрирования. Это означает, что имеют смысл обе части неравенства

$$\begin{aligned} \int_D \left| \left\{ \int_D K_1(P, P_1) \Psi(P) dP \right\} \right| dP_1 &\leq \\ &\leq \int_D \left\{ \int_D |K_1(P, P_1) \Psi(P)| dP \right\} dP_1, \end{aligned}$$

и неравенство справедливо. Но

$$\begin{aligned} \int_D \left\{ \int_D |K_1(P, P_1) \Psi(P)| dP \right\} dP_1 &= \\ &= \int_D |\Psi(P)| \left\{ \int_D |K_1(P, P_1)| dP_1 \right\} dP, \end{aligned}$$

что вместе с (XVIII.28) непосредственно дает (XVIII.38).

**Т е о р е м а 6.** Если последовательность  $\psi_k$  сходится в среднем к функции  $\psi_0$ , т. е. стремится к нулю интеграл

$$\int_D |\psi_0 - \psi_k| dP,$$

то последовательность  $A^*\psi_k$  сходится в среднем к  $A^*\psi_0$ .

В самом деле,

$$\int_D |A^*\psi_0 - A^*\psi_k| dP = \int_D |A^*(\psi_0 - \psi_k)| dP \leq M \int_D |\psi_0 - \psi_k| dP,$$

откуда и следует наше утверждение.

В частности, если ряд  $v = \sum_{k=1}^{\infty} u_k$  сходится в среднем, то

$$A^*v = \sum_{k=1}^{\infty} A^*u_k,$$

где ряд справа сходится в среднем,

Рассмотрим интегральное уравнение

$$B^* \psi \equiv (E - \lambda A^*) \psi = \chi, \quad (\text{XVIII.39})$$

союзное для уравнения (XVIII.3). Подобно тому как было найдено решение уравнения (XVIII.3), мы можем получить решение этого уравнения в виде ряда

$$\psi \equiv B^{*-1} \chi = \chi + \lambda A^* \chi + \lambda^2 A^{*2} \chi + \dots + \lambda^k A^{*k} \chi + \dots \quad (\text{XVIII.40})$$

Докажем, что формула (XVIII.40) действительно дает решение уравнения (XVIII.39) в круге

$$|\lambda| < \frac{1}{M}.$$

Установим, прежде всего, сходимость ряда в правой части (XVIII.40). Применяя последовательно неравенство (XVIII.38), получим:

$$\begin{aligned} \int_D |A^* \chi| dP &\leq M \int_D |\chi| dP, \quad \int_D |A^{*2} \chi| dP \leq M^2 \int_D |\chi| dP, \dots \\ \dots, \quad \int_D |A^{*k} \chi| dP &\leq M^k \int_D |\chi| dP, \dots \end{aligned}$$

Из полученных оценок непосредственно следует неравенство

$$\begin{aligned} \int_D \left| \sum_{k=m}^{m+p} \lambda^k A^{*k} \chi \right| dP &\leq \int_D \left\{ \sum_{k=m}^{m+p} |\lambda^k A^{*k} \chi| \right\} dP = \\ &= \sum_{k=m}^{m+p} |\lambda|^k \int_D |A^{*k} \chi| dP \leq \left( \sum_{k=m}^{m+p} |\lambda|^k M^k \right) \int_D |\chi| dP. \end{aligned}$$

В круге  $|\lambda| < \frac{1}{M}$  имеем:

$$\int_D \left| \sum_{k=m}^{m+p} \lambda^k A^{*k} \chi \right| dP \leq \frac{|\lambda|^m M^m}{1 - |\lambda| M} \int_D |\chi| dP.$$

При достаточно большом  $m$  правая часть неравенства будет меньше любого наперед заданного числа. Следовательно, на основании теоремы о сходимости в среднем (лекция VI, теорема 23) ряд (XVIII.40) сходится в среднем, и сумма его, обозначенная символом  $B^{*-1} \chi$ , представляет собой суммируемую функцию переменной точки  $P_1$ .

Докажем теперь тождества

$$B^* B^{*-1} \xi = \xi, \quad (\text{XVIII.41})$$

$$B^{*-1} B^* \psi = \psi. \quad (\text{XVIII.42})$$

Мы имеем:

$$B^{*-1} B^* \psi = (\psi - \lambda A^* \psi) + \lambda A^* (\psi - \lambda A^* \psi) + \lambda^2 A^{*2} (\psi - \lambda A^* \psi) + \dots \\ \dots + \lambda^k A^{*k} (\psi - \lambda A^* \psi) + \dots = \psi.$$

Далее, пользуясь теоремой 6 и сходимостью в среднем ряда

$$\xi + \lambda A^* \xi + \lambda^2 A^{*2} \xi + \dots + \lambda^k A^{*k} \xi + \dots,$$

получим:

$$(E - \lambda A^*) (\xi + \lambda A^* \xi + \lambda^2 A^{*2} \xi + \dots + \lambda^k A^{*k} \xi + \dots) = \xi,$$

откуда  $B^* B^{*-1} \xi = \xi$ . Последнее тождество выражает тот факт, что функция  $B^{*-1} \chi$  является решением уравнения (XVIII.39). Тождество (XVIII.42) показывает, что  $B^{*-1} \chi$  есть единственное решение, так как из уравнения (XVIII.39), применяя к обеим частям оператор  $B^{*-1}$ , получим  $\psi = B^{*-1} \chi$ .

Все остальные рассуждения для уравнений, ядра которых удовлетворяют лишь условию (XVIII.28), дословно совпадают с теми, которые были проведены в § 5.

## § 7. Уравнения с неограниченными ядрами специального вида

Рассмотрим ядро  $K(P, P_1)$ , где точки  $P, P_1$  принадлежат ограниченной области  $D$ . Обозначим через  $r$  расстояние между точками  $P$  и  $P_1$ . Предположим, что ядро  $K(P, P_1)$  непрерывно всюду по совокупности переменных точек  $P, P_1$  при  $r \neq 0$ , а при  $r \rightarrow 0$  может стремиться к бесконечности, удовлетворяя во всей области  $D$  неравенству

$$|K(P, P_1)| < \frac{A}{r^\alpha},$$

где  $0 < \alpha < n$ ,  $n$  — размерность пространства.

Покажем, что для ядер такого типа все наши условия выполнены и что ядро  $K(P, P_1)$  в этом случае представимо в виде (XVIII.27) при сколь угодно малой постоянной  $M$  в неравенствах (XVIII.28) и (XVIII.29).

Рассмотрим функцию

$$K^*(P, P_1) = \min \left[ K(P, P_1), \frac{A}{\delta^\alpha} \right],$$

где  $\delta$  — заданное положительное число,

Оценим интеграл

$$\int_D |K(P, P_1) - K^*(P, P_1)| dP_1.$$

Разность  $K(P, P_1) - K^*(P, P_1)$  может быть отлична от нуля лишь в области  $r < \delta$ , ибо во всех остальных точках  $K(P, P_1) \leq \frac{A}{\delta^\alpha}$  и, значит,  $K^*(P, P_1) = K(P, P_1)$ . Функция  $K(P, P_1) - K^*(P, P_1)$  всюду неотрицательна и при  $r \leq \delta$  удовлетворяет неравенству

$$0 \leq K(P, P_1) - K^*(P, P_1) \leq A \left( \frac{1}{r^\alpha} - \frac{1}{\delta^\alpha} \right).$$

Отсюда получаем:

$$\begin{aligned} \int_D |K(P, P_1) - K^*(P, P_1)| dP_1 &= \int_D [K(P, P_1) - K^*(P, P_1)] dP_1 \leq \\ &\leq A \int_{r \leq \delta} \frac{1}{r^\alpha} dP_1 \leq \frac{\varepsilon}{2}, \end{aligned}$$

если только  $\delta$  достаточно мало, при произвольном положительном числе  $\varepsilon$ .

Функция  $K^*(P, P_1)$  как минимум двух непрерывных функций непрерывна при  $r \neq 0$ . В окрестности поверхности  $r = 0$  она постоянна, равняясь  $\frac{A}{\delta^\alpha}$ , и, следовательно, также непрерывна. Таким образом, эта функция на основании § 5 представима в виде

$$K^*(P, P_1) = \sum_{i=1}^N \varphi_i(P) \psi_i(P_1) + K_2(P, P_1),$$

где

$$\int_D |K_2(P, P_1)| dP_1 \leq \frac{\varepsilon}{2}.$$

Следовательно,

$$K(P, P_1) = \sum_{i=1}^N \varphi_i(P) \psi_i(P_1) + K_2(P, P_1) + [K(P, P_1) - K^*(P, P_1)].$$

Полагая

$$K_1(P, P_1) = K_2(P, P_1) + [K(P, P_1) - K^*(P, P_1)],$$

будем иметь:

$$\begin{aligned} & \int_D |K_1(P, P_1)| dP_1 \leqslant \\ & \leqslant \int_D |K_2(P, P_1)| dP_1 + \int_D |K(P, P_1) - K^*(P, P_1)| dP_1 \leqslant \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon. \end{aligned}$$

Таким образом, для ядер рассматриваемого типа теоремы Фредгольма справедливы на всей плоскости комплексного параметра  $\lambda$ , так же как и для непрерывных ядер, что и требовалось доказать.

**З а м е ч а н и е.** Из проделанных оценок следует, что операторы рассматриваемого в этом параграфе вида переводят всякую ограниченную суммируемую функцию в некоторую непрерывную функцию.

---

# ПРИМЕНЕНИЕ ТЕОРИИ ФРЕДГОЛЬМА К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ ДИРИХЛЕ И НЕЙМАНА

## § 1. Вывод свойств интегральных уравнений

Развитая нами теория уравнений Фредгольма позволяет перейти к непосредственному решению задач Дирихле и Неймана, которые были нами ранее сведены к задаче отыскания решений некоторых интегральных уравнений.

Мы начнем с некоторых вспомогательных предложений.

Везде в дальнейшем мы будем рассматривать поверхности  $S$ , гладкие в смысле Ляпунова, или такие, как в § 4 лекции XV.

**Л е м м а 1.** Пусть поверхность  $S$  удовлетворяет условиям § 4 лекции XV,  $v(S)$  — непрерывная функция и потенциал простого слоя

$$v = \int_S \frac{v(S) dS}{r} \quad (\text{XIX.1})$$

имеет внешнюю нормальную производную  $\left. \frac{\partial v}{\partial n} \right|_e$ , тождественно равную нулю на  $S$ . Тогда плотность  $v(S)$  равна нулю тождественно.

**Д о к а з а т е л ь с т в о.** Рассматриваемый потенциал вне поверхности  $S$  есть гармоническая функция, обращающаяся в нуль на бесконечности, как  $\frac{1}{r}$ . Ее нормальная производная извне равна нулю на  $S$ . Согласно определению из § 4 лекции XV и замечанию 3 из § 3 той же лекции, в условиях леммы эта нормальная производная является правильной.

В силу замечания к теореме единственности решения задачи Неймана (л. XVI, § 1, теорема 2), рассматриваемый потенциал вне области, ограниченной поверхностью  $S$ , совпадает с тривиальным решением внешней задачи Неймана, т. е. тождественно равен нулю.

Потенциал простого слоя есть функция, непрерывная во всем пространстве. Следовательно, его предельное значение изнутри тоже нуль.

Применим теперь теорему единственности для внутренней задачи Дирихле. Рассматриваемый потенциал есть гармоническая функция внутри  $S$ . Ее предельное значение на поверхности есть нуль. Следовательно, она тождественно равна нулю.

При этом предельное значение ее нормальной производной внутри есть также нуль.

Пользуясь тем, что

$$\frac{\partial v}{\partial n} \Big|_e - \frac{\partial v}{\partial n} \Big|_i = 4\pi v(S), \quad (\text{XIX.2})$$

и замечая, что нормальная производная  $v$  имеет пределом нуль и изнутри и извне, видим, что плотность  $v(S)$  есть нуль, что и требовалось доказать.

Если предельное значение  $\frac{\partial v}{\partial n} \Big|_i$  на  $S$  равно нулю, то в силу теоремы единственности для задачи Неймана функция  $v$  есть постоянная внутри  $S$ .

**Л е м м а 2.** Если в тех же предположениях относительно  $v(S)$  имеем  $\frac{\partial v}{\partial n} \Big|_i = 0$  и  $v_i = 0$ , то плотность тождественно равна нулю.

Доказательство этой леммы почти совпадает с доказательством предыдущей.

Потенциал  $v$  есть функция непрерывная, значит  $v_e = 0$ . Из единственности решения внешней задачи Дирихле следует, что  $v$  — тождественный нуль также и вне  $S$ . Но тогда формула (XIX.2) дает

$$v(S) = 0,$$

что и требовалось доказать.

**З а м е ч а н и е.** При доказательстве лемм 1 и 2 мы опирались на замечание к теореме единственности (л. XVI, § 1, теорема 2). Можно было бы ослабить требования на  $S$ , считая ее поверхностью Ляпунова, воспользовавшись теоремой 6 лекции XV, тождеством  $f_2 \equiv 0$ , равенством (XVI.4), следствием из теоремы 5 лекции XV и теоремой 2 лекции XVI.

Леммы 1 и 2 позволяют непосредственно перейти к исследованию интегральных уравнений Фредгольма для задач Дирихле и Неймана, выведенных нами в лекции XVI.

Мы получили уравнения:

для внутренней задачи Дирихле —

$$\mu(S_0) + \iint_S K(S_0, S) \mu(S) dS = \Phi(S_0); \quad (\text{XIX.3})$$

для внешней задачи Неймана —

$$v(S_0) + \iint_S K(S, S_0) v(S) dS = \Psi(S_0); \quad (\text{XIX.4})$$

для внешней задачи Дирихле —

$$\mu(S_0) - \iint_S K(S_0, S) \mu(S) dS = \varphi(S_0); \quad (\text{XIX.5})$$

для внутренней задачи Неймана —

$$\nu(S_0) - \iint_S K(S, S_0) \nu(S) dS = \psi(S_0). \quad (\text{XIX.6})$$

Ядро  $K(S_0, S)$  имеет вид

$$K(S_0, S) = \frac{1}{2\pi} \frac{\cos(n, r)}{r^2}. \quad (\text{XIX.7})$$

В силу (XV.6) имеем неравенство

$$|K(S_0, S)| \leq \frac{A}{r^2 - \delta}.$$

Следовательно, ядро  $K(S_0, S)$  принадлежит к числу неограниченных ядер специального типа, рассмотренных в лекции XVIII, ибо в нашем случае, пользуясь обозначениями предыдущей лекции (см. § 7, лекция XVIII), имеем:

$$n = 2, \quad \alpha = 2 - \delta < n.$$

Таким образом, для этих уравнений имеют место все теоремы Фредгольма.

Результаты главы XVIII получены для интегральных уравнений, в которых область интегрирования  $D$  была плоской. Тем не менее полученные результаты применимы и в данном случае, так как поверхность Ляпунова можно разбить на конечное число кусков и перейти от интегрирования по куску поверхности к интегрированию по той области на касательной плоскости к этому куску в какой-либо точке  $Q$ , на которую этот кусок проектируется. При этом в силу третьего неравенства (XV.5') можно считать, что подинтегральная функция умножится на величину

$$0 < \frac{1}{\cos(n_Q, n)} < 3,$$

где  $n_Q$  — внутренняя нормаль в точке  $Q$ , а  $n$  — направление нормали в подвижной точке интегрирования.

## § 2. Исследование уравнений

**Т е о р е м а 1.** Уравнения (XIX.3) и (XIX.4) всегда имеют единственные решения.

Докажем это. Допустим, что интегральное уравнение

$$\nu(S_0) + \iint_S K(S, S_0) \nu(S) dS = 0 \quad (\text{XIX.8})$$

имеет ограниченное решение  $v(S)$ . Благодаря свойству интегрального оператора с ядром  $K(S, S_0)$ , отмеченному в конце § 7 лекции XVIII, второе слагаемое в (XIX.8) непрерывно, следовательно, непрерывно и первое слагаемое. Потенциал простого слоя

$$v = \int_E \frac{v(S)}{r} dS$$

с непрерывной плотностью  $v(S)$  имеет, как мы видели в § 4 лекции XV, правильную нормальную производную.

Предельные значения нормальной производной этого потенциала выражаются, как мы видели (теорема 2 из лекции XV), через плотность в следующем виде

$$2\pi \left( v(S_0) + \iint_S K(S, S_0) v(S) dS \right)$$

и в силу уравнения (XIX.8) равны нулю. Согласно лемме 1 из предыдущего параграфа  $v(S) \equiv 0$  и, таким образом, однородное уравнение, соответствующее (XIX.4), не имеет нетривиальных решений.

При этом 2-я теорема Фредгольма дает нам, что союзное однородное уравнение, совпадающее с (XIX.3) при  $\varphi = 0$ , тоже не имеет нетривиальных решений. Далее, из 1-й теоремы Фредгольма следует существование определенного единственного ограниченного решения  $u$  (XIX.3) и (XIX.4) при произвольных ограниченных правых частях.

Следовательно, мы можем получить решение этих уравнений, а одновременно и решение внутренней задачи Дирихле и внешней задачи Неймана.

Из доказанного, между прочим, вытекает доказательство второй половины теоремы Ляпунова из лекции XV, стр. 227.

Переходя к решению внешней задачи Дирихле и внутренней задачи Неймана, докажем следующую теорему.

**Т е о р е м а 2.** Каждое из уравнений

$$\left. \begin{aligned} \mu(S_0) - \iint_S K(S_0, S) \mu(S) dS &= 0, \\ v(S_0) - \iint_S K(S, S_0) v(S) dS &= 0 \end{aligned} \right\} \quad (\text{XIX.9})$$

имеет одну и только одну фундаментальную функцию.

Прежде всего, заметим, что уравнения (XIX.9) союзнны (сопряжены), и, следовательно, число линейно независимых решений у них одно и то же.

Для первого из уравнений (XIX.9) такой фундаментальной функцией служит единица. В самом деле, потенциал двойного слоя

$$w = \iint_S \frac{\partial}{\partial n} \frac{1}{r} \mu(S) dS$$

при  $\mu = 1$  дает величину телесного угла, под которым видна поверхность  $S$ , и, следовательно, его значения извне есть нуль. Но левая часть первого из уравнений (XIX.9) есть как раз предельное значение потенциала двойного слоя извне, и поэтому  $\mu = 1$  должно обращать эту левую часть в нуль. Следовательно, число фундаментальных функций каждого из уравнений (XIX.9) не меньше одной.

Покажем, что каждое из уравнений (XIX.9) не может иметь двух линейно независимых решений.

Повторяя в точности рассуждение, приведенное для доказательства непрерывности функции  $v(S)$  в теореме 1 и воспользовавшись теоремой 6 лекции XV, убеждаемся, что все решения второго из уравнений (XIX.9) удовлетворяют условию (XV.13).

Если бы существовали две фундаментальные функции  $v_1(S)$  и  $v_2(S)$ , то оба потенциала

$$v_1 = \iint_S \frac{v_1(S)}{r} dS \quad \text{и} \quad v_2 = \iint_S \frac{v_2(S)}{r} dS$$

были бы гармоническими функциями внутри области, ограниченной  $S$ , и имели бы в этой области первые производные, непрерывные вплоть до границы. При этом предельные значения  $\left. \frac{\partial v_1}{\partial n} \right|_2$  и  $\left. \frac{\partial v_2}{\partial n} \right|_1$  у обеих функций были бы равны нулю; на основании теоремы единственности решения задачи Неймана обе эти функции представляли бы собой не что иное, как постоянные. Заменяя  $v_i$ ,  $i = 1, 2$ , на  $\alpha_i v_i$ , где  $\alpha_i$ ,  $i = 1, 2$ , — постоянные множители, мы можем добиться того, чтобы оба потенциала  $v_1$  и  $v_2$  были бы равны единице внутри области. Предположим, что это сделано. При этом потенциал

$$v = v_1 - v_2 = \iint_S \frac{1}{r} (v_1(S) - v_2(S)) dS$$

с плотностью  $v_1(S) - v_2(S)$  будет равен нулю внутри.

Тогда предельное значение  $v_i$  будет также равно нулю. По лемме 2 плотность  $v_1(S) - v_2(S)$  должна равняться нулю, что и доказывает нашу теорему.

Нами доказано существование *собственной функции*  $v_0(S)$  второго уравнения (XIX.9). Можно считать, что величина потенциала  $v_0 = \iint_S \frac{v_0(S)}{r} dS$  внутри области  $\Omega$ , ограниченной поверхностью  $S$ , равна единице. Функция  $v_0(S)$  дает соответствующее распределение электрических зарядов на поверхности проводника, заполняющего область  $\Omega$ , ограниченную поверхностью  $S$ . Задача о нахождении потенциала заряженного проводника носит название задачи Робэна, а сам потенциал  $v_0$  называется *потенциалом Робэна*.

Внутренняя задача Неймана заключалась в отыскании гармонической функции, такой, что

$$\left. \frac{\partial u}{\partial n} \right|_1 = f_2(S). \quad (\text{XIX.10})$$

**Т е о р е м а 3.** *Для существования решения внутренней задачи Неймана необходимо и достаточно, чтобы правая часть (XIX.10), т. е. функция  $f_2(S)$ , удовлетворяла условию*

$$\iint_S f_2(S) dS = 0. \quad (\text{XIX.11})$$

Необходимость этого условия вытекает из того, что если применить формулу Грина (V.16) к  $u$  и 1 (обе эти функции гармонические), то мы получим:

$$0 = \iint_S \frac{\partial u}{\partial n} dS = \iint_S f_2(S) dS.$$

Достаточность следует при этом из того, что единица есть единственное решение первого уравнения (XIX.9), союзного с (XIX.6). Поэтому, если свободный член  $\psi(S)$  уравнения (XIX.6) ортогонален к единице, то это уравнение по теореме Фредгольма разрешимо. Но  $\psi(S)$  отличается лишь множителем от  $f_2(S)$ , и, следовательно, условие (XIX.11) необходимо и достаточно для решения уравнения (XIX.6), а с ним и задачи Неймана.

Перейдем теперь к решению *внешней задачи Дирихле*.

Как мы видели, интегральное уравнение (XIX.5) может и не иметь решения, так как соответствующее однородное уравнение имеет тривиальное решение. Этого можно было ожидать с самого начала. Искомая гармоническая функция  $u$ , удовлетворяющая условию

$$u|_e = f(S), \quad (\text{XIX.12})$$

как мы видели, единственна. Она будет стремиться к нулю на бесконечности, вообще говоря, как  $\frac{A}{r}$  (см. теорему 1 лекции XII),

как, например, гармоническая функция  $\frac{1}{r}$ , равная единице на единичной сфере.

Мы же пытаемся представить функцию в виде потенциала двойного слоя, который убывает, как  $\frac{A}{r^2}$ . Разумеется, такое представление может оказаться невозможным. Попробуем теперь в соответствии с этим искать решение внешней задачи Дирихле в виде

$$u = \frac{\alpha}{r_0} + u_1,$$

где  $\alpha$  — неопределенная постоянная,  $r_0$  — расстояние точки  $(x, y, z)$  до начала координат, которое мы будем считать выбранным внутри  $S$ , а  $u_1$  — потенциал двойного слоя

$$u_1 = \int_S \int \frac{\partial \frac{1}{r}}{\partial n} \mu(S) dS.$$

Значения  $u_1$  на поверхности  $S$  будут:

$$u_1|_S = f(S) - \frac{\alpha}{r_0}|_S.$$

Уравнение (XIX.5) превратится при этом в уравнение

$$\mu(S_0) - \int_S \int K(S_0, S) \mu(S) dS = \varphi(S_0) + \frac{\alpha}{2\pi} \frac{1}{r_0}|_{S_0}. \quad (\text{XIX.13})$$

Потребуем, чтобы свободный член этого уравнения был ортогонален к  $v_0(S)$  — собственной функции второго уравнения (XIX.9). Мы получим:

$$\int_S \int \varphi(S_0) v_0(S_0) dS_0 + \frac{\alpha}{2\pi} \int_S \int \frac{v_0(S_0)}{r_0} dS_0 = 0.$$

Интеграл во втором слагаемом равен единице по предположению, и мы получим:

$$\alpha = -2\pi \int_S \int \varphi(S_0) v_0(S_0) dS_0.$$

Определив, таким образом, постоянную  $\alpha$ , мы получим из (XIX.13) разрешимое уравнение. Решая его, получим тем самым решение внешней задачи Дирихле.

## ЛЕКЦИЯ XX

### ФУНКЦИЯ ГРИНА

#### § 1. Дифференциальные операторы с одной независимой переменной

Во многих задачах математической физики, с которыми мы встречались, неизвестная функция определялась, помимо дифференциального уравнения, еще условиями на границах области задания неизвестной функции.

Таковы были в своем большинстве задачи, связанные с решением уравнений эллиптического типа. Несколько позднее мы будем иметь случай убедиться в том, что и при решении краевых задач для уравнений других типов умение решать такую задачу с условиями на границе области приносит существенную пользу. Для того чтобы детальнее исследовать важнейшие свойства решений этих краевых задач, мы зададимся целью дать в явном виде представление таких решений.

Начнем с простейшего случая. Будем искать решение обыкновенного дифференциального уравнения 2-го порядка

$$Ly \equiv p(x)y'' + q(x)y' + r(x)y = f(x) \quad (XX.1)$$

в промежутке  $0 \leq x \leq 1$ , удовлетворяющее некоторым условиям на границах  $x = 0$  и  $x = 1$ .

Мы предположим, что функция  $p(x)$  непрерывна с производными до 2-го порядка и не обращается в нуль в промежутке  $0 \leq x \leq 1$ . Второе условие мы впоследствии снимем в некоторых примерах. Функцию  $q(x)$  мы предположим непрерывной с производной 1-го порядка, а функцию  $r(x)$  непрерывной в том же промежутке.

Хотя эта задача относится, формально говоря, к теории обыкновенных дифференциальных уравнений, тем не менее мы разберем ее подробно. Нам придется сделать несколько важных предварительных замечаний.

Составим оператор, сопряженный с оператором  $Ly$  (см. § 2 л. V). Этот сопряженный оператор будет иметь вид

$$Mz \equiv (p(x)z)'' - (q(x)z)' + r(x)z. \quad (XX.2)$$

Операторы  $M$  и  $L$  связаны между собой соотношением

$$zLy - yMz = \frac{d}{dx} \left( pz \frac{dy}{dx} - y \frac{d(pz)}{dx} + qyz \right).$$

Формула Грина для отрезка  $[0, 1]$  для этих операторов имеет вид

$$\{p_0 y'_0 z_0 - p_0 y_0 z'_0 + (q_0 - p'_0) y_0 z_0\} - \{p_1 y'_1 z_1 - p_1 y_1 z'_1 + (q_1 - p'_1) y_1 z_1\} + \\ + \int_0^1 (zLy - yMz) dx = 0, \quad (\text{XX.3})$$

где индексы 0 и 1 указывают, что берутся значения функций соответственно при  $x = 0$  и при  $x = 1$ , например:

$$p_0 = p(0), \quad y_0 = y(0), \quad z'_1 = z'(1).$$

Если функции  $y$  и  $z$  выбраны так, что фигурные скобки в формуле (XX.3) обращаются в нуль, то эта формула упрощается, и мы получим:

$$\int_0^1 (zLy - yMz) dx = 0. \quad (\text{XX.4})$$

Может случиться, что формула (XX.4) справедлива для любой пары функций  $y$  и  $z$ , принадлежащих некоторым двум семействам  $\{y\}$  и  $\{z\}$ . Такие два семейства мы будем называть *сопряженными*.

Разберем несколько примеров сопряженных семейств функций для оператора (XX.1).

Будем изучать семейства функций  $y$ , удовлетворяющие на границах одному из двух линейных условий:

$$\left. \begin{array}{l} \text{I) } y_0 = 0, \\ \text{II) } p_0 y'_0 + \beta_0 y_0 = 0 \end{array} \right\} \quad (\text{XX.5})$$

на конце  $x = 0$ , и аналогично

$$\left. \begin{array}{l} \text{I) } y_1 = 0, \\ \text{II) } p_1 y'_1 + \beta_1 y_1 = 0 \end{array} \right\} \quad (\text{XX.6})$$

на конце  $x = 1$ , где  $\beta_0$  и  $\beta_1$  — некоторые числа.

Представим первую фигурную скобку формулы (XX.3) в виде

$$-y_0 [p_0 z'_0 + (p'_0 - q_0 + \beta_0) z_0] + z_0 [p_0 y'_0 + \beta_0 y_0].$$

Подобным образом представим и вторую скобку. Тогда формула (XX.3) переписется так:

$$\begin{aligned}
 & -y_0[(pz)' + (\beta_0 - q)z]_{x=0} + z_0[py' + \beta_0 y]_{x=0} + \\
 & + \int_0^1 (zLy - yMz) dx + y_1[(pz)' + (\beta_1 - q)z]_{x=1} - \\
 & - z_1[py' + \beta_1 y]_{x=1} = 0. \quad (XX.7)
 \end{aligned}$$

Из этого представления вытекают несколько простых следствий.

Если семейство  $\{y\}$  удовлетворяет на конце  $x = 0$  первому условию, то для того чтобы обращался в нуль только внеинтегральный член при  $x = 0$ , в качестве семейства  $\{z\}$  можно взять любое семейство функций, удовлетворяющих при  $x = 0$  условию

$$I^a) \quad z_0 = 0.$$

Если семейство  $\{y\}$  удовлетворяет второму условию на конце  $x = 0$ , то семейство  $\{z\}$  достаточно подчинить условию

$$II^a) \quad p_0 z'_0 + (p'_0 - q_0 + \beta_0) z_0 = 0.$$

Для семейства  $\{y\}$ , подчиненного обоим условиям, т. е. у которого  $y'_0 = y_0 = 0$ , можно функции  $\{z\}$  никаким условиям при  $x = 0$  не подчинять. Обратно, если не накладывать ограничений на семейство  $\{y\}$ , то функции  $\{z\}$  нужно подчинить условиям  $z_0 = z'_0 = 0$ . Совершенно так же можно исследовать конец  $x = 1$ , где условия, разбираемые нами, будут иметь вид:

$$\begin{aligned}
 & I) \quad y_1 = 0, \\
 & II) \quad p_1 y'_1 + \beta_1 y_1 = 0, \\
 & I^a) \quad z_1 = 0, \\
 & II^a) \quad p_1 z'_1 + (p'_1 - q_1 + \beta_1) z_1 = 0.
 \end{aligned}$$

Условия  $I^a$  или  $II^a$ , поставленные на обоих концах промежутка, являются достаточными для того, чтобы семейство  $\{z\}$  было сопряженным с семейством  $\{y\}$ , если для последнего выполняются условия  $I$  или  $II$ . Эти условия будут и необходимы, если в качестве семейства  $\{y\}$  взять множество всех функций, удовлетворяющих условиям  $I$  или  $II$  на обоих концах промежутка и имеющих непрерывные производные до второго порядка включительно. В дальнейшем мы будем определять семейства  $\{y\}$  и  $\{z\}$  именно таким образом.

Условия (XX.5), для краткости, можно записать в виде одного условия

$$[\alpha_0 py' + \beta_0 y]_{x=0} = 0, \quad (XX.5')$$

а условия (XX.6) в виде

$$[\alpha_1 p y' + \beta_1 y]_{x-1} = 0, \quad (\text{XX.6}')$$

где  $\alpha_0, \alpha_1, \beta_0, \beta_1$  — некоторые числа; не ограничивая общности, можно считать, что  $\alpha_0$  и  $\alpha_1$  могут быть равны только нулю или единице.

Сопряженные условия  $I^a$  и  $II^a$  на конце  $x = 0$  примут вид

$$\alpha_0 p_0 z_0' + (\alpha_0 p_0' - \alpha_0 q_0 + \beta_0) z_0 = 0; \quad (\text{XX.5}'')$$

Соответственно на конце  $x = 1$  они запишутся в виде

$$\alpha_1 p_1 z_1' + (\alpha_1 p_1' - \alpha_1 q_1 + \beta_1) z_1 = 0.$$

Можно рассматривать и более общий тип условий, накладываемых на семейство  $\{y\}$ . Эти условия общего типа могут связывать значения  $y$  и  $y'$  на обоих концах. Мы не будем заниматься перечислением или классификацией таких условий, укажем лишь на способ их получения.

Билинейная форма

$$\Phi(y_0, y_0', y_1, y_1'; z_0, z_0', z_1, z_1') \equiv$$

$$\equiv p_0 y_0' z_0 - p_0 y_0 z_0' + (q_0 - p_0') y_0 z_0 - p_1 y_1' z_1 + p_1 y_1 z_1' - (q_1 - p_1') y_1 z_1$$

двух четверок переменных уничтожается для произвольных значений одной четверки тогда и только тогда, когда значения всех переменных другой четверки суть нули. Если между переменными одной четверки, например  $y_0, y_0', y_1, y_1'$ , существуют линейные связи, то, выражая некоторые из переменных через остальные, мы превратим эту форму в другую форму, линейную относительно  $y$ , но зависящую от меньшего числа переменных. Условием уничтожения этой формы будет обращение в нуль коэффициентов при этих оставшихся переменных. Таким образом, сумма числа условий, наложенных на  $\{y\}$  и на  $\{z\}$ , равна четырём.

Рассмотрим, например, уравнение

$$Ly \equiv y'' + k^2 y = 0.$$

При этом  $p = 1, q = 0, r = k^2$ , и пусть условия, наложенные на семейство  $\{y\}$ , будут:

$$y_0 = y_1,$$

$$y_0' = y_1'.$$

Согласно нашей теории форма  $\Phi$  примет вид

$$\Phi \equiv y_0 (z_0' - z_1') + y_0' (z_0 - z_1) = 0.$$

Следовательно, сопряженные условия будут:

$$\begin{aligned} z_0 &= z_1, \\ z'_0 &= z'_1. \end{aligned}$$

## § 2. Сопряженные операторы и сопряженные семейства

Понятие о сопряженных семействах или сопряженных условиях относится не только к обыкновенным уравнениям 2-го порядка. Его легко перенести на случай, когда оператор  $L$  есть линейный дифференциальный оператор с частными производными любого порядка. Выше мы определили понятие оператора  $M$ , сопряженного с данным дифференциальным оператором  $L$ . Интегральную формулу, справедливость которой для двух сопряженных операторов была выше доказана, мы можем теперь принять за определение сопряженных операторов.

**О п р е д е л е н и е.** Оператор  $Mv$  мы будем называть *сопряженным* с оператором  $Lu$  и два семейства функций  $\{u\}$  и  $\{v\}$ , заданных в области  $\Omega$ , мы будем называть *сопряженными* относительно  $L$  и  $M$  в этой области, если

$$\int_{\Omega} vLu \, d\Omega = \int_{\Omega} uMv \, d\Omega \quad (\text{XX.8})$$

для любых функций  $u$  и  $v$  из соответствующих семейств.

Условия, которыми определяются два сопряженных относительно операторов  $L$  и  $M$  семейства, носят название сопряженных.

**О п р е д е л е н и е.** Оператор  $L$  называется *самосопряженным*, если ему сопряженный совпадает с ним самим, т. е.

$$Mu \equiv Lu.$$

Аналогично для любого самосопряженного оператора семейство функций, совпадающее со своим сопряженным, называется *самосопряженным семейством*.

Мы рассмотрим еще несколько простейших примеров.

**П р и м е р 1.**

$$Ly = p_0 y^{(n)} + p_1 y^{(n-1)} + \dots + p_n y.$$

Семейство функций  $\{y\}$  на отрезке  $0 \leq x \leq 1$  выберем так, чтобы иметь:

$$y_0 = y'_0 = \dots = y_0^{(n-1)} = 0. \quad (\text{XX.9})$$

Легко видеть, что сопряженный оператор будет:

$$Mz = (-1)^n \frac{d^n (p_0 z)}{dx^n} + (-1)^{n-1} \frac{d^{n-1} (p_1 z)}{dx^{n-1}} + \dots + p_n z.$$

Заметив, что

$$\varphi \frac{d^m \psi}{dx^m} + (-1)^m \psi \frac{d^m \varphi}{dx^m} = \frac{d}{dx} \left[ \varphi \frac{d^{m-1} \psi}{dx^{m-1}} - \frac{d\varphi}{dx} \frac{d^{m-2} \psi}{dx^{m-2}} + \frac{d^2 \varphi}{dx^2} \frac{d^{m-3} \psi}{dx^{m-3}} - \dots \right],$$

легко взять в конечном виде неопределенный интеграл

$$\int (zLy - yMz) dx.$$

Не вычисляя его до конца, мы видим, что он выразится как билинейная форма относительно производных

$$y, y', \dots, y^{(n-1)}, \quad z, z', \dots, z^{(n-1)},$$

коэффициенты которой суть функции переменной  $x$ .

В силу условий (XX.9) значение этой билинейной формы при  $x = 0$  есть нуль. Для того чтобы ее значение при  $x = 1$  также было нулем, достаточно положить:

$$z_1 = z'_1 = \dots = z^{(n-1)}_1 = 0. \quad (\text{XX.10})$$

(Это же условие и необходимо, если не накладывать никаких ограничений на значения функции  $y$  и ее производных при  $x = 1$ .)

При этом

$$\int_0^1 (zLy - yMz) dx = 0.$$

Таким образом, условия (XX.10) — сопряженные с (XX.9).

**П р и м е р 2.** Рассмотрим оператор

$$Lu \equiv \Delta u \quad (\text{XX.11})$$

и пусть изучается семейство функций  $\{u\}$  в области  $\Omega$  двух переменных  $x, y$ , ограниченной контуром  $s$ , удовлетворяющих условию

$$\left[ \frac{\partial u}{\partial n} + \alpha u + \beta \frac{\partial u}{\partial s} \right] = 0, \quad (\text{XX.12})$$

где  $\frac{\partial u}{\partial n}$  — производная по внутренней нормали в точке контура,  $\frac{\partial u}{\partial s}$  — производная по касательной, соответствующей положительному обходу контура. Формула Грина дает:

$$\begin{aligned} \iint_{\Omega} (u \Delta v - v \Delta u) d\Omega &= \int_s \left( v \frac{\partial u}{\partial n} - u \frac{\partial v}{\partial n} \right) ds = \\ &= \int_s \left\{ v \left( \frac{\partial u}{\partial n} + \alpha u + \beta \frac{\partial u}{\partial s} \right) - u \frac{\partial v}{\partial n} - v \left( \alpha u + \beta \frac{\partial u}{\partial s} \right) \right\} ds. \end{aligned}$$

Интегрируя по частям член

$$\int_s \beta v \frac{\partial u}{\partial s} ds$$

и замечая, что внеинтегральные члены пропадут благодаря периодичности на контуре функций  $\beta$ ,  $v$  и  $u$ , будем иметь:

$$\begin{aligned} \iint_{\Omega} (u \Delta v - v \Delta u) d\Omega = \\ = \int_s \left\{ v \left[ \frac{\partial u}{\partial n} + \alpha u + \beta \frac{\partial u}{\partial s} \right] - u \left[ \frac{\partial v}{\partial n} + \alpha v - \frac{\partial(\beta v)}{\partial s} \right] \right\} ds. \end{aligned}$$

Естественно назвать выражение

$$\left[ \frac{\partial v}{\partial n} + \left( \alpha - \frac{\partial \beta}{\partial s} \right) v - \beta \frac{\partial v}{\partial s} \right]_s$$

сопряженным с (XX.12) относительно оператора  $\Delta$ .

Сопряженные относительно оператора  $\Delta$  семейства будут — семейство  $\{u\}$ , удовлетворяющее условию

$$\left[ \frac{\partial u}{\partial n} + \alpha u + \beta \frac{\partial u}{\partial s} \right]_s = 0,$$

и семейство  $\{v\}$ , удовлетворяющее условию

$$\left[ \frac{\partial v}{\partial n} + \left( \alpha - \frac{\partial \beta}{\partial s} \right) v - \beta \frac{\partial v}{\partial s} \right]_s = 0.$$

Для двух таких семейств получим:

$$\iint_{\Omega} v \Delta u d\Omega = \iint_{\Omega} u \Delta v d\Omega.$$

**Пример 3.** Если семейство  $\{u\}$  есть семейство функций, не подчиненных никаким требованиям, то сопряженное семейство в области  $\Omega$  относительно оператора Лапласа будет удовлетворять двум условиям:

$$v|_s = 0, \quad \frac{\partial v}{\partial n}|_s = 0.$$

Это следует из того, что только при указанных условиях интеграл

$$\iint_{\Omega} (u \Delta v - v \Delta u) d\Omega$$

обращается в нуль при произвольном выборе функции  $u$ , что и является условием сопряженности.

На этих примерах нами достаточно пояснено понятие о сопряженных семействах и сопряженных операторах. Переходим теперь к более детальному исследованию задачи.

### § 3. Основная лемма об интегралах сопряженных уравнений

Поставим следующую задачу: найти решение уравнения (XX.1), удовлетворяющее условиям

$$\left. \begin{aligned} [\alpha_0 p y' + \beta_0 y]_{x=0} &= a_0, \\ [\alpha_1 p y' + \beta_1 y]_{x=1} &= a_1 \end{aligned} \right\} \quad (\text{XX.13})$$

или условиям

$$\left. \begin{aligned} [\alpha_0 p y' + \beta_0 y]_{x=0} &= 0, \\ [\alpha_1 p y' + \beta_1 y]_{x=1} &= 0. \end{aligned} \right\} \quad (\text{XX.13}')$$

Задачи подобного рода встречаются, например, если нам нужно найти форму равновесия струны переменной плотности и переменного натяжения, на концах которой задано некоторое соотношение между отклонением и составляющей на ось  $y$  натяжения струны. Переменное натяжение может зависеть от того, что струна не горизонтальна. При этом вес каждого ее участка будет влиять на величину натяжения выше этого участка.

**Л е м м а 1.** Пусть  $Ly \equiv py'' + qy' + ry$  и  $Mz \equiv (pz)'' - (qz)' + rz$  — два сопряженных оператора с коэффициентами  $p(x)$ ,  $q(x)$ ,  $r(x)$ , непрерывными на отрезке  $0 \leq x \leq 1$ , причем  $p(x)$  обладает двумя непрерывными производными, а  $q(x)$  — одной непрерывной производной на том же отрезке.

Кроме того, предполагается, что  $p(x)$  нигде на нашем отрезке не обращается в нуль. Тогда, если  $y_1(x)$  удовлетворяет уравнению

$$Ly = 0 \quad (\text{XX.14})$$

и условию

$$[\alpha_0 p y' + \beta_0 y]_{x=0} = 0, \quad (\text{XX.15})$$

то функция

$$z_1(x) = \frac{y_1(x)}{p} e^{\int_0^x \frac{q}{p} dx} \quad (\text{XX.16})$$

есть решение сопряженного уравнения

$$Mz = 0, \quad (\text{XX.17})$$

удовлетворяющее условию

$$[(\alpha_0 p z)' + (\beta_0 - \alpha_0 q) z]_{x=0} = 0, \quad (\text{XX.18})$$

сопряженному с условием (XX.15) [ср. (XX.5') и (XX.5'')].

Доказательство этой леммы можно выполнить простой проверкой. Имеем:

$$(pz_1)' = y_1' e^{\int_c^x \frac{q}{p} dx} + y_1 \frac{q}{p} e^{\int_c^x \frac{q}{p} dx},$$

$$Mz_1 = [(pz_1)' - qz_1]' + rz_1 = e^{\int_c^x \frac{q}{p} dx} \frac{1}{p} [py_1' + qy_1' + ry_1] = 0.$$

Таким образом, функция (XX.16) есть действительно решение (XX.17). Проверим теперь выполнение условия (XX.18):

$$\begin{aligned} [(\alpha_0 pz_1)' + (\beta_0 - \alpha_0 q) z_1]_{x=0} &= \\ &= \left[ \alpha_0 y_1 + \alpha_0 y_1 \frac{q}{p} + \left( \beta_0 - \frac{\alpha_0 q}{p} \right) y_1 \right]_{x=0} e^{\int_0^0 \frac{q}{p} dx} = \\ &= \left[ \frac{1}{p} (\alpha_0 p y_1' + \beta_0 y_1) \right]_{x=0} e^{\int_c^0 \frac{q}{p} dx} = 0. \end{aligned}$$

Лемма доказана.

Аналогично, если  $y_2$  есть решение уравнения (XX.14), удовлетворяющее условию

$$[\alpha_1 p y_2' + \beta_1 y_2]_{x=1} = 0, \quad (\text{XX.19})$$

то

$$z_2 = \frac{y_2}{p} e^{\int_c^x \frac{q}{p} dx} \quad (\text{XX.20})$$

будет решением уравнения (XX.17), удовлетворяющим условию:

$$[(\alpha_1 pz)' + (\beta_1 - \alpha_1 q) z]_{x=1} = 0, \quad (\text{XX.21})$$

сопряженному с (XX.19). Формулам (XX.16) и (XX.20) можно придать несколько другую форму в случае, если  $y_1$  и  $y_2$  линейно независимы. Пользуясь известным выражением определителя Вронского

$$C[y_1' y_2 - y_2' y_1] = e^{-\int_c^x \frac{q}{p} dx}, \quad (\text{XX.22})$$

мы будем иметь, фиксируя должным образом постоянный произ-

вольный множитель:

$$\left. \begin{aligned} z_1 &= \frac{y_1}{p[y_1' y_2 - y_2' y_1]}, \\ z_2 &= \frac{y_2}{p[y_1' y_2 - y_2' y_1]}. \end{aligned} \right\} \quad (\text{XX.23})$$

**З а м е ч а н и е.** Очевидно, что наша лемма взаимна и может быть формулирована так:

Если  $z_1$  и  $z_2$  — решения уравнения  $Mz = 0$ , удовлетворяющие соответственно условиям (XX.18) и (XX.21), то

$$\begin{aligned} y_1 &= \frac{z_1}{p} e^{\int^x \frac{2p' - q}{p} dx} = C p z_1 e^{-\int^x \frac{q}{p} dx}, \\ y_2 &= \frac{z_2}{p} e^{\int^x \frac{2p' - q}{p} dx} = C p z_2 e^{-\int^x \frac{q}{p} dx}, \end{aligned}$$

где  $C$  — некоторое постоянное, являются решениями уравнения  $Ly = 0$ , удовлетворяющими соответственно условиям (XX.15) и (XX.19).

Из формул (XX.23) следует  $\frac{d}{dx} \left( \ln \frac{z_1}{z_2} \right) = \frac{d}{dx} \left( \ln \frac{y_1}{y_2} \right)$ , т. е.

$$\frac{z_1}{z_1} - \frac{z_2'}{z_2} = \frac{y_1'}{y_1} - \frac{y_2'}{y_2},$$

или

$$\frac{z_1' z_2 - z_2' z_1}{z_1 z_2} = \frac{y_1' y_2 - y_2' y_1}{y_1 y_2} = \frac{1}{p y_1 z_2} = \frac{1}{p y_2 z_1},$$

откуда имеем:

$$\left. \begin{aligned} y_1 &= \frac{z_1}{p(z_1' z_2 - z_2' z_1)}, \\ y_2 &= \frac{z_2}{p(z_1' z_2 - z_2' z_1)}. \end{aligned} \right\} \quad (\text{XX.23}')$$

Полезно еще заметить формулы

$$\begin{aligned} y_1 z_2 &= z_1 y_2, \\ y_1' z_2 - y_2' z_1 &= z_1' y_2 - y_1 z_2' = \frac{1}{p}, \end{aligned}$$

проверяемые непосредственно.

**С л е д с т в и е.** Если уравнение (XX.14) имеет нетривиальное решение, удовлетворяющее условиям (XX.15) и (XX.19), то уравнение (XX.17) имеет нетривиальное решение, удовлетворяющее условиям (XX.18) и (XX.24), и наоборот. При этом количество линейно независимых решений для обоих уравнений одно и то же.

При дальнейшем исследовании нам важно будет различать два случая:

1. Уравнение (XX.14) не имеет нетривиальных решений, удовлетворяющих условиям (XX.15) и (XX.19).

2. Уравнение (XX.14) имеет такое решение.

Мы докажем далее, что в первом случае уравнение (XX.1) всегда имеет определенное единственное решение, удовлетворяющее условиям (XX.13). Во втором случае это будет не так.

Задачу о нахождении решения (XX.14) при условиях (XX.15) и (XX.19) мы будем называть *однородной задачей*.

Пусть  $y_1$  есть решение однородной задачи. Нетрудно видеть, что такое решение может быть только одно с точностью до постоянного множителя. Действительно, если  $y_1$  и  $y_2$  — два линейно независимых решения уравнения (XX.14), то их определитель Вронского не равен нулю; следовательно, отношения

$$\frac{y_1'}{y_1} \text{ и } \frac{y_2'}{y_2}$$

не равны между собой, и поэтому ни  $y_2$ , и никакая линейная комбинация

$$C_1 y_1 + C_2 y_2,$$

где  $C_2 \neq 0$ , не удовлетворяют условиям на границе.

По следствию из леммы 1

$$z_1 = \frac{y_1}{p} e^{\int_c^x \frac{q}{p} dx}$$

есть единственное решение сопряженной задачи. Докажем теперь для разбираемого второго случая теорему, которую сформулируем в предположении, что  $\alpha_0 = \alpha_1 = 1$ .

**Т е о р е м а 1.** *Для того чтобы уравнение (XX.1) имело решение, удовлетворяющее (XX.13), необходимо соблюдение условия*

$$a_0 z_1 \Big|_{x=0} + \int_0^1 f(x) z_1 dx - a_1 z_1 \Big|_{x=1} = 0. \quad (\text{XX.24})$$

Пусть функция  $y_1(x)$  — нетривиальное решение однородной задачи, т. е. удовлетворяет уравнению (XX.14) и условиям (XX.15) и (XX.19); тогда функция  $z_1(x)$ , определяемая по формуле (XX.16), будет удовлетворять сопряженному уравнению и сопряженным крайним условиям (XX.18) и (XX.21).

Применяя формулу (XX.7) к функции  $y(x)$ , являющейся решением (XX.1) при условиях (XX.13), и  $z_1(x)$ , мы непосредственно получим (XX.24).

Сформулировать и доказать аналогичные теоремы в случаях, если  $\alpha_0$ , или  $\alpha_1$ , или  $\alpha_0$  и  $\alpha_1$  равны нулю, мы предоставляем читателю.

## § 4. Функция влияния

Займемся подробным разбором первого случая.

Пусть  $x_0$  — произвольная точка отрезка ( $0 \leq x \leq 1$ ), и пусть функция  $z_\varepsilon$  удовлетворяет уравнению

$$Mz_\varepsilon = \begin{cases} 0 & \text{при } |x - x_0| > \varepsilon, \\ \frac{1}{2\varepsilon} & \text{при } |x - x_0| \leq \varepsilon; \end{cases}$$

тогда

$$\int_0^1 y Mz_\varepsilon dx = \frac{1}{2\varepsilon} \int_{x_0-\varepsilon}^{x_0+\varepsilon} y dx.$$

Пользуясь теоремой о среднем и переходя в полученном равенстве к пределу при  $\varepsilon \rightarrow 0$ , получим:

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_0^1 y Mz_\varepsilon dx = y(x_0).$$

Если  $z_\varepsilon$  и  $y$  принадлежат сопряженным семействам, т. е. удовлетворяют условиям (XX.15), (XX.19), (XX.18) и (XX.21), то формула (XX.7) даст:

$$y(x_0) = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_0^1 y Mz_\varepsilon dx = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_0^1 z_\varepsilon Ly dx = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_0^1 z_\varepsilon f(x) dx.$$

В дальнейшем будем для определенности полагать, что числа  $\alpha_0$  и  $\alpha_1$ , входящие в условия (XX.13), оба равны единице (остальные три возможных случая:  $\alpha_0 = 0, \alpha_1 = 1$ ;  $\alpha_0 = 1, \alpha_1 = 0$ ;  $\alpha_0 = \alpha_1 = 0$ , мы предоставляем разобрать читателю).

Тогда при тех же  $z_\varepsilon$  и произвольной функции  $y$  по формуле (XX.7) получим:

$$y(x_0) = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} [z_\varepsilon(0)(py' + \beta_0 y)_{x=0} + \int_0^1 z_\varepsilon Ly dx - z_\varepsilon(1)(py' + \beta_1 y)_{x=1}] . \quad (\text{XX.25})$$

Если бы при этом оказалось, что функция  $z_\varepsilon$  при  $\varepsilon \rightarrow 0$  равномерно стремится к предельной функции

$$z_{+0}(x, x_0) = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} z_\varepsilon,$$

зависящей, конечно, от параметра  $x_0$ , то в формулах, выражающих  $y(x_0)$ , можно было бы перейти к пределу. Решение

уравнения (XX.1), удовлетворяющее условиям (XX.13), представлялось бы в виде

$$y(x_0) = z_{+0}(0, x_0) a_0 + \int_0^1 z_{+0}(x, x_0) f(x) dx - z_{-0}(1, x_0) a_1. \quad (\text{XX.26})$$

Заметим, что рассмотренное в начале параграфа уравнение относительно  $z_\varepsilon$  можно рассматривать как уравнение равновесия струны, которая удовлетворяет условиям закрепления, сопряженным с условиями (XX.13'), и находится под действием поперечной силы, величина которой равна 1 и которая распределена по отрезку струны длины  $2\varepsilon$  с серединой в точке  $x_0$ . В этом случае  $z_\varepsilon(x, x_0)$  можно истолковать как величину отклонения струны в точке  $x$  под действием единичной силы, действующей в  $\varepsilon$ -окрестности точки  $x_0$ . Функция  $z_{+0}(x, x_0)$ , таким образом, равна тому отклонению (*влиянию*), которое вызывает единичная сила, сосредоточенная в точке  $x_0$ . Из дальнейшего будет ясно, что функцию  $z_{+0}(x, x_0)$ , где  $x$  считается параметром, а  $x_0$  аргументом, можно считать также *функцией влияния* для струны с другой плотностью и натяжением, отклонение которой  $y(x_0)$  под действием силы  $f(x_0)$  удовлетворяет уравнению (XX.1). Это позволяет физически интерпретировать формулу (XX.26): интеграл означает суммарное влияние в точке  $x_0$ , вызванное распределенной силой  $f(x)$ .

Не вычисляя  $z_\varepsilon$ , выясним непосредственно, какими свойствами должна была бы обладать функция  $z_{-0}(x, x_0)$ .

**Свойство I.** Зная свойства  $z_\varepsilon$ , естественно ожидать, что  $z_{+0}$  как функция  $x$  должна удовлетворять всюду, кроме точки  $x_0$ , уравнению  $Mz = 0$  и крайним условиям, сопряженным с (XX.13').

Выясним еще одно свойство  $z_{+0}$ . Интегрируя  $Mz_\varepsilon$  в промежутке  $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ , где  $\delta > \varepsilon$ , получим:

$$\int_{x_0 - \delta}^{x_0 + \delta} Mz_\varepsilon dx = 1.$$

С другой стороны,

$$\int_{x_0 - \delta}^{x_0 + \delta} Mz_\varepsilon dx = (pz_\varepsilon)' \Big|_{x=x_0 - \delta}^{x=x_0 + \delta} - \int_{x_0 - \delta}^{x_0 + \delta} [(qz_\varepsilon)' - rz_\varepsilon] dx,$$

откуда

$$1 = (pz_\varepsilon)' \Big|_{x=x_0 - \delta}^{x=x_0 + \delta} - \int_{x_0 - \delta}^{x_0 + \delta} [(qz_\varepsilon)' - rz_\varepsilon] dx.$$

Предполагая  $z_\varepsilon$  и  $z'_\varepsilon$  равномерно ограниченными и переходя к пределу при  $\varepsilon \rightarrow 0$ , получаем:

$$(pz_{+0})' \Big|_{x=x_0-0}^{x=x_0+0} = 1.$$

Но функция  $p(x)$  непрерывна вместе с производной, и поэтому, считая  $z_{+0}$  непрерывной, получим:

$$(pz_{+0})' \Big|_{x=x_0-0}^{x=x_0+0} = p(x_0) z'_{+0} \Big|_{x=x_0-0}^{x=x_0+0},$$

откуда следует

С в о й с т в о II.

$$z'_{+0} \Big|_{x=x_0-0}^{x=x_0+0} = \frac{1}{p(x_0)}.$$

Наводящие соображения, которыми мы воспользовались, делают естественным следующее предположение: если удастся построить функцию  $G(x, x_0)$ , обладающую свойствами I и II, которыми должна была обладать функция  $z_{+0}$ , то для функции  $G(x, x_0)$  и любой функции  $y(x)$  будет справедливо равенство, аналогичное равенству (XX.25):

$$y(x_0) = G(0, x_0)[py' + \beta_0 y]_{x=0} + \\ + \int_0^1 G(x, x_0) Ly dx - G(1, x_0)[py' + \beta_1 y]_{x=1}, \quad (\text{XX.25}')$$

и что, следовательно, решение поставленной задачи, если оно существует, записывается в виде

$$y(x_0) = G(0, x_0) a_0 + \int_0^1 G(x, x_0) f(x) dx - G(1, x_0) a_1. \quad (\text{XX.26}')$$

## § 5. Определение и построение функции Грина

Переходим к строгому определению и построению функции  $G(x, x_0)$  и к обоснованию формул (XX.25') и (XX.26'). При определении и построении функции  $G(x, x_0)$  мы будем иметь в виду общий случай краевых условий; формулы же (XX.25') и (XX.26') справедливы лишь в случае, если  $\alpha_0 = \alpha_1 = 1$ .

О п р е д е л е н и е. Назовем *функцией Грина* для оператора  $Ly$  и краевых условий (XX.13) функцию  $G(x, x_0)$ , удовлетворяющую следующим условиям:

1. Как функция переменного  $x$  при любом  $x_0$  она удовлетворяет условиям (XX.18) и (XX.21), сопряженным с усло-

виями (XX.13') для оператора  $Ly$ , т. е.

$$[(\alpha_0 p G)' + (\beta_0 - \alpha_0 g) G]_{x=0} = 0,$$

$$[(\alpha_1 p G)' + (\beta_1 - \alpha_1 g) G]_{x=1} = 0.$$

2. В промежутках  $0 \leq x < x_0$ ,  $x_0 < x \leq 1$  функция  $G(x, x_0)$  непрерывна вместе с производными до второго порядка и удовлетворяет уравнению, сопряженному с уравнением  $Ly = 0$ , т. е.

$$Mz = \frac{d^2 [p(x)z]}{dx^2} - \frac{d [q(x)z]}{dx} + r(x)z = 0.$$

3. В точке  $x = x_0$  функция  $G(x, x_0)$  как функция  $x$  сама непрерывна, а ее первая производная имеет скачок, причем

$$G'_x(x_0 + 0, x_0) - G'_x(x_0 - 0, x_0) = \frac{1}{p(x_0)}. \quad (\text{XX.27})$$

Функцию Грина, введенную нами, нетрудно построить фактически. Очевидно, что она должна иметь следующий вид:

$$G(x, x_0) = a(x_0) z_1(x), \quad 0 \leq x \leq x_0,$$

$$G(x, x_0) = b(x_0) z_2(x), \quad x_0 \leq x \leq 1.$$

Построенная при помощи этих равенств функция  $G$  при любых  $a$  и  $b$  обладает первыми двумя свойствами, сформулированными в определении.

Подберем теперь  $a$  и  $b$  так, чтобы удовлетворить и третьему требованию, т. е. чтобы выполнялись равенства

$$a(x_0) z_1(x_0) - b(x_0) z_2(x_0) = 0,$$

$$a(x_0) z'_1(x_0) - b(x_0) z'_2(x_0) = -\frac{1}{p(x_0)}.$$

Получим:

$$a(x_0) = \frac{-z_2(x_0)}{p(x_0) [z_2(x_0) z'_1(x_0) - z'_2(x_0) z_1(x_0)]},$$

$$b(x_0) = \frac{-z_1(x_0)}{p(x_0) [z_2(x_0) z'_1(x_0) - z'_2(x_0) z_1(x_0)]}.$$

Стоящий в знаменателе определитель Вронского не равен нулю, так как  $z_1(x)$  и  $z_2(x)$  — линейно независимые решения.

Сравнивая эти выражения с формулами (XX.23'), мы видим, что

$$a(x_0) = y_2(x_0); \quad b(x_0) = y_1(x_0),$$

где  $y_1(x_0)$  и  $y_2(x_0)$  есть некоторые решения уравнения  $Ly = 0$ , удовлетворяющие соответственно условиям (XX.15) и (XX.19).

Таким образом, мы доказали существование функции Грина и получили для нее следующее явное выражение:

$$G(x, x_0) = \begin{cases} y_2(x_0) z_1(x), & 0 \leq x \leq x_0, \\ y_1(x_0) z_2(x), & x_0 \leq x \leq 1. \end{cases} \quad (\text{XX.28})$$

Из формулы (XX.28) следует

**Т е о р е м а.** *Функция Грина  $G(x, x_0)$ , как функция аргумента  $x_0$ , служит функцией Грина для оператора  $Mz$  при условиях (XX.18) и (XX.21). Другими словами, при замене задачи на сопряженную аргументы функции Грина лишь меняются местами.*

Используя (XX.28), установим другие свойства функции Грина.

**С в о й с т в о 1.** Функция Грина  $G(x, x_0)$  непрерывна в квадрате  $0 \leq x \leq 1; 0 \leq x_0 \leq 1$  на плоскости  $xOx_0$  по совокупности переменных.

**С в о й с т в о 2.** Первые производные функции Грина непрерывны внутри и на катетах обоих треугольников, на которые главная диагональ  $x = x_0$  разбивает квадрат  $0 \leq x \leq 1; 0 \leq x_0 \leq 1$ . При этом первые производные можно непрерывно продолжить из каждого треугольника на главную диагональ. Ввиду этого, в частности,

а)  $G'_{x_0}(x_0 + 0, x_0)$  и  $G'_{x_0}(x_0 - 0, x_0)$  есть непрерывные функции от  $x_0$ ;

$$\text{б) } G'_{x_0}(x_0 - 0, x_0) = G'_{x_0}(x_0, x_0 + 0),$$

$$G'_{x_0}(x_0 + 0, x_0) = G'_{x_0}(x_0, x_0 - 0).$$

**С в о й с т в о 3.** Производная  $G'_{x_0}$  на главной диагонали удовлетворяет условию

$$G'_{x_0}(x_0, x_0 + 0) - G'_{x_0}(x_0, x_0 - 0) = \frac{1}{p(x_0)}.$$

Первые два свойства очевидны. Для доказательства третьего вспомним, что функция  $G(x, x_0)$  как функция  $x_0$  есть функция Грина для оператора  $M_0 z$ , в выражении которого коэффициент при  $z''(x_0)$  есть  $p(x_0)$ . Доказываемое равенство выполняется по определению функции Грина [см. (XX.27)].

Докажем, что для любой функции  $y(x)$ , имеющей непрерывные производные до второго порядка включительно, выполняется равенство (XX.25'). Напишем равенство (XX.7), подставляя вместо  $z(x)$  функцию  $G(x, x_0)$  отдельно для отрезков  $0 \leq x \leq x_0 - 0$  и  $x_0 + 0 \leq x \leq 1$ ; на каждом из этих отрезков формула справедлива, так как  $G(x, x_0)$  внутри каждого из них имеет непрерывные вторые производные и непрерывные первые производные всюду, включая концы. Учитывая первые два пункта определения

функции Грина, получим для обоих отрезков соответственно формулы

$$G(0, x_0)[py' + \beta_0 y]_{x=0} + \int_0^{x_0} G(x, x_0) Ly dx + \\ + y(x_0)p(x_0)G'_x(x_0 - 0, x_0) + y(x_0)p'(x_0)G(x_0, x_0) - \\ - y(x_0)q(x_0)G(x_0, x_0) - G(x_0, x_0)p(x_0)y'(x_0) = 0$$

и

$$-y(x_0)p(x_0)G'_x(x_0 + 0, x_0) - y(x_0)p'(x_0)G(x_0, x_0) + \\ + G(x_0, x_0)p(x_0)y'(x_0) + y(x_0)q(x_0)G(x_0, x_0) + \int_{x_0}^1 G(x, x_0) Ly dx - \\ - G(1, x_0)(py' + \beta_1 y)_{x=1} = 0.$$

Складывая оба равенства и учитывая (XX.27), мы и получим доказательство (XX.25').

Из справедливости формулы (XX.25') непосредственно следует, что если решение существует, то оно выражается формулой (XX.26') и, следовательно, единственно. Покажем, что решение существует. Так как задачу всегда можно свести к задаче с однородными краевыми условиями (XX.13'), то достаточно установить, что функция

$$y(x_0) = \int_0^1 G(x, x_0)f(x) dx \quad (\text{XX.29})$$

удовлетворяет уравнению (XX.1) и условиям (XX.13').

Продифференцируем по  $x_0$  полученное выражение. Мы имеем:

$$y(x_0) = \int_0^{x_0} G(x, x_0)f(x) dx + \int_{x_0}^1 G(x, x_0)f(x) dx, \\ y'(x_0) = \int_0^{x_0} \frac{\partial G}{\partial x_0} f(x) dx + \int_{x_0}^1 \frac{\partial G}{\partial x_0} f(x) dx + \\ + G(x_0, x_0)f(x_0) - G(x_0, x_0)f(x_0), \\ y'(x_0) = \int_0^{x_0} \frac{\partial G}{\partial x_0} f(x) dx + \int_{x_0}^1 \frac{\partial G}{\partial x_0} f(x) dx. \quad (\text{XX.30})$$

Далее, воспользовавшись свойствами 2, а) и б), можно написать

$$\begin{aligned}
 y''(x_0) &= \int_0^{x_0} \frac{\partial^2 G}{\partial x_0^2} f(x) dx + \int_{x_0}^1 \frac{\partial^2 G}{\partial x_0^2} f(x) dx + \\
 &\quad + f(x_0) \frac{\partial G}{\partial x_0} \Big|_{x=x_0-0} - f(x_0) \frac{\partial G}{\partial x_0} \Big|_{x=x_0+0} = \\
 &= \int_0^1 \frac{\partial^2 G}{\partial x_0^2} f(x) dx + f(x_0) \frac{1}{p(x_0)}. \quad (\text{XX.31})
 \end{aligned}$$

Пользуясь этим, получим:

$$p(x_0)y''(x_0) + q(x_0)y'(x_0) + r(x_0)y(x_0) = f(x_0) + \int_0^1 L_0 G(x, x_0) f(x) dx.$$

Но  $G(x, x_0)$  как функция своего второго аргумента  $x_0$  удовлетворяет уравнению  $L_0 G = 0$ , отсюда

$$p(x_0)y''(x_0) + q(x_0)y'(x_0) + r(x_0)y(x_0) = f(x_0).$$

Выполнение условий (XX.13') следует из первого пункта определения функции Грина.

Нами изучена задача в первом случае. Мы установили, что при этом всегда существует определенное решение уравнения (XX.4), удовлетворяющее условиям (XX.13) или (XX.13') и представимое в виде (XX.26'), где  $G(x, x_0)$  — определенная нами функция Грина.

## § 6. Обобщенная функция Грина для линейного уравнения 2-го порядка

Разберем более подробно *второй* случай.

Функция Грина в этом случае не существует, ибо единственная функция, удовлетворяющая двум первым требованиям определения функции Грина и условию непрерывности, есть с точностью до постоянного множителя  $z(x)$ , но для этой функции не выполняется условие (XX.27).

**Л е м м а 2.** Если  $y_0(x)$  и  $z_0(x)$  являются решениями уравнений  $Ly = 0$  и  $Mz = 0$ , соответственно удовлетворяющими однородным условиям (XX.15), (XX.19) и (XX.18), (XX.21), то

$$\int_0^1 y_0(x) z_0(x) dx \neq 0. \quad (\text{XX.32})$$

Это замечание вытекает из того, что

$$\int_0^1 y_0(x) z_0(x) dx = c \int_0^1 \frac{y_0^2}{p} e^{\int_0^x \frac{q}{p} dx} dx.$$

Так как подинтегральное выражение постоянно по знаку, то интеграл не может равняться нулю.

Л е м м а 3. Уравнение

$$Mz = z_0$$

не может иметь решения, удовлетворяющего одновременно условиям (XX.18) и (XX.21), а уравнение  $Ly = y_0$  не может иметь решения, удовлетворяющего одновременно условиям (XX.15) и (XX.19).

В самом деле, если бы это было не так, то, применяя формулу (XX.7) и подставляя в нее вместо  $y$  решение  $y_0$ , мы получили бы:

$$\int_0^1 y_0 Mz dx = \int_0^1 z_0 y_0 dx = 0,$$

что противоречит лемме 2. Точно так же доказывается и вторая половина утверждения.

О п р е д е л е н и е. Обобщенной функцией Грина для оператора  $Ly$  и краевых условий (XX.13) назовем функцию  $G_1(x, x_0)$ , удовлетворяющую следующим условиям:

1. Как функция переменного  $x$  при любом  $x_0$  функция  $G_1(x, x_0)$  удовлетворяет условиям, сопряженным с условиями (XX.13')

$$\left. \begin{aligned} [(a_0 p(x) G_1)' + (\beta_0 - a_0 q) G_1]_{x=0} &= 0, \\ [(a_1 p(x) G_1)' + (\beta_1 - a_1 q) G_1]_{x=1} &= 0. \end{aligned} \right\} \quad (\text{XX.33})$$

2. В промежутках  $0 \leq x < x_0$ ,  $x_0 < x \leq 1$  функция  $G_1(x, x_0)$  непрерывна вместе с производными до второго порядка и удовлетворяет уравнению

$$Mz = a(x_0) z_0(x); \quad (\text{XX.34})$$

функцию  $a(x_0)$  мы определим позднее.

3. В точке  $x = x_0$  функция  $G_1(x, x_0)$  как функция  $x$  сама непрерывна, а производные ее разрывны, причем

$$\frac{\partial G_1(x_0 + 0, x_0)}{\partial x} - \frac{\partial G_1(x_0 - 0, x_0)}{\partial x} = \frac{1}{p(x_0)}. \quad (\text{XX.35})$$

$$4. \quad \int_0^1 G_1(x, x_0) y_0(x) dx = 0. \quad (\text{XX.36})$$

Переходим к явному построению функции  $G_1$ .

Обозначим через  $y^{(1)}$  и  $y^{(2)}$  частные решения уравнения

$$Ly = y_0, \quad (\text{XX.37})$$

удовлетворяющие условиям:

$$y^{(1)}|_{x=0} = y^{(1)'}|_{x=0} = 0,$$

$$y^{(2)}|_{x=1} = y^{(2)'}|_{x=1} = 0,$$

и аналогично  $z^{(1)}$  и  $z^{(2)}$  — частные решения уравнения

$$Mz = z_0, \quad (\text{XX.38})$$

удовлетворяющие условиям:

$$z^{(1)}|_{x=0} = z^{(1)'}|_{x=0} = 0,$$

$$z^{(2)}|_{x=1} = z^{(2)'}|_{x=1} = 0.$$

Очевидно, что разность  $y^{(2)} - y^{(1)} = y_1$  есть частное решение уравнения (XX.14), линейно независимое с  $y_0$ . В самом деле, если бы  $y^{(2)} - y^{(1)} = \alpha y_0$ , то обе функции  $y^{(1)}$  и  $y^{(2)}$  должны были бы удовлетворять на концах условиям (XX.15) и (XX.19), что невозможно в силу леммы 3.

Задание  $y_0$  определяет функции  $y^{(1)}$ ,  $y^{(2)}$  и  $y_1$ . Положим

$$z_0 = \frac{y_0}{p(y_0' y_1 - y_1' y_0)}, \quad z_1 = \frac{y_1}{p(y_0' y_1 - y_1' y_0)}.$$

Непосредственно проверяется, что функции  $y^{(1)}$  и  $y^{(2)}$  могут быть выражены через  $y_0$  и  $y_1$  в виде

$$y^{(1)}(x_0) = y_0(x_0) \int_0^{x_0} y_0(x) z_1(x) dx - y_1(x_0) \int_0^{x_0} y_0(x) z_0(x) dx,$$

$$y^{(2)}(x_0) = y_0(x_0) \int_1^{x_0} y_0(x) z_1(x) dx - y_1(x_0) \int_1^{x_0} y_0(x) z_0(x) dx.$$

В самом деле, равенства  $y^{(1)}(0) = y^{(2)}(1) = 0$  очевидны. Далее,

$$y^{(1)'}(0) = [y_0(0)]^2 z_1(0) - y_1(0) y_0(0) z_0(0) = 0,$$

$$y^{(2)'}(1) = [y_0(1)]^2 z_1(1) - y_1(1) y_0(1) z_0(1) = 0.$$

Кроме того,

$$y^{(1)'} = y_0'(x_0) \int_0^{x_0} y_0(x) z_1(x) dx - y_1(x_0) \int_0^{x_0} y_0(x) z_0(x) dx,$$

$$y^{(1)''} = y_0'(x_0) \int_0^{x_0} y_0(x) z_1(x) dx - y_1''(x_0) \int_0^{x_0} y_0(x) z_0(x) dx +$$

$$+ [y_0(x_0) z_1(x_0) - y_1'(x_0) z_0(x_0)] y_0(x_0),$$

откуда  $Ly^{(1)} = y_0(x)$ , что и требовалось доказать.

Так же доказывается и формула для  $y^{(2)}$ . Составляя разность

$$y_1(x_0) = y^{(2)}(x_0) - y^{(1)}(x_0) =$$

$$= -y_0(x_0) \int_0^1 y_0(x) z_1(x) dx + y_1(x_0) \int_0^1 y_0(x) z_0(x) dx,$$

видим, что

$$\int_0^1 y_0(x) z_1(x) dx = 0,$$

$$\int_0^1 y_0(x) z_0(x) dx = 1,$$

т. е.

$$\int_0^1 y_0(x) z^{(1)}(x) dx = \int_0^1 y_0(x) z^{(2)}(x) dx = C.$$

Покажем, что функция

$$G_1 = \begin{cases} y_0(x_0) z^{(1)}(x) + y^{(2)}(x_0) z_0(x) - Cy_0(x_0) z_0(x), & x \leq x_0, \\ y_0(x_0) z^{(2)}(x) + y^{(1)}(x_0) z_0(x) - Cy_0(x_0) z_0(x), & x \geq x_0 \end{cases}$$

удовлетворяет всем указанным выше четырем условиям.

1. Выполнение условий (XX.33) очевидно, так как этим условиям удовлетворяет  $z_0(x)$ , а также соответственно  $z^{(1)}$  при  $x = 0$  и  $z^{(2)}$  при  $x = 1$ .

2. Уравнение (XX.34) удовлетворяется в силу (XX.38). Очевидно,

$$MG_1 = y_0(x_0) z_0(x).$$

3. Непрерывность  $G_1$  очевидна. Для скачка ее производных имеем:

$$G_{1x}(x_0 + 0, x_0) - G_{1x}(x_0 - 0, x_0) =$$

$$= y_0(x_0) [z^{(2)'}(x_0) - z^{(1)'}(x_0)] + [y^{(1)}(x_0) - y^{(2)}(x_0)] z_0(x_0) =$$

$$= y_0(x_0) z_1(x_0) - y_1(x_0) z_0(x_0) = \frac{1}{p(x_0)}.$$

Наконец,

$$\begin{aligned}
 4. \int_0^1 G_1(x, x_0) y_0(x) dx &= -C y_0(x_0) + y_0(x_0) \int_0^1 y_0(x) z^{(2)}(x) dx + \\
 &+ y_0(x_0) \int_0^{x_0} [z^{(1)}(x) - z^{(2)}(x)] y_0(x) dx + \\
 &+ [y^{(2)}(x_0) - y^{(1)}(x_0)] \int_0^{x_0} z_0(x) y_0(x) dx + \\
 &+ y^{(1)}(x_0) \int_0^1 y_0(x) z_0(x) dx = \\
 &= -C y_0(x_0) + C y_0(x_0) + y^{(1)}(x_0) - y^{(1)}(x_0) = 0.
 \end{aligned}$$

Очевидно, что обобщенная функция Грина  $G_1(x, x_0)$  как функция от переменного  $x_0$  служит в свою очередь обобщенной функцией Грина для сопряженного оператора  $Mz$  и граничных условий (XX.18) и (XX.21). С ее помощью можно представить решение уравнения (XX.1), удовлетворяющее условиям (XX.13'), в виде

$$y(x_0) = \int_0^1 G_1(x, x_0) f(x) dx + C_1 y_0(x_0), \quad (\text{XX.39})$$

если только  $f(x)$  удовлетворяет условию

$$\int_0^1 f(x) z_0(x) dx = 0. \quad (\text{XX.40})$$

Из доказательства, между прочим, вытекает, что условие (XX.40) не только необходимо, но и достаточно для разрешимости уравнения (XX.1) при условии (XX.13').

Доказательство всех этих утверждений мы проводить не будем, так как оно совершенно совпадает с тем, которое было нами проведено для самой функции Грина.

Для уравнения 2-го порядка при рассмотренных условиях однородная задача могла иметь лишь одно нетривиальное решение.

Для уравнений высших порядков может встретиться случай, когда соответствующая однородная задача имеет несколько линейно независимых решений  $y_1(x)$ ,  $y_2(x)$ , ...,  $y_n(x)$ . Тогда обобщенная функция Грина должна соответственно удовлетворять уравнению

$$MG = \sum_{i=1}^n y_i(x_0) z_i(x),$$

и вместо одного условия (XX.36) мы будем иметь несколько подобных условий. Подробный разбор этих случаев мы проводить не будем.

Переходим к рассмотрению некоторых примеров.

## § 7. Примеры

**Пример 1.** Ищем решение уравнения

$$Ly \equiv y'' = f(x) \quad (\text{XX.41})$$

при условиях

$$\left. \begin{aligned} y|_{x=0} &= a_0, \\ y|_{x=1} &= a_1. \end{aligned} \right\} \quad (\text{XX.42})$$

Единственное решение уравнения  $y'' = 0$  при условии  $y|_{x=0} = a_0$  и  $y|_{x=1} = a_1$  есть нуль.

Согласно общей теории, изложенной выше, существует функция Грина

$$G = \begin{cases} x(x_0 - 1), & x \leq x_0, \\ x_0(x - 1), & x \geq x_0. \end{cases} \quad (\text{XX.43})$$

Решение задачи будет:

$$\begin{aligned} y(x_0) &= a_0(1 - x_0) + a_1x_0 + \\ &+ (x_0 - 1) \int_0^{x_0} f(x)x dx + x_0 \int_{x_0}^1 f(x)(x - 1) dx. \end{aligned} \quad (\text{XX.44})$$

**Пример 2.** Ищем решение (XX.41) при условиях

$$y'|_{x=0} = a_0, \quad y'|_{x=1} = a_1. \quad (\text{XX.45})$$

В этом случае уравнение  $y'' = 0$  имеет нетривиальное решение, удовлетворяющее условиям

$$y'|_{x=0} = y'|_{x=1} = 0, \quad (\text{XX.46})$$

а именно,

$$y = 1.$$

Следовательно, функция Грина в этом случае не существует, и нам нужно будет построить обобщенную функцию Грина. Мы имеем:

$$\begin{aligned} y_0 &= 1, \quad z_0 = 1, \\ y_1 &= \frac{1}{2} - x, \quad z_1 = \frac{1}{2} - x. \end{aligned}$$

Далее,

$$z^{(1)} = \frac{1}{2}x^2, \quad z^{(2)} = \frac{1}{2}(1 - x)^2.$$

Тогда

$$y^{(1)} = \frac{1}{2} x^2, \quad y^{(2)} = \frac{1}{2} (1-x)^2, \quad C = \frac{1}{6}.$$

Функция  $G_1$  будет при этом иметь вид

$$G_1 = \begin{cases} \frac{1}{2} x^2 + \frac{1}{2} (1-x_0)^2 - \frac{1}{6}, & x_0 \geq x, \\ \frac{1}{2} x_0^2 + \frac{1}{2} (1-x)^2 - \frac{1}{6}, & x \geq x_0. \end{cases} \quad (\text{XX.47})$$

**Пример 3.** Рассмотрим то же уравнение (XX.41) в промежутке  $0 \leq x \leq 2\pi$  и будем считать  $x$  длиной дуги окружности единичного радиуса, отсчитанной от некоторой начальной точки. Точки, координаты которых отличаются на число, кратное  $2\pi$ , тождественны.

При этом, очевидно, искомая функция  $y$  должна быть периодической функцией с периодом  $2\pi$ .

Мы получим для нее условия:

$$y|_{x=2\pi} = y|_{x=0}, \quad y'|_{x=2\pi} = y'|_{x=0}. \quad (\text{XX.48})$$

Эти условия выражают собою то обстоятельство, что функция  $y$  непрерывна со своей первой производной на окружности. Тот факт, что точка  $x = 0$  играет в этих условиях особую роль, связан лишь с выбором начала отсчета.

Теория такого рода задач не была нами развита в общем виде, но, ввиду ее полного сходства с уже изложенной, мы ограничимся разбором этого примера.

Нетрудно убедиться, что однородное уравнение

$$y'' = 0$$

имеет, как и в предыдущей задаче, нетривиальное решение  $y = 1$ , удовлетворяющее условиям (XX.48). Следовательно, мы должны будем построить обобщенную функцию Грина.

Построение это выполняется проще всего, если воспользоваться периодичностью искомой функции, а также тем, что все точки нашей окружности эквивалентны, и поэтому функция Грина зависит только от разности  $x - x_0$ .

Положим в виду этого сначала  $x_0 = \pi$ .

Уравнение для функции Грина имеет вид

$$\frac{d^2 G_1}{dx^2} = 0,$$

и решение его, очевидно, будет представлять собой квадратичный трехчлен

$$G_1(x, \pi) = c_1 x^2 + c_2 x + c_3, \quad -\pi \leq x \leq \pi.$$

Из условия непрерывности имеем.

$$G_1(\pi - 0, \pi) - G_1(\pi + 0, \pi) = G_1(\pi, \pi) - G_1(-\pi, \pi) = 2\pi c_2,$$

откуда

$$c_2 = 0.$$

Далее, выражая условие для скачка производной, получим:

$$G'_1(\pi + 0, \pi) - G'_1(\pi - 0, \pi) = -4\pi c_1 = 1,$$

откуда

$$c_1 = -\frac{1}{4\pi}.$$

Кроме того, функция Грина должна быть ортогональна к постоянной, откуда

$$-\frac{1}{4\pi} \int_{-\pi}^{+\pi} x^2 dx + 2\pi c_3 = 0,$$

или

$$c_3 = \frac{\pi}{12}.$$

Окончательно, имеем:

$$G_1(x, \pi) = -\frac{1}{4\pi} x^2 + \frac{\pi}{12}, \quad -\pi \leq x \leq +\pi.$$

В силу периодичности  $G_1(x, \pi) = G_1(x, (2k+1)\pi)$  и в общем случае:

$$G_1(x, x_0) = \begin{cases} G_1(x - x_0 + \pi, \pi) = -\frac{1}{4\pi} (x - x_0 + \pi)^2 + \frac{\pi}{12} \\ \quad \text{при } x_0 - 2\pi \leq x \leq x_0, \\ G_1(x - x_0 - \pi, -\pi) = -\frac{1}{4\pi} (x - x_0 - \pi)^2 + \frac{\pi}{12} \\ \quad \text{при } x_0 \leq x \leq x_0 + 2\pi \end{cases} \quad (\text{XX.49})$$

Построенная нами функция Грина симметрична относительно  $x$  и  $x_0$  и обладает всеми теми свойствами, которые были установлены выше для обобщенной функции Грина.

В практических задачах приходится сталкиваться со случаями, когда в уравнении (XX.1)  $p(0) = 0$  или  $p(1) = 0$ , а иногда оба конца промежутка служат корнями функции  $p(x)$ . При этих условиях мы можем иногда все же строить функцию Грина, сделав, однако, некоторые добавочные ограничения. Ограничимся разбором одного примера, который будет полезен нам в дальнейшем.

**Пример 4.** Рассмотрим уравнение

$$Ly = xy'' + y' - \frac{m^2}{x} y = f(x), \quad (\text{XX.50})$$

где  $m$  — целое число, и будем искать решение этой задачи, удовлетворяющее условию

$$y|_{x=1} = 0. \quad (\text{XX.51})$$

Интегралы однородного уравнения

$$Ly = 0$$

суть, как нетрудно видеть,

$$y_1 = x^m, \quad y_2 = x^{-m}.$$

Один из них не ограничен в начале промежутка. Поэтому для того чтобы одна из постоянных, входящих в общее решение однородного уравнения, была определена полностью, достаточно потребовать

$$|y| \leq \frac{1}{x^{m-1}}.$$

Другая постоянная определится условием (XX.51). Сопряженный оператор в данном случае совпадает с исходным:

$$Lz \equiv Mz.$$

Естественно заменить в определении функции Грина условие при  $x = 0$  требованием ограниченности. При этом функция Грина для нашей задачи представляется в виде

$$G(x, x_0) = \begin{cases} \frac{1}{2m} x^m (x_0^m - x_0^{-m}), & x \leq x_0, \\ \frac{1}{2m} x_0^m (x^m - x^{-m}), & x \geq x_0. \end{cases} \quad (\text{XX.52})$$

Допустим, что  $f(x)$  удовлетворяет неравенству

$$|f(x)| < \frac{A}{x^k}, \quad 0 \leq k \leq m.$$

Применяя формулу (XX.26) к искомому решению, будем иметь:

$$y(x_0) = \frac{x_0^m - x_0^{-m}}{2m} \int_0^{x_0} x^m f(x) dx + \frac{x_0^m}{2m} \int_{x_0}^1 (x^m - x^{-m}) f(x) dx.$$

Это решение нетрудно оценить:

$$\begin{aligned} |y(x_0)| &\leq \frac{x_0^{-m}}{2m} \int_0^{x_0} x^{m-k} A dx + \frac{x_0^m}{2m} \int_{x_0}^1 x^{-m-k} A dx + \frac{x_0^m}{2m} \int_0^1 A x^{m-k} dx \leq \\ &\leq A \left( \frac{x_0^{-k+1}}{2m(m-k+1)} + \frac{x_0^{k+1}}{2m(m+k-1)} + \frac{x_0^m}{2m(m-k+1)} \right), \end{aligned}$$

или

$$|y(x_0)| \leq \frac{A_1}{x_0^k - 1}.$$

Следовательно, решение будет удовлетворять поставленным условиям, так как  $k \leq m$ .

Если  $m = 0$ , то решениями однородного уравнения будут:

$$y_1 = 1, \quad y_2 = \ln x.$$

При этом для ограниченных  $f(x)$  можно искать ограниченное решение.

Для уравнений высшего порядка также возможно построение функции Грина.

Ограничимся опять одним примером.

Рассмотрим решение уравнения из примера 1 § 2 при условиях (XX.9).

Функция Грина  $G(x, x_0)$  определится при этом формулами:

$$G(x, x_0) = 0, \quad x > x_0,$$

$$MG = 0, \quad x < x_0,$$

и удовлетворяет условиям:

$$G|_{x=x_0} = G'_x|_{x=x_0} = G''_{xx}|_{x=x_0} = \dots = G^{(n-2)}_{xx\dots x}|_{x=x_0} = 0$$

$$G^{(n-1)}_{xx\dots x}|_{x=x_0} = 0 = -\frac{1}{p_0(x_0)}.$$

С помощью этой функции Грина решение задачи получается в виде

$$y(x_0) = \int_0^1 G(x, x_0) f(x) dx.$$

Читатели могут сами проверить это непосредственно. Функция Грина, определенная этими условиями, как и прежде, отличается лишь перестановкой аргументов от функции Грина для сопряженной задачи.

# ЛЕКЦИЯ XXI

## ФУНКЦИЯ ГРИНА ДЛЯ ОПЕРАТОРА ЛАПЛАСА

### § 1. Функция Грина для задачи Дирихле

Разобрав важнейшие случаи построения функции Грина для обыкновенных дифференциальных уравнений, мы перейдем к изучению функции Грина для различных задач, связанных с уравнением Пуассона.

Рассмотрим в пространстве с координатами  $x, y, z$  некоторую область  $\Omega$ , ограниченную достаточно гладкой поверхностью  $S$ .

Будем искать функцию  $u$ , удовлетворяющую в этой области уравнению

$$\Delta u = f(P) \quad (\text{XXI.1})$$

и одному из следующих условий:

$$u|_S = F_0(S) \quad (\text{XXI.2})$$

или

$$\left. \frac{\partial u}{\partial n} \right|_S = F_1(S). \quad (\text{XXI.3})$$

Такая задача встречается, например, при отыскании потенциала электрического поля с заданным распределением зарядов.

К задаче этого типа приводится вопрос о форме равновесия мембраны при заданной поперечной силе и т. п.

Оператор Лапласа, как мы знаем, является самосопряженным. То же самое относится и к однородным условиям

$$u|_S = 0 \quad \text{или} \quad \left. \frac{\partial u}{\partial n} \right|_S = 0,$$

соответствующим условиям (XXI.2) или (XXI.3), как это ясно из классической формулы Грина

$$\iiint_{\Omega} (v \Delta u - u \Delta v) d\Omega = \iint_S \left( u \frac{\partial v}{\partial n} - v \frac{\partial u}{\partial n} \right) dS. \quad (\text{XXI.4})$$

Рассуждения, которые мы будем проводить, можно без труда перенести и на случай более общих условий, но мы не будем затрагивать этого вопроса.

**О п р е д е л е н и е.** Назовем *функцией Грина для уравнения (XXI.1) при условии (XXI.2), или функцией Грина для задачи Дирихле*, функцию  $G(P, P_0)$  двух переменных точек  $P$  и  $P_0$ , удовлетворяющую следующим условиям:

1. Функция  $G(P, P_0)$  есть гармоническая функция точки  $P$  во всей области  $\Omega$ , исключая точку  $P_0$ .

2. Функция  $G(P, P_0)$  как функция точки  $P$  удовлетворяет условию

$$G(P, P_0)|_S = 0$$

3. В области  $\Omega$  функция  $G(P, P_0)$  допускает представление

$$G(P, P_0) = \frac{1}{4\pi r} + g(P, P_0),$$

где  $r$  есть расстояние между  $P$  и  $P_0$ , а  $g(P, P_0)$  — регулярная гармоническая функция.

Функция  $G(P, P_0)$  полностью аналогична построенной нами ранее для обыкновенного линейного уравнения функции Грина.

Мы могли бы вместо приведенного определения этой функции определить ее как функцию влияния, подобно предыдущему (см. § 2 лекции XX). Однако мы не будем останавливаться на этом подробнее.

Установим существование функции Грина для задачи Дирихле.

По свойству 3

$$G(P, P_0) - \frac{1}{4\pi r} = g(P, P_0)$$

есть гармоническая функция точки  $P$  во всей области  $\Omega$ :

$$\Delta g = 0. \quad (\text{XXI.5})$$

Ее предельные значения на  $S$  будут

$$g(P, P_0)|_S = - \frac{1}{4\pi r} \Big|_S. \quad (\text{XXI.6})$$

Функция  $g(P, P_0)$  по условиям (XXI.5) и (XXI.6) строится при помощи решения соответствующей задачи Дирихле.

Изучим еще одно важное свойство функции Грина. Предварительно докажем лемму.

**Л е м м а Л я п у н о в а.** Рассмотрим область  $\Omega$ , ограниченную дважды непрерывно дифференцируемой поверхностью  $S$ . Проведем две поверхности  $S_1$  и  $S_2$  на расстоянии  $h$  с обеих сторон от  $S$ , причем  $h < d$ , где  $d$  есть наименьший радиус кривизны плоских нормальных сечений поверхности  $S$ .

Пусть функция  $F(x, y, z)$  непрерывна вместе с производными 1-го порядка в полосе, заключенной между  $S_1$  и  $S_2$ , а вторые производные непрерывны всюду в этой полосе, кроме самой поверхности  $S$ , причем выражение  $\Delta F$  ограничено.

Тогда гармоническая внутри  $\Omega$  функция, совпадающая с  $F$  на поверхности  $S$ , обладает правильной нормальной производной на  $S$ .

Для доказательства этой леммы применим формулу Грина раздельно к двум слоям, заключенным, с одной стороны, между  $S_1$  и  $S$ , а с другой стороны, между  $S_2$  и  $S$ . Для точки  $P_0$ , лежащей во внутреннем слое  $\Omega_1$ , мы будем иметь:

$$F(P_0) = \frac{1}{4\pi} \iint_{S+S_1} \left( F \frac{\partial \frac{1}{r}}{\partial n} - \frac{1}{r} \frac{\partial F}{\partial n} \right) dS - \frac{1}{4\pi} \iiint_{\Omega_1} \frac{1}{r} \Delta F d\Omega$$

или

$$\begin{aligned} F(P_0) = & \frac{1}{4\pi} \iint_S F \frac{\partial \frac{1}{r}}{\partial n} dS + \frac{1}{4\pi} \iint_{S_1} F \frac{\partial \frac{1}{r}}{\partial n} dS - \\ & - \frac{1}{4\pi} \iint_{S+S_1} \frac{1}{r} \frac{\partial F}{\partial n} dS - \frac{1}{4\pi} \iiint_{\Omega_1} \frac{1}{r} \Delta F d\Omega. \end{aligned}$$

Стоящие справа интегралы

$$\frac{1}{4\pi} \iiint_{\Omega_1} \frac{1}{r} \Delta F d\Omega, \quad \frac{1}{4\pi} \iint_{S+S_1} \frac{1}{r} \frac{\partial F}{\partial n} dS, \quad \frac{1}{4\pi} \iint_{S_1} F \frac{\partial \frac{1}{r}}{\partial n} dS$$

имеют правильные нормальные производные. Это следует из теоремы 2 лекции XV. Левая часть имеет непрерывные производные 1-го порядка вблизи  $S$ .

Следовательно, интеграл

$$\frac{1}{4\pi} \iint_S F \frac{\partial \frac{1}{r}}{\partial n} dS$$

также имеет непрерывную правильную нормальную производную.

Аналогично для точки  $P_0$ , лежащей вне поверхности  $S_2$ , имеем:

$$0 = \frac{1}{4\pi} \iint_{S+S_2} \left( F \frac{\partial \frac{1}{r}}{\partial n} - \frac{1}{r} \frac{\partial F}{\partial n} \right) dS - \frac{1}{4\pi} \iiint_{\Omega_2} \frac{1}{r} \Delta F d\Omega,$$

откуда такими же рассуждениями убеждаемся, что интеграл

$$\frac{1}{4\pi} \iint_S F \frac{\partial \frac{1}{r}}{\partial n} dS$$

имеет правильную нормальную производную также и вне области  $\Omega$ .

На основании теоремы Ляпунова (лекция XV) мы видим, что гармоническая в  $\Omega$  функция, принимающая на  $S$  значения, равные значениям функции  $F$ , имеет правильную нормальную производную, что и требовалось доказать.

Мы можем теперь установить еще одно важное свойство функции Грина.

**Т е о р е м а 1.** Если поверхность  $S$  такова, что она удовлетворяет условиям леммы Ляпунова, то функция Грина как функция точки  $P$  обладает правильной нормальной производной, когда точка  $P_0$  лежит внутри  $\Omega$ .

Доказательство этой теоремы непосредственно следует из леммы Ляпунова. Действительно, имеем

$$G = \frac{1}{4\pi r} + g.$$

Функция  $\frac{1}{4\pi r}$  имеет, очевидно, правильную нормальную производную. Функция  $g$  принимает на поверхности  $S$  те же значения, что и функция  $\frac{1}{4\pi r}$ , которая является дважды непрерывно дифференцируемой в полосе близ  $S$ .

По лемме Ляпунова  $g$  обладает правильной нормальной производной, что и требовалось доказать.

**Т е о р е м а 2.** Решение уравнения (XXI.1) при условиях (XXI.2) (если оно существует) представляется в виде:

$$u(P_0) = \iint_S F_0(S) \frac{\partial G}{\partial n} dS - \iiint_{\Omega} G(P, P_0) f(P) dP. \quad (\text{XXI.7})$$

Для доказательства применим формулу Грина к области  $\Omega'$ , полученной из  $\Omega$  вырезыванием малого шара с поверхностью  $\sigma$  радиуса  $\delta$  вокруг точки  $P_0$ <sup>1)</sup>. За функции  $u$  и  $v$  возьмем неизвестное решение  $u$  уравнения (XXI.1) и функцию Грина  $G$ . В указанной области как  $u$ , так и  $G$  будут непрерывны вместе с первыми производными. Мы получим:

$$\iiint_{S'} G(P, P_0) \Delta u dP = \iint_{S'} \left( u \frac{\partial G}{\partial n} - G \frac{\partial u}{\partial n} \right) dS,$$

где  $S'$  — полная поверхность  $\Omega'$ .

На поверхности  $\sigma$  направление нормали, внутренней по отношению к области  $\Omega'$ , обозначим через  $n'$ . Пусть  $n$  — направление нормали, идущей к центру шара  $\sigma$ . Принимая во внимание,

<sup>1)</sup> Формула Грина применима, так как  $G$  имеет правильную нормальную производную.

что на  $S$  функция  $G$  обращается в нуль, получим:

$$\begin{aligned} \iiint_{\Omega'} G(P, P_0) f(P) dP = \\ = \iint_S F_0(S) \frac{\partial G}{\partial n} dS - \frac{1}{4\pi} \iint_{\sigma} \left( u \frac{\partial}{\partial n} \frac{1}{r} - \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial n} \right) d\sigma - \iint_{\sigma} \left( u \frac{\partial g}{\partial n} - g \frac{\partial u}{\partial n} \right) d\sigma. \end{aligned}$$

Знак минус перед последними слагаемыми поставлен потому, что при интегрировании по  $\sigma$  направление нормали  $n$  противоположно направлению внутренней нормали  $n'$ .

Предел последнего интеграла при  $\delta \rightarrow 0$  есть нуль в силу ограниченности  $u$  и  $g$  и их производных.

Далее,

$$\lim_{\delta \rightarrow 0} \frac{1}{4\pi} \iint_{\sigma} \left( u \frac{\partial}{\partial n} \frac{1}{r} - \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial n} \right) d\sigma = \lim_{\delta \rightarrow 0} \frac{1}{4\pi\delta^2} \iint_{\sigma} u d\sigma - \lim_{\delta \rightarrow 0} \frac{1}{4\pi\delta^2} \iint_{\sigma} \delta \frac{\partial u}{\partial n} d\sigma.$$

Предел первого слагаемого есть предел среднего значения  $u$  на сфере  $\sigma$  и равен  $u(P_0)$ . Предел второго слагаемого есть, очевидно, нуль. Пользуясь этим, сразу получим искомую формулу (XXI.7).

**Т е о р е м а 3.** *Функция  $G(P, P_0)$  есть симметрическая функция своих аргументов.*

Для доказательства применим формулу Грина к функциям  $G(P, P_1)$  и  $G(P, P_2)$  в области  $\Omega''$ , полученной вырезыванием из  $\Omega$  обеих точек  $P_1$  и  $P_2$  малыми шарами. Обозначая через  $S''$  границу области  $\Omega''$ , мы будем иметь:

$$\iint_{S''} \left( G(P, P_1) \frac{\partial G(P, P_2)}{\partial n} - G(P, P_2) \frac{\partial G(P, P_1)}{\partial n} \right) dS'' = 0.$$

Интеграл по поверхности  $S$  равен нулю, так как там обращаются в нуль обе функции  $G(P, P_1)$  и  $G(P, P_2)$ .

Предел интеграла по сфере вокруг  $P_1$  будет, очевидно, равен  $G(P_1, P_2)$ , а предел интеграла по сфере вокруг  $P_2$  равен  $-G(P_2, P_1)$ , откуда

$$G(P_1, P_2) = G(P_2, P_1),$$

что и требовалось доказать.

**Т е о р е м а 4.** *Функция  $u(P_0)$ , определенная формулой (XXI.7), дает решение поставленной задачи.*

Для доказательства достаточно установить существование решения, так как в силу теоремы 2 решение должно выражаться формулой (XXI.7), если оно существует. Пусть  $\psi$  есть

ньютонів потенціал області  $\Omega$  с плотністю  $f(P)$ :

$$\psi(P_0) = -\frac{1}{4\pi} \int_{\Omega} \int \frac{f(P)}{r} dv.$$

Функція  $\psi$  удовлетворяет уравнению Пуассона <sup>1)</sup>

$$\Delta\psi = f.$$

Положим  $v = u - \psi$ . Если мы найдем гармоническую функцию  $v$ , удовлетворяющую условиям

$$v|_S = u|_S - \psi|_S,$$

то  $u = v + \psi$  будет решением задачи. Но существование такой функции  $v$  следует из проведенного ранее исследования задачи Дирихле. Теорема 4 доказана.

Заслуживает внимания еще одно обстоятельство. Функция Грина удовлетворяет неравенству

$$G(P, P_0) \leq \frac{1}{4\pi r}.$$

Это ясно из того, что функция  $g$  отрицательна на контуре и, следовательно, отрицательна везде.

Подобно тому, как мы построили функцию Грина для задачи Дирихле в пространстве, мы могли бы построить такую же функцию на плоскости. Нам пришлось бы при этом вместо члена  $\frac{1}{4\pi r}$  выделить слагаемое  $\frac{1}{2\pi} \ln \frac{1}{r}$ .

Решение, очевидно, выразилось бы формулой (XXI.7), где под  $\Omega$  надо, разумеется, понимать плоскую область, а под  $S$  — ограничивающую ее кривую.

## § 2. Функция Грина для задачи Неймана

При решении задачи Неймана как в пространстве, так и на плоскости мы встретились бы с тем затруднением, что функции Грина в том смысле, как мы хотели ее построить, не существует, так как соответствующая однородная задача имеет нетривиальное решение, равное постоянной. Нам пришлось бы искать обобщенную функцию Грина, т. е. потребовать, чтобы она удовлетворяла не уравнению Лапласа, а уравнению

$$\Delta G_1(P, P_0) = C. \quad (\text{XXI.8})$$

Разберем этот вопрос подробнее. Покажем, что существует реше-

<sup>1)</sup> Ср. стр. 172.

ние уравнения (XXI.8), имеющее вид

$$G_1 = \frac{1}{4\pi r} + g, \quad (\text{XXI.9})$$

где  $\frac{\partial G_1}{\partial n} \Big|_S = 0$ , а  $g$  — регулярная в области функция. Для этого достаточно показать, что при соответственно подобранной постоянной  $C$  существует функция, удовлетворяющая уравнению (XXI.8) и условию

$$\frac{\partial g}{\partial n} \Big|_S = -\frac{1}{4\pi} \frac{\partial \frac{1}{r}}{\partial n} \Big|_S.$$

Будем искать  $g$  в виде  $g = \alpha R^2 + g_1$ , где  $R^2 = x^2 + y^2 + z^2$ , а  $g_1$  — гармоническая функция. Для функции  $g_1$  получим граничное условие

$$\frac{\partial g_1}{\partial n} \Big|_S = -\alpha \frac{\partial R^2}{\partial n} \Big|_S - \frac{1}{4\pi} \frac{\partial \frac{1}{r}}{\partial n} \Big|_S. \quad (\text{XXI.10})$$

Мы установим, что при соответствующем выборе постоянной  $\alpha$  имеет место равенство

$$\iint_S \left[ \alpha \frac{\partial R^2}{\partial n} \Big|_S + \frac{1}{4\pi} \frac{\partial \frac{1}{r}}{\partial n} \Big|_S \right] dS = 0. \quad (\text{XXI.11})$$

Отсюда будет следовать существование гармонической функции, удовлетворяющей условию (XXI.10). При этом

$$\Delta g = 6\alpha = C.$$

Следовательно, отсюда будет вытекать существование функции  $G_1$ , удовлетворяющей (XXI.8) и (XXI.9). Условия (XXI.8) и (XXI.9) определяют  $G_1$  с точностью до произвольной постоянной. Этим можно воспользоваться, чтобы сделать  $G_1$  ортогональной к постоянной. Функцию  $G_1$  мы будем называть *функцией Грина для задачи Неймана*. Мы имеем:

$$\iint_S \alpha \frac{\partial R^2}{\partial n} dS = -\alpha \int \int \int_{\Omega} \Delta (R^2) d\Omega = -6\alpha m\Omega,$$

где  $m\Omega$  — объем области  $\Omega$ . Далее,

$$\frac{1}{4\pi} \iint_S \frac{\partial \frac{1}{r}}{\partial n} dS = \frac{1}{4\pi} \int \int d\omega = 1.$$

Условие (XXI.11) выполняется, если положить  $\alpha = \frac{1}{6m\Omega}$ . Как и для обычной функции Грина, легко доказывается симметричность  $G_1$  относительно аргументов  $P$  и  $P_0$ .

С помощью функции Грина  $G_1$  можно построить решение следующей задачи: найти функцию  $u$ , удовлетворяющую

уравнению

$$\Delta u = f(P)$$

при условии  $\left. \frac{\partial u}{\partial n} \right|_S = 0$ .

Необходимое и достаточное условие разрешимости этой задачи состоит в том, что

$$\iiint_{\Omega} f(P) dv = 0.$$

Если это условие выполнено, то

$$u(P_0) = - \iiint_{\Omega} G_1(P, P_0) f(P) dv.$$

Проверить это утверждение мы предоставляем читателям. Воспользовавшись обычным приемом перевода неоднородности в правую часть, читатель сможет также найти решение задачи Неймана при неоднородном условии (XXI.3).

Рассмотрим один пример.

**П р и м е р.** Построим функцию Грина для задачи Неймана, поставленной для шара  $R \leq 1$ , где  $R = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ .

По определению

$$G_1 = \frac{1}{4\pi r} + g,$$

где

$$\Delta G_1 = \text{const}, \quad \left. \frac{\partial g}{\partial n} \right|_{R=1} = - \frac{1}{4\pi} \left. \frac{\partial \frac{1}{r}}{\partial n} \right|_{R=1}.$$

Для удобства предположим, что полюс функции Грина находится в точке с координатами 0, 0,  $z_0$ . Тогда  $r = \sqrt{x^2 + y^2 + (z - z_0)^2}$ ,

$$\left. \frac{\partial \frac{1}{r}}{\partial n} \right|_{R=1} = - \left. \frac{x \cos(n, x) + y \cos(n, y) + (z - z_0) \cos(n, z)}{r^3} \right|_{R=1}.$$

Но на поверхности  $R = 1$  имеем  $\cos(n, x) = -x$ ,  $\cos(n, y) = -y$ ,  $\cos(n, z) = -z$ .

Отсюда

$$\left. \frac{\partial \frac{1}{r}}{\partial n} \right|_{R=1} = \left. \frac{1 - z_0 z}{r^3} \right|_{R=1}. \quad (\text{XXI.12})$$

Введем еще число  $z'_0 = \frac{1}{z_0}$  и функцию  $r_1 = \sqrt{x^2 + y^2 + (z - z'_0)^2}$ .

Очевидно,

$$\left. \frac{\partial \frac{1}{r_1}}{\partial n} \right|_{R=1} = \left. \frac{1 - z'_0 z}{r_1^3} \right|_{R=1}.$$

Полагая в формуле (XXI.12)  $R_0 = z_0$ ,  $\rho = r_1$ ,  $R = 1$ , имеем:

$$r|_{R=1} = z_0 r_1|_{R=1}.$$

Пользуясь этим, получим:

$$\frac{\partial \frac{1}{r_1}}{\partial n} \Big|_{R=1} = z_0^2 \frac{z_0 - z}{r^3} \Big|_{R=1},$$

откуда

$$\frac{\partial \frac{1}{r}}{\partial n} \Big|_{R=1} + \frac{1}{z_0} \frac{\partial \frac{1}{r_1}}{\partial n} \Big|_{R=1} = \frac{1 - 2z z_0 + z_0^2}{r^3} \Big|_{R=1} = \frac{1}{r} \Big|_{R=1}. \quad (\text{XXI.13})$$

Для того чтобы закончить предварительные подсчеты, рассмотрим еще функцию

$$w = \lg(z_0 - z + r_1).$$

Докажем, что  $w$  — гармоническая функция. В самом деле,

$$\frac{\partial w}{\partial x} = \frac{x}{r_1(z_0 - z + r_1)}, \quad \frac{\partial w}{\partial y} = \frac{y}{r_1(z_0 - z + r_1)},$$

$$\frac{\partial w}{\partial z} = \frac{-1 + \frac{z - z_0}{r_1}}{z_0 - z + r_1} = -\frac{1}{r_1},$$

$$\frac{\partial^2 w}{\partial x^2} = \frac{(z' - z)(r_1^2 - x^2) + r_1^4 - 2r_1 x^2}{r_1^3(z_0 - z + r_1)^2}, \quad \frac{\partial^2 w}{\partial y^2} = \frac{(z_0 - z)(r_1^2 - y^2) + r_1^4 - 2r_1 y^2}{r_1^3(z_0 - z + r_1)^2},$$

$$\frac{\partial^2 w}{\partial z^2} = \frac{z - z_0}{r_1^3}, \quad \frac{\partial^2 w}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 w}{\partial y^2} = \frac{z_0 - z}{r_1^3}.$$

Отсюда следует  $\Delta w = 0$ .

Вычислим еще выражение для  $\frac{\partial w}{\partial n} \Big|_{R=1}$ . Мы будем иметь:

$$\begin{aligned} \frac{\partial w}{\partial n} \Big|_{R=1} &= \frac{x \cos(n, x) + y \cos(n, y) - (z_0 - z + r_1) \cos(n, z)}{r_1(z_0 - z + r_1)} \Big|_{R=1} = \\ &= -\frac{[r_1^2 - (z_0 - z)^2] - z(r_1 + z_0 - z)}{r_1(z_0 - z + r_1)} \Big|_{R=1} = -\frac{r_1 - z_0}{r_1} \Big|_{R=1} = \\ &= -1 + \frac{z_0}{r_1} \Big|_{R=1} = -1 + \frac{1}{z_0 r_1} \Big|_{R=1} = -1 + \frac{1}{r} \Big|_{R=1}. \quad (\text{XXI.14}) \end{aligned}$$

Пользуясь (XXI.12), (XXI.13) и (XXI.14), легко проверить, что функция Грина должна иметь вид

$$G_1 = \frac{1}{4\pi r} + \frac{1}{z_0} \frac{1}{4\pi r_1} - \frac{w}{4\pi} + \frac{R^2}{8\pi} + C,$$

где  $C$  — некоторая постоянная, определяемая из условия

$$\iiint_{R \leq 1} G_1 dx dy dz = 0.$$

Подсчет, который мы не будем здесь проводить подробнее, дает:

$$C = -\frac{z_0^2}{8\pi} - \frac{1}{4\pi} \ln z_0.$$

В связи с этим получим окончательно:

$$G_1 = \frac{1}{4\pi r} + \frac{1}{z_0} \frac{1}{4\pi r_1} - \frac{w}{4\pi} + \frac{R^2}{8\pi} - \frac{z_0^2}{8\pi} - \frac{1}{4\pi} \ln z_0.$$

Возвращаясь к обозначениям лекции XII, получим отсюда:

$$G_1 = \frac{1}{4\pi} \left\{ \frac{1}{\sqrt{R^2 - 2RR_0 \cos \gamma + R_0^2}} + \frac{1}{\sqrt{R^2 R_0^2 - 2RR_0 \cos \gamma + 1}} - \right. \\ \left. - \lg (1 - RR_0 \cos \gamma + \sqrt{R^2 R_0^2 - 2RR_0 \cos \gamma + 1}) + \frac{R^2}{2} - \frac{R_0^2}{2} \right\}.$$


---

# ЛЕКЦИЯ XXII

## КОРРЕКТНОСТЬ ПОСТАНОВКИ КРАЕВЫХ ЗАДАЧ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ

### § 1. Уравнение теплопроводности

В тех задачах, которые мы до сих пор рассматривали, самый метод решения в большинстве случаев давал ответ на вопрос о корректности постановки той или иной задачи. Однако в некоторых других задачах удобнее прежде установить корректность непосредственно.

Рассмотрим уравнение распространения тепла в ограниченной области  $\Omega$  пространства переменных  $(x, y, z)$  с граничной поверхностью  $S$  при наличии внутренних источников тепла с плотностью  $F(x, y, z)$ . Пусть  $u(x, y, z, t)$  — температура в точке  $(x, y, z)$  в момент времени  $t$ . Функция  $u$  удовлетворяет уравнению

$$\Delta u = \frac{\partial u}{\partial t} - F(x, y, z). \quad (\text{XXII.1})$$

Считая приток тепла везде неотрицательным, мы будем иметь:

$$F(x, y, z) = F(P) \geq 0. \quad (\text{XXII.2})$$

Пусть, кроме того, заданы следующие граничные и начальные условия:

$$\begin{aligned} u|_S &= f(Q, t), \\ u|_{t=0} &= \varphi(P), \end{aligned} \quad (\text{XXII.3})$$

где функции  $f$  и  $\varphi$  непрерывны, причем значения  $f$  при  $t = 0$  на границе  $S$  совпадают со значениями  $\varphi$ , где  $Q$  — точка на поверхности  $S$ , а  $P$  — точка области  $\Omega$ . Докажем следующую теорему.

**Т е о р е м а 1.** *Во все моменты времени из любого конечного отрезка  $0 \leq t_0 \leq T$  внутри области  $\Omega$  справедливо неравенство*

$$u(P_0, t_0) \geq \inf_{\substack{P \subset \Omega; Q \subset S, \\ 0 \leq t \leq t_0}} \min [f(Q, t), \varphi(P)]. \quad (\text{XXII.4})$$

Иными словами, наименьшее значение достигается функцией  $u$  или при  $t = 0$ , или на границе области  $\Omega$ .

Доказательство. Предположим противное. Пусть в точке  $P_0$  в момент времени  $t_0$  функция  $u$  принимает значение, меньшее по сравнению со всеми остальными ее значениями в области  $\Omega$  при  $t = 0$  или на поверхности  $S$  за промежуток времени  $0 \leq t \leq t_0$ . Тогда

$$u(P_0, t_0) - \inf_{\substack{P \in \Omega, Q \in S, \\ 0 \leq t \leq t_0}} \min [f(Q, t), \varphi(P)] = -\varepsilon_0 < 0.$$

Составим функцию

$$v(x, y, z, t) = u(x, y, z, t) - \frac{\varepsilon_0}{2} \frac{t_0 - t}{t_0}.$$

Функция  $v$  по-прежнему обладает тем свойством, что свое минимальное значение при  $0 \leq t \leq t_0$  она не принимает ни при  $t = 0$ , ни на границе области  $\Omega$ . Это следует уже из того, что ее значение в точке  $(P_0, t_0)$  по крайней мере на  $\frac{\varepsilon_0}{2}$  меньше минимума значений  $v(x, y, z, t)$  на границе  $\Omega$  и при  $t = 0$ , ибо

$$v(P_0, t_0) = u(P_0, t_0), \quad v|_S \geq u|_S - \frac{\varepsilon_0}{2}, \quad v|_{t=0} = u|_{t=0} - \frac{\varepsilon_0}{2}.$$

Функция  $v$  должна принимать наименьшее значение где-то внутри четырехмерной области  $\{\Omega, 0 \leq t \leq t_0\}$  или при  $t = t_0$ . Теперь уже легко убедиться, что сделанное нами допущение приводит к противоречию. Если бы минимум  $v$  лежал внутри  $\Omega$  при  $t < t_0$ , то в этой точке обращались бы в нуль первые производные от  $v$  по пространственным координатам и времени, а вторые производные

$$\frac{\partial^2 v}{\partial x^2}, \quad \frac{\partial^2 v}{\partial y^2}, \quad \frac{\partial^2 v}{\partial z^2}$$

были бы неотрицательны. Следовательно, выражение

$$\Delta v = \frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial z^2}$$

было бы также неотрицательно. С другой стороны,

$$\begin{aligned} \Delta v &= \Delta u, \\ \frac{\partial v}{\partial t} &= \frac{\partial u}{\partial t} + \frac{\varepsilon_0}{2t_0}, \\ \Delta v - \frac{\partial v}{\partial t} &= \Delta u - \frac{\partial u}{\partial t} - \frac{\varepsilon_0}{2t_0} < 0. \end{aligned}$$

Таким образом, неотрицательное число оказывается равным отрицательному. Полученное противоречие указывает на неправильность нашего предположения.

Остается рассмотреть случай, когда  $v$  достигает минимума при  $t = t_0$ . Производная  $\frac{\partial v}{\partial t}$  в точке минимума, очевидно, не может быть положительной, ибо иначе при меньших значениях в той же точке функция  $v$  принимала бы меньшие значения и мы не имели бы минимума. С другой стороны, как и выше, в этой точке имеет место неравенство

$$\Delta v \geq 0.$$

Повторяя прежние рассуждения, приходим к абсурдному выводу, что неотрицательное выражение

$$\Delta v - \frac{\partial v}{\partial t}$$

должно быть меньше нуля. Значит, этот случай также невозможен. Теорема доказана.

Меняя знак у функций  $u$ ,  $f$ ,  $\varphi$  и  $F$ , получим

**С л е д с т в и е 1.** Если в уравнении (XXII.4) функция  $F$  удовлетворяет неравенству

$$F(x, y, z) \leq 0,$$

то функция  $u$  достигает своего максимального значения либо при  $t = 0$ , либо на границе  $S$  области  $\Omega$ .

**С л е д с т в и е 2.** Функция  $u(x, y, z, t)$ , удовлетворяющая в области  $\Omega$  при  $0 \leq t \leq T$  однородному уравнению теплопроводности, принимает как свое максимальное, так и минимальное значение при  $t = 0$  или на границе  $S$  области  $\Omega$ .

Из приведенных рассуждений вытекает единственность решения уравнения теплопроводности при условиях (XXII.3) и непрерывная зависимость порядка  $(0, 0)$  этого решения от правых частей граничных и начальных условий, т. е. корректность постановки нашей краевой задачи.

В самом деле, если бы мы имели два каких-либо решения задачи, то их разность, удовлетворяя однородному уравнению, обращалась бы в нуль как при  $t = 0$ , так и на поверхности  $S$ . Но тогда по доказанной теореме и максимум и минимум этой разности были бы равны нулю. Следовательно, и сама эта разность равнялась бы нулю. Значит, двух разных решений наша задача иметь не может.

Подобным образом устанавливается и корректность. Если разность функций, задающих начальные и краевые условия, по абсолютной величине не превосходит некоторое положительное число  $\varepsilon$ , то и разность соответствующих решений, как решение однородного уравнения теплопроводности с малыми краевыми значениями, также будет по абсолютной величине не превосходить  $\varepsilon$ .

**Т е о р е м а 2.** Решение уравнения (XXII.1) непрерывно зависит не только от условий (XXII.3), но и от свободного члена

уравнения (XXII.1). Более точно: если при  $0 \leq t \leq t_0$  значения функций  $f$  и  $\varphi$  меньше  $\frac{\varepsilon_0}{2}$ , а функция  $F$  удовлетворяет неравенству

$$F \leq \frac{\varepsilon_0}{2t_0},$$

то при  $0 \leq t \leq t_0$  решение уравнения (XXII.1) удовлетворяет неравенству

$$u < \varepsilon_0.$$

**Доказательство.** Допустим, что в точке  $(P_0, t)$  решение нашей задачи принимает значение, превосходящее  $\varepsilon_0$ . Составим функцию

$$v = u + \frac{\varepsilon_0}{2} \frac{t_0 - t}{t_0}.$$

Эта функция должна иметь максимум внутри  $\Omega$  при  $0 < t < t_0$ . Однако, составляя для нее опять выражение

$$\Delta v - \frac{\partial v}{\partial t},$$

убеждаемся в том, что оно положительно везде в области  $\Omega$  при  $0 < t < t_0$ , что противоречит условию существования максимума.

**Следствие 1.** Меняя на обратный знак неравенств, относящихся к  $\varphi$ ,  $f$ ,  $F$ , т. е. предполагая выполненными условия

$$\varphi > -\frac{\varepsilon_0}{2}, \quad f > -\frac{\varepsilon_0}{2}, \quad F > -\frac{\varepsilon_0}{2t_0},$$

получим для функции  $u$  неравенство

$$u > -\varepsilon_0.$$

Таким образом, окончательно имеем

**Следствие 2.** При условиях

$$|\varphi| < \frac{\varepsilon_0}{2}, \quad |f| < \frac{\varepsilon_0}{2}, \quad |F| < \frac{\varepsilon_0}{2t_0}$$

в промежутке  $0 < t < t_0$  для всех  $P \in \Omega$  имеет место неравенство

$$|u| < \varepsilon_0.$$

## § 2. Понятие обобщенного решения

Во многих задачах математической физики, с которыми мы встретимся, существование решения устанавливается лишь при значительных ограничениях на краевые условия. Мы введем одно понятие, которое позволит нам не заниматься далее этими вопросами.

Пусть мы имеем три последовательности непрерывных функций:

$$F_n, \quad \varphi_n \quad \text{и} \quad f_n,$$

равномерно сходящиеся соответственно к непрерывным функциям  $F$ ,  $\varphi$  и  $f$ , и пусть уравнение

$$\Delta u_n - \frac{\partial u_n}{\partial t} = F_n$$

при условиях

$$u_n|_{t=0} = \varphi_n, \quad u_n|_S = f_n$$

имеет решение  $u_n$  (по доказанному такое решение единственно). Разность

$$u_m - u_n$$

на основании теоремы 2 этой лекции, по абсолютной величине сколь угодно мала, если  $m$  и  $n$  достаточно велики. Значит, последовательность  $u_n$  равномерно сходится к функции  $u$ , удовлетворяющей нашим предельным условиям.

О сходимости производных от  $u$  мы ничего не знаем, и поэтому мы не можем утверждать, что предельная функция удовлетворяет уравнению

$$\Delta u - \frac{\partial u}{\partial t} = F. \quad (\text{XXII.5})$$

Будем называть функцию  $u$  *обобщенным решением уравнения (XXII.5)* при заданных начальных и краевых условиях.

Такое обобщенное решение единственно, ибо не может существовать двух таких последовательностей  $u_n$  и  $u_n^{(1)}$ , у которых функции  $f_n$  и  $f_n^{(1)}$ ,  $\varphi_n$  и  $\varphi_n^{(1)}$ ,  $F_n$  и  $F_n^{(1)}$  стремились бы соответственно к одному пределу, а сами последовательности — к различным пределам, потому что при этом последовательность

$$u_1, u_1^{(1)}, u_2, u_2^{(1)}, \dots, u_n, u_n^{(1)}, \dots$$

расходилась бы, что невозможно.

Вместо того, чтобы ставить задачу об отыскании истинного решения, практически достаточно решать задачу об отыскании обобщенного решения. Действительно, в физических задачах нам неизвестны точные величины  $f$ ,  $\varphi$  и  $F$ . Те их значения, которые мы берем, не являются точными, а лишь мало отличаются от точных. Поэтому обобщенное решение, даже если оно не является истинным, мало будет отличаться от последнего.

Мы говорили сейчас об обобщенном решении уравнения теплопроводности. То же самое относится, однако, и к уравнению Пуассона, рассмотренному выше.

Так же, как и в случае уравнения теплопроводности, мы можем определить обобщенное решение уравнения

$$\Delta u = \rho$$

при условиях

$$u|_S = \varphi$$

или

$$\frac{\partial u}{\partial n} \Big|_S = \psi,$$

как предел решений уравнения  $\Delta u = \rho_n$  при условиях

$$u|_S = \varphi_n$$

или

$$\frac{\partial u}{\partial n} \Big|_S = \psi_n,$$

если  $\rho_n \rightarrow \rho$ ,  $\varphi_n \rightarrow \varphi$ ,  $\psi_n \rightarrow \psi$ , причем сходимость равномерная.

Приведем пример существования такого обобщенного решения.

Пример 1. Пусть

$$\Delta u = \frac{x^2 - y^2}{R^2} \left[ \frac{5}{\ln R} - \frac{1}{(\ln R)^2} \right], \quad (\text{XXII.6})$$

где

$$R = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}.$$

Докажем, что при  $R \leq \frac{1}{2}$  функция

$$u_0 = (x^2 - y^2) \ln |\ln R|$$

будет обобщенным решением уравнения (XXII.6) при граничном условии

$$u \Big|_{R=\frac{1}{2}} = u_0 \Big|_{R=\frac{1}{2}}.$$

В самом деле, положим:

$$u_h = (x^2 - y^2) \ln |\ln R_h|,$$

где  $R_h = \sqrt{R^2 + \delta_k}$ ,  $\delta_k \rightarrow +0$  при  $k \rightarrow \infty$ . Вычисляя  $\Delta u_h$ , получим:

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 u_h}{\partial x^2} &= 2 \ln |\ln R_h| + \frac{4x^2}{R_h^2 \ln R_h} + \\ &+ (x^2 - y^2) \left[ \frac{1}{R_h^2 \ln R_h} - \frac{2x^2}{R_h^4 \ln R_h} - \frac{x^2}{R_h^4 (\ln R_h)^2} \right], \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 u_h}{\partial y^2} &= -2 \ln |\ln R_h| - \frac{4y^2}{R_h^2 \ln R_h} + \\ &+ (x^2 - y^2) \left[ \frac{1}{R_h^2 \ln R_h} - \frac{2y^2}{R_h^4 \ln R_h} - \frac{y^2}{R_h^4 (\ln R_h)^2} \right], \end{aligned}$$

$$\frac{\partial^2 u_h}{\partial z^2} = (x^2 - y^2) \left[ \frac{1}{R_h^2 \ln R_h} - \frac{2z^2}{R_h^4 \ln R_h} - \frac{z^2}{R_h^4 (\ln R_h)^2} \right],$$

отсюда

$$\Delta u_k = \frac{x^2 - y^2}{R_k^2} \left[ \frac{5}{\ln R_k} - \frac{1}{(\ln R_k)^2} \right] + \delta_k \frac{x^2 - y^2}{R_k^2} \left[ \frac{2}{\ln R_k} + \frac{1}{(\ln R_k)^2} \right].$$

Последовательность  $u_k$ , очевидно, равномерно сходится к функции  $u_0$  при  $k \rightarrow \infty$ . Вместе с тем при  $R \leq \frac{1}{2}$  и последовательность  $\Delta u_k$  равномерно сходится к правой части уравнения (XXII.6). Действительно, при  $R < r$  и достаточно малом положительном  $\delta_k$  как  $\Delta u_k$ , так и функция

$$\frac{x^2 - y^2}{R^2} \left[ \frac{5}{\ln R} - \frac{1}{(\ln R)^2} \right]$$

будут сколь угодно малы, если  $r$  достаточно мало, а при  $r \leq R \leq \frac{1}{2}$  равномерная сходимостъ очевидна.

Следовательно,  $u_0$  есть обобщенное решение уравнения (XXII.6). Однако в точке  $(0, 0, 0)$  вторые производные от  $u_0$  не имеют смысла.

Решения уравнения (XXII.6) с граничными условиями

$$u \Big|_{R=\frac{1}{2}} = u_0 \Big|_{R=\frac{1}{2}}$$

не существует.

Заметим предварительно, что  $u_0$  удовлетворяет уравнению (XXII.6) в обычном смысле всюду в рассматриваемом круге, кроме точки  $(0, 0, 0)$ .

Если бы  $u$  было решением поставленной задачи, то разность  $u - u_0$  должна была бы быть функцией, гармонической везде, кроме, быть может, начала координат, везде непрерывной и на границе области должна была бы равняться нулю. Однако мы видели ранее, что непрерывная функция, гармоническая всюду, кроме, быть может, одной точки, есть гармоническая функция и в этой точке.

В силу этой теоремы разность  $u - u_0$  есть гармоническая функция, равная нулю на поверхности шара, т. е. нуль. Значит, единственным возможным решением нашей задачи является функция  $u_0$ . Так как она не удовлетворяет уравнению (XXII.6) в начале координат, то наша задача вообще не имеет решения.

Взяв теперь уравнение теплопроводности с той же правой частью, что (XXII.6):

$$\Delta u - \frac{\partial u}{\partial t} = \frac{x^2 - y^2}{R^2} \left[ \frac{5}{\ln R} - \frac{1}{(\ln R)^2} \right],$$

и опять решая его при условиях

$$u \Big|_{R=\frac{1}{2}} = u_0 \Big|_{R=\frac{1}{2}}, \quad u|_{t=0} = u_0,$$

мы не сможем найти решения этого уравнения.

Обобщенным решением будет при этом служить опять функция  $u_0$ .

Можно доказать, что непрерывная функция, удовлетворяющая однородному уравнению теплопроводности везде, кроме одной точки  $(x_0, y_0, z_0)$ , при всех значениях времени, будет удовлетворять этому уравнению повсюду, включая эту точку. Пользуясь этим и повторяя рассуждения, проведенные нами при исследовании уравнения Пуассона, убеждаемся, что задача решения не имеет.

### § 3. Волновое уравнение

Займемся теперь изучением волнового уравнения

$$\Delta u - \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = F \quad (\text{XXII.7})$$

и будем рассматривать его решение в области  $\Omega$ , ограниченной поверхностью  $S$  при начальных условиях:

$$\begin{aligned} u|_{t=0} &= \varphi(P), \\ \frac{\partial u}{\partial t} \Big|_{t=0} &= \psi(P) \end{aligned} \quad (\text{XXII.8})$$

и при условиях на границе:

$$\frac{\partial u}{\partial n} \Big|_S = f(S). \quad (\text{XXII.9})$$

Без всяких изменений наше рассуждение переносится и на тот случай, когда вместо (XXII.9) на границе задана сама неизвестная функция.

Относительно функции  $u$  мы будем предполагать, что внутри  $\Omega$  она имеет непрерывные производные до 2-го порядка включительно, причем первые производные непрерывны в замкнутой области  $\Omega$ .

Без ограничения общности можно всегда считать, что

$$\varphi = 0, \quad \psi = 0, \quad f = 0.$$

Если бы это было не так, то, взяв вместо  $u$  новую неизвестную функцию  $v$  по формуле

$$v = u - w,$$

где  $w$  какая-нибудь функция, удовлетворяющая условиям (XXII.8) и (XXII.9), мы сразу получили бы однородные условия для  $v$ .

Рассмотрим интеграл

$$K_1(t) = \int \int_{\Omega} \left[ \left( \frac{\partial u}{\partial x} \right)^2 + \left( \frac{\partial u}{\partial y} \right)^2 + \left( \frac{\partial u}{\partial z} \right)^2 + \left( \frac{\partial u}{\partial t} \right)^2 \right] dx dy dz.$$

Вычисляя  $\frac{dK_1(t)}{dt}$ , мы получим, используя уравнение (XXII.7),

$$\begin{aligned} \frac{dK_1}{dt} &= 2 \int \int \int_{\Omega} \left[ \frac{\partial u}{\partial x} \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial t} + \frac{\partial u}{\partial y} \frac{\partial^2 u}{\partial y \partial t} + \frac{\partial u}{\partial z} \frac{\partial^2 u}{\partial z \partial t} + \frac{\partial u}{\partial t} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} \right] dx dy dz = \\ &= 2 \int \int \int_{\Omega} \left[ \left( \frac{\partial u}{\partial x} \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial t} + \frac{\partial u}{\partial t} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \right) + \left( \frac{\partial u}{\partial y} \frac{\partial^2 u}{\partial y \partial t} + \frac{\partial u}{\partial t} \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right) + \right. \\ &\quad \left. + \left( \frac{\partial u}{\partial z} \frac{\partial^2 u}{\partial z \partial t} + \frac{\partial u}{\partial t} \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} \right) - F \frac{\partial u}{\partial t} \right] dx dy dz = \\ &= 2 \int \int \int_{\Omega} \left[ \frac{\partial}{\partial x} \left( \frac{\partial u}{\partial t} \frac{\partial u}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left( \frac{\partial u}{\partial t} \frac{\partial u}{\partial y} \right) + \right. \\ &\quad \left. + \frac{\partial}{\partial z} \left( \frac{\partial u}{\partial t} \frac{\partial u}{\partial z} \right) - F \frac{\partial u}{\partial t} \right] dx dy dz = \\ &= -2 \int_S \frac{\partial u}{\partial t} \frac{\partial u}{\partial n} dS - 2 \int \int \int_{\Omega} F \frac{\partial u}{\partial t} dx dy dz. \end{aligned}$$

В силу того, что по нашему предположению  $\frac{\partial u}{\partial n} \Big|_S = 0$ , получим:

$$\frac{dK_1}{dt} = -2 \int \int \int_{\Omega} F \frac{\partial u}{\partial t} dx dy dz. \quad (\text{XXII.10})$$

Пользуясь очевидным неравенством

$$|ab| \leq \frac{1}{2} a^2 + \frac{1}{2} b^2,$$

перепишем (XXII.10) в виде

$$\frac{dK_1}{dt} \leq \int \int \int_{\Omega} F^2 dx dy dz + \int \int \int_{\Omega} \left( \frac{\partial u}{\partial t} \right)^2 dx dy dz$$

или, еще усиливая неравенство,

$$\frac{dK_1}{dt} \leq \int \int \int_{\Omega} F^2 dx dy dz + K_1.$$

Если положить

$$\int \int \int_{\Omega} F^2 dx dy dz = A(t),$$

то

$$\begin{aligned} \frac{dK_1}{dt} - K_1 &\leq A(t), \\ \frac{d(e^{-t} K_1)}{dt} &\leq e^{-t} A(t). \end{aligned} \quad (\text{XXII.11})$$

Следовательно,

$$\left. \begin{aligned} e^{-t} K_1(t) &\leq K_1(0) + \int_0^t e^{-t_1} A(t_1) dt_1, \\ K_1(t) &\leq e^t K_1(0) + \int_0^t e^{t-t_1} A(t_1) dt_1. \end{aligned} \right\} \quad (\text{XXII.12})$$

Отсюда сразу следует, что если только  $K_1(0) = 0$ , то на любом фиксированном конечном промежутке изменения  $t$  величина  $K_1(t)$  сколь угодно мала, коль скоро функция  $A(t)$  достаточно мала.

Заметим еще, что, положив

$$K_0(t) = \iiint_{\Omega} u^2 dx dy dz,$$

будем иметь:

$$\frac{dK_0(t)}{dt} = 2 \iiint_{\Omega} u \frac{\partial u}{\partial t} dx dy dz \leq K_0(t) + K_1(t),$$

т. е.

$$\frac{dK_0(t)}{dt} - K_0(t) \leq K_1(t). \quad (\text{XXII.13})$$

Из этого неравенства, так же как и выше, следует:

$$K_0(t) \leq e^t K_0(0) + \int_0^t e^{t-t_1} K_1(t_1) dt_1. \quad (\text{XXII.14})$$

При  $K_0(0) = K_1(0) = 0$  вместе с  $K_1(t)$  будет малой также  $K_0(t)$ . Из полученных оценок (XXII.12) и (XXII.14) можно вывести ряд следствий.

**Т е о р е м а 3.** Пусть последовательность функций  $u_n$  удовлетворяет уравнениям

$$\Delta u_n - \frac{\partial^2 u_n}{\partial t^2} = F_n$$

и условиям

$$u_n|_{t=0} = \frac{\partial u_n}{\partial t} \Big|_{t=0} = 0, \quad (\text{XXII.15})$$

$$\frac{\partial u}{\partial n} \Big|_S = 0, \quad (\text{XXII.16})$$

и пусть функции  $F_n$  удовлетворяют условию

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^T \left[ \iiint_{\Omega} F_n^2 dx dy dz \right] dt = 0.$$

Тогда для всех значений  $t$ , таких, что

$$0 \leq t \leq T,$$

имеют место равенства

$$\lim_{n \rightarrow \infty} K_0(t) = 0,$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} K_1(t) = 0.$$

**Доказательство.** Усиливая неравенства (XXII 12) и (XXII.14), мы получим:

$$K_1(t) \leq e^T \int_0^T A(t_1) dt_1, \quad (\text{XXII.17})$$

$$K_0(t) \leq e^T \int_0^T K_1(t_1) dt_1 \leq e^{2T} T \int_0^T A(t_1) dt_1; \quad (\text{XXII 18})$$

из (XXII.17) и (XXII 18) сразу следует наша теорема.

Из доказанной теоремы следует непрерывная зависимость решения от правой части уравнения в среднем порядка (0, 1) (ср. стр. 36). Если мы будем сравнивать между собою два решения уравнений

$$\Delta u_1 - \frac{\partial^2 u_1}{\partial t^2} = F_1 \text{ и } \Delta u_2 - \frac{\partial^2 u_2}{\partial t^2} = F_2, \quad (\text{XXII 19})$$

при однородных условиях (XXII 15) и (XXII.16), для которых разность  $F_1 - F_2$  достаточно мала в среднем, т. е. интеграл  $\iiint_{\Omega} (F_1 - F_2)^2 dx dy dz$  достаточно мал при всех  $t$ , то хотя мы и не можем утверждать, что эти решения везде мало отличаются одно от другого, тем не менее разность  $u_1 - u_2$  со своими производными 1-го порядка будет для любых моментов времени сколь угодно мала в среднем, т. е.

$$\iiint_{\Omega} (u_1 - u_2)^2 dx dy dz < \epsilon,$$

$$\iiint_{\Omega} \left[ \left( \frac{\partial u_1}{\partial x} - \frac{\partial u_2}{\partial x} \right)^2 + \left( \frac{\partial u_1}{\partial y} - \frac{\partial u_2}{\partial y} \right)^2 + \left( \frac{\partial u_1}{\partial z} - \frac{\partial u_2}{\partial z} \right)^2 + \left( \frac{\partial u_1}{\partial t} - \frac{\partial u_2}{\partial t} \right)^2 \right] dx dy dz < \epsilon.$$

Пусть требуется сравнить между собой решения двух уравнений

$$\Delta u_1 - \frac{\partial^2 u_1}{\partial t^2} = F_1, \quad \Delta u_2 - \frac{\partial^2 u_2}{\partial t^2} = F_2 \quad (\text{XXII.20})$$

с условиями

$$\begin{aligned} u_1|_{t=0} &= \varphi_1; & u_2|_{t=0} &= \varphi_2; \\ \frac{\partial u_1}{\partial t}|_{t=0} &= \psi_1; & \frac{\partial u_2}{\partial t}|_{t=0} &= \psi_2; \\ \frac{\partial u_1}{\partial n}|_S &= f_1; & \frac{\partial u_2}{\partial n}|_S &= f_2, \end{aligned}$$

причем  $\varphi_1, \varphi_2$  имеют непрерывные производные до 2-го порядка, а  $\psi_1, \psi_2, f_1, f_2$  — непрерывные производные 1-го порядка. Допустим, что эти функции близки между собой в том смысле, что имеют место следующие неравенства:

$$\begin{aligned} |\varphi_1 - \varphi_2| &< \delta, \quad \left| \frac{\partial \varphi_1}{\partial x_i} - \frac{\partial \varphi_2}{\partial x_i} \right| < \delta, \quad \left| \frac{\partial^2 \varphi_1}{\partial x_i \partial x_j} - \frac{\partial^2 \varphi_2}{\partial x_i \partial x_j} \right| < \delta; \\ |\psi_1 - \psi_2| &< \delta, \quad \left| \frac{\partial \psi_1}{\partial x_i} - \frac{\partial \psi_2}{\partial x_i} \right| < \delta; \quad |f_1 - f_2| < \delta, \quad \left| \frac{\partial f_1}{\partial x_j} - \frac{\partial f_2}{\partial x_j} \right| < \delta; \\ |F_1 - F_2| &< \delta \\ (x_1 = x, \quad x_2 = y, \quad x_3 = z). \end{aligned}$$

Можно доказать, что, приводя эти задачи к задачам с однородными условиями, мы получим опять два уравнения вида (XXII.20) с близкими правыми частями и, следовательно, решения их будут близки в среднем для любых значений  $t$  из конечного промежутка.

Так же как и для уравнения теплопроводности, легко доказать единственность решения уравнения (XXII.7) с произвольными начальными условиями (XXII.8). В самом деле, для этого достаточно доказать, что однородное уравнение с однородными условиями имеет только тривиальное решение, тождественно равное нулю. Последнее вытекает из того, что, как мы видели, интеграл квадрата такого решения равен нулю.

Наконец, так же как и в прошлых задачах, вопрос о существовании решения представляет значительные трудности, которые, как можно показать, даже отчасти превосходят соответствующие трудности в уравнении Лапласа и уравнении теплопроводности. Избежать этих трудностей можно, введя понятие об обобщенных решениях.

#### § 4. Обобщенные решения волнового уравнения

Сделаем предварительно некоторые замечания. Рассмотрим функцию  $u(x, y, z, t)$  четырех независимых переменных — трех координат произвольной точки из некоторой области  $\Omega$  и  $t$ , интегрируемую с квадратом по  $x, y, z$  для любого значения  $t$  из некоторого промежутка. Мы будем говорить, что функция  $u(x, y, z, t)$

непрерывна в среднем по переменному  $t$  в точке  $t_0$ , если величина

$$\left\{ \iiint_{\Omega} [u(x, y, z, t_0 + h) - u(x, y, z, t_0)]^2 dx dy dz \right\}^{1/2}$$

может быть сделана сколь угодно малой при достаточно малом  $|h|$ . Функцию, непрерывную в среднем в каждой точке промежутка  $\alpha \leq t \leq \beta$ , мы будем называть непрерывной в среднем на этом промежутке. Введем одно сокращенное обозначение. Для всякой функции переменных  $x, y, z$ , заданной в области  $\Omega$  и имеющей интегрируемый квадрат, величину

$$\left[ \iiint_{\Omega} u^2(x, y, z) dx dy dz \right]^{1/2}$$

мы будем называть *нормой функции*  $u$  и обозначать  $\|u\|$ .

На основании неравенства Минковского (см. ниже, § 6)

$$\|u + v\| \leq \|u\| + \|v\|.$$

Если  $\|u\| = 0$ , то функция  $u$ , как показано в § 7 лекции VI, почти всюду в  $\Omega$  обращается в нуль. Для любой постоянной  $a$  имеет место очевидное равенство

$$\|au\| = |a| \|u\|.$$

Эти свойства нормы будут нужны нам в дальнейшем. Пользуясь новым обозначением, определение непрерывности в среднем можно переформулировать следующим образом: функция  $u(x, y, z, t)$  называется непрерывной в среднем в точке  $t_0$ , если каково бы ни было положительное число  $\varepsilon$ , можно указать такое положительное число  $\eta(\varepsilon)$ , что

$$\|u(t + h) - u(t)\| < \varepsilon$$

как только  $|h| < \eta(\varepsilon)$  (аргументы  $x, y, z$  у функции  $u$  опущены для краткости).

Последовательность функций

$$u_n(x, y, z, t) \quad (n = 1, 2, \dots)$$

мы будем называть *равномерно сходящейся в среднем* к функции  $u_0(x, y, z, t)$ , если неравенство

$$\|u_n - u_0\| = \left\{ \iiint_{\Omega} [u_n(x, y, z, t) - u_0(x, y, z, t)]^2 dx dy dz \right\}^{1/2} < \varepsilon$$

справедливо для всех  $t$  из заданного промежутка, как только

$$n \geq N(\varepsilon).$$

Имеет место следующая

**Т е о р е м а 4** *Предел равномерно сходящейся в среднем последовательности функций  $u_n(x, y, z, t)$ ,  $n = 1, 2, \dots$ , каждая из которых непрерывна в среднем, есть также непрерывная в среднем функция.*

Мы докажем эту теорему точно таким же образом, каким она доказывается для обычных непрерывных функций в математическом анализе. Пусть задано положительное число  $\varepsilon$ . Выберем  $N$  столь большим, чтобы имело место неравенство

$$\|u_n(t) - u_0(t)\| < \frac{\varepsilon}{3} \quad (\text{XXII.21})$$

при всех  $t$  из заданного промежутка, как только  $n \geq N$ . Функция  $u_n(x, y, z, t)$  по условию теоремы непрерывна в среднем в любой точке  $t_0$ . Следовательно, при  $|h| < \eta$

$$\|u_n(t+h) - u_n(t)\| < \frac{\varepsilon}{3}. \quad (\text{XXII.22})$$

Из (XXII.21) и (XXII.22), пользуясь неравенством Минковского, получим:

$$\begin{aligned} \|u_0(t+h) - u_0(t)\| &\leq \|u_0(t+h) - u_n(t+h)\| + \|u_0(t) - u_n(t)\| + \\ &\quad + \|u_n(t+h) - u_n(t)\| < \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} = \varepsilon. \end{aligned}$$

Следовательно, при указанном выборе  $h$

$$\|u_0(t+h) - u_0(t)\| < \varepsilon.$$

Теорема доказана.

Будем говорить, что функция  $u$ , интегрируемая со своим квадратом в некоторой области  $\Omega$ , есть предел в среднем для последовательности  $u_n$ , если

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \iiint_{\Omega} (u_n - u)^2 dx dy dz = 0.$$

Мы будем называть *обобщенным решением уравнения (XXII.7) при условиях (XXII.15) и (XXII.16) функцию  $u$ , являющуюся пределом в среднем для последовательности функций  $u_n$ , удовлетворяющих уравнениям*

$$\Delta u_n - \frac{\partial^2 u_n}{\partial t^2} = F_n$$

и условиям (XXII.15) и (XXII.16), где последовательность  $F_n$  сходится в среднем к  $F$ .

Из оценок теоремы 3 следует важный результат: если последовательность  $F_n(x, y, z, t)$  сходится в среднем равномерно по  $t$ , то и последовательность решений  $u_n(x, y, z, t)$  сходится в среднем равномерно по  $t$ .

Подобно тому, как мы делали это выше (см., например, лекцию XVIII), будем считать две функции  $u^{(1)}$  и  $u^{(2)}$  эквивалентными, если

$$\iiint_{\Omega} (u^{(1)} - u^{(2)})^2 dx dy dz = 0^1).$$

Обобщенное решение единственно, ибо последовательность  $u_n$  не может иметь двух пределов в среднем, иначе мы имели бы для этих разных пределов  $u^{(1)}$  и  $u^{(2)}$  неравенство

$$\begin{aligned} \iiint_{\Omega} (u^{(1)} - u^{(2)})^2 dx dy dz &\leq \\ &\leq \iiint_{\Omega} [(u^{(1)} - u_n) + (u_n - u^{(2)})]^2 dx dy dz \leq \\ &\leq 2 \iiint_{\Omega} (u^{(1)} - u_n)^2 dx dy dz + 2 \iiint_{\Omega} (u^{(2)} - u_n)^2 dx dy dz \leq 4\varepsilon \end{aligned}$$

и  $u^{(1)}$  и  $u^{(2)}$  совпали бы.

Существование обобщенного решения можно установить, пользуясь одной теоремой из теории функций вещественного переменного, которая носит название теоремы Фишера—Рисса.

Эта теорема гласит:

*Если последовательность  $u_1, u_2, \dots, u_n, \dots$  функций, интегралы от квадратов которых существуют, обладает тем свойством, что для всех достаточно больших  $m$  и  $n$*

$$\iiint_{\Omega} (u_m - u_n)^2 dx dy dz < \varepsilon,$$

*то существует предел в среднем этой последовательности, т. е. такая функция  $u$ , что*

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \iiint_{\Omega} (u_n - u)^2 dx dy dz = 0.$$

Доказательство этой теоремы мы приведем в конце лекции.

Покажем, каким образом можно применить теорему Фишера—Рисса для доказательства существования обобщенных решений волнового уравнения. Пусть  $u_n(x, y, z, t)$  — решение уравнения (XXII.7), удовлетворяющее условиям (XXII.15) и (XXII.16). Рассмотрим выражение

$$\|u_m(t) - u_n(t)\|.$$

<sup>1)</sup> Как мы видели выше (теорема 24 лекции VI), при этом они могут отличаться друг от друга лишь на множестве меры нуль.

Функция  $v_{m,n} \equiv u_m(t) - u_n(t)$  представляет собой решение уравнения

$$\Delta v_{m,n} - \frac{\partial^2 v_{m,n}}{\partial t^2} = F_m - F_n.$$

В силу равномерной сходимости в среднем  $F_n$  к функции  $F$  мы будем иметь  $\|F_m(t) - F_n(t)\| < \eta$  при достаточно больших  $m$  и  $n$  и любом  $\eta > 0$ . Как мы видели, отсюда следует, что  $\|v_{m,n}\| < \varepsilon$ , где  $\varepsilon$  — любое положительное число. По теореме Фишера—Рисса последовательность  $u_n(x, y, z, t)$  сходится в среднем равномерно к некоторой предельной функции, которая в силу теоремы 4 будет непрерывна в среднем, что и требовалось доказать.

В примерах, которые мы рассматривали в прошлых параграфах, оказывалось, что обобщенные решения уравнений Лапласа, Пуассона и уравнения теплопроводности имеют непрерывные первые производные. Мы вскоре убедимся, что это обстоятельство не является случайным.

В противоположность этим задачам обобщенные решения волнового уравнения могут уже не быть непрерывны с первыми производными. Выяснение обстоятельств, при которых это имеет место, заняло бы слишком много времени, и мы не будем этим заниматься.

В заключение этого параграфа приведем один простой пример.

**Пример 2.** Возьмем за область  $\Omega$  шар радиуса 1. Пусть  $\psi(\xi)$  — некоторая функция, заданная в промежутке  $-\infty < \xi < +\infty$ . Рассмотрим функцию

$$u_0 = \frac{\psi(t+r) - \psi(t-r)}{r}, \quad (\text{XXII.23})$$

где  $r$  есть расстояние от переменной точки до начала координат. При  $r \neq 0$  функция  $u_0$  имеет столько же производных, как и функция  $\psi$ . При  $r = 0$  число производных, которыми обладает  $u_0$ , на единицу меньше числа производных у  $\psi$ . Это нетрудно установить дифференцированием для производных по пространственным координатам  $x, y, z$ , а для производных по времени это обстоятельство непосредственно очевидно. В самом деле,

$$\frac{\partial^k u_0}{\partial t^k} = \frac{1}{r} [\psi^{(k)}(t+r) - \psi^{(k)}(t-r)].$$

Эта функция имеет определенный смысл при  $r = 0$  только в том случае, если существует

$$\lim_{r \rightarrow 0} \frac{1}{r} [\psi^{(k)}(t+r) - \psi^{(k)}(t-r)] = 2\psi^{(k+1)}(t).$$

Следовательно, для существования непрерывной при  $r = 0$  производной  $\frac{\partial^k u_0}{\partial t^k}$  необходимо (и достаточно), чтобы существовала не-

прерывная производная  $\psi^{(k-1)}$ . Дифференцированием легко убедиться, что  $u_0$  есть решение уравнения

$$\Delta u_0 - \frac{\partial^2 u_0}{\partial t^2} = 0,$$

если  $\psi$  имеет непрерывные третьи производные. Пусть теперь функция  $\psi$  из формулы (XII.23) дифференцируема один раз или не имеет вовсе производной. При этом можно установить, что  $u_0$  все же останется обобщенным решением.

К этой функции будет сходиться последовательность решений

$$u_n = \frac{\psi_n(r+t) - \psi_n(r-t)}{r},$$

если последовательность трижды непрерывно дифференцируемых функций  $\psi_n$  сходится к  $\psi$ .

Если в некоторой точке  $\xi = t_0$  функция  $\psi(\xi)$  не имеет производной, то  $u_0$  будет терпеть разрыв в точке  $r = 0, t = t_0$ . Функция  $u$ , удовлетворяющая условиям

$$u|_S = u_0|_S, \quad u|_{t=0} = u_0|_{t=0}, \quad \frac{\partial u}{\partial t}|_{t=0} = \frac{\partial u_0}{\partial t}|_{t=0}$$

и уравнению

$$\Delta u - \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = 0,$$

при этом вообще не существует.

Действительно, если бы такое решение существовало, то по свойству непрерывной зависимости решения от начальных данных к нему должна была бы стремиться последовательность  $u_n$ , а это невозможно, так как последовательность сходится к функции  $u_0$ .

Существует еще другой подход к обобщенным решениям, позволяющий определить их непосредственно, не прибегая к помощи предельного перехода.

Если  $u_n$  есть некоторое решение уравнения

$$Lu_n = F_n,$$

а  $\psi$  — совершенно произвольная функция, имеющая непрерывные производные до 2-го порядка и отличная от нуля лишь в некоторой внутренней части  $\sigma$  области  $\Omega$ , то

$$\iiint_{\Omega} (\psi F_n - u_n M \psi) d\Omega = 0.$$

Внеинтегральные члены пропадают в силу того, что  $\psi$  и ее производные обращаются в нуль вне  $\sigma$ .

В дальнейшем нам потребуется одно важное неравенство, которое носит название *неравенства Бунаковского*. Пусть  $\varphi_1$  и  $\varphi_2$  — две

функции  $n$  переменных  $x_1, x_2, \dots, x_n$ , заданные в открытом множестве  $\Omega$ . Если интегралы

$$\int_{\Omega} \varphi_1^2 dv \text{ и } \int_{\Omega} \varphi_2^2 dv$$

существуют, то существует и интеграл

$$\int_{\Omega} \varphi_1 \varphi_2 dv,$$

причем справедливо неравенство

$$\left( \int_{\Omega} \varphi_1 \varphi_2 dv \right)^2 \leq \left( \int_{\Omega} \varphi_1^2 dv \right) \left( \int_{\Omega} \varphi_2^2 dv \right).$$

Это неравенство мы докажем позднее. Пользуясь неравенствами Минковского и Буняковского, для любого обобщенного решения уравнения (XXII.7) и любого  $\varepsilon > 0$  при достаточно больших  $n$  получим:

$$\begin{aligned} \left| \int \int \int (\psi F - u M \psi) d\Omega \right| &= \left| \int \int \int [\psi (F - F_n) - (u - u_n) M \psi] d\Omega \right| \leq \\ &\leq \sqrt{\int \int \int \psi^2 d\Omega \int \int \int (F - F_n)^2 d\Omega} + \\ &+ \sqrt{\int \int \int (u - u_n)^2 d\Omega \int \int \int (M \psi)^2 d\Omega} \leq \varepsilon. \end{aligned}$$

Значит, для любого обобщенного решения при любом  $\psi$  справедливо интегральное равенство

$$\int \int \int u M \psi d\Omega = \int \int \int \psi F d\Omega. \quad (\text{XXII.24})$$

Этим равенством можно полностью заменить дифференциальное уравнение и называть обобщенным решением уравнения

$$Lu = F$$

любую функцию, удовлетворяющую интегральному соотношению (XXII.24) при любой функции  $\psi$ , имеющей непрерывные производные до 2-го порядка и отличной от нуля только в некоторой внутренней части  $\sigma$  области  $\Omega$ .

Если мы вспомним доказательство существования решения, для получения которого мы пользовались методом Кирхгофа, то убедимся, что формула (XXII.24) была у нас важным звеном в доказательстве. Мы доказывали, таким образом, лишь существование

обобщенного решения. Уже из (XXII.24), предполагая, что  $u$  имеет производные, и интегрируя по частям, мы выводим следующую формулу:

$$\iiint_{\Omega} \psi (Lu - F) d\Omega = 0, \quad (\text{XXII.25})$$

и заключаем отсюда, что  $u$  есть решение уравнения  $Lu = F$ . Этот последний этап можно провести лишь, если  $u$  есть решение задачи, понимаемое в классическом смысле слова.

## § 5. Свойство обобщенных решений однородных уравнений

Справедлива следующая общая теорема.

**Т е о р е м а 5.** Для уравнения Лапласа, уравнения  $\Delta u + \lambda u = 0$  и однородного уравнения теплопроводности всякое обобщенное решение в смысле интегрального соотношения (XXII.24) обязательно дифференцируемо сколько угодно раз и является решением в обычном смысле.

Этим свойством уравнения эллиптического и параболического типов резко отличаются от уравнений гиперболического типа, для которых это обстоятельство не имеет места.

Доказательство этой теоремы мы проведем сначала для уравнения теплопроводности.

Займемся сперва построением некоторых вспомогательных функций. Определим функцию  $\Psi(\xi)$  с помощью формулы

$$\Psi(\xi) = \begin{cases} 0, & \xi \leq \frac{1}{4}, \\ \frac{1}{-\xi + \frac{1}{2}}, & \frac{1}{4} \leq \xi \leq 1, \\ 1 + e^{\left(\xi - \frac{1}{4}\right)(1-\xi)}, & \\ 1, & \xi \geq 1. \end{cases}$$

Функция  $\Psi(\xi)$  обладает некоторыми очевидными свойствами:

а) Она непрерывна в промежутке  $0 \leq \xi \leq \infty$ . В самом деле, дробь

$$\frac{-\xi + \frac{1}{2}}{\left(\xi - \frac{1}{4}\right)(1-\xi)}$$

имеет своим пределом  $+\infty$  при  $\xi \rightarrow \frac{1}{4} + 0$  и  $-\infty$  при

$\xi \rightarrow 1 - 0$ . Следовательно,

$$\lim_{\xi \rightarrow \frac{1}{4}} e^{\frac{-\xi + \frac{1}{2}}{\left(\xi - \frac{1}{4}\right)(1-\xi)}} = \infty, \quad \lim_{\xi \rightarrow 1} e^{\frac{-\xi + \frac{1}{2}}{\left(\xi - \frac{1}{4}\right)(1-\xi)}} = 0,$$

откуда и следует непрерывность  $\Psi$ .

б) Функция  $\Psi(\xi)$  имеет непрерывные производные всех порядков. Для того чтобы установить это, достаточно убедиться в том, что предель-

ные значения производных любого порядка от  $\Psi(\xi)$  при  $\xi \rightarrow \frac{1}{4}$  или  $\xi \rightarrow 1$  суть нули. Мы получим:

$$\begin{aligned} \Psi'(\xi) &= \frac{-\xi + \frac{1}{2}}{\left(\xi - \frac{1}{4}\right)(1-\xi)} \frac{d}{d\xi} \frac{-\xi + \frac{1}{2}}{\left(\xi - \frac{1}{4}\right)(1-\xi)} = \\ &= \frac{\frac{d}{d\xi} \frac{-\xi + \frac{1}{2}}{\left(\xi - \frac{1}{4}\right)(1-\xi)}}{\left(\frac{-\xi + \frac{1}{2}}{\left(\xi - \frac{1}{4}\right)(1-\xi)} + 1\right) \left(\frac{\xi - \frac{1}{2}}{\left(\xi - \frac{1}{4}\right)(1-\xi)} + 1\right)}. \end{aligned}$$

Выражение  $\frac{-\xi + \frac{1}{2}}{\left(\xi - \frac{1}{4}\right)(1-\xi)}$  стремится к бесконечности при  $\xi \rightarrow \frac{1}{4}$  быстрее

любой рациональной функции от  $\xi$ , а выражение  $\frac{\xi - \frac{1}{2}}{\left(\xi - \frac{1}{4}\right)(1-\xi)}$  стремится к бесконечности при  $\xi \rightarrow 1$  также быстрее любой рациональной функции от  $\xi$ . Следовательно,

$$\Psi'\left(\frac{1}{4} + 0\right) = 0; \quad \Psi'(1 - 0) = 0. \quad (\text{XXII.26})$$

Любая производная  $\Psi^m(\xi)$  будет допускать представление:

$$\Psi^{(m)}(\xi) = \sum_{\substack{p \geq 1 \\ q \geq 1}} \frac{R_{m,p,q}(\xi)}{\left(\frac{-\xi + \frac{1}{2}}{\left(\xi - \frac{1}{4}\right)(1-\xi)} + 1\right)^p \left(\frac{\xi - \frac{1}{2}}{\left(\xi - \frac{1}{4}\right)(1-\xi)} + 1\right)^q}, \quad (\text{XXII.27})$$

где  $R_{m,p,q}(\xi)$  суть некоторые рациональные функции.

Эта формула сразу доказывается методом полной индукции. Из формулы (XXII.27) вытекает:

$$\Psi^{(m)}\left(\frac{1}{4} + 0\right) = 0, \quad \Psi^{(m)}(1 - 0) = 0, \quad (\text{XXII.28})$$

что и требовалось доказать.

Введем теперь в рассмотрение функцию

$$w_n(x-x_0, y-y_0, z-z_0, t_0-t) = \begin{cases} 0, & t_0 \leq t, \\ -\frac{1}{8\pi^{3/2}(t_0-t)^{3/2}} e^{-\frac{r^2}{4(t_0-t)}} \Psi(n^2(r^2+t_0-t)), & t < t_0, \end{cases}$$

где  $r = \sqrt{(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2 + (z-z_0)^2}$ ,  $0 \leq r < +\infty$ .

Отметим несколько свойств функции  $w_n$ .

а) Очевидно, что

$$w_n(x-x_0, y-y_0, z-z_0, t_0-t) = n^3 w_1[n(x-x_0), n(y-y_0), n(z-z_0), n^2(t_0-t)]. \quad (\text{XXII.29})$$

б) Составим выражение

$$\Delta w_n + \frac{\partial w_n}{\partial t} = \Phi_n(x-x_0, y-y_0, z-z_0, t_0-t).$$

Тогда из формулы (XXII.29) следует:

$$\Phi_n(x-x_0, y-y_0, z-z_0, t_0-t) = n^5 \Phi_1[n(x-x_0), n(y-y_0), n(z-z_0), n^2(t_0-t)]. \quad (\text{XXII.30})$$

в) Функция  $\Phi_n$  отлична от нуля лишь в области  $D_n$ :

$$\frac{1}{4n^2} \leq r^2 + t_0 - t \leq \frac{1}{n^2}; \quad t < t_0,$$

которая стягивается к точке  $x_0, y_0, z_0, t_0$  при  $n \rightarrow \infty$ . В самом деле, в области, где  $\Psi[n^2(r^2+t_0-t)]$  обращается в единицу, т. е. при  $r^2 + (t_0-t) \geq \frac{1}{n^2}$ ,

мы имеем  $w_n = -v$ , где  $v$  есть частное решение уравнения  $\Delta v + \frac{\partial v}{\partial t} = 0$  (см. лекцию VIII). Значит,

$$\Delta w_n + \frac{\partial w_n}{\partial t} = 0; \quad r^2 + t_0 - t \geq \frac{1}{n^2}.$$

Обращение  $\Phi_n$  в нуль при  $r^2 + t_0 - t \leq \frac{1}{4n^2}$  очевидно.

г) Справедлива формула

$$\iiint_{D_n} \Phi_n dx dy dz dt = \int_{t_0 - \frac{1}{n^2}}^{t_0} \left[ \iint_{-\infty}^{+\infty} \Phi_n dx dy dz \right] dt = 1. \quad (\text{XXII.34})$$

В самом деле, на основании формулы Грина (XXI.4) имеем:

$$\begin{aligned} \int_{t_0 - \frac{1}{n^2}}^{t_0} \left[ \iint_{-\infty}^{+\infty} \Phi_n dx dy dz \right] dt &= \int_{t_0 - \frac{1}{n^2}}^{t_0} \left[ \iiint_{-\infty}^{+\infty} \left( \Delta w_n + \frac{\partial w_n}{\partial t} \right) dx dy dz \right] dt = \\ &= \iiint_{-\infty}^{+\infty} (w_n) \Big|_{t_0 - \frac{1}{n^2}}^{t_0} dx dy dz = \iiint_{-\infty}^{+\infty} v \Big|_{t=t_0 - \frac{1}{n^2}}^{t_0} dx dy dz, \end{aligned}$$

где  $v$  есть фундаментальное решение уравнения теплопроводности, определенное в лекции VIII. Последний интеграл, как показано в лемме 2 упомянутой лекции, равен единице, что и доказывает (XXII.31).

д) Пусть  $f(x, y, z, t)$  — произвольная непрерывная функция в области  $\Omega$  четырех переменных  $x, y, z, t$ .

Выберем область  $\Omega_n$  значений  $x_0, y_0, z_0, t_0$  так, чтобы для точек  $x_0, y_0, z_0, t_0$  из  $\Omega_n$  область  $D_n$  лежала целиком внутри  $\Omega$ .

Построим в  $\Omega_n$  функцию

$$f_n(x_0, y_0, z_0, t_0) = \int \int \int \int \Omega \Phi_n(x - x_0, y - y_0, z - z_0, t - t_0) f(x, y, z, t) dx dy dz dt.$$

Тогда последовательность  $f_n(x_0, y_0, z_0, t_0)$  сходится к функции  $f(x_0, y_0, z_0, t_0)$ , причем сходимость будет равномерной во всякой внутренней по отношению к  $\Omega$  области.

Представим функцию  $f$  в виде

$$f(x, y, z, t) = f(x_0, y_0, z_0, t_0) + \eta.$$

Очевидно, что в области  $D_n$  при достаточно большом  $n$  мы будем иметь в силу непрерывности  $f$

$$|\eta| < \varepsilon.$$

Обозначим

$$\int_{-\infty}^{t_0} \left( \int \int \int_{-\infty}^{+\infty} |\Phi_1| dx dy dz \right) dt = M.$$

В силу формулы (XXII.30)

$$\int_{-\infty}^{t_0} \left( \int \int \int_{-\infty}^{+\infty} |\Phi_n| dx dy dz \right) dt = \int_{-\infty}^{t_0} \left( \int \int \int_{-\infty}^{+\infty} |\Phi_1| dx dy dz \right) dt = M.$$

Мы будем иметь:

$$\begin{aligned} f_n(x_0, y_0, z_0, t_0) &= \int \int \int \int \Omega \Phi_n f dx dy dz dt = \\ &= \int \int \int \int \Omega \Phi_n f(x_0, y_0, z_0, t_0) dx dy dz dt + \int \int \int \int \Omega \Phi_n \eta dx dy dz dt = \\ &= f(x_0, y_0, z_0, t_0) + \int \int \int \int_{D_n} \Phi_n \eta dx dy dz dt, \end{aligned}$$

откуда

$$|f_n(x_0, y_0, z_0, t_0) - f(x_0, y_0, z_0, t_0)| \leq \varepsilon M,$$

что и требовалось доказать.

е) Функция  $f_n$ , которую мы построили, будет дифференцируема неограниченно. Это свойство вытекает из неограниченной дифференцируемости  $\Phi_n$ . После этих замечаний можно уже доказать нашу теорему.

Пусть  $u$  — некоторое обобщенное решение уравнения теплопроводности. Составим  $u_n(x_0, y_0, z_0, t_0)$ .

Тогда все  $u_n(x_0, y_0, z_0, t_0)$  при любом  $n$  равны между собой и не зависят от  $n$ .

В самом деле,

$$\begin{aligned} u_n(x_0, y_0, z_0, t_0) - u_{n+p}(x_0, y_0, z_0, t_0) &= \\ &= \iiint_{\Omega} u(x, y, z, t) (\Phi_n - \Phi_{n+p}) dx dy dz dt = \\ &= \iiint_{\Omega} u(x, y, z, t) \left[ \Delta(w_n - w_{n+p}) + \frac{\partial}{\partial t}(w_n - w_{n+p}) \right] dx dy dz dt. \end{aligned}$$

Но  $w_n - w_{n+p} = \psi$  отлична от нуля только в области

$$\frac{1}{4(n+p)^2} \leq r^2 + t_0 - t \leq \frac{1}{n^2},$$

ибо при  $r^2 + t_0 - t \geq \frac{1}{n^2}$  функция  $w_n$  совпадает с  $w_{n+p}$ .

Функция  $\psi$  удовлетворяет всем условиям для применимости формулы (XXII.24). Очевидно, при этом

$$\begin{aligned} M &= \Delta + \frac{\partial}{\partial t}, \\ L &= \Delta - \frac{\partial}{\partial t}, \end{aligned}$$

откуда, заметив, что наше уравнение имеет вид:  $Lu = 0$ , т. е.  $F = 0$ , имеем:

$$u_n - u_{n+p} = \iiint_{\Omega} \psi F dx dy dz dt = 0.$$

Отсюда следует, что  $u = u_n$ , но  $u_n$  имеет неограниченное число производных. Следовательно,  $u$  также дифференцируемо сколько угодно раз. Теорема доказана.

Пусть теперь функция удовлетворяет уравнению:

$$\Delta u + \lambda u = 0.$$

Положим:

$$v = e^{-\lambda t} u.$$

Тогда

$$\Delta v = e^{-\lambda t} \Delta u = -\lambda e^{-\lambda t} u.$$

Следовательно,

$$\Delta v = \frac{\partial v}{\partial t}.$$

Функция  $v$  на основании только что доказанного будет дифференцируема сколько угодно раз. Следовательно, тем же свойством будет обладать и функция  $u$ , что и требовалось доказать.

Можно доказать, что все решения уравнения  $\Delta u + \lambda u = 0$  будут даже апериодическими во всей области  $\Omega$  в отличие от решений уравнения теплопроводности, для которого это утверждение не имеет места.

## § 6. Неравенства Буняковского и Минковского

Пусть  $\rho(P)$  — неотрицательная функция, которую мы назовем *весом*.

Пусть две функции  $\varphi(P)$  и  $\psi(P)$ , заданные в области  $\Omega$ , интегрируемы с квадратом модуля с весом  $\rho(P)$ , т. е.

$$\left. \begin{aligned} \int_{\Omega} |\varphi(P)|^2 \rho(P) dP &< \infty, \\ \int_{\Omega} |\psi(P)|^2 \rho(P) dP &< \infty. \end{aligned} \right\} \quad (\text{XXII.32})$$

Тогда справедливо следующее неравенство:

$$\begin{aligned} \left| \int_{\Omega} \varphi(P) \psi(P) \rho(P) dP \right|^2 &\leq \\ &\leq \int_{\Omega} |\varphi(P)|^2 \rho(P) dP \int_{\Omega} |\psi(P)|^2 \rho(P) dP. \end{aligned} \quad (\text{XXII.33})$$

Очевидно, для доказательства достаточно ограничиться случаем, когда  $\psi(P)$  и  $\varphi(P)$  — вещественные неотрицательные функции, ибо

$$\left| \int_{\Omega} \varphi(P) \psi(P) \rho(P) dP \right| \leq \int_{\Omega} |\varphi(P)| |\psi(P)| \rho(P) dP. \quad (\text{XXII.34})$$

Каковы бы ни были неотрицательные функции  $\varphi$  и  $\psi$ , для них имеет место неравенство

$$\varphi\psi \leq \frac{1}{2}\varphi^2 + \frac{1}{2}\psi^2.$$

Следовательно, интеграл

$$\int_{\Omega} \varphi(P) \psi(P) \rho(P) dP$$

имеет смысл.

Рассмотрим также имеющий смысл интеграл

$$\begin{aligned} \int_{\Omega} (\varphi - \lambda\psi)^2 \rho dP &= \int_{\Omega} \varphi^2 \rho dP + 2\lambda \int_{\Omega} \varphi\psi \rho dP + \lambda^2 \int_{\Omega} \psi^2 \rho dP = \\ &= a\lambda^2 - 2b\lambda + c. \end{aligned} \quad (\text{XXII.35})$$

Парабола

$$y = a\lambda^2 - 2b\lambda + c$$

в плоскости переменных  $y$  и  $\lambda$  не может иметь ни одной точки ниже оси  $\lambda$ , так как величина (XXII.35) больше или равна нулю. Значит, уравнение

$$a\lambda^2 - 2b\lambda + c = 0$$

не может иметь различных вещественных корней, а один кратный корень может существовать у этого уравнения лишь тогда, когда существует  $\lambda_0$ , такое, что

$$\int_{\Omega} (\varphi - \lambda_0 \psi)^2 \rho dP = 0,$$

т. е. когда выражение  $(\varphi - \lambda_0 \psi) \rho$  эквивалентно нулю, т. е. отлично от нуля лишь на множестве меры нуль. В случае, если весовая функция  $\rho(P)$  обращается в нуль разве лишь на множестве нулевой меры, это означает, что выражение  $\varphi - \lambda_0 \psi$  эквивалентно нулю.

Следовательно,

$$b^2 \leq ac,$$

причем знак равенства может иметь место лишь в том случае, если  $\varphi$  и  $\psi$  пропорциональны. Тем самым неравенство Буняковского (XXII.33) доказано.

Из неравенства Буняковского очевидным образом следует для любых  $\varphi$  и  $\psi$ , интегрируемых вместе с их квадратами с весом  $\rho$ , неравенство

$$\begin{aligned} \left| \int_{\Omega} (\varphi^2 + 2\varphi\psi + \psi^2) \rho dP \right| &\leq \\ &\leq \int_{\Omega} |\varphi|^2 \rho dP + \int_{\Omega} |\psi|^2 \rho dP + 2 \sqrt{\int_{\Omega} |\psi|^2 \rho dP \int_{\Omega} |\psi|^2 \rho dP} = \\ &= \left( \sqrt{\int_{\Omega} |\varphi|^2 \rho dP} + \sqrt{\int_{\Omega} |\psi|^2 \rho dP} \right)^2, \end{aligned}$$

или

$$\sqrt{\left| \int_{\Omega} (\varphi + \psi)^2 \rho dP \right|} \leq \sqrt{\int_{\Omega} |\varphi|^2 \rho dP} + \sqrt{\int_{\Omega} |\psi|^2 \rho dP}. \quad (\text{XXII.36})$$

Неравенство (XXII.36), доказанное нами, носит название *неравенства Минковского*.

Так же как это имело место при доказательстве неравенства Буняковского, левая часть имеет смысл, если имеет смысл правая часть.

## § 7. Теорема Рисса—Фишера

**Теорема Рисса—Фишера.** Пусть имеется последовательность функций

$$\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_k, \dots,$$

интегрируемых с квадратом в ограниченной области  $\Omega$ . Пусть для любого  $\varepsilon$  можно указать такое  $N(\varepsilon)$ , что

$$\int_{\Omega} (\varphi_k - \varphi_s)^2 dv < \varepsilon, \text{ если } k > N(\varepsilon), \quad s > N(\varepsilon). \quad (\text{XXII.37})$$

Тогда существует такая функция  $\varphi_0$ , интегрируемая с квадратом в  $\Omega$ , что

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_{\Omega} (\varphi_k - \varphi_0)^2 dv = 0. \quad (\text{XXII.38})$$

Очевидно, что такая функция единственна с точностью до эквивалентности, ибо, предположив существование двух таких предельных функций  $\varphi_0$  и  $\varphi_*$ , будем иметь на основании неравенства Минковского

$$\sqrt{\int_{\Omega} (\varphi_0 - \varphi_*)^2 dv} \leq \sqrt{\int_{\Omega} (\varphi_0 - \varphi_n)^2 dv} + \sqrt{\int_{\Omega} (\varphi_n - \varphi_*)^2 dv} < \varepsilon$$

при произвольно малом  $\varepsilon > 0$ , откуда следует:

$$\int_{\Omega} (\varphi_0 - \varphi_*)^2 dv = 0.$$

Мы будем говорить, что  $\varphi_0$  есть предел в среднем квадратичном для последовательности  $\varphi_k$ . Докажем эту теорему.

Установим прежде всего, что последовательность  $\varphi_k$  сходится в среднем, т. е. существует суммируемая функция  $\varphi_0$ , такая, что

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_{\Omega} |\varphi_0 - \varphi_k| dv = 0.$$

С этой целью заметим, что в силу неравенства Буняковского имеем:

$$\begin{aligned} \int_{\Omega} |\varphi_m - \varphi_p| d\Omega &= \int_{\Omega} |\varphi_m - \varphi_p| \cdot 1 d\Omega \leq \\ &\leq \left[ \int_{\Omega} |\varphi_m - \varphi_p|^2 d\Omega \right]^{1/2} \left[ \int_{\Omega} 1 d\Omega \right]^{1/2}, \end{aligned}$$

и, следовательно,

$$\int_{\Omega} |\varphi_m - \varphi_p| d\Omega < \eta,$$

если только  $m > N(\eta)$ ,  $p > N(\eta)$ . Применяя теорему 23 лекции VI, убеждаемся в существовании суммируемой функции  $\varphi_0$  — предела в среднем последовательности  $\varphi_k$ .

При этом из способа доказательства вытекает, что существует подпоследовательность  $\varphi_{k_i}$  последовательности  $\varphi_k$ , которая сходится к  $\varphi_0$  почти всюду и притом равномерно на замкнутых множествах  $F_{\delta}$ , на которых все функции непрерывны. Множества  $F$ , могут быть взяты сколь угодно близкими по мере к  $\Omega$ . Мы имеем:

$$\int_{F_{\delta}} \varphi_0^2 dv = \lim_{i \rightarrow \infty} \int_{F_{\delta}} \varphi_{k_i}^2 dv \leq A < \infty,$$

откуда вытекает

$$\int_{\Omega} \varphi_0^2 dv \leq A,$$

причем интеграл в левой части существует. Нетрудно видеть, что величина

$$\int_{\Omega} (\varphi_0 - \varphi_{k_i})^2 d\Omega$$

может быть сделана сколь угодно малой при достаточно большом  $i$ . Обозначим для краткости  $\psi_i = \varphi_{k_i}$ . Каково бы ни было замкнутое множество  $F_\delta$  и заданное положительное число  $\varepsilon$ , при достаточно большом  $l$ , зависящем, вообще говоря, от  $F_\delta$ , получим:

$$\begin{aligned} \int_{F_\delta} (\varphi_0 - \psi_i)^2 d\Omega &= \int_{F_\delta} [(\psi_l - \psi_i) + (\varphi_0 - \psi_l)]^2 d\Omega \leq \\ &\leq 2 \int_{F_\delta} (\psi_l - \psi_i)^2 d\Omega + 2 \int_{F_\delta} (\varphi_0 - \psi_l)^2 d\Omega \leq 2 \int_{\Omega} (\psi_l - \psi_i)^2 d\Omega + \varepsilon. \end{aligned}$$

В силу условия теоремы при достаточно больших  $l$  и  $i$  независимо от  $F_\delta$

$$\int_{\Omega} (\psi_l - \psi_i)^2 d\Omega \leq \varepsilon.$$

Отсюда

$$\int_{F_\delta} (\varphi_0 - \psi_i)^2 d\Omega \leq 3\varepsilon$$

и, следовательно,

$$\int_{\Omega} (\varphi_0 - \psi_i)^2 d\Omega \leq 3\varepsilon.$$

Докажем теперь, что  $\varphi_0$  является пределом в среднем квадратичном и для первоначальной последовательности  $\varphi_k$ .

При  $s, k_i > N(\varepsilon)$  имеем:

$$\int_{\Omega} (\varphi_0 - \varphi_s)^2 d\Omega \leq 2 \int_{\Omega} (\varphi_0 - \psi_i)^2 d\Omega + 2 \int_{\Omega} (\psi_i - \varphi_s)^2 d\Omega \leq 6\varepsilon + 2\varepsilon = 8\varepsilon.$$

Теорема доказана.

§ 1. Разделение переменных

Красивые задачи математической физики для уравнений параболического и гиперболического типов удобно решать приемом, который предложен Фурье и который мы будем называть *разделением переменных*.

Сущность этого приема мы разберем на частных примерах. Читателю нетрудно будет, руководствуясь соображениями, изложенными в предыдущих лекциях, сразу сообразить, как и в каких случаях метод Фурье позволяет отыскивать решение задачи. Пусть разыскивается решение уравнения

$$\Delta u = \frac{1}{a} \frac{\partial u}{\partial t} \quad (\text{XXIII.1})$$

в области  $\Omega$  пространства  $x, y, z$ , ограниченной поверхностью  $S$ , и для  $t$ , удовлетворяющего неравенству  $0 \leq t \leq T$ , при условиях:

$$u|_S = 0, \quad (\text{XXIII.2})$$

$$u|_{t=0} = \varphi(x, y, z). \quad (\text{XXIII.3})$$

Отвлечемся пока от условия (XXIII.3), будем искать частные решения уравнения (XXIII.1), удовлетворяющие условию (XXIII.2).

Эти решения удобно искать в виде произведения двух функций:

$$u = U(x, y, z) T(t). \quad (\text{XXIII.4})$$

Подставляя (XXIII.4) в (XXIII.1) и деля обе части на  $u$ , будем иметь:

$$\frac{\Delta U(x, y, z)}{U(x, y, z)} = \frac{1}{a} \frac{T'(t)}{T(t)}. \quad (\text{XXIII.5})$$

Переменные  $x, y, z$  и  $t$  в уравнении (XXIII.5) разделены, левая часть не зависит от  $t$ , а правая от  $x, y, z$ . Равенство (XXIII.5) возможно лишь при условии, если и правая и левая части равны

одной и той же постоянной —  $\lambda$ , откуда

$$\frac{\Delta U}{U} = -\lambda, \quad \frac{1}{a} \frac{T'(t)}{T(t)} = -\lambda, \quad (\text{XXIII.6})$$

или

$$\Delta U + \lambda U = 0, \quad (\text{XXIII.7})$$

$$T(t) = Ce^{-\lambda at}. \quad (\text{XXIII.8})$$

Для того чтобы наше решение удовлетворяло условию (XXIII.2), нужно, чтобы этому условию удовлетворяла функция  $U(x, y, z)$ . Значения  $\lambda$ , при которых уравнение (XXIII.7) имеет решение, удовлетворяющее граничному условию (XXIII.2), называются *собственными значениями* краевой задачи для этого уравнения при условии (XXIII.2). Далеко не всякое значение  $\lambda$  является собственным. В самом деле, перенося в уравнении (XXIII.7) член, содержащий  $\lambda U$ , в правую часть и рассматривая его как свободный член, получим, применяя формулу (XXI.7):

$$U(P_0) = \frac{\lambda}{4\pi} \iint_{\Omega} G(P, P_0) U(P) dP, \quad (\text{XXIII.9})$$

где  $G(P, P_0)$  — функция Грина для оператора Лапласа в области  $\Omega$ .

Уравнение (XXIII.9) есть линейное однородное интегральное уравнение 2-го рода типа Фредгольма с ядром, удовлетворяющим требованию § 7 лекции XVIII. Согласно четвертой теореме Фредгольма, оно может иметь решения, отличные от нуля, лишь для некоторых дискретных значений  $\lambda$ . Пусть эти значения  $\lambda$  будут:  $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n, \dots$  и пусть

$$U_1, U_2, \dots, U_n, \dots$$

— соответствующие решения уравнения (XXIII.9), которые называются *собственными функциями*. Тогда мы получим целый набор частных решений уравнения (XXIII.1) отыскиваемого типа:

$$u_i = U_i e^{-\lambda_i at}.$$

Заметим, что ядро интегрального уравнения (XXIII.9) является симметрической функцией координат точек  $P$  и  $P_0$ .

Мы докажем немного спустя, в теории интегральных уравнений с симметрическим ядром, что таких решений бесконечно много и что при любой функции  $\varphi$ , интегрируемой с квадратом, можно построить ряд

$$u = \sum_{i=1}^{\infty} a_i U_i e^{-\lambda_i at}, \quad (\text{XXIII.10})$$

который будет удовлетворять условиям (XXIII.2) и (XXIII.3) и представлять собой обобщенное решение уравнения (XXIII.4). Из теоремы 5 лекции XXII следует, что всякое обобщенное

решение уравнения (XXIII.1) есть решение в обычном смысле слова. Укажем, пока без доказательства, пять важных свойств системы функций  $U_i(x, y, z)$  и чисел  $\lambda_i$ :

1. Чисел  $\lambda_i$  бесконечно много, все они вещественны и положительны. (В некоторых других задачах это условие заменяется тем, что среди них лишь конечное число отрицательных.)

2. Все функции  $U_i$  можно считать ортогональными и нормированными, то есть

$$\iiint_{\Omega} U_i(x, y, z) U_j(x, y, z) dx dy dz = \begin{cases} 1, & i = j; \\ 0, & i \neq j. \end{cases}$$

3. Функции  $U_i$  образуют так называемую полную систему, т. е. любая непрерывная функция  $\varphi(x, y, z)$  представима рядом

$$\varphi(x, y, z) = \sum_{i=1}^{\infty} a_i U_i(x, y, z), \quad (\text{XXIII.11})$$

сходящимся в среднем, где числа  $a_i$  — это так называемые *коэффициенты Фурье* функции  $\varphi$ . Если, кроме того,  $\varphi$  удовлетворяет условию

$$\varphi_s = 0$$

и имеет непрерывные, включая границу, производные 2-го порядка, то ряд (XXIII.11) сходится равномерно.

4. Кроме условия ортонормальности, написанного выше, имеет место еще система равенств

$$\iiint_{\Omega} \left( \frac{\partial U_i}{\partial x} \frac{\partial U_j}{\partial x} + \frac{\partial U_i}{\partial y} \frac{\partial U_j}{\partial y} + \frac{\partial U_i}{\partial z} \frac{\partial U_j}{\partial z} \right) dx dy dz = \begin{cases} \lambda_i, & i = j; \\ 0, & i \neq j. \end{cases}$$

5. Если дважды непрерывно дифференцируемая функция  $\varphi$  удовлетворяет граничному условию (XXIII.2), то ряд (XXIII.11) не только сходится к  $\varphi$  равномерно, но и ряд, полученный из него почленным дифференцированием, сходится в среднем к соответствующей производной функции  $\varphi$ . Иными словами, если положить

$$\varphi_N = \sum_{i=1}^N a_i U_i,$$

то интеграл

$$\iiint_{\Omega} \left\{ \left[ \frac{\partial(\varphi - \varphi_N)}{\partial x} \right]^2 + \left[ \frac{\partial(\varphi - \varphi_N)}{\partial y} \right]^2 + \left[ \frac{\partial(\varphi - \varphi_N)}{\partial z} \right]^2 \right\} dx dy dz$$

стремится к нулю.

Поставим себе задачу отыскания коэффициентов Фурье функции  $\varphi(x, y, z)$ . Умножая обе части (XXIII.11) на  $U_j$  и интегрируя

по области  $\Omega$ , получим с помощью почленного интегрирования ряда:

$$\begin{aligned} \iiint_{\Omega} U_j(x, y, z) \varphi(x, y, z) dx dy dz = \\ = \sum_{i=1}^{\infty} a_i \iiint_{\Omega} U_i(x, y, z) U_j(x, y, z) dx dy dz = a_j. \end{aligned} \quad (\text{XXIII } 12)$$

Формула (XXIII.12) и дает нам  $a_j$ .

Для того чтобы функция, представленная рядом (XXIII.10), удовлетворяла условию (XXIII.3), естественно потребовать выполнения равенства (XXIII.11). Если сумма ряда (XXIII.10) непрерывна при  $t \geq 0$ , то условия (XXIII.2) и (XXIII.3) будут выполнены при  $a_j$ , являющихся коэффициентами Фурье функции  $\varphi$ .

Нетрудно установить, что ряд (XXIII.10) равномерно сходится и дает обобщенное решение уравнения (XXIII.11). В самом деле, пусть

$$\varphi_N = \sum_{i=1}^N a_i U_i(x, y, z).$$

Очевидно, что

$$u_N = \sum_{i=1}^N a_i U_i(x, y, z) e^{-\lambda_i a t}$$

дает нам решение уравнения (XXIII.4) при условиях (XXIII.2) и

$$u_N|_{t=0} = \varphi_N$$

Но в прошлой лекции мы показали, что при этих условиях из сходимости последовательности  $\varphi_N$  вытекает, что последовательность  $u_N$  сходится равномерно во всяком конечном промежутке изменения времени к обобщенному решению  $u$ , что и требовалось доказать.

Совершенно таким же образом можно методом разделения переменных решить задачу интегрирования волнового уравнения. Пусть требуется найти решение уравнения

$$\Delta u - \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = 0 \quad (\text{XXIII.13})$$

при начальных условиях

$$u|_{t=0} = \varphi_0(x, y, z); \quad \frac{\partial u}{\partial t}|_{t=0} = \varphi_1(x, y, z) \quad (\text{XXIII } 14)$$

и граничных условиях, например, вида

$$\frac{\partial u}{\partial n}|_S = 0, \quad (\text{XXIII } 15)$$

где  $S$  — поверхность, ограничивающая объем  $\Omega$  в пространстве переменных  $x, y, z$ .

Частные решения этого уравнения, удовлетворяющие условиям (XXIII.15), можно по-прежнему искать в виде

$$u = U(x, y, z) T(t). \quad (\text{XXIII.16})$$

Подставляя (XXIII.16) в (XXIII.13), получим:

$$T(t) \Delta U(x, y, z) = U(x, y, z) T''(t),$$

или

$$\frac{T''(t)}{T(t)} = \frac{\Delta U(x, y, z)}{U(x, y, z)} = -\lambda^2,$$

откуда

$$T'' + \lambda^2 T = 0, \quad (\text{XXIII.17})$$

$$\Delta U + \lambda^2 U = 0. \quad (\text{XXIII.18})$$

Решение уравнения (XXIII.18) при условиях (XXIII.15) ищется опять при помощи функции Грина. Функция  $G_1(P, P_0)$  в этом случае удовлетворяет не уравнению Лапласа, а уравнению

$$\Delta G_1 = \frac{1}{D},$$

где  $D$  — объем области  $\Omega$ . Постоянная  $\frac{1}{D}$  служит в этом случае решением сопряженной однородной задачи, т. е.

$$\Delta \left( \frac{1}{D} \right) = 0, \quad \frac{\partial \left( \frac{1}{D} \right)}{\partial n} = 0,$$

и подобрана так, чтобы обеспечить существование функции Грина. Это вытекает из проведенного выше исследования задачи Неймана [см. § 2 лекции XXI].  $G_1$  будет, таким образом, обобщенной функцией Грина.

Будем искать то решение  $U$  уравнения

$$\Delta U = -\lambda^2 U,$$

которое ортогонально к постоянной по нашей области:

$$\iiint_{\Omega} \lambda^2 U dx dy dz = 0.$$

Будем решать уравнение (XXIII.18), считая  $\lambda^2 U$  свободным членом. При этом то его решение, которое само ортогонально к постоянной, должно на основании результатов прошлых лекций иметь вид:

$$U(P_0) = \lambda^2 \iiint_{\Omega} G_1(P, P_0) U(P) dP. \quad (\text{XXIII.19})$$

Мы снова получили для собственных функций задачи интегральное уравнение с симметрическим ядром.

Для этого интегрального уравнения справедливы все высказанные нами ранее утверждения, кроме 3, которое видоизменяется при этом так.

За. Всякая функция  $\varphi(P)$ , имеющая непрерывные производные 2-го порядка вплоть до границы области  $\Omega$ , ортогональная к постоянной:

$$\int \int \int_{\Omega} \frac{1}{D} \varphi(P) dP = 0,$$

и удовлетворяющая граничным условиям, разлагается в равномерно сходящийся ряд по собственным функциям уравнения (XXIII.19).

Уравнение (XXIII.17) имеет два линейно независимых решения:

$$\begin{aligned} T_1 &= \cos \lambda t, \\ T_2 &= \sin \lambda t. \end{aligned}$$

Если  $U_i(x, y, z) = U_i(P)$  — собственная функция уравнения (XXIII.19), а  $\lambda_i$  — его собственное значение, то искомые частные решения уравнения (XXIII.13) будут:

$$U_i(x, y, z) \cos \lambda_i t, \quad U_i(x, y, z) \sin \lambda_i t.$$

Решение  $u$  интересующей нас задачи мы будем искать в виде ряда

$$\sum_{i=1}^{\infty} a_i U_i(x, y, z) \cos \lambda_i t + \sum_{i=1}^{\infty} b_i U_i(x, y, z) \sin \lambda_i t + c_0 + c_1 t. \quad (\text{XXIII.20})$$

Если ряд (XXIII.20) равномерно сходится в среднем вместе с производной по времени, то  $u$  и  $\frac{\partial u}{\partial t}$  будут непрерывными в среднем функциями времени. Это было доказано в лекции XXII, теорема 4. Скоро мы убедимся, что условие равномерной сходимости в среднем вместе с производной по времени выполнено.

Потребуем, чтобы ряд (XXIII.20) удовлетворял начальным условиям:

$$\left. \begin{aligned} u|_{t=0} &= \sum_{i=1}^{\infty} a_i U_i(x, y, z) + c_0, \\ \frac{\partial u}{\partial t} \Big|_{t=0} &= \sum_{i=1}^{\infty} \lambda_i b_i U_i(x, y, z) + c_1. \end{aligned} \right\} \quad (\text{XXIII.21})$$

Если выбрать коэффициенты  $a_i$  и  $b_i$  так, чтобы иметь:

$$\sum_{i=1}^{\infty} a_i U_i(x, y, z) = \varphi_0(x, y, z) - c_0,$$

$$\sum_{i=1}^{\infty} \lambda_i b_i U_i(x, y, z) = \varphi_1(x, y, z) - c_1,$$

то начальные условия (XXIII.14) будут выполнены в среднем. Предполагая опять систему функций  $U_i$  ортогональной и нормированной

$$\iiint_{\Omega} U_i(P) U_j(P) dP = \begin{cases} 1, & i = j; \\ 0, & i \neq j, \end{cases}$$

можем снова определить все коэффициенты рядов (XXIII.24), подобрав сначала постоянные  $c_0$  и  $c_1$  так, чтобы  $\varphi_0 - c_0$  и  $\varphi_1 - c_1$  были ортогональны к постоянной. Повторяя прежние рассуждения, получим:

$$c_i = \iiint_{\Omega} \varphi_0 U_i dP, \quad \lambda_i b_i = \iiint_{\Omega} \varphi_1 U_i dP.$$

Переходим к доказательству сходимости в среднем ряда (XXIII.20). Подобно предыдущему, убеждаемся сначала, что

$$u_N = \sum_{i=1}^N a_i U_i \cos \lambda_i t + \sum_{i=1}^N b_i U_i \sin \lambda_i t + c_0 + c_1 t$$

есть решение задачи с приближенными начальными условиями.

Рассмотрим два конечных отрезка ряда (XXIII.20)  $u_n$  и  $u_m$ , причем пусть  $n > m$ . Разность этих двух отрезков

$$v_{nm} = u_n - u_m = \sum_{i=m+1}^n a_i U_i \cos \lambda_i t + \sum_{i=m+1}^n b_i U_i \sin \lambda_i t$$

удовлетворяет уравнению

$$\Delta v_{nm} - \frac{\partial^2 v_{nm}}{\partial t^2} = 0,$$

краевым условиям (XXIII.15) и начальным условиям

$$v_{nm}|_{t=0} = \sum_{i=m+1}^n a_i U_i,$$

$$\frac{\partial v_{nm}}{\partial t} \Big|_{t=0} = \sum_{i=m+1}^n \lambda_i b_i U_i.$$

Очевидно,

$$\left\{ \iiint_{\Omega} v_{nm}^2|_{t=0} d\Omega \right\}^{\frac{1}{2}} < \varepsilon, \quad \left\{ \iiint_{\Omega} \left[ \frac{\partial v_{nm}}{\partial t} \Big|_{t=0} \right]^2 d\Omega \right\}^{\frac{1}{2}} < \varepsilon,$$

если только  $n$  и  $m$  достаточно велики.

Если теперь воспользоваться свойством 5 системы собственных функций, то в обозначениях предыдущей лекции имеем:

$$K_0(0) < \varepsilon^2, \quad K_1(0) < \varepsilon^2, \quad A(t) \equiv 0.$$

Из неравенств (XXII.12) и (XXII.14) вытекает при этих условиях, что  $K_0(t)$  и  $K_1(t)$  также будут сколько угодно малы в любом конечном промежутке по  $t$ . Таким образом, последовательности  $u_n$  и  $\frac{\partial u_n}{\partial t}$  удовлетворяют условию теоремы Фишера—Рисса и, значит, сходятся в среднем равномерно относительно  $t$  во всяком конечном промежутке  $a \leq t \leq b$ . Следовательно, ряд (XXIII.20) в среднем сходится к некоторому обобщенному решению. Мы не будем более подробно исследовать, при каких обстоятельствах это решение будет решением в обычном смысле слова.

Как мы видим, каждый член ряда (XXIII.20) представляет собой так называемое гармоническое колебание, причем частоты  $\lambda_i$  колебаний расположены дискретно.

## § 2. Аналогия между задачей о колебании непрерывной среды и колебаниями механических систем с конечным числом степеней свободы

Легко проследить аналогию между рассмотренной задачей для уравнения (XXIII.13) и задачей о свободных малых колебаниях механических систем с конечным числом степеней свободы.

Эта последняя задача формулируется как задача об интегрировании системы уравнений:

$$\frac{d^2 q_j}{dt^2} = \sum_{k=1}^m a_{jk} q_k \quad (j = 1, 2, \dots, m) \quad (\text{XXIII.22})$$

при условиях:

$$q_j|_{t=0} = (q_j)_0,$$

$$\frac{dq_j}{dt} \Big|_{t=0} = (q'_j)_0,$$

причем предполагается, что  $a_{ij} = a_{ji}$ .

В такой системе вместо функции  $u(P, t)$ , зависящей от  $t$  и от переменной точки пространства, мы имеем величину, зависящую от  $t$  и от дискретного номера  $j$ . Если бы мы построили в

области  $\Omega$  сетку из конечного числа точек  $P_1, P_2, \dots, P_m$  и заменили бы рассмотрение функции  $u(P, t)$  рассмотрением величин  $q_j = u(P_j, t)$  в конечном числе, то мы могли бы, заменив в уравнении (XXIII.13) производные по координатам конечными разностями, получить систему, аналогичную (XXIII.22).

Решение системы (XXIII.22), как мы знаем из курса обыкновенных дифференциальных уравнений, имеет вид

$$q_j = \sum_{r=1}^m (c_{jr} \cos \lambda_r t + d_{jr} \sin \lambda_r t),$$

где  $\lambda_r$  — частоты колебаний, определяемые из так называемого *векового уравнения*:

$$\begin{vmatrix} a_{11} - \lambda^2 & a_{12} & \dots & a_{1m} \\ a_{21} & a_{22} - \lambda^2 & \dots & a_{2m} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mm} - \lambda^2 \end{vmatrix} = 0.$$

Разница между нашей задачей и задачей отыскания решения системы (XXIII.22) состоит лишь в том, что система (XXIII.22) имеет конечное число собственных частот колебаний, в то время как задача об интегрировании волнового уравнения имеет их бесконечно много. Рассматриваемая аналогия идет еще глубже.

Если мы будем трактовать совокупность чисел  $q_1, q_2, \dots, q_m$  как некоторую точку в  $m$ -мерном пространстве или, точнее, как вектор  $\mathbf{q}$ , соединяющий начало с некоторой точкой этого пространства, то система уравнений (XXIII.22) запишется в виде

$$\frac{d^2 \mathbf{q}}{dt^2} = \mathbf{A} \mathbf{q}, \quad (\text{XXIII.23})$$

где  $\mathbf{A}$  — линейная подстановка над вектором  $\mathbf{q}$ . Из теории обыкновенных дифференциальных уравнений известно, что интегрирование (XXIII.23) сводится фактически к такой *ортogonalной* замене переменных (преобразованию координат в пространстве  $q$ ), чтобы матрица подстановки  $\mathbf{A}$  была приведена к диагональной форме. Если эти новые координаты обозначить через  $r_1, r_2, \dots, r_m$ , то после замены

$$q_j = \sum_{s=1}^m \beta_{js} r_s \quad (\text{XXIII.24})$$

или

$$r_s = \sum_{j=1}^m \beta_{sj} q_j$$

мы будем иметь систему

$$\frac{d^2 r_j}{dt^2} = \sum_{k=1}^m \bar{a}_{jk} r_k,$$

где

$$\bar{a}_{jk} = \begin{cases} -\lambda_j^2; & j = k, \\ 0; & j \neq k. \end{cases}$$

Рассмотрение в случае волнового уравнения собственных функций

$$U_1, U_2, \dots, U_m$$

совершенно аналогично такому новому выбору координат. Вместо значений какой-нибудь функции  $f(P, t)$  во всевозможных точках  $P$  мы будем считать эту функцию заданной своими коэффициентами  $f_i(t)$  разложения в ряд

$$f(P, t) = \sum_{i=1}^{\infty} f_i(t) U_i(P). \quad (\text{XXIII.25})$$

Формула (XXIII.25) вместе с формулой

$$f_i(t) = \iint_{\Omega} f(P, t) U_i(P) dP \quad (\text{XXIII.26})$$

аналогична (XXIII.24), только значок  $i$  в формулах (XXIII.25) и (XXIII.26), соответствующий значку  $s$  в формулах (XXIII.24), меняется не от 1 до  $m$ , а от 1 до бесконечности, а роль значка  $j$  из формул (XXIII.24), менявшегося от 1 до  $m$ , играет точка  $P$ , меняющаяся в области  $\Omega$ .

Эта точка зрения дает новый взгляд на самый метод Фурье для решения задачи об интегрировании волнового уравнения (XXIII.13) с предельными и начальными условиями.

Совпадение, отмеченное нами, разумеется, не является случайным. По существу, как одна, так и другая задачи представляют собой частные случаи некоторой общей задачи, формулируемой в терминах абстрактной теории уравнений в функциональных пространствах.

### § 3. Неоднородное уравнение

Не углубляя вопроса, мы будем пользоваться существующей аналогией, указанной в § 2, расширяя ее далее. Мы проиллюстрируем эту аналогию на задаче об интегрировании волнового уравнения со свободным членом и нулевыми начальными данными. К этой задаче, как мы видели, сводится самый общий случай.

Рассмотрим уравнение

$$\Delta u - \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = F$$

и попытаемся найти его решение, удовлетворяющее условиям

$$u|_{t=0} = \frac{\partial u}{\partial t} \Big|_{t=0} = 0,$$

$$\frac{\partial u}{\partial n} \Big|_S = 0.$$

Отыскивая  $u$  в виде ряда

$$u = \sum_{i=1}^{\infty} a_i(t) U_i + c_0(t) \quad (\text{XXIII.27})$$

(всякая дважды дифференцируемая функция  $u$ , удовлетворяющая условию  $\frac{\partial u}{\partial n} \Big|_S = 0$ , в такой ряд разлагается) и представляя  $F$  в виде такого же ряда <sup>1)</sup>, получим:

$$-c_0''(t) + \Delta \left( \sum_{i=1}^{\infty} a_i(t) U_i \right) - \frac{\partial^2}{\partial t^2} \left( \sum_{i=1}^{\infty} a_i(t) U_i \right) = \sum_{i=1}^{\infty} F_i(t) U_i + F_0(t).$$

Произведем дифференцирование под знаком суммы. Это дифференцирование законно, если допустить, что ряды из производных равномерно сходятся. Тогда мы будем иметь:

$$-c_0''(t) - F_0(t) + \sum_{i=1}^{\infty} U_i [-\lambda_i^2 a_i(t) - a_i''(t) - F_i(t)] = 0.$$

Умножая обе части последнего равенства на  $U_j$ , интегрируя и замечая, что при этом все члены, кроме того, который имел номер  $j$ , пропадут, получим для определения  $a_j(t)$  дифференциальное уравнение

$$a_j''(t) + \lambda_j^2 a_j(t) + F_j(t) = 0. \quad (\text{XXIII.28})$$

Мы также получим:

$$c_0''(t) + F_0(t) = 0.$$

<sup>1)</sup> Функция  $F$ , вообще говоря, не удовлетворяет краевым условиям. Однако она, очевидно, может быть заменена функцией  $F'$ , удовлетворяющей этим условиям, и такой, что  $\int \int \int_{\Omega} (F' - F)^2 dx dy dz < \epsilon$ . На основании рассуждений предыдущей лекции такого рода замена повлечет за собой сколь угодно малую ошибку в решении.

Пользуясь известной формулой для решения обыкновенных уравнений, имеем:

$$a_i(t) = \frac{1}{\lambda_i} \int_0^t \sin[\lambda_i(t_1 - t)] F_i(t_1) dt_1,$$

$$c_0(t) = \int_0^t (t_1 - t) F_0(t_1) dt_1.$$

При таких  $a_i(t)$  формула (XXIII.27) даст нам искомое решение, если только ряд (XXIII.27) окажется равномерно сходящимся со своими производными до 2-го порядка. Чтобы избежать исследования сходимости, мы можем опять заменить свободный член  $F$  функцией  $F_N$  — отрезком ряда Фурье. Переходя затем к пределу, мы получим, пользуясь теоремой Рисса—Фишера, если не решение в обычном смысле слова, то обобщенное решение.

Наша подстановка (XXIII.27) есть аналог замены переменных в системе (XXIII.23), приводившей эту последнюю к каноническому виду. Так же как и для (XXIII.23), она быстро решает задачу.

Очень легко указать также путь к решению задачи об интегрировании уравнения теплопроводности с правой частью и неоднородными условиями на границе:

$$\Delta u - \frac{1}{a} \frac{\partial u}{\partial t} = F(P, t),$$

$$u|_S = f(S, t),$$

$$u|_{t=0} = \varphi(P).$$

Достаточно заметить, что эта задача может быть сведена к задаче интегрирования того же уравнения при условиях

$$u|_S = 0,$$

$$u|_{t=0} = 0.$$

Разложим свободный член в ряд вида

$$F(P, t) = \sum_{i=1}^{\infty} U_i(P) F_i(t) \quad (\text{XXIII.29})$$

Такое разложение возможно, так как при фиксированном значении  $t$  функция  $F(P, t)$  разложима в ряд вида (XXIII.29). Коэффициенты этого ряда, вообще говоря, зависят от  $t$ :

$$F_i(t) = \iint_{\Omega} U_i(P) F(P, t) dP. \quad (\text{XXIII.30})$$

$F_i(t)$  суть непрерывные дифференцируемые функции, если частная производная по  $t$  функции  $F(P, t)$  непрерывна, как это видно из формулы (XXIII.30).

Отыскивая решение уравнения

$$\Delta u_N - \frac{1}{a} \frac{\partial u_N}{\partial t} = \sum_{i=1}^N F_i(t) U_i(P) \quad (\text{XXIII.31})$$

в виде

$$u_N = \sum_{i=1}^N a_i(t) U_i(P),$$

получим:

$$\sum_{i=1}^N U_i(P) \left\{ F_i(t) + \frac{1}{a} a_i'(t) + \lambda_i a_i(t) \right\} = 0,$$

откуда, умножая на  $U_j$  и интегрируя, видим, что коэффициенты  $a_i(t)$  должны удовлетворять уравнению

$$\frac{1}{a} a_i'(t) + \lambda_i a_i(t) + F_i(t) = 0. \quad (\text{XXIII.32})$$

Взяв за  $a_i(t)$  то решение (XXIII.32), которое обращается в нуль при  $t = 0$ , т. е.

$$a_i = \int_0^t e^{a\lambda_i(t_1 - t)} F_i(t_1) dt_1,$$

мы увидим, что  $u_N(t)$  будет удовлетворять как уравнению (XXIII.31), так и поставленным начальным и граничным условиям.

Переходя затем к пределу при  $N \rightarrow \infty$  и замечая, что правая часть (XXIII.31) стремится к функции  $F$ , получим, рассуждая подобно прежнему, обобщенное решение, которое при достаточной гладкости  $F$  будет решением в обычном смысле слова (см. § 2 лекции XXII).

В практических задачах часто наибольший интерес при решении волнового уравнения представляет как раз отыскание всех частот  $\lambda_i$  или, как говорят, *спектра собственных частот колебаний*. Знание такого спектра позволяет избежать неприятного явления резонанса.

Резонанс возникает большей частью тогда, когда внешняя сила изменяется по синусоидальному закону и частота ее совпадает с собственной частотой колебаний.

Пусть, например, в формуле (XXIII.28)

$$F_i(t) = \sin \lambda_i t;$$

тогда

$$\begin{aligned} a_i(t) &= \frac{1}{\lambda_i} \int_0^t \sin \lambda_i(t-t_1) \sin \lambda_i t_1 dt_1 = \\ &= \frac{1}{2\lambda_i} \int_0^t [\cos \lambda_i(2t_1-t) - \cos \lambda_i t] dt_1 = -\frac{t}{2\lambda_i} \cos \lambda_i t + \frac{1}{2\lambda_i^2} \sin \lambda_i t. \end{aligned}$$

Как видно,  $a_i(t)$ , а вместе с тем и амплитуда колебаний неограниченно растут вместе с  $t$ .

#### § 4. Продольные колебания стержня со свободными концами

Кроме разобранных нами случаев применения метода Фурье, мы могли бы указать еще много других. Естественно, например, изучать таким образом уравнение

$$p(x) \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + q(x) \frac{\partial u}{\partial x} + r(x) u = \rho(x) \frac{\partial u}{\partial t} + F(x, t),$$

или

$$p(x) \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + q(x) \frac{\partial u}{\partial x} + r(x) u = \rho(x) \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} + F(x, t),$$

при условиях для  $u$  в момент  $t = t_0$  и на концах промежутка  $0 \leq x \leq 1$ , и ряд других.

Не вдаваясь в детали, рассмотрим один простейший пример применения изложенной теории.

Изучим решение уравнения

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = 0$$

при условиях

$$u \Big|_{t=0} = \Phi_0(x), \quad \frac{\partial u}{\partial t} \Big|_{t=0} = \Phi_1(x), \quad (\text{XXIII.33})$$

$$\frac{\partial u}{\partial x} \Big|_{x=0} = 0, \quad \frac{\partial u}{\partial x} \Big|_{x=1} = 0. \quad (\text{XXIII.34})$$

Эта задача возникает, например, при изучении продольных колебаний стержня, свободного по обоим концам.

Согласно изложенному методу, решение следует искать в виде ряда

$$u = \sum_{j=1}^{\infty} (a_j \cos \lambda_j t + b_j \sin \lambda_j t) U_j(x) + c_0 + c_1 t,$$

где  $U_j(x)$  суть решения дифференциального уравнения

$$\frac{d^2 U_j}{dx^2} + \lambda_j^2 U_j = 0. \quad (\text{XXIII.35})$$

В нашем случае нет надобности прибегать к помощи интегрального уравнения для отыскания решения уравнения (XXIII.35), удовлетворяющего граничным условиям:

$$\left. \frac{dU_j}{dx} \right|_{x=0} = 0 \quad \text{и} \quad \left. \frac{dU_j}{dx} \right|_{x=1} = 0.$$

Общее решение уравнения (XXIII.35) будет:

$$U_j = c_j \cos \lambda_j x + d_j \sin \lambda_j x,$$

если  $\lambda_j^2 < 0$ , или

$$U_j = c_j \operatorname{ch} i\lambda_j x + d_j \operatorname{sh} i\lambda_j x,$$

если  $\lambda_j^2 > 0$ .

В указанных случаях

$$\frac{dU_j}{dx} = \lambda_j (-c_j \sin \lambda_j x + d_j \cos \lambda_j x),$$

$$\frac{dU_j}{dx} = \lambda_j (c_j \operatorname{sh} i\lambda_j x + d_j \operatorname{ch} i\lambda_j x).$$

Первое из граничных условий заставляет считать  $d_i = 0$  в обоих случаях, а второе условие приводит к заключению, что мнимые значения  $\lambda_j$  (т. е. отрицательные для  $\lambda_j^2$ ) невозможны.

Таким образом,

$$U_j = c_j \cos \lambda_j x, \quad \frac{dU_j}{dx} = -\lambda_j c_j \sin \lambda_j x.$$

Пользуясь вторым граничным условием, заключаем, что

$$\sin \lambda_j = 0,$$

откуда

$$\lambda_j = j\pi.$$

и

$$U_j = c_j \cos j\pi x.$$

Известны формулы:

$$\int_0^1 \cos j\pi x \cos k\pi x dx = \begin{cases} \frac{1}{2}, & j = k; \\ 0, & j \neq k. \end{cases}$$

Если выбрать теперь  $c_j = \sqrt{2}$ , то мы получим искомую систему ортогональных нормированных функций  $U_j$  в виде

$$U_j = \sqrt{2} \cos j\pi x.$$

Коэффициенты  $a_j$  и  $b_j$  получим в виде

$$a_j = \sqrt{2} \int_0^1 \varphi_0(x) \cos j\pi x dx,$$

$$b_j = \frac{\sqrt{2}}{\pi j} \int_0^1 \varphi_1(x) \cos j\pi x dx,$$

и окончательный ответ в виде ряда

$$u = \sqrt{2} \sum_{j=1}^{\infty} [a_j \cos j\pi t + b_j \sin j\pi t] \cos j\pi x + c_0 + c_1 t,$$

где

$$c_0 = \int_0^1 \varphi_0(x) dx, \quad c_1 = \int_0^1 \varphi_1(x) dx.$$

Как мы видим, частоты собственных колебаний такого стержня будут иметь вид

$$\pi j, \quad j = 1, 2, \dots, n, \dots$$

Для того чтобы закончить изложение метода Фурье, мы сделаем еще несколько замечаний общего характера. В наших рассуждениях существенную роль играло то обстоятельство, что числа  $\lambda_j$  не сгущались нигде. Поэтому в формулах (XXIII.25) и (XXIII.26), которые мы рассматривали как аналог линейных преобразований  $n$  чисел, одно из переменных — значок  $i$  — принимал лишь счетное множество значений. Как выясняется при детальном исследовании, это обстоятельство тесно связано с фактом ограниченности области  $\Omega$ . Те свойства интегральных уравнений с симметрическим ядром, на которые мы опирались, могут потеряться, если область будет неограниченной.

При этом может случиться, например, что таких ортогональных нормированных собственных функций не существует. Они заменяются при этом целым множеством функций  $U(P, \xi)$ , зависящим от непрерывно меняющегося параметра  $\xi$ . Если задача несамосопряженная, то собственные значения  $\lambda$  могут быть не только вещественными, но и комплексными.

# ИНТЕГРАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ С ВЕЩЕСТВЕННЫМ СИММЕТРИЧЕСКИМ ЯДРОМ

## § 1. Простейшие свойства. Вполне непрерывные операторы

Мы видели выше, что задача об отыскании собственных значений и собственных функций для многих задач математической физики приводится при помощи функции Грина к задаче о собственных значениях и собственных функциях некоторого интегрального уравнения типа Фредгольма 2-го рода с вещественным симметрическим ядром, т. е. таким ядром, что

$$K(P, P_0) = K(P_0, P).$$

Мы будем изучать несколько более общее интегральное уравнение, а именно:

$$\varphi(P_0) = f(P_0) + \lambda \int_{\Omega} K(P_0, P) \varphi(P) \rho(P) dP, \quad (\text{XXIV.1})$$

и соответствующее однородное уравнение

$$\varphi(P_0) = \lambda \int_{\Omega} K(P_0, P) \varphi(P) \rho(P) dP, \quad (\text{XXIV.2})$$

где  $K(P_0, P)$  — симметрическая функция координат точек  $P_0$  и  $P$ , а  $\rho(P)$  — неотрицательная измеримая функция, называемая *весом* (или *нагрузкой*).

В случае  $\rho = 1$  получаем интегральные уравнения с симметрическим ядром.

Для рассматриваемых интегральных уравнений и, в частности, для интегральных уравнений с симметрическим ядром имеет место целый ряд важных предложений, к изучению которых мы и перейдем.

Будем говорить, что уравнение (XXIV.1) имеет *нагруженное симметрическое ядро* или *симметрическое ядро с нагрузкой*  $\rho(P)$ .

Для того чтобы не затруднять изложения, рассмотрим лишь тот случай, когда функция  $\rho(P)$  ограничена.

Предположим, кроме того, что функция  $\rho(P)$  обращается в нуль только на множестве меры нуль.

**Л е м м а 1.** Пусть  $\varphi(P)$  и  $\psi(P_0)$  — две произвольные функции, вещественные или комплексные<sup>1)</sup>, интегрируемые с квадратом модуля с весом  $\rho(P)$  в ограниченной области  $\Omega$ , т. е.

$$\int_{\Omega} |\varphi(P)|^2 \rho(P) dP < \infty, \quad \int_{\Omega} |\psi(P_0)|^2 \rho(P_0) dP_0 < \infty.$$

Далее, пусть вещественное ядро<sup>2)</sup>  $K(P, P_0)$  удовлетворяет неравенству

$$|K(P, P_0)| \leq \frac{A}{r^\alpha},$$

где  $r$  — расстояние между точками  $P$  и  $P_0$ ,  $\alpha < n$ . Тогда интеграл

$$\int_{\Omega} \int_{\Omega} |K(P, P_0) \varphi(P) \psi(P_0)| \rho(P) \rho(P_0) dP dP_0 \quad (\text{XXIV.3})$$

сходится.

Оценивая интеграл (XXIV.3) при помощи неравенства Буняковского, получим:

$$\begin{aligned} & \int_{\Omega} \int_{\Omega} |K(P, P_0) \varphi(P) \psi(P_0)| \rho(P) \rho(P_0) dP dP_0 \leq \\ & \leq \sqrt{\int_{\Omega} |\varphi(P)|^2 \rho(P) dP} \sqrt{\int_{\Omega} \left\{ \int_{\Omega} |K(P, P_0) \psi(P_0)| \rho(P_0) dP_0 \right\}^2 \rho(P) dP}. \end{aligned}$$

Если мы установим существование интеграла

$$\int_{\Omega} |K(P, P_0) \psi(P_0)| \rho(P_0) dP_0 \quad (*)$$

для почти всех  $P$ , а также сходимость интеграла

$$\int_{\Omega} \left\{ \int_{\Omega} |K(P, P_0) \psi(P_0)| \rho(P_0) dP_0 \right\}^2 \rho(P) dP, \quad (\text{XXIV.4})$$

то отсюда будет вытекать наша лемма.

<sup>1)</sup> Под комплексной функцией вещественного аргумента (или вещественных аргументов)  $\varphi(P)$  мы понимаем функцию, представимую так:

$$\varphi(P) = \varphi_1(P) + i\varphi_2(P),$$

где  $\varphi_1(P)$  и  $\varphi_2(P)$  — вещественные функции.

<sup>2)</sup> Ядро  $K(P, P_0)$  не предполагается симметрическим.

Имеем:

$$\begin{aligned} \int_{\Omega} |K(P, P_0) \psi(P_0)| \rho(P_0) dP_0 &\leq \\ &\leq \int_{\Omega} \frac{A}{r^\alpha} |\psi(P_0)| \rho(P_0) dP_0 = A \int_{\Omega} \frac{1}{r^{\alpha/2}} \frac{1}{r^{\alpha/2}} |\psi(P_0)| \rho(P_0) dP_0 \leq \\ &\leq A \sqrt{\int_{\Omega} \frac{\rho(P_0)}{r^\alpha} dP_0} \sqrt{\int_{\Omega} \frac{1}{r^\alpha} |\psi(P_0)|^2 \rho(P_0) dP_0}, \end{aligned}$$

но

$$A^2 \int_{\Omega} \frac{\rho(P_0) dP_0}{r^\alpha} \leq M. \quad (**)$$

где  $M$  — некоторая постоянная.

Следовательно, интеграл (\*) существует для всех тех точек  $P$ , для которых существует интеграл

$$\int_{\Omega} \frac{1}{r^\alpha} |\psi(P_0)|^2 \rho(P_0) dP_0. \quad (\text{XXIV.5})$$

Таким образом,

$$\begin{aligned} \int_{\Omega} \left[ \int_{\Omega} |K(P, P_0) \psi(P_0)| \rho(P_0) dP_0 \right]^2 \rho(P) dP &\leq \\ &\leq M \int_{\Omega} \left[ \int_{\Omega} \frac{1}{r^\alpha} |\psi(P_0)|^2 \rho(P_0) dP_0 \right] \rho(P) dP. \end{aligned}$$

Мы установим одновременно и существование почти везде интеграла (XXIV.5) и сходимость интеграла в правой части последнего неравенства, пользуясь теоремой Лебега — Фубини.

Докажем сходимость  $2n$ -мерного интеграла

$$\int_{\Omega} \int_{\Omega} \frac{1}{r^\alpha} |\psi(P_0)|^2 \rho(P_0) \rho(P) dP_0 dP. \quad (\text{XXIV.6})$$

Отсюда будет следовать, что кратный интеграл

$$\int_{\Omega} \left[ \int_{\Omega} \frac{1}{r^\alpha} |\psi(P_0)|^2 \rho(P_0) dP_0 \right] \rho(P) dP$$

будет иметь смысл и будет сходящимся, так же как и интеграл (XXIV.4).

Чтобы установить сходимость интеграла (XXIV.6), будем совершать интегрирование в другом порядке:

$$\int_{\Omega} \left[ |\psi(P_0)|^2 \rho(P_0) \int_{\Omega} \frac{1}{r^\alpha} \rho(P) dP \right] dP_0. \quad (\text{XXIV.7})$$

В силу (\*\*) подинтегральная функция меньше, чем

$$B |\psi(P_0)|^2 \rho(P_0),$$

где  $B$  — постоянная; следовательно, интеграл (XXIV.7) меньше, чем

$$B \int_{\Omega} |\psi(P_0)|^2 \rho(P_0) dP_0,$$

который сходится по условию леммы; значит, сходится и интеграл (XXIV.6); лемма доказана.

**С л е д с т в и е.** *Справедливо равенство*

$$\begin{aligned} \int_{\Omega} \varphi(P) \left\{ \int_{\Omega} K(P, P_0) \psi(P_0) \rho(P_0) dP_0 \right\} \rho(P) dP = \\ = \int_{\Omega} \psi(P_0) \left\{ \int_{\Omega} K(P, P_0) \varphi(P) \rho(P) dP \right\} \rho(P_0) dP_0. \end{aligned}$$

Доказательство следует из добавления к теореме Лебега — Фубини (см. лекцию VI).

Введем следующие обозначения:

$$\int_{\Omega} K(P_0, P) \varphi(P) \rho(P) dP = A\varphi, \quad (\text{XXIV.8})$$

$$\int_{\Omega} K(P_0, P) \psi(P_0) \rho(P_0) dP_0 = A^*\psi. \quad (\text{XXIV.9})$$

Из доказанного выше следует, что существуют интегралы

$$\int_{\Omega} |A\varphi|^2 \rho(P) dP, \quad \int_{\Omega} |A^*\psi|^2 \rho(P) dP.$$

Заметим, что в случае симметричности функции  $K(P_0, P)$  оператор  $A$  совпадает с оператором  $A^*$ . Пусть также

$$(\varphi, \psi) = \int_{\Omega} \varphi(P) \overline{\psi(P)} \rho(P) dP. \quad (\text{XXIV.10})$$

где  $\overline{\psi}$  обозначает комплексно сопряженную функцию к  $\psi$ . При этом очевидно  $(\varphi, \overline{\psi}) = \int_{\Omega} \varphi(P) \psi(P) \rho(P) dP$ .

Будем называть выражение  $(\varphi, \psi)$  *скалярным произведением* функции  $\varphi$  и  $\psi$ .

Отметим некоторые свойства этих символов:

1.  $A(a_1\varphi_1 + a_2\varphi_2) = a_1A\varphi_1 + a_2A\varphi_2$
2.  $(a_1\varphi_1 + a_2\varphi_2, \psi) = a_1(\varphi_1, \psi) + a_2(\varphi_2, \psi)$ .
3.  $(\varphi, a_1\psi_1 + a_2\psi_2) = \overline{a_1}(\varphi, \psi_1) + \overline{a_2}(\varphi, \psi_2)$ .
4.  $(\varphi, \psi) = \overline{(\psi, \varphi)}$ .
5. Для любой интегрируемой с квадратом функции  $\varphi$

$$(\varphi, \varphi) \geq 0,$$

причем знак равенства имеет место в том и только в том случае, если функция  $\varphi$  эквивалентна нулю.

Множители  $a_1$  и  $a_2$  в равенствах 1, 2, 3 — некоторые постоянные. Справедливость всех наших равенств устанавливается непосредственной проверкой.

Наше следствие может быть записано в форме

$$(\varphi, \overline{A^*\psi}) = (A\varphi, \bar{\psi}). \quad (\text{XXIV.11})$$

Для случая вещественной и симметрической функции  $K(P, P_0)$  и вещественных  $\varphi$  и  $\psi$  будем иметь  $(\varphi, A\psi) = (A\varphi, \psi)$ .

Переходим к изучению интегральных уравнений. Изучим прежде всего однородные уравнения. Условимся в дальнейшем рассматривать только такие собственные функции, у которых квадрат модуля интегрируем с весом  $\rho$ .

**Т е о р е м а 1.** Если  $\lambda_1$  и  $\lambda_2$  суть два различных характеристических числа уравнений

$$\varphi = \lambda_1 A\varphi$$

и

$$\psi = \lambda_2 A^*\psi,$$

то собственные функции этих уравнений  $\varphi$  и  $\psi$  удовлетворяют соотношению

$$(\varphi, \bar{\psi}) = 0. \quad (\text{XXIV.12})$$

В самом деле,

$$(\varphi, \overline{A^*\psi}) = \left( \varphi, \frac{1}{\lambda_2} \bar{\psi} \right) = \frac{1}{\lambda_2} (\varphi, \bar{\psi}),$$

$$(A\varphi, \bar{\psi}) = \left( \frac{1}{\lambda_1} \varphi, \bar{\psi} \right) = \frac{1}{\lambda_1} (\varphi, \bar{\psi});$$

из (XXIV.11) следует при этом

$$\lambda_2 (\varphi, \bar{\psi}) = \lambda_1 (\varphi, \bar{\psi}),$$

что возможно лишь, если  $(\varphi, \bar{\psi}) = 0$ , что и требовалось доказать.

Функции  $\varphi$  и  $\psi$ , удовлетворяющие (XXIV.12), мы будем называть ортогональными с весом  $\rho(P)$  или, когда это не поведет к недоразумениям, ортогональными.

**С л е д с т в и е.** Фундаментальные функции интегрального уравнения с нагруженным симметрическим ядром, соответствующие разным характеристическим числам, ортогональны.

В самом деле, для симметрического ядра с нагрузкой все фундаментальные функции уравнения  $\psi = \lambda A^*\psi$  просто превращаются в фундаментальные функции уравнения  $\varphi = \lambda A\varphi$ , ибо  $A \equiv A^*$ .

**Т е о р е м а 2.** Вещественное нагруженное симметрическое ядро не может иметь комплексных характеристических чисел.

**Д о к а з а т е л ь с т в о.** Пусть наше уравнение имеет характеристическое число  $\lambda_0$  и фундаментальную функцию  $\varphi_0$ , т. е.

$$\varphi_0 = \lambda_0 A \varphi_0.$$

Взяв сопряженные комплексные величины от обеих частей нашего уравнения и обращая внимание на то, что для вещественного ядра  $K(P, P_0)$

$$\overline{A\varphi} = A\bar{\varphi},$$

получим:

$$\bar{\varphi}_0 = \bar{\lambda}_0 A \bar{\varphi}_0.$$

Отсюда следует, что  $\bar{\lambda}_0$  и  $\bar{\varphi}_0$  суть также характеристическое число и фундаментальная функция нашего уравнения.

Поскольку  $\lambda_0 \neq \bar{\lambda}_0$ , на основании следствия из теоремы 1 видим, что  $\varphi_0$  и  $\bar{\varphi}_0$  должны быть ортогональны с весом  $\rho$ , т. е.

$$(\varphi_0, \bar{\varphi}_0) = \int_{\Omega} \varphi_0(P) \overline{\varphi_0(P)} \rho(P) dP = \int_{\Omega} |\varphi_0(P)|^2 \rho(P) dP = 0;$$

значит,  $\varphi_0 = 0$ , что и противоречит предположению о том, что  $\varphi_0$  есть нетривиальное решение уравнения

$$\varphi = \lambda A \varphi.$$

**Т е о р е м а 3.** Все фундаментальные функции вещественного симметрического ядра сами вещественны (точнее говоря, могут быть выбраны вещественными).

Пусть

$$\varphi_0(P) = \alpha(P) + i\beta(P)$$

— фундаментальная функция. Подставляя ее в уравнение, получим:

$$\varphi_0 = \alpha + i\beta = \lambda A \varphi_0 = \lambda A \alpha + i \lambda A \beta;$$

разделяя вещественную и мнимую части, получим:

$$\alpha = \lambda A \alpha, \quad \beta = \lambda A \beta.$$

Следовательно,  $\alpha$  и  $\beta$  суть сами фундаментальные функции, и вместо  $\varphi_0$  можно рассматривать именно обе эти функции; линейной комбинацией их будет наша функция  $\varphi_0$ .

**Л е м м а 2.** Все фундаментальные функции нагруженного симметрического ядра можно считать ортогональными с весом  $\rho$

Заметим, что для уравнения с симметрическим ядром описанного вида вся теория Фредгольма, очевидно, справедлива, ибо интегралы

$$\int_{\Omega} |K(P, P_0)| \rho(P) dP, \quad \int_{\Omega} |K(P, P_0)| \rho(P) dP$$

ограничены. В частности, каждому собственному значению  $\lambda$  отвечает лишь конечное число линейно независимых функций.

Перейдем к доказательству леммы. В самом деле, неортогональными могли бы быть лишь фундаментальные функции, соответствующие одному и тому же характеристическому числу  $\lambda$ . Пусть эти функции будут, например,  $\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_q$ . Вместо них мы рассмотрим их линейные комбинации:

$$\psi_1 = \varphi_1,$$

$$\psi_2 = \varphi_2 - \frac{(\psi_1, \bar{\varphi}_2)}{(\psi_1, \bar{\psi}_1)} \psi_1,$$

$$\psi_3 = \varphi_3 - \frac{(\psi_1, \bar{\varphi}_3)}{(\psi_1, \bar{\psi}_1)} \psi_1 - \frac{(\psi_2, \bar{\varphi}_3)}{(\psi_2, \bar{\psi}_2)} \psi_2,$$

$$\dots \dots \dots$$

$$\psi_k = \varphi_k - \frac{(\psi_1, \bar{\varphi}_k)}{(\psi_1, \bar{\psi}_1)} \psi_1 - \frac{(\psi_2, \bar{\varphi}_k)}{(\psi_2, \bar{\psi}_2)} \psi_2 - \dots - \frac{(\psi_{k-1}, \bar{\varphi}_k)}{(\psi_{k-1}, \bar{\psi}_{k-1})} \psi_{k-1}.$$

Методом полной индукции легко доказать, что каждая функция  $\psi_s$  ортогональна ко всем предыдущим, так как

$$(\psi_s, \bar{\psi}_t) = (\varphi_s, \bar{\psi}_t) - \frac{(\psi_1, \bar{\varphi}_s)}{(\psi_1, \bar{\psi}_1)} (\psi_1, \bar{\psi}_t) - \dots - \frac{(\psi_{s-1}, \bar{\varphi}_s)}{(\psi_{s-1}, \bar{\psi}_{s-1})} (\psi_{s-1}, \bar{\psi}_t).$$

В правой части все слагаемые нули по предположению индукции, ибо  $t < s$ , кроме  $(\varphi_s, \bar{\psi}_t)$  и  $-\frac{(\psi_t, \bar{\varphi}_s)}{(\psi_t, \bar{\psi}_t)} (\psi_t, \bar{\psi}_t)$ , которые взаимно уничтожаются. Очевидно,  $\psi_k$  являются решениями однородного уравнения, что и требовалось доказать.

**О п р е д е л е н и е.** Мы будем говорить, что последовательность  $\{\varphi_n\}$  функций с интегрируемым квадратом модуля *сходится в среднем с весом  $\rho$  к функции  $\varphi$*  с интегрируемым квадратом модуля, если справедливо соотношение

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\Omega} |\varphi_n - \varphi|^2 \rho dP = 0.$$

Заметим, что если последовательность  $\{\varphi_n\}$  функций с интегрируемым квадратом равномерно сходится к  $\varphi$ , то эта последовательность сходится в среднем к  $\varphi$ . Однако обратное предложение, очевидно, не имеет места. Если отказаться от требования равномерной сходимости, то можно построить примеры всюду сходящихся последовательностей, которые в среднем не сходятся.

В лекции XXII, § 7 мы встречались уже с понятием сходимости в среднем и доказали, что одна последовательность не может сходиться в среднем к двум различным функциям. Здесь мы напомним еще раз, что если предполагать интегрируемость

в смысле Лебега, то в упомянутом предложении следует считать различными только функции, значения которых различны на множестве положительной меры.

**О п р е д е л е н и е.** Назовем некоторое множество функций *компактным*, если из любой его бесконечной части можно выбрать сходящуюся последовательность.

При разных требованиях, наложенных на сходимость, которая может быть сходимостью в среднем или равномерной сходимостью и т. п., мы получим и разные условия компактности.

Компактные множества функций по своему определению весьма близко напоминают ограниченные множества точек. Ясно, что любая бесконечная часть ограниченного множества точек сама есть ограниченное бесконечное множество и поэтому имеет хотя одну предельную точку, а значит, и последовательность, сходящуюся к этой точке.

В курсе математического анализа вводится понятие равностепенной непрерывности множества функций. Напомним определение этого понятия.

Множество функций  $\{\varphi\}$  называется *равностепенно непрерывным*, если для любого положительного  $\varepsilon$  можно указать такое число  $\eta(\varepsilon)$ , что неравенство

$$|\varphi(P) - \varphi(P_1)| < \varepsilon$$

имеет место, как только расстояние между точками  $P$  и  $P_1$  меньше  $\eta(\varepsilon)$ , одновременно для всех функций, принадлежащих множеству  $\{\varphi\}$ .

Одним из важнейших применений понятия равностепенной непрерывности является так называемая теорема Арцела<sup>1)</sup>. Эта теорема гласит: *если некоторое множество функций  $\{\varphi\}$  равномерно ограничено и равностепенно непрерывно, то из него можно выделить равномерно сходящуюся последовательность.* (Равномерно ограниченным называется множество функций, удовлетворяющих неравенству  $|\varphi| < A$ , где  $A$  не зависит от  $\varphi$ .)

Пользуясь понятием компактности, мы можем сформулировать этот результат так:

*Множество, состоящее из равномерно ограниченных равностепенно непрерывных функций, будет компактным, если рассматривается равномерная сходимость или, тем более, сходимость в среднем.*

В самом деле, по теореме Арцела любое такое бесконечное множество имеет хотя одну предельную функцию, т. е. содержит равномерно сходящуюся последовательность. Разумеется, при этом

<sup>1)</sup> См. Степанов В. В., Курс дифференциальных уравнений, 4-е изд., глава II, § 2, стр. 64, или Петровский И. Г., Лекции по теории обыкновенных дифференциальных уравнений, § 11.

сходимость в среднем также имеет место, если область задания функций ограничена, что мы и будем предполагать. Очевидно, что множество функций, компактное для равномерной сходимости, компактно и для сходимости в среднем.

Будем называть множество функций  $\{\varphi\}$  *ограниченным в среднем с весом  $\rho(P)$* , если оно удовлетворяет условию

$$\int_{\Omega} |\varphi|^2 \rho dP \leq A.$$

**О п р е д е л е н и е.** Назовем *вполне непрерывным* оператором такой оператор  $A\varphi$ , который, будучи применен ко всем функциям некоторого *ограниченного в среднем* множества  $\{\varphi\}$ , превращает его в *компактное множество в смысле сходимости в среднем*. Если множество  $A\varphi$  будет *компактным в смысле равномерной сходимости*, то оператор  $A$  мы будем называть *усиленно вполне непрерывным*.

**Т е о р е м а 4.** *Интегральный оператор*

$$A\varphi = \int_{\Omega} K(P_0, P) \varphi(P) \rho(P) dP,$$

где функция  $K(P_0, P)$  непрерывна, а  $\rho(P)$  — интегрируемая функция, есть *усиленно вполне непрерывный оператор*.

Пусть  $\{\varphi\}$  — множество функций, ограниченное в среднем

$$\int_{\Omega} |\varphi|^2 \rho dP < A.$$

Пользуясь неравенством Буняковского, легко видеть, что семейство функций  $\{A\varphi\}$  является равномерно ограниченным. Пусть

$$\omega = A\varphi.$$

Тогда

$$|\omega|^2 \leq \int_{\Omega} |\varphi|^2 \rho dP \int_{\Omega} |K(P_0, P)|^2 \rho(P) dP \leq AM^2 B,$$

если

$$|K(P_0, P)| \leq M, \quad B = \int_{\Omega} \rho(P) dP.$$

Докажем, что семейство  $\{\omega\}$  *равностепенно непрерывно*.

Составим разность

$$\omega(P_1) - \omega(P_2) = \int_{\Omega} [K(P, P_1) - K(P, P_2)] \varphi(P) \rho(P) dP.$$

Имеем:

$$|\omega(P_1) - \omega(P_2)|^2 \leq \int_{\Omega} |\Phi(P)|^2 \rho(P) dP \int_{\Omega} |K(P, P_1) - K(P, P_2)|^2 \rho(P) dP.$$

Выберем точку  $P_2$  столь близко к  $P_1$ , чтобы иметь

$$|K(P, P_1) - K(P, P_2)| < \varepsilon.$$

Это возможно, так как ядро  $K(P, P_0)$  непрерывно в замкнутой области изменения переменных  $P, P_0$  и по известной теореме будет там равномерно непрерывно. При этом

$$|\omega(P_1) - \omega(P_2)|^2 \leq A \int_{\Omega} \varepsilon^2 \rho(P) dP = \varepsilon^2 AB,$$

где

$$B = \int_{\Omega} \rho(P) dP.$$

Мы видим, таким образом, что разность  $|\omega(P_1) - \omega(P_2)|$  может быть сделана меньше любого наперед заданного числа при  $P_1$ , достаточно близким к  $P_2$ , одновременно для всех  $\omega = A\Phi$ , так как в нашу оценку не вошли индивидуальные свойства функции  $\Phi$ . Следовательно, семейство  $\{A\Phi\}$  равностепенно непрерывно. Отсюда следует компактность этого семейства в смысле равномерной сходимости и, тем более, в смысле сходимости в среднем.

Предположим теперь, что ядро  $K(P_0, P)$  вещественно и непрерывно всюду в области  $\Omega \times \Omega$  по обоим переменным, за исключением множества  $\{P = P_0\}$  и везде в области  $\Omega \times \Omega$  удовлетворяет неравенству

$$|K(P_0, P)| \leq \frac{A}{r^{\frac{n}{2}-\alpha}}, \quad \alpha > 0. \quad (\text{XXIV.13})$$

Такие ядра мы будем называть *почти регулярными*. Справедлива  
Т е о р е м а 5. *Интегральный оператор  $A$ :*

$$A\Phi = \int_{\Omega} K(P_0, P) \Phi(P) \rho(P) dP,$$

где ядро  $K(P_0, P)$  почти регулярно, а функция  $\rho(P)$  ограничена, представляет собою усиленно вполне непрерывный оператор.

Доказательство этой теоремы весьма близко к доказательству предыдущей теоремы.

Пусть  $\{\Phi\}$  — семейство функций, равномерно ограниченное в среднем. Докажем, что семейство  $\{A\Phi\}$  равномерно ограничено и равностепенно непрерывно.

Как и прежде, равномерная ограниченность следует из неравенства Буняковского. В самом деле, если

$$\int_{\Omega} |\varphi(P)|^2 \rho(P) dP \leq M,$$

то

$$\begin{aligned} \left[ \int_{\Omega} K(P_0, P) \varphi(P) \rho(P) dP \right]^2 &\leq \\ &\leq \left[ \int_{\Omega} |K(P_0, P)|^2 \rho(P) dP \right] \left[ \int_{\Omega} |\varphi(P)|^2 \rho(P) dP \right]. \end{aligned}$$

В силу условия (XXIV.13) имеем:

$$\int_{\Omega} [K(P_0, P)]^2 \rho(P) dP \leq \int_{\Omega} \frac{A^2}{r^{n-2\alpha}} \rho(P) dP \leq C,$$

где  $C$  — некоторая постоянная. Пользуясь этим, получим:

$$\left[ \int_{\Omega} K(P_0, P) \varphi(P) \rho(P) dP \right]^2 \leq MC.$$

Ограниченность семейства  $\{A\varphi\}$  доказана.

Пусть теперь  $\omega = A\varphi$ . Составим разность

$$\omega(P_1) - \omega(P_2) = \int_{\Omega} [K(P_1, P) - K(P_2, P)] \varphi(P) \rho(P) dP.$$

Имеем:

$$\begin{aligned} [\omega(P_1) - \omega(P_2)]^2 &\leq \int_{\Omega} |\varphi(P)|^2 \rho(P) dP \int_{\Omega} |K(P_1, P) - \\ &- K(P_2, P)|^2 \rho(P) dP \leq M \int_{\Omega} |K(P_1, P) - K(P_2, P)|^2 \rho(P) dP = MI, \end{aligned}$$

где через  $I$  обозначен интеграл

$$\int_{\Omega} |K(P_1, P) - K(P_2, P)|^2 \rho(P) dP. \quad (\text{XXIV.14})$$

Оценим этот последний интеграл. Функция  $|K(P_1, P) - K(P_2, P)|^2$  представляет собой функцию  $3n$  координат точек  $P, P_1, P_2$ , непрерывную в области  $\Omega \times \Omega \times \Omega$  всюду, кроме множества точек  $\{P = P_1 \text{ и } P = P_2\}$ . Пусть  $r_1$  — расстояние от точки  $P$  до точки  $P_1$ , а  $r_2$  — расстояние от  $P$  до  $P_2$ . В пространстве  $3n$  переменных исключим из области  $\Omega \times \Omega \times \Omega$  открытые множества точек, удовлетворяющих условиям  $r_1 < \eta$  и  $r_2 < \eta$ , где  $\eta$  — любое наперед заданное положительное число. В оставшемся замкнутом множестве функция  $|K(P_1, P) - K(P_2, P)|^2$  будет, по теореме

Вейерштрасса, равномерно непрерывной. При  $P_1 = P_2$  она обращается в нуль. Следовательно, при любом  $\varepsilon > 0$  можно указать такое положительное число  $\delta(\varepsilon, \eta)$ , что коль скоро расстояние между точками  $P_1$  и  $P_2$ , которое мы обозначим через  $r^*$ , будет меньше  $\delta$ , то будет иметь место неравенство

$$|K(P_1, P) - K(P_2, P)|^2 < \varepsilon.$$

Воспользуемся этим замечанием для оценки интересующего нас интеграла. Пусть задано некоторое положительное число  $\varepsilon$ . Окружая в области изменения  $P$  обе особые точки  $P_1, P_2$  малыми шарами радиуса  $\eta$  и разбивая интеграл (XXIV.14) на две части, положим:

$$I_1 = \int_{\substack{r_1 < \eta \\ r_2 < \eta}} |K(P_1, P) - K(P_2, P)|^2 \rho(P) dP;$$

$$I_2 = \int_{\substack{r_1 \geq \eta \\ \text{или} \\ r_2 \geq \eta}} |K(P_1, P) - K(P_2, P)|^2 \rho(P) dP.$$

Тогда  $I = I_1 + I_2$ . Нетрудно видеть, что  $\eta(\varepsilon)$  всегда можно взять столь малым, чтобы иметь

$$I_1 \leq \frac{\varepsilon}{2}.$$

Действительно,

$$\begin{aligned} [K(P_1, P) - K(P_2, P)]^2 &\leq \\ &\leq [K(P_1, P) - K(P_2, P)]^2 + [K(P_1, P) + K(P_2, P)]^2 = \\ &= 2[K(P_1, P)]^2 + 2[K(P_2, P)]^2 \end{aligned}$$

и, следовательно,

$$I_1 \leq 2 \int_{\substack{r_1 < \eta \\ r_2 < \eta}} [K(P_1, P)]^2 \rho(P) dP + 2 \int_{\substack{r_1 < \eta \\ r_2 < \eta}} [K(P_2, P)]^2 \rho(P) dP.$$

Отсюда, применяя оценку (XXIV.13) для  $K(P_1, P), K(P_2, P)$ , получаем:

$$I_1 < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Выбрав величину  $\eta(\varepsilon)$ , мы можем далее найти  $\delta(\varepsilon)$  таким образом, чтобы везде под знаком интеграла  $I_2$  имело место неравенство

$$[K(P_1, P) - K(P_2, P)]^2 \leq \frac{\varepsilon}{2 \sup_P \rho(P) m \Omega},$$

где  $m\Omega$  — объем области  $\Omega$ , как только  $r^* < \delta$ .

При этом будем иметь:

$$I_2 \leq \frac{\varepsilon}{2m\Omega} \int_{\Omega} \frac{\rho(P)}{\sup \rho} dP \leq \frac{\varepsilon}{2}.$$

Отсюда

$$I \leq \varepsilon.$$

Мы видим, что величина  $\delta(\varepsilon)$  оказалась зависящей только от расстояния между точками  $P_1$  и  $P_2$  и не зависит от функции  $\varphi$ . Следовательно, множество функций  $\{A\varphi\}$  равномерно непрерывно. Выше было доказано, что оно равномерно ограничено. В силу теоремы Арцела множество  $\{A\varphi\}$  является компактным в смысле равномерной сходимости. Таким образом, оператор  $A$  является усиленно вполне непрерывным, что и требовалось доказать.

Мы выясним далее, что свойство оператора быть вполне непрерывным есть чрезвычайно важное свойство, ибо именно из него будут следовать основные теоремы для уравнений с нагруженным симметрическим ядром.

Можно доказать, что вся качественная сторона теории Фредгольма для несимметрических ядер, т. е. альтернатива Фредгольма, условия разрешимости уравнений и т. д., целиком переносится на уравнения

$$\varphi = \lambda A\varphi + f$$

с вполне непрерывным оператором  $A$ . Однако мы не будем останавливаться на этом вопросе. В дальнейшем для того чтобы установить полную непрерывность оператора  $A$ , мы будем убеждаться, что он является усиленно вполне непрерывным.

## § 2. Доказательство существования собственного значения

*Т е о р е м а 6. Интегральное уравнение*

$$\varphi = \lambda A\varphi \tag{XXIV.15}$$

*с вещественным симметрическим ядром, если  $A$  — вполне непрерывный оператор, имеет по крайней мере одно собственное значение.*

**Д о к а з а т е л ь с т в о.** Заметим прежде всего, что для наших целей достаточно установить существование хотя бы одного характеристического числа и фундаментальной функции у уравнения

$$\varphi = \mu A^2\varphi.$$

В самом деле, перепишем это последнее уравнение в виде

$$\varphi - \mu A^2\varphi = 0,$$

и пусть  $\mu_0$  — его собственное значение, а  $\varphi_0$  — соответствующая собственная функция. Полагая  $\mu_0 = \lambda_0^2$ , имеем:

$$(E - \lambda_0 A) [(E + \lambda_0 A) \varphi_0] = 0,$$

в обозначениях лекции XVIII.

Левая часть последнего уравнения может обратиться в нуль лишь в том случае, если функция

$$\psi_0 = (E + \lambda_0 A) \varphi_0$$

является решением уравнения

$$(E - \lambda A) \psi = 0 \quad \text{при} \quad \lambda = \lambda_0.$$

Следовательно, либо  $\psi_0 = 0$ , либо уравнение  $(E - \lambda_0 A) \psi_0 = 0$  имеет нетривиальное решение. В первом случае имеем:

$$(E + \lambda_0 A) \varphi_0 = 0,$$

и, значит,  $\varphi_0$  есть собственная функция уравнения (XXIV.15), отвечающая собственному значению  $\lambda = -\lambda_0$ . Во втором случае также получаем существование собственного значения  $\lambda = \lambda_0$  у уравнения (XXIV.15).

Рассмотрим выражение

$$\frac{(A\varphi, A\varphi)}{(\varphi, \varphi)} = \frac{(\varphi, A^2\varphi)}{(\varphi, \varphi)}$$

для всевозможных функций  $\varphi$ , вещественных и интегрируемых с квадратом и не эквивалентных нулю. Это отношение не может равняться нулю для всех  $\varphi$ , ибо иначе  $A\varphi$  было бы тождественным нулем. Очевидно, что оно не отрицательно. Оно не может, кроме того, принимать неограниченно больших значений. Действительно, это отношение не меняется от умножения функции на любую постоянную. Поэтому достаточно установить ограниченность этого отношения для функций, равномерно ограниченных в среднем, а это очевидным образом вытекает из доказанного ранее. Следовательно, выражение  $\frac{(A\varphi, A\varphi)}{(\varphi, \varphi)}$  имеет точную верхнюю границу, которую мы обозначим через  $\kappa_1$ .

При этом, очевидно,

$$\frac{(A^2\varphi, A^2\varphi)}{(\varphi, \varphi)} = \frac{(A^2\varphi, A^2\varphi)}{(A\varphi, A\varphi)} \frac{(A\varphi, A\varphi)}{(\varphi, \varphi)} \leq \kappa_1^2. \quad (\text{XXIV.16})$$

Пусть  $\varphi_n$  — последовательность функций, таких, что

$$(\varphi_n, \varphi_n) = 1, \quad (\text{XXIV.17})$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (A\varphi_n, A\varphi_n) = \kappa_1. \quad (\text{XXIV.18})$$

Такую последовательность всегда можно построить. По свойству верхней границы существует последовательность  $\varphi_n^*$ , такая, что

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(A\varphi_n^*, A\varphi_n^*)}{(\varphi_n^*, \varphi_n^*)} = \kappa_1.$$

Полагая затем

$$\varphi_n = \frac{\varphi_n^*}{\sqrt{(\varphi_n^*, \varphi_n^*)}},$$

получим искомую последовательность.

Рассмотрим последовательность

$$\psi_n = \kappa_1 \varphi_n - A^2 \varphi_n.$$

Докажем, что

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (\psi_n, \psi_n) = 0. \quad (\text{XXIV.19})$$

В самом деле,

$$(\psi_n, \psi_n) = \kappa_1^2 (\varphi_n, \varphi_n) - 2\kappa_1 (\varphi_n, A^2 \varphi_n) + (A^2 \varphi_n, A^2 \varphi_n).$$

В силу (XXIV.16) имеем:

$$(\psi_n, \psi_n) \leq 2\kappa_1^2 - 2\kappa_1 (\varphi_n, A^2 \varphi_n) = 2\kappa_1 (\kappa_1 - (A\varphi_n, A\varphi_n)).$$

Пользуясь (XXIV.18), убеждаемся в справедливости (XXIV.19).

Таким образом, последовательность функций  $\kappa_1 \varphi_n - A^2 \varphi_n$  стремится к нулю в среднем. Благодаря полной непрерывности оператора  $A^2$  из последовательности  $A^2 \varphi_n$  можно выбрать подпоследовательность  $A^2 \varphi_{n_k}$ , сходящуюся в среднем к некоторой функции. Но

$$\lim A^2 \varphi_{n_k} = \kappa_1 \lim \varphi_{n_k}, \quad (\text{XXIV.20})$$

где предел справа понимается в среднем. Значит, последовательность  $\varphi_{n_k}$  также имеет своим пределом в среднем некоторую функцию, которую мы обозначим через  $\varphi_0$ . Переходя к пределу в соотношении (XXIV.20), получим:

$$\kappa_1 \varphi_0 - A^2 \varphi_0 = 0.$$

Или, полагая

$$\kappa_1 = \frac{1}{\mu_1},$$

имеем:

$$\varphi_0 - \mu_1 A^2 \varphi_0 = 0.$$

Следовательно, уравнение (XXIV.15) имеет собственное значение  $\mu_1$ , что и требовалось доказать.

Сопоставляя теоремы 4, 5 и 6, мы видим, что доказано существование по крайней мере одной собственной функции и одного собственного значения для интегральных уравнений с нагруженными вещественными симметричными ядрами в двух случаях — для непрерывных ядер и для почти регулярных ядер.

Важно отметить, что в этих случаях собственная функция, существование которой мы доказали, всегда непрерывна. Это следует из усиленной полной непрерывности оператора  $A$ .

---

# ЛЕКЦИЯ XXV

## БИЛИНЕЙНАЯ ФОРМУЛА И ТЕОРЕМА ГИЛЬБЕРТА — ШМИДТА

### § 1. Билинейная формула

Рассматривая интегральное уравнение с симметрическим нагруженным ядром

$$\varphi = \lambda A\varphi, \quad (\text{XXV.1})$$

мы доказали в предыдущей лекции, что уравнение это всегда имеет фундаментальную функцию  $\varphi_1$  и характеристическое число  $\lambda_1$ . Умножая эту функцию на постоянную, добьемся того, чтобы иметь

$$\int_{\Omega} [\varphi_1(P)]^2 \rho(P) dP = 1.$$

Введем теперь новый интегральный оператор  $B_1\varphi$ , определяемый условиями:

$$\psi(P_0) = B_1\varphi \equiv \frac{1}{\lambda_1} \varphi_1(P_0) \int_{\Omega} \varphi_1(P) \varphi(P) \rho(P) dP.$$

Очевидно, ядром операции  $B_1$  служит

$$L_1(P, P_0) = \frac{\varphi_1(P_0) \varphi_1(P)}{\lambda_1}.$$

Уравнение

$$\varphi = \lambda B_1\varphi \quad (\text{XXV.2})$$

имеет, очевидно, одно собственное значение  $\lambda_1$  и одну фундаментальную функцию  $\varphi_1$ . В самом деле, функция  $B_1\varphi$  отличается лишь множителем от функции  $\varphi_1$ . Следовательно, при любом  $\lambda$  решением уравнения (XXV.2), с точностью до постоянного множителя, может служить только функция  $\varphi_1$ . Подставляя  $\varphi = \varphi_1$  в (XXV.2), получим:

$$\varphi_1(P) = \frac{\lambda}{\lambda_1} \varphi_1(P),$$

откуда

$$\lambda = \lambda_1.$$

**Л е м м а.** Все фундаментальные функции интегрального уравнения

$$\varphi = \lambda (A - B_1) \varphi \quad (\text{XXV.3})$$

с ядром

$$K - L = K(P, P_0) - \frac{\varphi_1(P) \varphi_1(P_0)}{\lambda_1} \quad (\text{XXV.4})$$

являются фундаментальными функциями уравнения (XXV.1) при тех же самых значениях  $\lambda$ . Обратно, все фундаментальные функции уравнения (XXV.1), ортогональные к  $\varphi_1$ , служат фундаментальными функциями уравнения (XXV.3) при тех же значениях  $\lambda$ .

**Д о к а з а т е л ь с т в о.** Пусть  $\varphi_k$  ( $k \neq 1$ ) есть некоторое решение уравнения (XXV.1), соответствующее собственному значению  $\lambda_k$ . Тогда

$$B_1 \varphi_k = 0$$

в силу того, что все фундаментальные функции уравнения (XXV.1) ортогональны. Значит,

$$(A - B_1) \varphi_k = A \varphi_k = \frac{1}{\lambda_k} \varphi_k,$$

т. е.

$$\varphi_k = \lambda_k (A - B_1) \varphi_k.$$

Далее,

$$\lambda (A - B_1) \varphi_1 = 0.$$

Следовательно, все решения уравнения (XXV.1), кроме  $\varphi_1$ , удовлетворяют уравнению (XXV.3) и притом с теми же собственными значениями.

Докажем теперь, что всякая собственная функция уравнения (XXV.3) удовлетворяет уравнению (XXV.1).

Установим прежде всего, что все решения (XXV.3) при любом  $\lambda$  ортогональны к  $\varphi_1$ . В самом деле, из (XXV.3) имеем:

$$(\varphi, \varphi_1) = \lambda [(A - B_1) \varphi, \varphi_1] = \lambda (\varphi, (A - B_1) \varphi_1) = 0.$$

Пусть теперь  $\varphi_k^*$  — какое угодно решение (XXV.3), соответствующее  $\lambda = \lambda^*$ . В силу того, что  $\varphi_k^*$  ортогонально к  $\varphi_1$ , имеем:

$$B_1 \varphi_k^* = 0.$$

Таким образом,

$$(A - B_1) \varphi_k^* = A \varphi_k^*$$

и, следовательно,

$$\varphi_k^* = \lambda^* (A - B_1) \varphi_k^* = \lambda^* A \varphi_k^*,$$

что и требовалось доказать.

Обозначим для краткости

$$A - B_1 = A_1.$$

Оператор  $A_1$  есть опять симметрический интегральный оператор. Могут представиться две возможности: или его ядро — тождественный нуль, или он имеет еще по крайней мере одну фундаментальную функцию  $\varphi_2(P)$ , соответствующую собственному значению  $\lambda_2$  ( $\lambda_2$  может иногда быть равным  $\lambda_1$ ). Но тогда мы сможем составить операцию  $B_2$  с ядром

$$\frac{\varphi_2(P) \varphi_2(P_0)}{\lambda_2}$$

и, повторяя прежние рассуждения, прийти к оператору

$$A_2 = A - B_1 - B_2,$$

для которого интегральное уравнение

$$\varphi = \lambda A_2 \varphi$$

будет иметь все те же и только те фундаментальные функции, что и (XXV.1), кроме  $\varphi_1$  и  $\varphi_2$ .

Будем продолжать этот процесс.

Если ядро оператора  $A$  имеет лишь  $m$  собственных функций, то оператор

$$A_m = A - B_1 - B_2 - \dots - B_m \quad (\text{XXV.5})$$

окажется не имеющим ни одной фундаментальной функции, т. е. тождественно равным нулю.

Отсюда мы имеем теорему.

**Т е о р е м а 1.** *Симметрическое нагруженное ядро, имеющее конечное число фундаментальных функций, представляется в виде*

$$K(P, P_0) = \sum_{i=1}^m \frac{\varphi_i(P) \varphi_i(P_0)}{\lambda_i} \quad (\text{XXV.6})$$

и, следовательно, является вырожденным.

Если ядро  $K(P, P_0)$  имеет бесконечное множество собственных функций, то мы можем, расположив все  $\lambda_m$  в порядке возрастания абсолютной величины, получить операторы

$$A_m = A - B_1 - B_2 - \dots - B_m, \quad m = 1, 2, 3 \dots$$

все собственные значения которых при достаточно больших  $m$  сколь угодно велики по абсолютной величине, так как на основании 4-й теоремы Фредгольма последовательность  $\{\lambda_m\}$ , если она бесконечна, должна быть неограниченной. Пусть

$$\kappa_m = \frac{1}{\lambda_m^2}.$$

Тогда для всех  $\varphi$ , таких, что  $(\varphi, \varphi) = 1$ ,

$$\max(A_m \varphi, A_m \varphi) = \kappa_m$$

В самом деле, если бы  $(A_m \varphi, A_m \varphi)$  могло принимать значения, большие, чем  $\lambda_m$ , уравнение

$$\varphi = \lambda A_m \varphi$$

имело бы собственное значение  $\lambda_{m+1}$ , причем

$$|\lambda_{m+1}| < |\lambda_m|,$$

что невозможно.

Мы имеем, таким образом,

$$\lim_{m \rightarrow \infty} (A_m \varphi, A_m \varphi) = 0 \quad (\text{XXV.7})$$

и притом равномерно для всех  $\varphi$ , равномерно ограниченных в среднем.

В известном смысле равенство (XXV.7) говорит о том, что  $A_n \varphi$  стремится к нулю; следовательно, ядро оператора  $A - \sum_{i=1}^m B_i$  стремится к нулю. Поэтому ряд

$$\sum_{i=1}^{\infty} \frac{\varphi_i(P) \varphi_i(P_0)}{\lambda_i}$$

в каком-то смысле представляет ядро  $K(P, P_0)$ .

Если бы оказалось, что ряд  $\sum \frac{\varphi_i(P) \varphi_i(P_0)}{\lambda_i}$  равномерно сходится, то ядро оператора  $A - \sum_{i=1}^{\infty} B_i$  оказалось бы ядром, не имеющим собственных значений, т. е. равнялось бы нулю.

Таким образом, нами получена

**Т е о р е м а 2.** (Б и л и н е й н а я ф о р м у л а.) Если ряд

$$\sum_{i=1}^{\infty} \frac{\varphi_i(P) \varphi_i(P_0)}{\lambda_i} \quad (\text{XXV.8})$$

сходится равномерно по двум переменным, то сумма его равна ядру  $K(P, P_0)$ :

$$K(P, P_0) = \sum_{i=1}^{\infty} \frac{\varphi_i(P) \varphi_i(P_0)}{\lambda_i}.$$

Однако равномерной сходимости ряда (XXV.8) может вообще и не быть. При этом представляет интерес еще один вопрос. Назовем функцию  $f(P_0)$ , имеющую вид

$$f(P_0) = \int_{\Omega} K(P, P_0) h(P) \rho(P) dP,$$

где функция  $h$  интегрируема с квадратом, *истокообразно* представлена через  $h$  с помощью ядра  $K$ .

Подставив вместо  $K(P, P_0)$  его предполагаемое представление (XXV.8), мы получили бы для  $f$  формулу

$$f(P_0) = \sum_{i=1}^{\infty} \varphi_i(P_0) \int_{\Omega} \frac{\varphi_i(P) h(P) \rho(P) dP}{\lambda_i} = \sum_{i=1}^{\infty} \frac{h_i}{\lambda_i} \varphi_i(P_0), \quad (\text{XXV.9})$$

где

$$h_i = \int_{\Omega} h(P) \varphi_i(P) \rho(P) dP.$$

Докажем теорему.

**Т е о р е м а 3.** Если  $f(P_0)$  — функция, *представимая истокообразно* через  $h$ , причем интеграл

$$\int_{\Omega} h^2(P) \rho(P) dP$$

сходится, то ряд

$$\sum_{i=1}^{\infty} \frac{h_i}{\lambda_i} \varphi_i(P_0) \quad (\text{XXV.10})$$

сходится в среднем и сумма его равна  $f(P_0)$ . Иными словами,

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \int_{\Omega} [f(P_0) - \sum_{i=1}^N \frac{h_i}{\lambda_i} \varphi_i(P_0)]^2 \rho(P_0) dP_0 = 0. \quad (\text{XXV.11})$$

Эта теорема есть очевидное следствие формулы (XXV.7). В самом деле,

$$f(P_0) - \sum_{i=1}^N \frac{h_i}{\lambda_i} \varphi_i(P_0) = \int_{\Omega} \left( K - \sum_{i=1}^N L_i \right) h(P) \rho(P) dP = A_N h,$$

откуда, применяя формулу (XXV.7), сразу получим нашу теорему.

В свете доказанных теорем нам легко будет в дальнейшем уяснить смысл рассуждения, с помощью которого мы усганавливаем существование собственных значений. Докажем сначала лемму.

**Л е м м а 2.** (Н е р а в е н с т в о Б е с с е л я.) Пусть  $\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_n, \dots$  — конечная или бесконечная последовательность вещественных, ортогональных и нормированных с весом  $\rho$  функций:

$$\int_{\Omega} \varphi_i(P) \varphi_j(P) \rho(P) dP = \begin{cases} 1, & i = j, \\ 0, & i \neq j, \end{cases}$$

и пусть  $f$  — некоторая функция с интегрируемым квадратом

$$\int_{\Omega} f^2 \rho \, dP = A.$$

Назовем числа

$$f_i = \int_{\Omega} f \varphi_i \rho \, dP$$

коэффициентами Фурье для функции  $f$ . Тогда ряд  $\sum_{i=1}^{\infty} f_i$  сходится и сумма его не превосходит  $A$ :

$$\sum_{i=1}^{\infty} f_i \leq A. \quad (\text{XXV.12})$$

Если для некоторой функции неравенство (XXV.12) превращается в равенство, то говорят, что система функций замкнута по отношению к  $f$ . Система функций, замкнутая по отношению ко всем функциям с интегрируемым квадратом, называется просто замкнутой.

Неравенство (XXV.12) носит название *неравенства Бесселя*. Для доказательства леммы установим сначала, что

$$\sum_{i=1}^N f_i' \leq A,$$

откуда при  $N \rightarrow \infty$  сразу получим доказательство нашей леммы. Имеем:

$$\begin{aligned} 0 &\leq \int_{\Omega} \left( f - \sum_{i=1}^N \varphi_i f_i \right)^2 \rho \, dP = \\ &= \int_{\Omega} f^2 \rho \, dP - 2 \sum_{i=1}^N f_i \int_{\Omega} f \varphi_i \rho \, dP + \sum_{i=1}^N f_i^2 \int_{\Omega} \varphi_i^2 \rho \, dP = \\ &= \int_{\Omega} f^2 \rho \, dP - \sum_{i=1}^N f_i^2 = A - \sum_{i=1}^N f_i^2. \end{aligned}$$

Лемма доказана.

Замкнутость системы  $\{\varphi_i\}$  по отношению к  $f$  имеет следующий смысл. Если

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^N f_i^2 = A,$$

то

$$\lim_{N \rightarrow \infty} [A - \sum_{i=1}^N f_i^2] = 0$$

и, значит,

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \int_{\Omega} \left( f - \sum_{i=1}^N \varphi_i f_i \right)^2 \rho \, dP = 0,$$

т. е. функция  $f(P)$  представима рядом  $\sum_{i=1}^{\infty} f_i \varphi_i(P)$ , сходящимся в среднем.

Теорема 3 устанавливает, таким образом, замкнутость системы фундаментальных функций по отношению к любой истокообразно представленной функции.

**Л е м м а 3.** Пусть

$$u_1(P), u_2(P), \dots, u_N(P)$$

— какая-то система ортогональных нормированных функций, а  $f(P)$  — произвольная функция с интегрируемым квадратом. Будем исследовать минимум интеграла

$$I_N = \int_{\Omega} \left[ f(P) - \sum_{i=1}^N a_i u_i(P) \right]^2 dP$$

при всевозможных  $a_i$ .

Этот минимум достигается при  $a_i = f_i$ , где

$$f_i = \int_{\Omega} f(P) u_i(P) dP$$

и равен

$$\int_{\Omega} [f(P)]^2 dP - \sum_{i=1}^N f_i^2.$$

В самом деле, пусть

$$f(P) = \sum_{i=1}^N f_i u_i(P) + R_N(P); \quad (\text{XXV.13})$$

умножая обе части (XXV.13) на  $u_i(P)$  и интегрируя, получим:

$$\int_{\Omega} R_N(P) u_i(P) dP = 0 \quad (i = 1, 2, \dots, N).$$

При этом

$$\begin{aligned} I_N &= \int_{\Omega} \left[ \sum_{i=1}^N (f_i - a_i) u_i(P) + R_N(P) \right]^2 dP = \\ &= \int_{\Omega} R_N^2(P) dP + \sum_{i=1}^N (f_i - a_i)^2, \end{aligned}$$

Очевидно, что это выражение будет иметь минимум при  $a_i = f_i$ . Тогда:

$$\int_{\Omega} R_N^1(P) dP = \int_{\Omega} \left[ f(P) - \sum_{i=1}^N f_i u_i(P) \right]^2 dP = \int_{\Omega} f^2(P) dP - \sum_{i=1}^N f_i^2,$$

что и требовалось доказать.

Сделаем еще два небольших замечания.

**Т е о р е м а 4.** Для любой функции  $\psi$  с интегрируемым квадратом справедливо равенство

$$(\psi, A\psi) = \sum_{i=1}^{\infty} \frac{\psi_i^2}{\lambda_i}, \quad (\text{XXV.14})$$

где  $\psi_i$  обозначают коэффициенты Фурье функции  $\psi$ , т. е.

$$\psi_i = \int_{\Omega} \psi(P) \varphi_i(P) \rho(P) dP.$$

Заметим, что  $A_m \psi = A\psi - \sum_{i=1}^m \frac{\psi_i \varphi_i(P)}{\lambda_i}$ , следовательно,

$$(\psi, A_m \psi) = (\psi, A\psi) - \sum_{i=1}^m \left( \psi, \frac{\psi_i \varphi_i(P)}{\lambda_i} \right) = (\psi, A\psi) - \sum_{i=1}^m \frac{\psi_i^2}{\lambda_i}.$$

Но

$$\begin{aligned} |(\psi, A_m \psi)| &= \left| \int_{\Omega} \psi A_m \psi \rho dP \right| \leq \\ &\leq \sqrt{\int_{\Omega} \psi^2 \rho dP} \sqrt{\int_{\Omega} (A_m \psi)^2 \rho dP} \leq \sqrt{\int_{\Omega} \psi^2 \rho dP} \kappa_m. \end{aligned}$$

Так как  $\kappa_m \rightarrow 0$  при  $m \rightarrow \infty$ , то и величина  $(\psi, A_m \psi)$  стремится к нулю.

Мы имеем

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \left| (\psi, A\psi) - \sum_{i=1}^m \frac{\psi_i^2}{\lambda_i} \right| = 0,$$

что и требовалось доказать.

**С л е д с т в и е.** Если все собственные значения  $\lambda_j$  положительны, то и  $(\psi, A\psi) \geq 0$  для любых  $\psi$ , и обратно, если  $(\psi, A\psi)$  никогда не принимает отрицательных значений, то все  $\lambda_i$  положительны.

Ядра, имеющие только положительные собственные значения, называются положительно определенными.

**Теорема 5.** *Наименьшее собственное значение положительно определенного ядра определяется равенством*

$$\frac{1}{\lambda_0} = \sup_{(\psi, \psi)=1} (\psi, A\psi). \quad (\text{XXV.15})$$

В самом деле,  $(\psi, A\psi) = \frac{1}{\lambda_0}$  при  $\psi = \varphi_0$ . С другой стороны,

$$\sum_{i=1}^{\infty} \frac{\psi_i^2}{\lambda_i} \leq \sum_{i=1}^{\infty} \frac{\psi_i^2}{\lambda_0},$$

где  $\lambda_0$  — наименьшее положительное из  $\lambda_i$ , и так как  $(\psi, \psi) = 1$ , то в силу (XXV.12)

$$\sum_{i=1}^{\infty} \frac{\psi_i^2}{\lambda_i} \leq \frac{1}{\lambda_0},$$

что и требовалось доказать.

Напомним, что именно путем определения верхней грани выражения  $(\psi, A\psi)$  при условии  $(\psi, \psi) = 1$  и было установлено существование собственного значения у ядра  $K_2$  оператора  $A^2$ .

## § 2. Теорема Гильберта — Шмидта

Чтобы закончить наше исследование, мы докажем еще, что при известных условиях сходимость ряда (XXV.10) будет равномерной.

**Теорема 6.** (Гильберта — Шмидта.) *Если вещественное симметрическое ядро  $K(P_0, P)$  интегрируемо с квадратом по каждому переменному, причем интеграл квадрата равномерно относительно другого переменного ограничен, т. е.*

$$\int_{\Omega} |K(P_0, P)|^2 \rho(P) dP = A(P_0) \leq A, \quad (\text{XXV.16})$$

то ряд (XXV.10) сходится равномерно к функции  $f(P_0)$ .

В самом деле, в силу неравенства Бесселя, ряд  $\sum_{i=1}^{\infty} \frac{\varphi_i^2(P_0)}{\lambda_i^2}$  сходится, причем имеет место неравенство

$$\sum_{i=1}^{\infty} \frac{\varphi_i^2(P_0)}{\lambda_i^2} \leq A. \quad (\text{XXV.17})$$

Это вытекает из того, что  $\frac{\varphi_i(P_0)}{\lambda_i}$  служат коэффициентами Фурье для функции  $f = K(P_0, P)$ :

$$\frac{\varphi_i(P_0)}{\lambda_i} = \int_{\Omega} K(P_0, P) \varphi_i(P) \rho(P) dP. \quad (\text{XXV.18})$$

Кроме того, сходится и ряд с постоянными членами

$$\sum_{i=1}^{\infty} h_i^2 \quad (\text{XXV.19})$$

опять в силу неравенства Бесселя.

Из сходимости ряда (XXV.19) следует, что

$$\sum_{i=m}^{m+p} h_i^2 < \varepsilon_m,$$

где  $\varepsilon_m \rightarrow 0$  при  $m \rightarrow \infty$ .

Оценим сумму

$$\sum_{i=m}^{m+p} \left| \frac{h_i \varphi_i(P_0)}{\lambda_i} \right|. \quad (\text{XXV.20})$$

Неравенство Буняковского дает нам

$$\left( \sum_{i=m}^{m+p} \left| \frac{h_i \varphi_i}{\lambda_i} \right| \right)^2 \leq \left( \sum_{i=m}^{m+p} h_i^2 \right) \left( \sum_{i=m}^{m+p} \frac{\varphi_i^2}{\lambda_i^2} \right) \leq \varepsilon_m A;$$

следовательно, сумма (XXV.20) сколь угодно мала вместе с  $\varepsilon_m$  и, значит, ряд (XXV.10) сходится равномерно.

Обозначим

$$\gamma(P_0) = \sum_{i=1}^{\infty} \frac{h_i \varphi_i(P_0)}{\lambda_i}.$$

Переходя в формуле (XXV.11) к пределу, получим:

$$\int_{\Omega} (f - \gamma)^2 \rho dP_0 = 0.$$

Следовательно,

$$f(P_0) = \gamma(P_0) = \sum_{i=1}^{\infty} \frac{h_i \varphi_i(P_0)}{\lambda_i}. \quad (\text{XXV.21})$$

Теорема Гильберта — Шмидта доказана.

**С л е д с т в и е.** (Билинейный ряд для повторного ядра.) Если ядро  $K(P_0, P)$  удовлетворяет условию теоремы, то для

повторного ядра билинейный ряд сходится и притом равномерно относительно  $P$  при фиксированном  $P_0$ .

Коэффициентами Фурье для повторного ядра будут служить функции  $\frac{\varphi_i(P_0)}{\lambda_i^2}$ . Действительно,

$$\begin{aligned} \int_{\Omega} K_2(P_0, P) \varphi_i(P) \rho(P) dP &= \\ &= \int_{\Omega} K(P_0, P_1) \left[ \int_{\Omega} K(P_1, P) \varphi_i(P) \rho(P) dP \right] \rho(P_1) dP_1 = \\ &= \frac{1}{\lambda_i} \int_{\Omega} K(P_0, P_1) \varphi_i(P_1) \rho(P_1) dP_1 = \frac{1}{\lambda_i^2} \varphi_i(P_0). \end{aligned}$$

Значит,

$$K_2(P_0, P) = \sum_{i=1}^{\infty} \frac{\varphi_i(P_0) \varphi_i(P)}{\lambda_i^2}. \quad (\text{XXV.22})$$

Тем более сходимость имеет место для ядер  $K_m$ , где  $m \leq 2$ ; для этих ядер, очевидно, имеет место формула

$$K_m(P_0, P) = \sum_{i=1}^{\infty} \frac{\varphi_i(P_0) \varphi_i(P)}{\lambda_i^m}.$$

Можно показать, хотя мы не будем этого делать, что сходимость билинейного ряда (XXV.22) равномерна по обоим переменным.

Теорема Гильберта — Шмидта, очевидно, справедлива для непрерывных ядер при любом ограниченном измеримом весе. Нетрудно убедиться в том, что она справедлива и для всех почти регулярных ядер. В самом деле, для таких ядер

$$\int_{\Omega} \{K(P_0, P)\}^2 \rho(P) dP \leq \int_{\Omega} \frac{A^2}{r^{n-2\alpha}} \rho(P) dP < M,$$

что и требуется в предположениях теоремы Гильберта — Шмидта.

Теорема Гильберта — Шмидта непосредственно распространяется на все ядра типа функций Грина для двух или трех независимых переменных. В самом деле, такие ядра, имеющие особенность  $\ln \frac{1}{r}$  или  $\frac{1}{r}$ , очевидно, являются почти регулярными.

Рассмотрим интеграл

$$d_N = \int_{\Omega} \int_{\Omega} \left[ K(P, P_1) - \sum_{i=1}^N \frac{\varphi_i(P) \varphi_i(P_1)}{\lambda_i} \right]^2 \rho(P) \rho(P_1) dP dP_1.$$

Простые преобразования дают

$$\begin{aligned}
 d_N &= \int_{\Omega} \int_{\Omega} [K(P, P_1)]^2 \rho(P) \rho(P_1) dP dP_1 - \\
 &\quad - 2 \sum_{i=1}^N \int_{\Omega} \int_{\Omega} K(P, P_1) \frac{\varphi_i(P) \varphi_i(P_1)}{\lambda_i} \rho(P) \rho(P_1) dP dP_1 + \\
 &\quad + \int_{\Omega} \int_{\Omega} \sum_{i=1}^N \frac{\varphi_i^2(P) \varphi_i^2(P_1)}{\lambda_i^2} \rho(P) \rho(P_1) dP dP_1 = \\
 &= \int_{\Omega} \left[ \int_{\Omega} [K(P, P_1)]^2 \rho(P_1) dP_1 - 2 \sum_{i=1}^N \frac{\varphi_i^2(P)}{\lambda_i^2} + \sum_{i=1}^N \frac{\varphi_i^2(P)}{\lambda_i^2} \right] \rho(P) dP = \\
 &= \int_{\Omega} \left[ K_2(P, P) - \sum_{i=1}^N \frac{\varphi_i^2(P)}{\lambda_i^2} \right] \rho(P) dP.
 \end{aligned}$$

Очевидно,  $d_N > 0$ . По доказанному выше ряд  $\sum_{i=1}^{\infty} \frac{\varphi_i^2(P)}{\lambda_i^2}$  сходится к

функции  $K_2(P, P)$ .

На основании леммы 8 из лекции VI мы можем утверждать, что неубывающая последовательность функций  $\sum_{i=1}^N \frac{\varphi_i^2(P)}{\lambda_i^2}$ , имея ограниченный интеграл, стремится почти везде к предельной функции, причем возможен предельный переход под знаком интеграла. Эта предельная функция не может быть иной, чем  $K_2(P, P)$ , откуда следует, что  $\lim d_N = 0$ .

Полученный результат дает важную теорему.

**Т е о р е м а 7.** *Билинейный ряд для непрерывного ядра сходится к этому ядру в среднем по двум переменным.*

Существует теорема, принадлежащая Мерсеру, которая гласит:

*Билинейный ряд для любого непрерывного положительно определенного ядра, т. е. ядра, имеющего лишь положительные собственные значения, сходится равномерно.*

Эту теорему, из которой следует равномерная по обоим переменным сходимость (XXV.22), мы также не будем доказывать.

### § 3. Обоснование метода Фурье для решения краевых задач математической физики

Теперь мы можем возвратиться к утверждениям, оставленным нами без доказательства при изложении метода Фурье в лекции XXIII. Мы докажем пять основных свойств системы собственных функций, сформулированных в лекции XXIII на стр. 340.

Как мы видели, собственные функции краевых задач для уравнения (XXIII.7) представляют собой решения интегрального уравнения (XXIII.9) с вещественным симметрическим и почти регулярным ядром.

Отсюда следует, что собственные значения  $\lambda_i$  будут вещественными. Несколько позже мы докажем, что собственных значений бесконечно много и что среди них нет отрицательных чисел.

Далее, собственные функции, по доказанному выше, можно считать ортогональными и нормированными, то есть имеет место свойство 2.

Некоторые свойства собственных функций нам полезно будет исследовать порознь для различных краевых задач. Рассмотрим сначала первую краевую задачу.

Мы показали, что функции  $U_i$  — решения уравнения

$$\Delta U_i + \lambda_i U_i = 0, \quad (\text{XXV.23})$$

удовлетворяющие условиям

$$U_i|_s = 0, \quad (\text{XXV.24})$$

суть решения интегрального уравнения

$$U_i(P_0) = \lambda_i \iint_{\Omega} G U_i dP. \quad (\text{XXV.25})$$

Докажем теперь обратное утверждение: всякое решение интегрального уравнения (XXV.25) имеет непрерывные производные до второго порядка включительно внутри области, непрерывно вплоть до границы, удовлетворяет дифференциальному уравнению (XXV.23) и граничному условию (XXV.24).

Предварительно установим, что  $U_i$  имеют непрерывные производные первого порядка. Ввиду усиленной вполне непрерывности интегрального оператора с почти регулярным ядром (XXV.25) функция  $U_i$  ограничена (она равномерно непрерывна в ограниченной области). Функция Грина  $G$  записывается в виде

$$G(P, P_0) = \frac{1}{4\pi r} + g(P, P_0),$$

где  $g$  — регулярная в области  $\Omega$  по любому своему аргументу функция, когда другой аргумент имеет фиксированное значение, лежащее внутри области  $\Omega$ . Поэтому

$$U_i(P_0) = \frac{1}{4\pi} \iint_{\Omega} \frac{1}{r} U_i(P) dP + \iint_{\Omega} g U_i(P) dP.$$

Оба слагаемых в правой части этого равенства имеют непрерывные производные первого порядка в каждой внутренней точке  $P_0$  из области  $\Omega$ , так как дифференцирование по параметру под знаком интеграла дает равномерно сходящиеся в точке  $P_0$  интегралы. Непрерывная дифференцируемость  $U_i$  доказана.

Переходим к доказательству сформулированного выше утверждения.

Рассмотрим уравнение Пуассона

$$\Delta u = -\lambda_i U_i, \quad (\text{XXV.26})$$

где в правой части стоит решение интегрального уравнения (XXV.25). Будем искать решение этого уравнения, удовлетворяющее условию

$$u|_S = 0. \quad (\text{XXV.27})$$

Такое решение можно построить в два приема. Рассмотрим прежде всего ньютонов потенциал с непрерывно дифференцируемой плотностью  $\frac{\lambda_i U_i}{4\pi}$ :

$$Q(P_0) = \frac{\lambda_i}{4\pi} \int_{\Omega} \int \frac{U_i}{r} dP. \quad (\text{XXV.28})$$

Несущественно изменяя доказательство, приведенное в лекции XI, можно показать, что потенциал  $Q(P_0)$  есть решение уравнения (XXV.26). Функция  $u$ , удовлетворяющая уравнению (XXV.26) и условию (XXV.27), будет представлять собой сумму

$$u(P_0) = Q(P_0) + w(P_0),$$

где  $w(P_0)$  — гармоническая в области  $\Omega$  функция, принимающая значения  $-Q(S)$  на границе  $S$ . Такая функция существует. По лемме Ляпунова (см. лекцию XXI, стр. 302) она имеет правильную нормальную производную.

Следовательно, существует решение  $u$  уравнения (XXV.26) при условии (XXV.27), обладающее правильной нормальной производной.

Но такое решение, как было доказано в лекции XXI, представимо в виде:

$$u(P_0) = \lambda_i \int_{\Omega} \int G(P_0, P) U_i(P) dP. \quad (\text{XXV.29})$$

В силу уравнения (XXV.25) правая часть последнего равенства есть  $U_i(P_0)$ . Значит, функция  $U_i(P_0)$  совпадает с функцией  $u(P_0)$ , откуда непосредственно следует справедливость доказываемого утверждения.

Перейдем теперь к исследованию собственных функций второй краевой задачи. Мы доказали, что всякая функция  $V_i$ , ограниченная, удовлетворяющая уравнению

$$\Delta V_i + \lambda_i V_i = 0 \quad (\text{XXV.30})$$

и граничному условию

$$\frac{\partial V_i}{\partial n} \Big|_S = 0, \quad (\text{XXV.31})$$

причем производная понимается как правильная нормальная производная, будет решением интегрального уравнения

$$V_i(P_0) = \lambda_i \int \int_{\Omega} G^*(P_0, P) V_i(P) dP, \quad (\text{XXV.32})$$

где  $G^*(P_0, P)$  — обобщенная функция Грина для задачи Неймана. Докажем обратное утверждение.

Будем искать решение уравнения

$$\Delta v = -\lambda_i V_i \quad (\text{XXV.33})$$

при условии

$$\left. \frac{\partial v}{\partial n} \right|_S = 0. \quad (\text{XXV.34})$$

Такое решение существует, так как функция  $V_i$  ортогональна к постоянной, то есть к решению однородной задачи Неймана. Для того чтобы отыскать нужное решение, мы составим сначала ньютонов потенциал

$$R(P_0) = \frac{\lambda_i}{4\pi} \int \int_{\Omega} \frac{V_i}{r} d\Omega. \quad (\text{XXV.35})$$

Этот потенциал, в силу ограниченности  $V_i$ , будет иметь всюду непрерывные производные первого порядка, удовлетворяющие условию теоремы 4 из лекции XV (условию Ляпунова).

Далее, функция  $v$  будет представима в виде

$$v(P_0) = R(P_0) + s(P_0), \quad (\text{XXV.36})$$

где  $s(P_0)$  — гармоническая функция, удовлетворяющая условию

$$\left. \frac{\partial s}{\partial n} \right|_S = - \left. \frac{\partial R}{\partial n} \right|_S.$$

Но  $\left. \frac{\partial R}{\partial n} \right|_S$  есть непрерывная функция на поверхности  $S$ , удовлетворяющая условию Ляпунова. Согласно лекции XVI, § 2 функция  $s$  будет представляться в виде потенциала простого слоя, плотность которого, в силу (XVI.4) и теоремы 6 из лекции XV, в свою очередь будет удовлетворять условию Ляпунова. Как следует из теоремы 5 лекции XV, функция  $s$  обладает правильной нормальной производной.

В лекции XXI было доказано<sup>1)</sup>, что решение уравнения (XXV.33) с условиями (XXV.34) может быть представлено в виде

$$v(P_0) = \lambda_i \int \int_{\Omega} G^*(P_0, P) V_i(P) dP. \quad (\text{XXV.37})$$

<sup>1)</sup> См. § 2 из лекции XXI.

Следовательно, функция  $v(P_0)$  совпадает с функцией  $V_i$ . В силу этого  $V_i$  обладает правильной нормальной производной, обращающейся в нуль на границе, и удовлетворяет уравнению (XXV.30).

Докажем свойство 1. Нам остается показать, что среди собственных чисел  $\lambda_i$  ядра, представляющего функцию Грина, нет отрицательных.

Пользуясь уравнением (XXIII.7), будем иметь:

$$\int_{\Omega} U_i \Delta U_i dx dy dz = -\lambda_i \int_{\Omega} U_i^2 dx dy dz = -\lambda_i. \quad (\text{XXV.38})$$

С другой стороны, по формуле Грина, пользуясь ограниченностью  $U_i$  и правильностью нормальных производных, получим:

$$\begin{aligned} \int_{\Omega} \int \int U_i \Delta U_i dx dy dz = \\ = - \int_{\Omega} \int \int \left[ \left( \frac{\partial U_i}{\partial x} \right)^2 + \left( \frac{\partial U_i}{\partial y} \right)^2 + \left( \frac{\partial U_i}{\partial z} \right)^2 \right] dx dy dz - \\ - \int_{\Omega} \int U_i \frac{\partial U_i}{\partial n} dS. \quad (\text{XXV.39}) \end{aligned}$$

Но если  $U_i|_S = 0$  или  $\frac{\partial U_i}{\partial n}|_S = 0$ , то последнее слагаемое, содержащее поверхностный интеграл, обращается в нуль, и мы получим:

$$\lambda_i = \int_{\Omega} \int \int \left[ \left( \frac{\partial U_i}{\partial x} \right)^2 + \left( \frac{\partial U_i}{\partial y} \right)^2 + \left( \frac{\partial U_i}{\partial z} \right)^2 \right] dx dy dz \geq 0, \quad (\text{XXV.40})$$

что и требовалось доказать.

Докажем третье свойство системы собственных функций — ее полноту. Пусть  $\varphi$  — произвольная функция, удовлетворяющая на границе области условию  $\varphi|_S = 0$  или  $\frac{\partial \varphi}{\partial n}|_S = 0$  и всюду имеющая непрерывные производные 2-го порядка. Тогда, если положить

$$\Delta \varphi = 4\pi\psi,$$

то  $\psi$  — непрерывная функция в замкнутой области  $\Omega$ . По свойству функции Грина

$$\varphi = - \int_{\Omega} \int \int G(P_0, P) \psi(P) dP.$$

Таким образом, функция  $\varphi$  истокообразно представлена через  $\psi$  с помощью ядра  $G$  и, следовательно, разлагается в равномерно сходящийся ряд по собственным функциям. Таким образом, система собственных функций является полной по отношению

к любой функции  $\varphi$ , дважды непрерывно дифференцируемой и удовлетворяющей граничным условиям. Но при помощи таких функций можно, очевидно, представить приближенно в среднем любую функцию, интегрируемую с квадратом по области.

Как мы доказали выше (см. лемму 3 на стр. 376), наилучшим приближением в среднем к данной функции служат отрезки ряда Фурье. Поэтому отрезки ряда Фурье тоже позволяют приблизить в среднем любую функцию, интегрируемую с квадратом по области  $\Omega$ . Значит, каждая функция  $f$ , интегрируемая с квадратом по области  $\Omega$ , разлагается в ряд Фурье по собственным функциям, сходящийся в среднем. Свойство 3 доказано. Отсюда, между прочим, вытекает, что собственных функций  $\{U_i\}$  бесконечно много, ибо иначе они не могли бы составлять полную систему.

Докажем теперь свойство 4. Пусть  $U_i, U_j$  — две собственные функции. Интегрируя по частям и пользуясь граничными условиями, имеем:

$$\begin{aligned} \iiint_{\Omega} \left( \frac{\partial U_i}{\partial x} \frac{\partial U_j}{\partial x} + \frac{\partial U_i}{\partial y} \frac{\partial U_j}{\partial y} + \frac{\partial U_i}{\partial z} \frac{\partial U_j}{\partial z} \right) dx dy dz = \\ = - \iiint_{\Omega} U_i \Delta U_j dx dy dz + \iint_S U_i \frac{\partial U_j}{\partial n} dS = \\ = \lambda_j \iiint_{\Omega} U_i U_j dx dy dz, \quad (\text{XXV.41}) \end{aligned}$$

откуда и вытекает доказываемое свойство.

Осталось установить еще свойство 5. С этой целью рассмотрим интеграл

$$\begin{aligned} J = \iiint_{\Omega} \left\{ \left[ \frac{\partial}{\partial x} (\varphi - \varphi_N) \right]^2 + \left[ \frac{\partial}{\partial y} (\varphi - \varphi_N) \right]^2 + \right. \\ \left. + \left[ \frac{\partial}{\partial z} (\varphi - \varphi_N) \right]^2 \right\} dx dy dz, \quad (\text{XXV.42}) \end{aligned}$$

где  $\varphi_N = \sum_{i=1}^N a_i U_i$ , а величины  $a_i$  суть коэффициенты Фурье функции  $\varphi$  по системе  $\{U_i\}$ . Раскрывая скобки и интегрируя, подобно тому, как мы поступали при выводе неравенства Бесселя, получим, если воспользоваться еще свойством 4:

$$\begin{aligned} J = \iiint_{\Omega} \left[ \left( \frac{\partial \varphi}{\partial x} \right)^2 + \left( \frac{\partial \varphi}{\partial y} \right)^2 + \left( \frac{\partial \varphi}{\partial z} \right)^2 \right] dx dy dz - \\ - 2 \sum_{i=1}^N a_i \iiint_{\Omega} \left( \frac{\partial \varphi}{\partial x} \frac{\partial U_i}{\partial x} + \frac{\partial \varphi}{\partial y} \frac{\partial U_i}{\partial y} + \frac{\partial \varphi}{\partial z} \frac{\partial U_i}{\partial z} \right) dx dy dz + \sum_{i=1}^N \lambda_i a_i^2. \quad (\text{XXV.43}) \end{aligned}$$

Легко доказать равенство

$$\int \int \int_{\Omega} \left( \frac{\partial \varphi}{\partial x} \frac{\partial U_i}{\partial x} + \frac{\partial \varphi}{\partial y} \frac{\partial U_i}{\partial y} + \frac{\partial \varphi}{\partial z} \frac{\partial U_i}{\partial z} \right) dx dy dz = \lambda_i a_i.$$

В самом деле, интегрируя по частям, получим:

$$\begin{aligned} \int \int \int_{\Omega} \left( \frac{\partial \varphi}{\partial x} \frac{\partial U_i}{\partial x} + \frac{\partial \varphi}{\partial y} \frac{\partial U_i}{\partial y} + \frac{\partial \varphi}{\partial z} \frac{\partial U_i}{\partial z} \right) dx dy dz = \\ = - \int \int \int_{\Omega} \varphi \Delta U_i dx dy dz = \lambda_i \int \int \int_{\Omega} \varphi U_i dx dy dz = \lambda_i a_i. \end{aligned}$$

Таким образом, из (XXV.43) имеем:

$$\begin{aligned} \int \int \int_{\Omega} \left\{ \left[ \frac{\partial}{\partial x} (\varphi - \varphi_N) \right]^2 + \left[ \frac{\partial}{\partial y} (\varphi - \varphi_N) \right]^2 + \right. \\ \left. + \left[ \frac{\partial}{\partial z} (\varphi - \varphi_N) \right]^2 \right\} dx dy dz = \\ = \int \int \int_{\Omega} \left[ \left( \frac{\partial \varphi}{\partial x} \right)^2 + \left( \frac{\partial \varphi}{\partial y} \right)^2 + \left( \frac{\partial \varphi}{\partial z} \right)^2 \right] dx dy dz - \sum_{i=1}^N \lambda_i a_i^2. \end{aligned}$$

Левая часть последнего равенства неотрицательна, и мы получаем неравенство, аналогичное неравенству Бесселя:

$$\sum_{i=1}^N \lambda_i a_i^2 \leq \int \int \int_{\Omega} \left[ \left( \frac{\partial \varphi}{\partial x} \right)^2 + \left( \frac{\partial \varphi}{\partial y} \right)^2 + \left( \frac{\partial \varphi}{\partial z} \right)^2 \right] dx dy dz.$$

Это неравенство показывает, что ряд

$$\sum \lambda_i a_i^2$$

сходится. По отсюда следует сходимость в среднем рядов

$$\sum_{i=1}^{\infty} a_i \frac{\partial U_i}{\partial x}, \quad \sum_{i=1}^{\infty} a_i \frac{\partial U_i}{\partial y}, \quad \sum_{i=1}^{\infty} a_i \frac{\partial U_i}{\partial z}.$$

Действительно, рассмотрим интеграл

$$\int \int \int_{\Omega} \left[ \left( \sum_{i=n}^{n+p} a_i \frac{\partial U_i}{\partial x} \right)^2 + \left( \sum_{i=n}^{n+p} a_i \frac{\partial U_i}{\partial y} \right)^2 + \left( \sum_{i=n}^{n+p} a_i \frac{\partial U_i}{\partial z} \right)^2 \right] dx dy dz.$$

Если мы установим, что этот интеграл будет сколь угодно мал при достаточно большом  $n$  и любом  $p$ , то отсюда и будет следовать интересующая нас сходимость. Мы можем вычислить этот

интеграл непосредственно, пользуясь свойством 4. Это вычисление дает:

$$\begin{aligned} \iiint_{\Omega} \left[ \left( \sum_{i=n}^{n+p} a_i \frac{\partial U_i}{\partial x} \right)^2 + \left( \sum_{i=n}^{n+p} a_i \frac{\partial U_i}{\partial y} \right)^2 + \left( \sum_{i=n}^{n+p} a_i \frac{\partial U_i}{\partial z} \right)^2 \right] dx dy dz = \\ = \iiint_{\Omega} \left\{ \sum_{i=n}^{n+p} a_i^2 \left[ \left( \frac{\partial U_i}{\partial x} \right)^2 + \left( \frac{\partial U_i}{\partial y} \right)^2 + \left( \frac{\partial U_i}{\partial z} \right)^2 \right] \right\} dx dy dz + \\ + 2 \sum_{\substack{i,j=n \\ i \neq j}}^{n+p} a_i a_j \iiint_{\Omega} \left( \frac{\partial U_i}{\partial x} \frac{\partial U_j}{\partial x} + \frac{\partial U_i}{\partial y} \frac{\partial U_j}{\partial y} + \frac{\partial U_i}{\partial z} \frac{\partial U_j}{\partial z} \right) dx dy dz = \sum_{i=n}^{n+p} \lambda_i a_i^2. \end{aligned}$$

Из сходимости ряда  $\sum_{i=1}^{\infty} \lambda_i a_i^2$ , по признаку Коши, вытекает произвольная малость последней суммы при достаточно большом  $n$ . Мы доказали, что ряды, получаемые почленным дифференцированием по  $x$ ,  $y$  и  $z$  ряда

$$\sum_{i=1}^{\infty} a_i U_i(x, y, z),$$

сходятся в среднем.

Для того чтобы закончить доказательство свойства 5, нам остается установить еще одну теорему.

**Т е о р е м а 8.** Если ряд  $\Phi = \sum_{i=1}^{\infty} v_i$  с непрерывно дифференцируемыми в области  $\Omega$  членами сходится равномерно, сумма ряда имеет непрерывную частную производную по  $x$ , а ряд, полученный почленным дифференцированием,

$$\sum_{i=1}^{\infty} \frac{\partial v_i}{\partial x},$$

сходится в среднем, то ряд  $\sum_{i=1}^{\infty} v_i$  можно почленно дифференцировать, т. е.

$$\frac{\partial \Phi}{\partial x} = \sum_{i=1}^{\infty} \frac{\partial v_i}{\partial x}, \quad (\text{XXV.44})$$

где сходимость, очевидно, понимается как сходимость в среднем.

**Д о к а з а т е л ь с т в о.** Пусть  $\Phi$  — произвольная непрерывно дифференцируемая функция переменных  $x, y, z$ , отличная от нуля

только в некоторой области  $\Omega_\psi$ , лежащей целиком внутри области  $\Omega$ . Тогда справедлива формула интегрирования по частям:

$$\iiint_{\Omega} \left( \psi \frac{\partial \chi}{\partial x} + \chi \frac{\partial \psi}{\partial x} \right) dx dy dz = 0, \quad (\text{XXV.45})$$

где  $\chi$  — произвольная функция, обладающая непрерывной производной  $\frac{\partial \chi}{\partial x}$ .

В частности,

$$\iiint_{\Omega} \left( \psi \frac{\partial \varphi}{\partial x} + \varphi \frac{\partial \psi}{\partial x} \right) dx dy dz = 0. \quad (\text{XXV.46})$$

Подставим теперь в формулу (XXV.45) вместо функции  $\chi$  функцию  $\varphi_N = \sum_{i=1}^N v_i$ . Мы будем иметь:

$$\iiint_{\Omega} \left( \psi \frac{\partial \varphi_N}{\partial x} + \varphi_N \frac{\partial \psi}{\partial x} \right) dx dy dz = 0.$$

В этой формуле возможен переход к пределу при  $N \rightarrow \infty$ . Обозначим через  $\varphi'$  сумму ряда

$$\sum_{i=1}^{\infty} \frac{\partial v_i}{\partial x}.$$

По предположению теоремы, эта сумма существует. Мы получим:

$$\iiint_{\Omega} \left( \psi \varphi' + \varphi \frac{\partial \psi}{\partial x} \right) dx dy dz = 0.$$

Вычитая это равенство из (XXV.46), будем иметь:

$$\iiint_{\Omega} \psi \left( \frac{\partial \varphi}{\partial x} - \varphi' \right) dx dy dz = 0.$$

Последнее равенство должно иметь место при любой функции, подчиненной только указанным выше требованиям. Отсюда

$$\frac{\partial \varphi}{\partial x} = \varphi' = \sum_{i=1}^{\infty} \frac{\partial v_i}{\partial x},$$

что и требовалось доказать.

#### § 4. Применение теории интегральных уравнений с симметрическим ядром

Одним из важнейших применений теории интегральных уравнений с симметрическим ядром служит теория так называемых *уравнений Штурма — Лиувилля*, т. е. обыкновенных дифференциальных уравнений:

$$(py')' + ry + \lambda \rho(x)y = 0, \quad (\text{XXV.47})$$

зависящих от параметра  $\lambda$ , с некоторыми граничными условиями.

Будем искать решение такого уравнения, удовлетворяющее однородным условиям:

$$\left. \begin{aligned} [py' + \alpha y]_{x=0} &= 0, \\ [py' + \beta y]_{x=1} &= 0. \end{aligned} \right\} \quad (\text{XXV.48})$$

Предположив, что при  $\lambda = 0$  однородная задача имеет лишь тривиальные решения, и применяя формулу Грина, будем иметь:

$$y(x_0) = - \int_0^1 \lambda G(x, x_0) y(x) \rho(x) dx. \quad (\text{XXV.49})$$

Ядро  $G(x, x_0)$  будет симметрическим в силу того, что оператор  $Ly$  и граничные условия самосопряженные.

Следовательно, собственные функции задачи Штурма—Лиувилля, т. е. функции, удовлетворяющие (XXV.47) и (XXV.48), будут служить собственными функциями интегрального уравнения (XXV.49) с нагруженным симметрическим ядром и будут обладать всеми свойствами собственных функций таких уравнений. Легко установить и обратное: всякое решение уравнения (XXV.49) будет удовлетворять дифференциальному уравнению (XXV.47) и граничным условиям (XXV.48). Проверить это мы предоставим читателям.

В качестве примера более общего уравнения с особенностью рассмотрим уравнение вида

$$(xy')' - \frac{m^2}{x} y + \lambda xy = 0,$$

или

$$xy'' + y' + x \left( \lambda - \frac{m^2}{x^2} \right) y = 0.$$

Функция Грина для этого уравнения была построена выше [см. (XX.52)]. По отношению к этому уравнению, называемому *уравнением Бесселя*, справедлива вся изложенная теория.

# НЕОДНОРОДНОЕ ИНТЕГРАЛЬНОЕ УРАВНЕНИЕ С СИММЕТРИЧЕСКИМ ЯДРОМ

## § 1. Разложение резольвенты

В предыдущих лекциях нами было подробно изучено однородное интегральное уравнение типа Фредгольма с симметрическим ядром. В настоящей лекции мы изучим неоднородное уравнение с точки зрения развитой выше теории.

Мы выяснили выше, каким образом можно выразить ядро симметрического интегрального уравнения, зная его собственные значения и собственные функции. Аналогичным образом можно дать представление решения неоднородного уравнения через те же собственные значения и функции.

В самом деле, применим к неоднородному интегральному уравнению с симметрическим ядром теорему Гильберга — Шмидта.

Мы имеем:

$$\mu(P) = f(P) + \lambda \int_{\Omega} K(P, P_1) \mu(P_1) dP_1$$

(для простоты считаем  $\rho = 1$ ).

Пусть  $\lambda$  не есть собственное значение. Тогда решение уравнения существует. Найдём выражение этого решения через собственные функции.

Очевидно, что функция  $\mu(P) - f(P)$  представима истокообразно через ядро. Следовательно,

$$\mu(P) - f(P) = \lambda \sum_{i=1}^{\infty} \frac{\mu_i \varphi_i(P)}{\lambda_i}, \quad (\text{XXVI.1})$$

где

$$\mu_i = \int_{\Omega} \mu(P) \varphi_i(P) dP.$$

С другой стороны, умножая обе части (XXVI.1) на  $\varphi_i(P)$  и интегрируя, получим:

$$\mu_i - f_i = \frac{\lambda \mu_i}{\lambda_i},$$

откуда

$$\mu_i = \frac{f_i}{1 - \frac{\lambda}{\lambda_i}} = \frac{\lambda_i f_i}{\lambda_i - \lambda}.$$

Следовательно, функция  $\mu$ , если она существует, представляется в виде

$$\mu(P) = f(P) + \lambda \sum_{i=1}^{\infty} \frac{f_i}{\lambda_i - \lambda} \varphi_i(P). \quad (\text{XXVI.2})$$

Если теперь ввести выражение для  $f_i$  через фундаментальные функции и заменить ряд пределом его частичной суммы, то получим:

$$\mu(P) = f(P) + \lambda \lim_{N \rightarrow \infty} \int_{\Omega} f(P_1) \sum_{i=1}^N \frac{\varphi_i(P) \varphi_i(P_1)}{\lambda_i - \lambda} dP_1.$$

Покажем, что полученная формула действительно дает решение задачи. Для этого удобно ввести новую функцию

$$\Gamma(P, P_1, \lambda),$$

называемую *резольвентой* рассматриваемого интегрального уравнения по формуле

$$\Gamma(P, P_1, \lambda) = \sum_{i=1}^{\infty} \frac{\varphi_i(P) \varphi_i(P_1)}{\lambda_i - \lambda}. \quad (\text{XXVI.3})$$

Легко доказать сходимости в среднем написанного ряда для всевозможных  $\lambda$ , не совпадающих ни с одним из  $\lambda_i$ . Для этого заметим, что написанный выше ряд для резольвенты можно представить еще в иной форме. Имеем:

$$\begin{aligned} \Gamma(P, P_1, \lambda) &= \sum_{i=1}^{\infty} \varphi_i(P) \varphi_i(P_1) \left[ \frac{1}{\lambda_i} + \left( \frac{1}{\lambda_i - \lambda} - \frac{1}{\lambda_i} \right) \right] = \\ &= \sum_{i=1}^{\infty} \frac{\varphi_i(P) \varphi_i(P_1)}{\lambda_i} + \lambda \sum_{i=1}^{\infty} \frac{\varphi_i(P) \varphi_i(P_1)}{\lambda_i (\lambda_i - \lambda)}, \end{aligned}$$

или

$$\begin{aligned}\Gamma(P, P', \lambda) &= K(P, P') + \lambda \sum_{i=1}^{\infty} \frac{\varphi_i(P) \varphi_i(P')}{\lambda_i (\lambda_i - \lambda)} = \\ &= \sum_{i=1}^{\infty} \frac{\varphi_i(P) \varphi_i(P')}{\lambda_i} + \lambda \sum_{i=1}^{\infty} \frac{\varphi_i(P) \varphi_i(P')}{\lambda_i (\lambda_i - \lambda)}, \quad (\text{XXVI.4})\end{aligned}$$

где ряд во втором слагаемом сходится равномерно.

Необходимым и достаточным условием равномерной сходимости ряда (XXVI.3) является, очевидно, равномерная сходимость билинейного ряда для ядра.

Пользуясь доказанной сходимостью ряда для  $\Gamma(P, P_1, \lambda)$ , можно переменить порядок суммирования и интегрирования в формуле

$$\mu(P) = f(P) + \lambda \int_{\Omega} \Gamma(P, P_1, \lambda) f(P_1) dP_1,$$

имеющей, по доказанному, смысл. Применяя к обеим частям интегральную операцию с ядром  $K(P_0, P)$ , можно убедиться в том, что  $\mu(P)$  действительно удовлетворяет интегральному уравнению

$$\mu(P) = f(P) + \lambda \int_{\Omega} K(P, P_1) \mu(P_1) dP_1.$$

**П р и м е ч а н и е.** Как мы видим, резольвента интегрального уравнения с симметрическим ядром является мероморфной функцией во всей комплексной плоскости параметра  $\lambda$ . Все полюсы этой функции — простые и являются собственными значениями ядра.

## § 2. Представление решения при помощи аналитических функций

Разложение в ряд Фурье, которое мы рассматривали в предыдущих лекциях (лекция XXIII, § 2), было у нас интерпретировано чисто геометрическим образом, как представление некоторой функции, рассматриваемой в функциональном пространстве, в котором за оси координат приняты собственные направления линейного оператора.

Пользуясь резольventой, мы можем подойти к этому вопросу еще с другой стороны.

Рассмотрим интеграл

$$\chi(P, \lambda) = - \int_{\Omega} \Gamma(P, P_1, \lambda) f(P_1) dP_1 = - \sum_{i=1}^{\infty} \frac{f_i \varphi_i(P)}{\lambda_i - \lambda}.$$

Этот интеграл представляет собой мероморфную функцию параметра  $\lambda$  с простыми полюсами в точках  $\lambda_i$ . Вычеты в этих полюсах равны  $f_i \varphi_i(P)$

и представляют собой последовательные члены ряда Фурье. Ряд Фурье функции  $f$  представляет собой сумму вычетов, а отрезок этого ряда — сумму вычетов, относящихся к некоторой части полюсов.

Поэтому можно представить такой отрезок в виде

$$f_N(P) = \frac{1}{2\pi i} \int_{C_M} \chi(P, \lambda) d\lambda,$$

где  $C_M$  — контур в плоскости комплексного переменного  $\lambda$ , захватывающий  $N$  первых особых точек резольвенты

Удобно опять перейти к символической записи.

Из формулы (XXVI.2) функцию  $\chi(P, \lambda)$  можно выразить в виде

$$\chi(P, \lambda) = -\frac{\mu(P) - f(P)}{\lambda},$$

где  $\mu(P)$  — решение уравнения

$$\mu(P) - \lambda \int_{\Omega} \int K(P, P_1) \mu(P_1) dP_1 = f(P),$$

т. е. уравнения

$$(E - \lambda A) \mu = f.$$

Как мы уже видели ранее, это решение для малых значений  $\lambda$  можно написать в виде ряда

$$\mu = (E + \lambda A + \lambda^2 A^2 + \dots + \lambda^m A^m + \dots) f;$$

с другой стороны,

$$\mu = (E - \lambda A)^{-1} f,$$

откуда, пользуясь той же символической записью,

$$\chi = -\frac{\mu - f}{\lambda} = -(E - \lambda A)^{-1} A f.$$

При этом

$$f_N(P) = -\frac{1}{2\pi i} \int_{C_N} \frac{A}{E - \lambda A} f d\lambda. \quad (\text{XXVI.5})$$

Мы видели выше аналогию между некоторыми символическими формулами, содержащими многочлены или степенные ряды от оператора  $A$ , и соответствующими формулами обычной алгебры и анализа.

Полученная нами интегральная формула (XXVI.5) также является аналогом соответствующей формулы из теории функций. В самом деле, пусть  $a$  и  $f$  — какие-нибудь числа. Рассмотрим интеграл

$$\psi = -\frac{1}{2\pi i} \int_C \frac{a}{1 - \lambda a} f d\lambda = -\frac{1}{2\pi i} \int_C \frac{f}{\frac{1}{a} - \lambda} d\lambda. \quad (\text{XXVI.6})$$

Очевидно,  $\psi = f$ , если контур  $C$  содержит внутри себя точку  $\lambda_0 = \frac{1}{a}$ , и  $\psi = 0$ , если это не так.

Формула (XXVI.5) обобщает формулу (XXVI.6).

Число  $\lambda_0$  удовлетворяет соотношению

$$\lambda_0 a \varphi_k = \varphi_k, \quad (\text{XXVI.7})$$

где  $\varphi_k$  — какое-нибудь число, не равное нулю.

Уравнение (XXVI.7) переходит в уравнение (XXV.1) для определения  $\lambda_k$ , если заменить в нем число  $a$  оператором  $A$ .

Используем формулу (XXVI.5) для того, чтобы получить решения задач математической физики, выраженные в виде определенных интегралов.

Не вдаваясь подробно в теорию этого вопроса, мы разберем пример задачи о распределении тепла, т. е. задачи об интегрировании уравнения

$$\Delta u - \frac{\partial u}{\partial t} = 0 \quad (\text{XXVI.8})$$

при условии

$$\begin{aligned} u|_S &= 0, \\ u|_{t=0} &= u_0(P). \end{aligned}$$

Повторим вкратце рассуждения, обычные в методе Фурье.

Применяя к уравнению формулу Грина, будем иметь:

$$u = - \int_{\Omega} G(P, P_1) \frac{\partial u(P_1, t)}{\partial t} dP_1$$

или символически

$$u + A \frac{\partial u}{\partial t} = 0.$$

Частные решения этого уравнения будут:

$$u = e^{-\lambda_i t} u_i(P),$$

где

$$u_i - \lambda_i A u_i = 0.$$

Сумма частных решений, соответствующих различным собственным значениям  $\lambda_i$ , т. е. решение в форме ряда Фурье, будет иметь вид:

$$u = \sum_{i=1}^{\infty} e^{-\lambda_i t} u_i(P). \quad (\text{XXVI.9})$$

Из условия

$$u|_{t=0} = u_0$$

следует, что  $u_i(P)$  суть члены ряда Фурье функции  $u_0$ , а это значит, что функции  $u_i$  являются вычетами в полюсах резольвенты от функции:

$$- \int_{\Omega} \int_{\Omega} \Gamma(P, P_1, \lambda) u_0(P_1) dP_1.$$

При этом  $e^{-\lambda_i t} u_i(P)$  суть вычеты в тех же полюсах функции

$$- e^{-\lambda t} \int_{\Omega} \int_{\Omega} \Gamma(P, P_1, \lambda) u_0(P_1) dP_1,$$

и отрезок ряда (XXVI.9) представляется в виде интеграла

$$u_N = -\frac{1}{2\pi i} \int_{C_N} e^{-\lambda t} \left( \iint_{\Omega} \Gamma(P, P_1, \lambda) u_0(P_1) dP_1 \right) d\lambda, \quad (\text{XXVI.10})$$

дающего, таким образом, полное решение задачи.

Символически можно записать решение нашей задачи в виде

$$u_N = -\frac{1}{2\pi i} \int_{C_N} e^{-\lambda t} \frac{A}{E - \lambda A} u_0 d\lambda. \quad (\text{XXVI.11})$$

Сравним полученное нами решение с решением обыкновенного уравнения  $a \frac{\partial u}{\partial t} + u = 0$ , где  $a$  — постоянное число.

Очевидно,

$$u = e^{-\frac{1}{a}t} u_0. \quad (\text{XXVI.12})$$

На основании теоремы о вычетах

$$u = -\frac{1}{2\pi i} \int_C e^{-\lambda t} \frac{a u_0}{1 - \lambda a} d\lambda.$$

Этот интеграл равен своему вычету в точке  $\lambda_0 = \frac{1}{a}$ , если  $\lambda_0$  лежит внутри  $C$ , и нулю, если  $\lambda_0$  — вне этого контура.

На этом основании удобно обозначить символически

$$-\frac{1}{2\pi i} \int_C e^{-\lambda t} \frac{A}{E - \lambda A} f_0 dt$$

через  $e^{-\frac{t}{A}} f_0$ .

Решение уравнения (XXVI.8) записывается при этом в виде

$$u = e^{-\frac{t}{A}} u_0. \quad (\text{XXVI.13})$$

Общая теория функций от операторов, развивая которую мы здесь не имеем возможности, позволяет вывести ряд обобщений этой формулы на значительно более широкий класс задач математической физики. Развитие этой теории дает возможность применять аналогичные методы решения задач математической физики в ряде случаев, когда особенности резольвенты не являются изолированными точками в плоскости переменного  $\lambda$ .

Эти идеи, в частности, позволяют изучать решение задач математической физики в неограниченных областях или такие задачи, где рассматриваемые уравнения имеют особенности в изучаемой области. Часто появление таких особенностей связано с изменением аналитического характера резольвенты, приводя в свою очередь к особенностям резольвенты, не являющимися просто полюсами.

В следующих главах мы не будем углублять этот вопрос, а займемся конкретным применением метода Фурье в частных задачах математической физики. Примеры, которые мы будем рассматривать, весьма поучительны, так как именно с них начиналось развитие вопроса.

# КОЛЕБАНИЯ ПРЯМОУГОЛЬНОГО ПАРАЛЛЕЛЕПИПЕДА

В качестве примера применения метода Фурье рассмотрим прежде всего колебания прямоугольного параллелепипеда.

Поставим эту задачу следующим образом.

Будем искать решение уравнения

$$\Delta u - \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = 0 \quad (\text{XXVII.1})$$

в области

$$0 \leq x \leq a, \quad 0 \leq y \leq b, \quad 0 \leq z \leq c$$

при граничных условиях

$$u|_{x=0} = u|_{x=a} = u|_{y=0} = u|_{y=b} = u|_{z=0} = u|_{z=c} = 0 \quad (\text{XXVII.2})$$

и начальных условиях

$$u|_{t=0} = u_0(x, y, z), \quad \frac{\partial u}{\partial t}|_{t=0} = u_1(x, y, z). \quad (\text{XXVII.3})$$

По общей теории [см. § 1 лекции XXIII] решение будет иметь вид:

$$u = \sum U_i(x, y, z) (a_i \cos \lambda_i t + b_i \sin \lambda_i t), \quad (\text{XXVII.4})$$

где  $U_i$  — решения уравнения

$$\Delta U_i + \lambda_i^2 U_i = 0, \quad (\text{XXVII.5})$$

удовлетворяющие условиям (XXVII.2). В данном случае эти решения можно выразить в конечном виде через элементарные функции, если воспользоваться приемом, который называется полным разделением переменных. С этой целью решения уравнения (XXVII.5) мы будем искать в виде

$$U_i(x, y, z) = X_i(x) V_i(y, z),$$

где  $X_i$  зависит только от  $x$ , а  $V_i$  от  $x$  не зависит. Для определения функций  $X_i$  и  $V_i$  мы получим:

$$V_i X_i'' + X_i \left( \frac{\partial^2 V_i}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 V_i}{\partial z^2} \right) + \lambda_i^2 X_i V_i = 0,$$

или

$$\frac{X_i''}{X_i} + \frac{\frac{\partial^2 V_i}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 V_i}{\partial z^2}}{V_i} + \lambda_i^2 = 0.$$

Очевидно, что

$$\frac{X_i''}{X_i} = -\kappa_i^2, \quad \frac{\frac{\partial^2 V_i}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 V_i}{\partial z^2}}{V_i} = -\tau_i^2,$$

где  $\kappa_i$  и  $\tau_i$  — постоянные, связанные соотношением

$$\kappa_i^2 + \tau_i^2 = \lambda_i^2.$$

Уравнение

$$X_i'' + \kappa_i^2 X_i = 0 \quad (\text{XXVII.6})$$

имеет при условиях (XXVII.2) собственными значениями числа

$$\kappa_i = \frac{k_i \pi}{a},$$

где  $k_i$  — целые числа.

Функция

$$X_i = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin \frac{k_i \pi x}{a}$$

удовлетворяет уравнению (XXVII.6), граничным условиям при  $x = 0$  и при  $x = a$ . Система решений  $\{X_i\}$  является ортогональной нормированной системой функций.

Рассматривая уравнение

$$\frac{\partial^2 V_i}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 V_i}{\partial z^2} + \tau_i^2 V_i = 0,$$

опять ищем его решение в виде

$$V_i = Y_i(y) Z_i(z),$$

где  $Y_i$  зависит только от  $y$ , а  $Z_i$  — только от  $z$ . Мы будем иметь:

$$\frac{Y_i''}{Y_i} + \frac{Z_i''}{Z_i} + \tau_i^2 = 0,$$

откуда следует, что

$$\frac{Y_i''}{Y_i} = -\sigma_i^2, \quad \frac{Z_i''}{Z_i} = -\mu_i^2,$$

где  $\sigma_i$  и  $\mu_i$  — постоянные, удовлетворяющие соотношению

$$\sigma_i^2 + \mu_i^2 = \tau_i^2.$$

Уравнение

$$Y_i'' + \sigma_i^2 Y_i = 0$$

имеет собственные значения

$$\sigma_i = \frac{l_i \pi}{b},$$

где  $l_i$  — целые числа, и собственные функции

$$Y_i = \sqrt{\frac{2}{b}} \sin \frac{\pi l_i}{b} y,$$

а уравнение

$$Z_i'' + \mu_i^2 Z_i = 0$$

имеет собственные значения

$$\mu_i = \frac{m_i \pi}{c},$$

где  $m_i$  — целые числа, и собственные функции

$$Z_i = \sqrt{\frac{2}{c}} \sin \frac{\pi m_i}{c} z.$$

Окончательно получим множество собственных функций колебания параллелепипеда вида

$$U_i = \sqrt{\frac{8}{abc}} \sin \frac{\pi k_i x}{a} \sin \frac{\pi l_i y}{b} \sin \frac{\pi m_i z}{c}. \quad (\text{XXVII.7})$$

Эти собственные функции отвечают следующим собственным значениям уравнения (XXVII.5) при граничных условиях (XXVII.2):

$$\lambda_i^2 = \pi^2 \left( \frac{k_i^2}{a^2} + \frac{l_i^2}{b^2} + \frac{m_i^2}{c^2} \right), \quad (\text{XXVII.8})$$

где  $k_i$ ,  $l_i$ ,  $m_i$  пробегает всевозможные тройки целых чисел. Заметим, что числа  $\lambda_i$  могут повторяться, т. е. может оказаться, что

$$\lambda_i = \lambda_{i+1} = \dots = \lambda_{i+h}.$$

Число равных между собой собственных чисел  $\lambda_i$  равно числу решений в целых числах уравнения (XXVII.8) относительно  $k_i$ ,  $l_i$ ,  $m_i$ .

Можно доказать, что других собственных значений или собственных функций уравнение (XXVII.5) при условиях (XXVII.2) не имеет.

Для этого установим следующую лемму.

**Л е м м а 1.** *Всякая функция  $\Phi(x, y, z)$ , удовлетворяющая условиям (XXVII.2) и имеющая непрерывные вторые производные<sup>1)</sup>,*

<sup>1)</sup> Вторые производные мы здесь требуем лишь потому, что сослался на теорему о разложении по собственным функциям.

представима сходящимся рядом:

$$\varphi(x, y, z) = \sqrt{\frac{8}{abc}} \sum_{k=1}^{\infty} \sin \frac{\pi kx}{a} \left[ \sum_{l=1}^{\infty} \sin \frac{\pi ly}{b} \left( \sum_{m=1}^{\infty} \varphi_{k, l, m} \sin \frac{\pi mz}{c} \right) \right], \quad (\text{XXVII.9})$$

причем ряды

$$\begin{aligned} \varphi_{k, l}(z) &= \sum_{m=1}^{\infty} \varphi_{k, l, m} \sin \frac{\pi mz}{c}, \\ \varphi_k(y, z) &= \sum_{l=1}^{\infty} \varphi_{k, l}(z) \sin \frac{\pi ly}{b}, \\ \varphi(x, y, z) &= \sum_{k=1}^{\infty} \varphi_k(y, z) \sin \frac{\pi kx}{a} \end{aligned}$$

сходятся равномерно по аргументам, стоящим под знаком синуса. Здесь

$$\begin{aligned} \varphi_{k, l, m} &= \\ &= \sqrt{\frac{8}{abc}} \int_0^a \int_0^b \int_0^c \varphi(x, y, z) \sin \frac{\pi kx}{a} \sin \frac{\pi ly}{b} \sin \frac{\pi mz}{c} dx dy dz. \quad (\text{XXVII.10}) \end{aligned}$$

Будем сначала рассматривать  $\varphi(x, y, z)$  как функцию переменного  $x$  с параметрами  $y$  и  $z$ . В силу того что для уравнения (XXVII.6) и данных краевых условий построена функция Грина (см. § 5 лекции XX), пользуясь теоремой Гильберта — Шмидта, можно функцию  $\varphi(x, y, z)$  представить в виде равномерно сходящегося ряда относительно  $x$  по собственным функциям уравнения (XXVII.6), т. е.

$$\varphi(x, y, z) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sum_{k=1}^{\infty} \varphi_k(y, z) \sin \frac{k\pi x}{a},$$

где

$$\varphi_k(y, z) = \sqrt{\frac{2}{a}} \int_0^a \varphi(x_1, y, z) \sin \frac{k\pi x_1}{a} dx_1. \quad (\text{XXVII.11})$$

Из формулы (XXVII.11) видно, что  $\varphi_k(y, z)$  есть непрерывная дважды дифференцируемая функция  $y, z$ , удовлетворяющая по этим переменным условиям (XXVII.2). Следовательно,  $\varphi_k(y, z)$

представима равномерно сходящимся рядом относительно  $y$ :

$$\varphi_k(y, z) = \sqrt{\frac{2}{b}} \sum_{l=1}^{\infty} \varphi_{k,l}(z) \sin \frac{\pi l y}{b},$$

где

$$\varphi_{k,l}(z) = \sqrt{\frac{2}{b}} \int_0^b \varphi_k(y_1, z) \sin \frac{\pi l y_1}{b} dy_1.$$

Наконец,  $\varphi_{k,l}(z)$  может быть разложена в равномерно сходящийся ряд по переменному  $z$ :

$$\varphi_{k,l}(z) = \sqrt{\frac{2}{c}} \sum_{m=1}^{\infty} \varphi_{k,l,m} \sin \frac{\pi m z}{c},$$

где

$$\varphi_{k,l,m} = \sqrt{\frac{2}{c}} \int_0^c \varphi_{k,l}(z_1) \sin \frac{\pi m z_1}{c} dz_1.$$

Сопоставляя формулы для  $\varphi_k(y, z)$ ,  $\varphi_{k,l}(z)$ ,  $\varphi_{k,l,m}$  и ряды для  $\varphi(x, y, z)$ ,  $\varphi_k(y, z)$  и  $\varphi_{k,l,m}$ , сразу получим утверждения леммы.

Пусть теперь  $U_0$  — какая-нибудь собственная функция уравнения (XXVII.5) при условиях (XXVII.2), отличающаяся от всех функций (XXVII.7). По доказанному в лекции XXIV, ее можно считать ортогональной ко всем функциям (XXVII.7). Согласно лемме ее можно разложить в ряд (XXVII.9). Из формулы (XXVII.10) следует, что все коэффициенты такого разложения будут равны нулю. Формула (XXVII.9) дает при этом

$$U_0 = 0.$$

Следовательно, никаких собственных функций, отличных от (XXVII.7), наша задача иметь не может.

Точно так же, как мы рассмотрели условие (XXVII.2), мы могли бы рассмотреть условия другого типа, например,

$$\left( \alpha \frac{\partial u}{\partial n} + \beta u \right) \Big|_S = 0, \quad (\text{XXVII.12})$$

где  $\alpha$  и  $\beta$  принимают постоянные значения на каждой из граней.

На основании общей теории, изложенной выше, мы заключаем, что поставленная задача полностью решается методом Фурье, так что мы можем удовлетворить всем начальным и граничным условиям, подбирая соответственно коэффициенты разложения решения в ряд по собственным функциям (XXVII.7).

Колебания прямоугольной мембраны изучаются тем же способом, как и колебания параллелепипеда.

Полезно обратить внимание на следующее обстоятельство. Пусть в формуле (XXVII.12) коэффициенты  $\alpha$  и  $\beta$  непостоянные. Тогда разложение собственных функций  $U_i$  в произведение  $X_i Y_i Z_i$ , вообще говоря, может и не иметь места. Возникает вопрос: может быть возможно сделать какую-либо замену независимых переменных, введя вместо  $x, y, z$  новые координаты  $t_1, t_2, t_3$  так, чтобы подобное представление оказалось возможным? Координаты, в которых для данной задачи математической физики возможно провести разделение переменных, называются иногда *нормальными координатами*. Мы можем поставить вопрос: существуют ли нормальные координаты для данной задачи и если существуют, то как их найти?

Для некоторых специальных задач математической физики мы укажем в следующей лекции такие нормальные координаты. Как доказал В. В. Степанов, нормальные координаты существуют в очень ограниченном классе задач.

---

# ЛЕКЦИЯ XXVIII

## УРАВНЕНИЕ ЛАПЛАСА В КРИВОЛИНЕЙНЫХ КООРДИНАТАХ.

### ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДА ФУРЬЕ

#### § 1. Уравнение Лапласа в криволинейных координатах

В математической физике часто рассматриваются различные криволинейные координаты: полярные, цилиндрические и т. п. Рассмотрим, как будет выглядеть в таких переменных уравнение Лапласа.

Пусть  $t_1, t_2, t_3$  будут эти криволинейные координаты, связанные с  $x, y, z$  формулами:

$$\begin{aligned} t_1 &= t_1(x, y, z), & t_2 &= t_2(x, y, z), & t_3 &= t_3(x, y, z), \\ x &= x(t_1, t_2, t_3), & y &= y(t_1, t_2, t_3), & z &= z(t_1, t_2, t_3). \end{aligned}$$

Рассмотрим две какие-либо кривые

$$\begin{aligned} x_1(s_1), \quad y_1(s_1), \quad z_1(s_1); \\ x_2(s_2), \quad y_2(s_2), \quad z_2(s_2), \end{aligned}$$

проходящие через одну и ту же точку;  $s$  — длина дуги. Косинус угла между этими кривыми, как известно из дифференциальной геометрии, определяется по формуле

$$\cos \varphi = \frac{dx_1}{ds_1} \frac{dx_2}{ds_2} + \frac{dy_1}{ds_1} \frac{dy_2}{ds_2} + \frac{dz_1}{ds_1} \frac{dz_2}{ds_2}.$$

В новых координатах эта формула примет вид

$$\begin{aligned} \cos \varphi &= \sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^3 \left( \frac{\partial x}{\partial t_i} \frac{\partial x}{\partial t_j} + \frac{\partial y}{\partial t_i} \frac{\partial y}{\partial t_j} + \frac{\partial z}{\partial t_i} \frac{\partial z}{\partial t_j} \right) \frac{dt_i^{(1)}}{ds_1} \frac{dt_j^{(2)}}{ds_2} = \\ &= \sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^3 \alpha_{ij} \frac{dt_i^{(1)}}{ds_1} \frac{dt_j^{(2)}}{ds_2}, \end{aligned}$$

или

$$\cos \varphi ds_1 ds_2 = \sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^3 \alpha_{ij} dt_i^{(1)} dt_j^{(2)}, \quad (\text{XXVIII.1})$$

где  $dt_i^{(1)}$  и  $dt_j^{(2)}$  — дифференциалы, взятые соответственно вдоль каждой из рассматриваемых линий.

Заметим, что

$$\alpha_{ij} = \alpha_{ji} = \frac{\partial x}{\partial t_i} \frac{\partial x}{\partial t_j} + \frac{\partial y}{\partial t_i} \frac{\partial y}{\partial t_j} + \frac{\partial z}{\partial t_i} \frac{\partial z}{\partial t_j}.$$

Если обе линии совпадают, то формула (XXVIII.1) примет вид

$$ds^2 = \sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^3 \alpha_{ij} dt_i dt_j. \quad (\text{XXVIII.2})$$

Для вывода уравнения Лапласа, как и во многих других вопросах, связанных с криволинейными координатами, удобно представить все формулы через коэффициенты  $\alpha_{ij}$ .

Если система координат  $t_1, t_2, t_3$  ортогональная, т. е. если координатные линии образуют между собой прямые углы, то все  $\alpha_{ij} = 0$  при  $i \neq j$ . В самом деле, фиксируем произвольно выбранные значения  $i = i_0$  и  $j = j_0$ ,  $i_0 \neq j_0$ . На одной координатной линии лишь  $dt_{i_0}^{(1)} \neq 0$ , на другой — лишь  $dt_{j_0}^{(2)} \neq 0$ . Для этих координатных линий левая часть формулы (XXVIII.1) обратится в нуль, так как угол  $\varphi = \frac{\pi}{2}$ , а правая часть будет равна  $2\alpha_{i_0 j_0} dt_{i_0}^{(1)} dt_{j_0}^{(2)}$ , откуда  $\alpha_{i_0 j_0} = 0$ . Ограничиваясь случаем ортогональности, положим:

$$\alpha_{ij} = \begin{cases} h_i^2, & i = j, \\ 0, & i \neq j. \end{cases}$$

При этом

$$ds^2 = h_1^2 dt_1^2 + h_2^2 dt_2^2 + h_3^2 dt_3^2.$$

П р и м е р ы.

1. Для полярных координат в пространстве

$$x = r \sin \vartheta \cos \varphi, \quad y = r \sin \vartheta \sin \varphi, \quad z = r \cos \vartheta,$$

откуда

$$ds^2 = dx^2 + dy^2 + dz^2 = dr^2 + r^2 d\vartheta^2 + r^2 \sin^2 \vartheta d\varphi^2.$$

2. Для цилиндрических координат получим:

$$x = r \cos \varphi, \quad y = r \sin \varphi, \quad z = z, \\ ds^2 = dx^2 + dy^2 + dz^2 = dr^2 + r^2 d\varphi^2 + dz^2.$$

Полезно вычислить определитель преобразования  $\frac{\partial(x, y, z)}{\partial(t_1, t_2, t_3)}$  через те же величины  $h_1, h_2$  и  $h_3$ . Для этого мы введем еще одну промежуточную прямоугольную систему координат  $x_1, y_1, z_1$ , которая отличается только направлением осей от  $x, y, z$ . Направления  $x_1, y_1, z_1$  мы выберем таким образом, чтобы в данной точке  $x, y, z$  они совпадали соответственно с направлениями  $t_1, t_2, t_3$ . При этом в рассматриваемой точке имеем:

$$\frac{\partial(x, y, z)}{\partial(t_1, t_2, t_3)} = \frac{\partial(x, y, z)}{\partial(x_1, y_1, z_1)} \frac{\partial(x_1, y_1, z_1)}{\partial(t_1, t_2, t_3)} = \pm \frac{\partial(x_1, y_1, z_1)}{\partial(t_1, t_2, t_3)},$$

ибо в этой точке  $\frac{\partial(x, y, z)}{\partial(x_1, y_1, z_1)} = \pm 1$ , причем знак определяется в зависимости от ориентации системы координат  $(x_1, y_1, z_1)$ .

Отсюда

$$\frac{\partial(x, y, z)}{\partial(t_1, t_2, t_3)} = \pm \begin{vmatrix} \frac{\partial x_1}{\partial t_1} \frac{\partial x_1}{\partial t_2} \frac{\partial x_1}{\partial t_3} \\ \frac{\partial y_1}{\partial t_1} \frac{\partial y_1}{\partial t_2} \frac{\partial y_1}{\partial t_3} \\ \frac{\partial z_1}{\partial t_1} \frac{\partial z_1}{\partial t_2} \frac{\partial z_1}{\partial t_3} \end{vmatrix}.$$

Но в определителе  $\frac{\partial(x_1, y_1, z_1)}{\partial(t_1, t_2, t_3)}$  все члены, кроме тех, которые стоят на главной диагонали, равны нулю и, значит,

$$\frac{\partial(x_1, y_1, z_1)}{\partial(t_1, t_2, t_3)} = \frac{\partial x_1}{\partial t_1} \frac{\partial y_1}{\partial t_2} \frac{\partial z_1}{\partial t_3}.$$

Далее, на оси  $x_1$  и на всякой кривой, касательной к  $x_1$  в нашей точке, имеем:

$$dx_1^2 = ds^2 = h_1^2 dt_1^2,$$

на оси  $y_1$  и на кривой, касательной к ней, аналогично:

$$dy_1^2 = ds^2 = h_2^2 dt_2^2,$$

и, наконец, на оси  $z_1$  и на кривых, касательных к оси  $z_1$ :

$$dz_1^2 = ds^2 = h_3^2 dt_3^2,$$

откуда

$$\begin{aligned} \frac{\partial t_1}{\partial x_1} &= \pm \frac{1}{h_1}, & \frac{\partial t_2}{\partial x_1} &= 0, & \frac{\partial t_3}{\partial x_1} &= 0; \\ \frac{\partial t_1}{\partial y_1} &= 0, & \frac{\partial t_2}{\partial y_1} &= \pm \frac{1}{h_2}, & \frac{\partial t_3}{\partial y_1} &= 0; \\ \frac{\partial t_1}{\partial z_1} &= 0, & \frac{\partial t_2}{\partial z_1} &= 0, & \frac{\partial t_3}{\partial z_1} &= \pm \frac{1}{h_3} \end{aligned} \quad (\text{XXVIII.3})$$

и

$$\begin{aligned}\frac{\partial x_1}{\partial t_1} &= \pm h_1, & \frac{\partial x_1}{\partial t_2} &= 0, & \frac{\partial x_1}{\partial t_3} &= 0; \\ \frac{\partial y_1}{\partial t_1} &= 0, & \frac{\partial y_1}{\partial t_2} &= \pm h_2, & \frac{\partial y_1}{\partial t_3} &= 0; \\ \frac{\partial z_1}{\partial t_1} &= 0, & \frac{\partial z_1}{\partial t_2} &= 0, & \frac{\partial z_1}{\partial t_3} &= \pm h_3;\end{aligned}$$

окончательно получим:

$$\frac{\partial (x_1, y_1, z_1)}{\partial (t_1, t_2, t_3)} = \pm h_1 h_2 h_3,$$

причем знак определяется ориентацией систем координат  $(x_1, y_1, z_1)$  и  $(t_1, t_2, t_3)$ .

Мы видели выше, что если операторы  $L$  и  $M$  взаимно сопряжены, то справедливо интегральное соотношение

$$\iiint_{\Omega} (uLv - vMu) d\Omega = \iint_S [uP(v) - vQ(u)] dS,$$

где  $\Omega$  — некоторый объем, ограниченный гладкой поверхностью  $S$ , а  $P(v)$ ,  $Q(u)$  — линейные комбинации производных от функций  $v$ ,  $u$  с коэффициентами, не зависящими от  $v$  и  $u$ .

Если одна из функций, например  $v$ , обращается в нуль вне некоторой области  $\Omega_v$ , целиком вместе со своей границей, лежащей внутри области  $\Omega$ , то в этом тождестве поверхностный интеграл исчезнет и мы получим:

$$\iiint_{\Omega} (uLv - vMu) d\Omega = 0.$$

Это последнее соотношение можно принять за определение оператора  $Mu$ , если потребовать, чтобы оно выполнялось при произвольной функции  $u$  и любой функции  $v$ , отличной от нуля лишь в некоторой внутренней области  $\Omega_v$ .

Прежде чем вычислить выражение для оператора Лапласа в криволинейных координатах, докажем лемму.

**Л е м м а 1.** Если некоторый оператор 2-го порядка является самосопряженным, то он обязательно представляется в виде

$$Lu = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \frac{\partial}{\partial x_i} \left( A_{ij} \frac{\partial u}{\partial x_j} \right) + cu, \quad (\text{XXVIII.4})$$

причем  $A_{ij} = A_{ji}$ .

Заметим, что оператор вида (XXVIII.4) является самосопряженным. Это сразу следует из определения самосопряженности оператора (см. § 2 лекции V).

Докажем теперь обратное утверждение, выраженное в лемме.

Убедимся сначала, что сопряженный оператор к данному может быть лишь один. В самом деле, пусть  $M_1$  и  $M_2$  — два оператора, сопряженных оператору  $L$ , и пусть  $v$  — функция, везде равная нулю, кроме области  $\Omega_1$ , внутренней по отношению к  $\Omega$ ; тогда

$$\iiint_{\Omega} (uLv - vM_1u) d\Omega = 0$$

и

$$\iiint_{\Omega} (uLv - vM_2u) d\Omega = 0$$

для любой функции  $u$ . Вычитая, мы получим:

$$\iiint_{\Omega} v (M_1 - M_2) u d\Omega = 0.$$

Но функция  $v$  — произвольная в области  $\Omega_v$ . Поэтому

$$(M_1 - M_2)u = 0,$$

и, следовательно, операторы  $M_1$  и  $M_2$  тождественны.

Если  $L$  имеет вид

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \frac{\partial}{\partial t_i} \left( A_{ij} \frac{\partial u}{\partial t_j} \right) + \sum_{i=1}^n B_i \frac{\partial u}{\partial t_i} + cu,$$

то сопряженный с ним будет оператор вида

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \frac{\partial}{\partial t_i} \left( A_{ji} \frac{\partial u}{\partial t_j} \right) - \sum_{i=1}^n \frac{\partial}{\partial t_i} (B_i u) + cu,$$

и они могут быть равны только, если  $B_i = 0$  и  $A_{ij} = A_{ji}$ . Лемма доказана.

В переменных  $t_1, t_2, t_3$  оператор Лапласа  $\Delta$  не будет самосопряженным. Однако его легко выразить через такой оператор. В самом деле, для любой пары функций  $u$  и  $v$ , выбранных так же, как при доказательстве леммы, имеем:

$$\iiint_{\Omega} (u \Delta v - v \Delta u) dx dy dz = 0,$$

или, переходя к новым переменным:

$$\iiint_{\Omega} (u \Delta v - v \Delta u) h_1 h_2 h_3 dt_1 dt_2 dt_3 = 0,$$

так как, по доказанному выше, якобиан  $\frac{\partial(x, y, z)}{\partial(t_1, t_2, t_3)}$  лишь знаком может отличаться от величины  $h_1 h_2 h_3$ .

Значит, оператор

$$Lu = h_1 h_2 h_3 \Delta u$$

будет уже самосопряженным.

Если

$$Lu = \sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^3 \frac{\partial}{\partial t_i} \left( A_{ij} \frac{\partial u}{\partial t_j} \right)$$

(очевидно, что слагаемое с  $u$  не может войти ни в  $\Delta$  ни в  $L$ ), то

$$\Delta u = \frac{1}{h_1 h_2 h_3} \sum_{i=1}^3 \frac{\partial}{\partial t_i} \left( \sum_{j=1}^3 A_{ij} \frac{\partial u}{\partial t_j} \right). \quad (\text{XXVIII.5})$$

Коэффициенты  $\beta_{ij}$  при вторых производных в выражении (XXVIII.5) будут, как легко видеть, равны  $\frac{A_{ij}}{h_1 h_2 h_3}$ .

С другой стороны,  $\beta_{ij}$  можно определить непосредственно. Заменим сначала переменные на  $x_1, y_1, z_1$ ; при этом вид оператора  $\Delta u$  не изменится, так как оператор Лапласа инвариантен относительно линейного ортогонального преобразования переменных<sup>1)</sup>. Теперь, пользуясь формулами (XXVIII.3), получим:

$$\beta_{ij} = \frac{\partial t_i}{\partial x_1} \frac{\partial t_j}{\partial x_1} + \frac{\partial t_i}{\partial y_1} \frac{\partial t_j}{\partial y_1} + \frac{\partial t_i}{\partial z_1} \frac{\partial t_j}{\partial z_1} = \begin{cases} \frac{1}{h_i^2}, & i = j, \\ 0, & i \neq j. \end{cases}$$

Отсюда имеем:

$$A_{ij} = \begin{cases} \frac{h_1 h_2 h_3}{h_i^2}, & i = j, \\ 0, & i \neq j, \end{cases}$$

т. е.

$$\Delta u = \frac{1}{h_1 h_2 h_3} \left[ \frac{\partial}{\partial t_1} \left( \frac{h_2 h_3}{h_1} \frac{\partial u}{\partial t_1} \right) + \frac{\partial}{\partial t_2} \left( \frac{h_1 h_3}{h_2} \frac{\partial u}{\partial t_2} \right) + \frac{\partial}{\partial t_3} \left( \frac{h_1 h_2}{h_3} \frac{\partial u}{\partial t_3} \right) \right]. \quad (\text{XXVIII.6})$$

В полярных координатах, где  $h_1 = 1$ ,  $h_2 = r$ ,  $h_3 = r \sin \vartheta$ , получим:

$$\begin{aligned} \Delta u &= \frac{1}{r^2 \sin \vartheta} \left[ \frac{\partial}{\partial r} \left( r^2 \sin \vartheta \frac{\partial u}{\partial r} \right) + \frac{\partial}{\partial \vartheta} \left( \sin \vartheta \frac{\partial u}{\partial \vartheta} \right) + \frac{\partial}{\partial \varphi} \left( \frac{1}{\sin \vartheta} \frac{\partial u}{\partial \varphi} \right) \right] = \\ &= \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left( r^2 \frac{\partial u}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \vartheta} \frac{\partial}{\partial \vartheta} \left( \sin \vartheta \frac{\partial u}{\partial \vartheta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \vartheta} \frac{\partial^2 u}{\partial \varphi^2}. \quad (\text{XXVIII.7}) \end{aligned}$$

<sup>1)</sup> Это можно проверить непосредственно.

В цилиндрических координатах будем иметь:

$$\begin{aligned} h_1 &= 1, \quad h_2 = r, \quad h_3 = 1; \\ \Delta u &= \frac{1}{r} \left[ \frac{\partial}{\partial r} \left( r \frac{\partial u}{\partial r} \right) + \frac{\partial}{\partial \varphi} \left( \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial \varphi} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left( r \frac{\partial u}{\partial z} \right) \right] = \\ &= \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left( r \frac{\partial u}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \varphi^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2}. \quad (\text{XXVIII.8}) \end{aligned}$$

## § 2. Функции Бесселя

Рассмотрим обыкновенное дифференциальное уравнение

$$y'' + \frac{1}{x} y' + \left( 1 - \frac{\nu^2}{x^2} \right) y = 0. \quad (\text{XXVIII.9})$$

Это уравнение носит название *уравнения Бесселя*. В курсах аналитической теории дифференциальных уравнений и в курсах теории специальных функций устанавливается ряд важных свойств решений этого уравнения, которые мы дадим без доказательства. Желающие могут познакомиться с доказательством этих свойств хотя бы по книге В. И. Смирнова «Курс высшей математики», т. III, ч. 2 или Р. О. Кузьмина «Бесселевы функции». Подробное изложение теории бесселевых функций см. в книге Ватсона «Теория бесселевых функций».

Мы рассмотрим уравнение (XXVIII.9) отдельно для целых и нецелых значений  $\nu$ .

Справедливы следующие утверждения:

1. Для нецелых значений  $\nu$  уравнение (XXVIII.9) имеет два линейно независимых интеграла:

$$J_\nu(x) \text{ и } J_{-\nu}(x),$$

разложимых в равномерно сходящиеся на всей плоскости комплексного переменного  $x$  ряды:

$$\begin{aligned} J_\nu(x) &= \sum_{s=0}^{\infty} \frac{(-1)^s \left( \frac{x}{2} \right)^{\nu+2s}}{\Gamma(s+1) \Gamma(\nu+s+1)}, \\ J_{-\nu}(x) &= \sum_{s=0}^{\infty} \frac{(-1)^s \left( \frac{x}{2} \right)^{-\nu-2s}}{\Gamma(s+1) \Gamma(-\nu+s+1)}. \end{aligned}$$

Иными словами,  $x^{-\nu} J_\nu(x)$  и  $x^\nu J_{-\nu}(x)$  суть целые функции от  $x$ . Функции  $J_\nu(x)$  и  $J_{-\nu}(x)$  называются соответственно *бесселевыми функциями порядка  $\nu$  и  $-\nu$* ; их линейная комбинация

$$N_\nu(x) = \frac{J_\nu(x) \cos(\nu\pi) - J_{-\nu}(x)}{\sin(\nu\pi)}$$

носит название *функции Неймана*.

2. Для целых значений  $\nu = m$  определенные выше функции Бесселя порядка  $m$  и порядка  $-m$  уже не будут независимыми:

$$J_{-m}(x) = (-1)^m J_m(x).$$

При этом за линейно независимые решения уравнения (XXVIII.7) можно взять две функции:

$$J_m(x) = \sum_{s=0}^{\infty} \frac{(-1)^s \left(\frac{x}{2}\right)^{m+2s}}{\Gamma(s+1) \Gamma(m+s+1)}, \quad (\text{XXVIII.10})$$

$$\begin{aligned} N_m(x) = & \frac{2}{\pi} J_m(x) \left( \ln \frac{x}{2} + C \right) - \frac{1}{\pi} \sum_{s=0}^{m-1} \frac{(m-s-1)!}{\Gamma(s+1)} \left(\frac{x}{2}\right)^{-m+2s} - \\ & - \frac{1}{\pi} \left(\frac{x}{2}\right)^m \frac{1}{m!} \left( \frac{1}{m} + \frac{1}{m-1} + \dots + 1 \right) - \\ & - \frac{1}{\pi} \sum_{s=1}^{\infty} \left[ \frac{(-1)^s}{\Gamma(s+1) \Gamma(m+s+1)} \left(\frac{x}{2}\right)^{2s+m} \times \right. \\ & \times \left. \left( \frac{1}{m+s} + \frac{1}{m+s-1} + \dots + 1 + \frac{1}{s} + \frac{1}{s-1} + \dots + 1 \right) \right], \end{aligned}$$

где  $C = 0,577215\dots$  — эйлерова постоянная.

Как видно из формул (XXVIII.10), функция Бесселя  $J_m(x)$  есть целая функция своего аргумента вместе с  $x^{-m} J_m(x)$ . Функция же  $N_m(x)$ , называемая *функцией Неймана* и являющаяся пределом для функции  $N_\nu(x)$  при  $\nu \rightarrow m$ , имеет в начале координат особенность в виде точки ветвления, соединенной с полюсом.

3. Для чисто мнимых значений аргумента ( $x = it$ ) функция

$$i^{-m} J_m(x) = i^{-m} J_m(it) + J_m(t),$$

являющаяся решением уравнения Бесселя относительно переменного  $x$ , будет вещественной.

Другое решение уравнения (XXVIII.9), вещественное для мнимых значений  $x$ , имеет вид

$$i^{-m} \left[ N_m(x) - \frac{i\pi}{2} J_m(x) \right] = i^{-m} \left[ N_m(it) - \frac{i\pi}{2} J_m(it) \right].$$

#### 4. Линейные комбинации

$$H_\nu^{(1)}(x) = J_\nu(x) + iN_\nu(x),$$

$$H_\nu^{(2)}(x) = J_\nu(x) - iN_\nu(x)$$

носят название *функций Ганкеля 1-го или 2-го рода*. Эти функции, являющиеся, очевидно, решениями уравнения Бесселя (хотя и комплексными при вещественных значениях  $x$ ), имеют следующие

асимптотические выражения для больших вещественных значений  $x$ , годные как для целых, так и для дробных  $\nu$ :

$$\left. \begin{aligned} H_{\nu}^{(1)}(x) &= \sqrt{\frac{2}{\pi x}} e^{i\left(x - \frac{\nu\pi}{2} - \frac{\pi}{4}\right)} [1 + O(x^{-1})], \\ H_{\nu}^{(2)}(x) &= \sqrt{\frac{2}{\pi x}} e^{-i\left(x - \frac{\nu\pi}{2} - \frac{\pi}{4}\right)} [1 + O(x^{-1})]. \end{aligned} \right\} \quad (\text{XXVIII.11})$$

(Равенство  $f(x) = O(\varphi(x))$  означает, что отношение  $\frac{f(x)}{|\varphi(x)|}$  остается ограниченным при  $x \rightarrow \infty$ .)

Для  $H_{\nu}^{(1)}(x)$  это представление годится для больших  $x$ , удовлетворяющих условию

$$\left| \arg x - \frac{\pi}{2} \right| < \frac{3\pi}{2},$$

а для  $H_{\nu}^{(2)}(x)$  — для больших значений  $x$ , удовлетворяющих условию

$$\left| \arg x + \frac{\pi}{2} \right| < \frac{3\pi}{2}.$$

Из формул (XXVIII.11) получаются следующие асимптотические выражения для функций Бесселя и Неймана:

$$\left. \begin{aligned} J_{\nu}(x) &= \sqrt{\frac{2}{\pi x}} \cos\left(x - \frac{\nu\pi}{2} - \frac{\pi}{4}\right) + O(x^{-\frac{3}{2}}), \\ N_{\nu}(x) &= \sqrt{\frac{2}{\pi x}} \sin\left(x - \frac{\nu\pi}{2} - \frac{\pi}{4}\right) + O(x^{-\frac{3}{2}}). \end{aligned} \right\} \quad (\text{XXVIII.12})$$

Формулы (XXVIII.12) показывают, как ведут себя функции Бесселя и Неймана при возрастании аргумента. Это — колеблющиеся функции, бесчисленное множество раз проходящие через нуль. Амплитуда их колебаний постепенно затухает. Корни функций Бесселя и Неймана с одинаковым значком перемежаются. Функции  $I_n(z)$  для вещественных больших значений  $z$  имеет представление:

$$I_n(z) \sim \frac{e^z}{\sqrt{2\pi z}} \left\{ 1 + O\left(\frac{1}{z}\right) \right\}.$$

Элементарно можно получить уравнение, которому удовлетворяет функция  $I_n(z)$ :

$$\frac{d^2 I_n(z)}{dz^2} + \frac{1}{z} \frac{d I_n(z)}{dz} - \left(1 + \frac{n^2}{z^2}\right) I_n(z) = 0.$$

Эта функция часто встречается в приложениях.

Обычно в таблицах даются только значения функций  $J_0(z)$  и  $J_1(z)$ . Между функциями  $J_n(z)$  для разных  $n$  существуют соотношения, позволяющие выразить при целом  $n$  любую функцию  $J_n(z)$  и ее производную через эти две основные функции:

$$J_{n-1}(z) + J_{n+1}(z) = \frac{2n}{z} J_n(z), \quad J_{n-1}(z) - J_{n+1}(z) = 2J'_n(z).$$

### § 3. Полное разделение переменных в уравнении $\Delta u = 0$ в полярных координатах

Рассмотрим волновое уравнение на плоскости:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} - \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = 0.$$

Пусть мы изучаем колебания круглой мембраны  $r \leq 1$  с граничным условием

$$u|_{r=1} = 0 \quad (\text{XXVIII.13})$$

и начальными условиями

$$u|_{t=0} = u_0; \quad \frac{\partial u}{\partial t} \Big|_{t=0} = u_1.$$

Переходя к переменным  $r$  и  $\varphi$  по формулам  $x = r \cos \varphi$ ,  $y = r \sin \varphi$ , преобразуем это уравнение к виду

$$\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left( r \frac{\partial u}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \varphi^2} - \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = 0 \quad (\text{XXVIII.14})$$

[см. (XXVIII.8)].

Решение (XXVIII.14) будем искать в виде

$$u = \sum_{i=1}^{\infty} v_i(r, \varphi) (a_i \cos \lambda_i t + b_i \sin \lambda_i t),$$

где  $v_i$  есть решение уравнения

$$\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left( r \frac{\partial v_i}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 v_i}{\partial \varphi^2} + \lambda_i^2 v_i = 0. \quad (\text{XXVIII.15})$$

Покажем, что  $r$  и  $\varphi$  являются нормальными координатами нашей задачи.

Ищем решение  $v_i$  опять в виде произведения

$$v_i = \Phi_i(\varphi) R_i(r). \quad (\text{XXVIII.16})$$

Как мы установим позднее, такие решения существуют. Подставляя (XXVIII.16) в уравнение (XXVIII.15), получим:

$$\frac{\Phi_i}{r} \frac{d}{dr} \left( r \frac{dR_i}{dr} \right) + \frac{1}{r^2} R_i \frac{d^2 \Phi_i}{d\varphi^2} + \lambda_i^2 R_i \Phi_i = 0$$

или, деля на  $R_i \Phi_i$  и умножая на  $r^2$ :

$$\frac{r \frac{d}{dr} \left( r \frac{dR_i}{dr} \right)}{R_i} + \frac{\frac{d^2 \Phi_i}{d\varphi^2}}{\Phi_i} + \lambda_i^2 r^2 = 0,$$

т. е.

$$-\frac{\frac{d^2 \Phi_i}{d\varphi^2}}{\Phi_i} = -\frac{r \frac{d}{dr} \left( r \frac{dR_i}{dr} \right)}{R_i} + r^2 \lambda_i^2.$$

Приравнявая обе части постоянной  $m_i^2$ , имеем два уравнения:

$$\Phi_i'' + m_i^2 \Phi_i = 0, \quad (\text{XXVIII.17})$$

$$r(rR_i)' - (m_i^2 - r^2 \lambda_i^2) R_i = 0. \quad (\text{XXVIII.18})$$

Решение уравнения (XXVIII.17) должно обладать периодом  $2\pi$  для того, чтобы иметь определенный физический смысл. При этом, очевидно,  $m_i$  должно быть вещественным и целым. Тогда

$$\Phi_i^{(1)} = \cos m_i \varphi, \quad \Phi_i^{(2)} = \sin m_i \varphi.$$

Уравнение (XXVIII.18) преобразуем к самосопряженному виду:

$$(rR_i)' - \left( \frac{m_i^2}{r} - \lambda_i^2 r \right) R_i = 0. \quad (\text{XXVIII.19})$$

В таком виде уравнение для  $R_i$  есть самосопряженное уравнение 2-го порядка. Мы будем искать то его решение, которое обращается в нуль при  $r = 1$  и остается ограниченным при  $r = 0$ . По общей теории (лекция XX и лекция XXV, § 4) такое решение существует для некоторого множества значений  $\lambda_i^2$ .

**Лемма 1.** *Фундаментальные функции уравнения (XXVIII.19), удовлетворяющие указанным граничным условиям, ортогональны с весом  $r$ :*

$$\int_0^1 R_i(r) R_j(r) r dr = \begin{cases} 0, & i \neq j, \\ 1, & i = j. \end{cases}$$

В самом деле <sup>1)</sup>, пусть

$$LR_i \equiv (rR_i)' - \frac{m_i^2}{r} R_i = -\lambda_i^2 r R_i;$$

тогда

$$\int_0^1 [R_j LR_i - R_i LR_j] dr = (\lambda_j^2 - \lambda_i^2) \int_0^1 r R_j R_i dr.$$

<sup>1)</sup> Лемма следует из общей теории, однако ее доказательство приводится вторично. Лемма имеет место для более общего условия при  $r = 1$ , а именно

$$(\alpha R_i + \beta R_j)|_{r=1} = 0.$$

Но интеграл в левой части тождества равен нулю, значит, и интеграл справа равен нулю, что и требовалось доказать.

Сделаем подстановку:

$$\lambda_i r = \rho,$$

тогда

$$\frac{d}{dr} = \lambda_i \frac{d}{d\rho},$$

и уравнение (XXVIII.19) переписывается так:

$$\lambda_i \frac{d}{d\rho} \left( \rho \frac{dR_i}{d\rho} \right) - \left( \frac{m_i^2 \lambda_i}{\rho} - \lambda_i \rho \right) R_i = 0,$$

или

$$\frac{d}{d\rho} \left( \rho \frac{dR_i}{d\rho} \right) - \left( \frac{m_i^2}{\rho} - \rho \right) R_i = 0. \quad (\text{XXVIII.20})$$

Обозначая  $R_i$  через  $y$ , имеем:

$$y'' + \frac{1}{\rho} y' + \left( 1 - \frac{m_i^2}{\rho^2} \right) y = 0.$$

Мы видим, что задача свелась к уравнению Бесселя, о котором шла речь выше.

Естественно, что следует взять за  $R$  регулярное решение уравнения (XXVIII.20), т. е.

$$R_i(r) = J_{m_i}(\lambda_i r).$$

Значение  $\lambda_i$  получится из граничного условия (XXVIII.13). Имеем:

$$R_i(1) = J_{m_i}(\lambda_i) = 0. \quad (\text{XXVIII.21})$$

Как и следовало ожидать, это уравнение имеет бесконечное множество решений, что с очевидностью следует из асимптотического представления для бесселевой функции (XXVIII.12).

Мы получаем, таким образом, систему решений нашей краевой задачи в виде

$$c_i \cos(m_i \varphi) J_{m_i}(\lambda_i r), \quad d_i \sin(m_i \varphi) J_{m_i}(\lambda_i r) \quad (\text{XXVIII.22})$$

с собственными значениями  $\lambda_i^2$ , где  $c_i$  и  $d_i$  — некоторые постоянные, определяемые из условия нормировки. Все эти решения ортогональны между собою. Легко доказать, как и в случае колебаний прямоугольного параллелепипеда, что функция (XXVIII.22), в которых пары чисел  $m_i$  и  $\lambda_i$  суть всевозможные пары, удовлетворяющие уравнению (XXVIII.21), дают все собственные функции задачи. Для доказательства установим сначала лемму.

**Л е м м а 2.** Произвольная функция  $\omega(r, \varphi)$ , имеющая непрерывные производные до второго порядка включительно, удовлетворяющая граничному условию (XXVIII.13), может быть представлена сходящимся рядом вида

$$\omega(r, \varphi) = \sum_{m=0}^{\infty} \sum_{k=1}^{\infty} (\alpha_{mk} \cos m\varphi + \beta_{mk} \sin m\varphi) J_m(\lambda_k^{(m)} r), \quad (\text{XXVIII.23})$$

где

$$\alpha_{mk} = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} \int_0^1 \omega(r, \varphi) \cos m\varphi J_m(\lambda_k^{(m)} r) r dr d\varphi,$$

$$\beta_{mk} = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} \int_0^1 \omega(r, \varphi) \sin m\varphi J_m(\lambda_k^{(m)} r) r dr d\varphi.$$

Прежде всего  $\omega(r, \varphi)$  как периодическая функция представима в виде

$$\omega(r, \varphi) = \sum_{m=0}^{\infty} [a_m(r) \cos m\varphi + b_m(r) \sin m\varphi], \quad (\text{XXVIII.24})$$

где

$$a_m(r) = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} \omega(r, \varphi) \cos m\varphi d\varphi, \quad b_m(r) = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} \omega(r, \varphi) \sin m\varphi d\varphi.$$

Коэффициенты  $a_m(r)$  имеют непрерывные вторые производные, удовлетворяют краевому условию (XXVIII.13) и должны оставаться ограниченными при  $r = 0$ , поэтому могут быть разложены в равномерно сходящиеся ряды по собственным функциям самосопряженного уравнения (XXVIII.20), т. е. по функциям  $J_m(\lambda_k^{(m)} r)$ :

$$a_m(r) = \sum_{k=1}^{\infty} \alpha_{mk} J_m(\lambda_k^{(m)} r), \quad (\text{XXVIII.25})$$

где

$$\alpha_{mk} = \frac{\int_0^1 a_m(r) J_m(\lambda_k^{(m)} r) r dr}{\left\{ \int_0^1 [J_m(\lambda_k^{(m)} r)]^2 r dr \right\}^{\frac{1}{2}}}. \quad (\text{XXVIII.26})$$

Аналогично

$$b_m(r) = \sum_{k=1}^{\infty} \beta_{mk} J_m(\lambda_k^{(m)} r), \quad (\text{XXVIII.27})$$

где

$$\beta_{mh} = \frac{\int_0^1 b_m(r) J_m(\lambda_k^{(m)} r) r dr}{\left\{ \int_0^1 [J_m(\lambda_k^{(m)} r)]^2 r dr \right\}^{\frac{1}{2}}}. \quad (\text{XXVIII.28})$$

Сопоставляя (XXVIII.25), (XXVIII.26), (XXVIII.27) и (XXVIII.28), получим утверждение леммы, причем ряд (XXVIII.24) равномерно сходится относительно  $\varphi$ , а ряды (XXVIII.25) и (XXVIII.27) равномерно сходятся относительно  $r$ .

Из леммы 2 сразу следует, что других собственных функций, кроме найденных, наша задача иметь не может, ибо каждая такая собственная функция представлялась бы рядом (XXVIII.23) с коэффициентами, равными нулю, и должна, следовательно, равняться нулю.

Задача о колебании мембраны решена тем самым до конца.

---

# ЛЕКЦИЯ XXIX

## ГАРМОНИЧЕСКИЕ ПОЛИНОМЫ И СФЕРИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ

### § 1. Определение сферических функций

Прежде чем переходить к дальнейшим приложениям метода Фурье, мы займемся еще одним важным вопросом. Рассмотрим уравнение Лапласа с тремя переменными:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = 0$$

и поставим себе целью найти те решения этого уравнения, которые имеют вид однородных многочленов степени  $n$  относительно  $x$ ,  $y$  и  $z$ .

В плоском случае такие однородные решения уравнения Лапласа имеют, как легко проверить, вид

$$(x + iy)^n, \quad (x - iy)^n.$$

Будем искать решение задачи в виде

$$v = (x + iy)^m \sum_{j=0}^{\left[\frac{n-m}{2}\right]} a_j \rho^{2j} z^{n-m-2j} = (x + iy)^m f(\rho^2, z)^{1)} \\ (m = 0, 1, 2, \dots, n), \quad (\text{XXIX.1})$$

где

$$\rho = \sqrt{x^2 + y^2}.$$

---

<sup>1)</sup> Суммирование ведется от  $j = 0$  до  $j = E\left(\frac{n-m}{2}\right)$ , где  $E\left(\frac{n-m}{2}\right)$  есть целая часть числа  $\frac{n-m}{2}$ .

Вычисляя оператор Лапласа от  $v$ , получим:

$$\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} = m(m-1)(x+iy)^{m-2} f(\rho^2, z) + 4mx(x+iy)^{m-1} \frac{\partial f(\rho^2, z)}{\partial(\rho^2)} + \\ + 2(x+iy)^m \frac{\partial f(\rho^2, z)}{\partial(\rho^2)} + 4x^2(x+iy)^m \frac{\partial^2 f(\rho^2, z)}{\partial(\rho^2)^2};$$

$$\frac{\partial^2 v}{\partial y^2} = -m(m-1)(x+iy)^{m-2} f(\rho^2, z) + 4miy(x+iy)^{m-1} \frac{\partial f(\rho^2, z)}{\partial(\rho^2)} + \\ + 2(x+iy)^m \frac{\partial f(\rho^2, z)}{\partial(\rho^2)} + 4y^2(x+iy)^m \frac{\partial^2 f(\rho^2, z)}{\partial(\rho^2)^2},$$

$$\frac{\partial^2 v}{\partial z^2} = (x+iy)^m \frac{\partial^2 f(\rho^2, z)}{\partial z^2},$$

откуда

$$\Delta v = (x+iy)^m \left[ \frac{\partial^2 f(\rho^2, z)}{\partial z^2} + 4(m+1) \frac{\partial f(\rho^2, z)}{\partial(\rho^2)} + 4\rho^2 \frac{\partial^2 f(\rho^2, z)}{\partial(\rho^2)^2} \right] = \\ = (x+iy)^m \left\{ \frac{\partial^2 f}{\partial z^2} + \frac{4}{(\rho^2)^m} \frac{\partial}{\partial(\rho^2)} \left[ \rho^{2(m+1)} \frac{\partial f}{\partial(\rho^2)} \right] \right\}.$$

Подставляя значение  $f(\rho^2, z)$ , получим:

$$\Delta v = (x+iy)^m \left[ \sum_{j=0}^{(n-m)/2} (n-m-2j)(n-m-2j-1) a_j \rho^{2j} z^{n-m-2j-2} + \right. \\ \left. + 4 \sum_{j=1}^{(n-m)/2} j(j+m) a_j \rho^{2j-2} z^{n-m-2j} \right].$$

Заменяя во второй сумме  $j$  на  $j+1$  и замечая, что последнее слагаемое в первой сумме обратится в 0, так как

$$(n-m-2j) \Big|_{j=\frac{n-m}{2}} = 0, \text{ если } \frac{n-m}{2} - \text{целое,}$$

и

$$(n-m-2j-1) \Big|_{j=\left[\frac{n-m}{2}\right]} = 0, \text{ если } \frac{n-m}{2} - \text{дробное,}$$

получим:

$$\Delta v = (x+iy)^m \left\{ \sum_{j=0}^{(n-m)/2-1} [(n-m-2j)(n-m-2j-1) a_j + \right. \\ \left. + 4(j+1)(j+m+1) a_{j+1}] \rho^{2j} z^{n-m-2j-2} \right\}.$$

Приравнивая нулю коэффициенты при  $\rho^{2j} z^{n-m-2j-2}$ , мы получим систему уравнений, из которой все  $a_j$  один за другим

выражаются через какой-нибудь один из них. Мы получим:

$$a_1 = (-1) \frac{(n-m)(n-m-1)}{4(m+1)} a_0,$$

$$a_2 = (-1)^2 \frac{(n-m)(n-m-1)(n-m-2)(n-m-3)}{4^2 \cdot 2(m+1)(m+2)} a_0, \dots,$$

$$a_{j+1} = (-1)^{j+1} \frac{(n-m)(n-m-1) \dots (n-m-2j-1)}{4^{j+1} (j+1)! (m+1)(m+2) \dots (m+j+1)} a_0.$$

Если  $a_0$  вещественно и положительно, то все  $a_{2j}$  будут положительны, а все  $a_{2j+1}$  отрицательны. Пусть для определенности

$$a_0 = \frac{(n+m)!}{2^m m! (n-m)!}.$$

Нами установлено, таким образом, существование одного и, с точностью до постоянного множителя, только одного гармонического полинома вида

$$v = (x + iy)^m f_{n,m}(\rho^2, z)$$

для каждого  $n$  и  $m = 0, 1, \dots, n$ .

Присоединяя к ним еще  $n$  полиномов вида

$$(x - iy)^m f_{n,m}(\rho^2, z) \quad (m = 1, \dots, n), \quad (\text{XXIX.2})$$

мы получим систему  $2n + 1$  гармонических полиномов.

Нетрудно убедиться в том, что эти полиномы линейно независимы. Принимая за новые независимые переменные  $\zeta_1 = x + iy$  и  $\zeta_2 = x - iy$ , мы получим в каждом из этих полиномов такой старший относительно  $\zeta_1$  или  $\zeta_2$  член, который не может встретиться ни в одной линейной комбинации многочленов с меньшими значениями индекса  $m$ .

Покажем, что других однородных гармонических многочленов степени  $n$ , независимых от данных, не существует.

Любой однородный многочлен  $R_n(x, y, z)$ , если ввести в него новые независимые переменные  $z, \zeta_1 = x + iy, \zeta_2 = x - iy$ , будет многочленом относительно  $z, \zeta_1$  и  $\zeta_2$ , а значит, может быть единственным образом представлен в виде:

$$R_n = \varphi_{n,0}(\zeta_1 \zeta_2, z) + \sum_{m=1}^n [\zeta_1^m \varphi_{n,m}^{(1)}(\zeta_1 \zeta_2, z) + \zeta_2^m \varphi_{n,m}^{(2)}(\zeta_1 \zeta_2, z)]. \quad (\text{XXIX.3})$$

Для этого нужно в полном выражении этого полинома сгруппировать вместе те члены вида  $\zeta_1^j \zeta_2^k z^i$ , где  $j - k = \pm m$ .

Отсюда следует, что любой однородный многочлен степени  $n$  единственным образом представляется в виде суммы многочленов по формуле (XXIX.3).

Применив к многочлену  $R_n$  оператор Лапласа, мы получим однородный многочлен степени  $(n-2)$ , также представляемый единственным образом в виде суммы многочленов по формуле (XXIX.3) с заменой  $n$  на  $(n-2)$ . Если  $R_n$  — гармонический полином, то все слагаемые в таком разложении  $\Delta R_n$  должны, следовательно, обратиться в нуль (из единственности следует, что других способов разложить его, кроме того, при котором все члены равны нулю, не существует). С другой стороны, применяя оператор Лапласа к формуле (XXIX.3) и замечая, что применение оператора Лапласа к многочлену вида (XXIX.1) и (XXIX.2) дает многочлен того же вида, но с соответственным уменьшением  $n$  на две единицы, мы видим, что оператор Лапласа от каждого слагаемого суммы (XXIX.3) порознь равен нулю и, значит,  $\varphi_{n,m}^{(k)} = c_k f_{n,m}$  ( $k=1, 2$ ), что и требовалось доказать.

Продолжая действовать по аналогии с плоским случаем, заменим координаты  $x, y, z$  полярными, полагая

$$x = r \sin \vartheta \cos \varphi, \quad y = r \sin \vartheta \sin \varphi, \quad z = r \cos \vartheta,$$

где

$$r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}.$$

При этом любой гармонический полином рассмотренного нами типа примет вид

$$r^n e^{\pm im\varphi} f_{n,m}(\sin^2 \vartheta, \cos \vartheta) \sin^m \vartheta. \quad (\text{XXIX.4})$$

Пусть

$$f_{n,m}(\sin^2 \vartheta, \cos \vartheta) = \psi_{n,m}(\cos \vartheta);$$

нетрудно видеть, что  $\psi_{n,m}(\cos \vartheta)$  есть многочлен от  $\cos \vartheta$ , степень которого в точности равна  $(n-m)$ .

Действительно, каждый член вида

$$a_j z^{n-m-2j} \rho^{2j}$$

заменяется многочленом вида

$$a_j (\cos \vartheta)^{n-m-2j} \sin^{2j} \vartheta = a_j (1 - \cos^2 \vartheta)^j (\cos \vartheta)^{n-m-2j},$$

в котором знак при членах, содержащих

$$(\cos \vartheta)^{n-m},$$

равен  $(-1)^j$ . В сумме таких многочленов ни одно слагаемое сократиться не может. При этом, очевидно,

$$\psi_{n,m}(1) = a_0 = \frac{(n+m)!}{m! 2^m (n-m)!}.$$

Полагая

$$\sin^m \vartheta \psi_{n,m}(\cos \vartheta) = P_n^{(m)}(\cos \vartheta), \quad (\text{XXIX.5})$$

мы можем, пользуясь выражением (XXIX.4), выписать полную систему однородных гармонических полиномов от  $x, y, z$  степени  $n$

в виде

$$\left. \begin{aligned} r^n P_n^{(0)}(\cos \vartheta), r^n \sin \varphi P_n^{(1)}(\cos \vartheta), r^n \sin 2\varphi P_n^{(2)}(\cos \vartheta), \dots \\ \dots, r^n \sin n\varphi P_n^{(n)}(\cos \vartheta); \\ r^n \cos \varphi P_n^{(1)}(\cos \vartheta), r^n \cos 2\varphi P_n^{(2)}(\cos \vartheta), \dots \\ \dots, r^n \cos n\varphi P_n^{(n)}(\cos \vartheta). \end{aligned} \right\} \quad (\text{XXIX.6})$$

Функции (XXIX.6) служат пространственным аналогом функций

$$\rho^n \cos n\varphi, \rho^n \sin n\varphi,$$

являющихся решениями плоской задачи о гармонических полиномах, а функции

$$\left. \begin{aligned} \sin m\varphi P_n^{(m)}(\cos \vartheta), \\ \cos m\varphi P_n^{(m)}(\cos \vartheta) \end{aligned} \right\} \quad (\text{XXIX.7})$$

— аналогом тригонометрических функций кратного аргумента, т. е.  $\cos n\varphi$  и  $\sin n\varphi$ . Эти функции или их линейные комбинации принято называть *сферическими гармониками порядка  $n$* .

## § 2. Приближение при помощи сферических функций

**Т е о р е м а 1.** *Линейной комбинацией функций (XXIX.7) порядков  $0, 1, \dots, N$  можно с любой точностью, в смысле равномерной сходимости, представить произвольную непрерывную функцию на сфере радиуса 1, если  $N$  достаточно велико.*

Для того чтобы доказать эту теорему, установим сначала несколько вспомогательных предложений.

**Л е м м а 1.** *Произвольная функция  $F(\vartheta, \varphi)$  на поверхности сферы радиуса 1, непрерывная на ней, может быть представлена со сколь угодно большой точностью в виде многочлена:*

$$Q(x, y, z) = \sum_{k=1}^N \sum_{l=1}^N \sum_{m=1}^N a_{klm} x^k y^l z^m.$$

**Д о к а з а т е л ь с т в о.** Составим выражение:

$$Q_N = \frac{N+1}{4\pi} \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \left( \frac{1+\cos \gamma}{2} \right)^N F(\vartheta_1, \varphi_1) \sin \vartheta_1 d\vartheta_1 d\varphi_1,$$

где  $\cos \gamma$  обозначает косинус угла между вектором

$$x = \sin \vartheta \cos \varphi, y = \sin \vartheta \sin \varphi, z = \cos \vartheta$$

и вектором

$$x_1 = \sin \vartheta_1 \cos \varphi_1, y_1 = \sin \vartheta_1 \sin \varphi_1, z_1 = \cos \vartheta_1.$$

Имеем:

$$\cos \gamma = xx_1 + yy_1 + zz_1.$$

Легко установить, что  $Q_N$  есть многочлен степени  $N$  от  $x, y, z$ . Докажем, с другой стороны, что

$$Q_N - F = \varepsilon(N)$$

равномерно стремится к нулю при  $N$ , стремящемся к бесконечности.

Рассмотрим интеграл

$$\begin{aligned} \frac{N+1}{4\pi} \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \left( \frac{1+\cos \gamma}{2} \right)^N F(\vartheta, \varphi) \sin \vartheta_1 d\vartheta_1 d\varphi_1 = \\ = \frac{N+1}{4\pi} F(\vartheta, \varphi) \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \left( \frac{1+\cos \gamma}{2} \right)^N \sin \vartheta_1 d\vartheta_1 d\varphi_1. \end{aligned}$$

Пусть  $S$  — поверхность шара радиуса 1. Величина

$$\frac{N+1}{4\pi} \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \left( \frac{1+\cos \gamma}{2} \right)^N \sin \vartheta_1 d\vartheta_1 d\varphi_1 = \frac{N+1}{4\pi} \int_S \left( \frac{1+\cos \gamma}{2} \right)^N dS$$

не зависит от точки  $(\vartheta, \varphi)$ . Следовательно, вычисляя ее, можно положить  $\varphi = 0, \vartheta = 0$ . При этом  $\cos \gamma = \cos \vartheta_1$ , и интеграл запишется так:

$$\begin{aligned} \frac{N+1}{4\pi} \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \left( \frac{1+\cos \vartheta_1}{2} \right)^N \sin \vartheta_1 d\vartheta_1 d\varphi_1 = \\ = -\frac{N+1}{4\pi} 4\pi \int_0^\pi \left( \frac{1+\cos \vartheta_1}{2} \right)^N d \left( \frac{1+\cos \vartheta_1}{2} \right) = - \left( \frac{1+\cos \vartheta_1}{2} \right)^{N+1} \Big|_0^\pi = 1. \end{aligned}$$

Значит,

$$\frac{N+1}{4\pi} \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \left( \frac{1+\cos \gamma}{2} \right)^N F(\vartheta, \varphi) \sin \vartheta_1 d\vartheta_1 d\varphi_1 = F(\vartheta, \varphi).$$

Далее,

$$\begin{aligned} Q_N - F(\vartheta, \varphi) = \\ = \frac{N+1}{4\pi} \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \left( \frac{1+\cos \gamma}{2} \right)^N [F(\vartheta_1, \varphi_1) - F(\vartheta, \varphi)] \sin \vartheta_1 d\vartheta_1 d\varphi_1. \end{aligned}$$

Разобьем последний интеграл на два слагаемых, выделив вокруг точки  $(\vartheta, \varphi)$  область на сфере  $\gamma < \delta$ , так, чтобы иметь

$$|F(\vartheta, \varphi) - F(\vartheta_1, \varphi_1)| < \frac{\varepsilon}{2}$$

для точек  $(\vartheta_1, \varphi_1)$ , принадлежащих области  $\gamma < \delta$ .

Функция  $F(\vartheta, \varphi)$ , в силу своей непрерывности, ограничена, значит,

$$|F(\vartheta, \varphi)| \leq M.$$

Возьмем теперь  $N$  настолько большим, чтобы удовлетворить неравенству

$$(N+1) \left( \frac{1+\cos \delta}{2} \right)^N < \frac{\varepsilon}{4M},$$

При этом, очевидно,

$$(N+1) \left( \frac{1+\cos \gamma}{2} \right)^N < \frac{\varepsilon}{4M} \text{ для } \gamma \geq \delta.$$

Для таких  $N$

$$\begin{aligned} |Q_N - F| &\leq \\ &\leq \frac{N+1}{4\pi} \int \int_{\gamma \geq \delta} \left( \frac{1+\cos \gamma}{2} \right)^N |F(\vartheta, \varphi) - F(\vartheta_1, \varphi_1)| \sin \vartheta_1 d\vartheta_1 d\varphi_1 + \\ &+ \frac{N+1}{4\pi} \int \int_{\gamma < \delta} \left( \frac{1+\cos \gamma}{2} \right)^N |F(\vartheta, \varphi) - F(\vartheta_1, \varphi_1)| \sin \vartheta_1 d\vartheta_1 d\varphi_1 \leq \\ &\leq \frac{N+1}{4\pi} 2M \int \int_{\gamma \geq \delta} \left( \frac{1+\cos \gamma}{2} \right)^N dS + \frac{\varepsilon}{2} \frac{N+1}{4\pi} \int \int_{\gamma < \delta} \left( \frac{1+\cos \gamma}{2} \right)^N dS \leq \\ &\leq \frac{\varepsilon}{4M} \cdot 2M + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon. \end{aligned}$$

Наша лемма доказана.

**Л е м м а 2.** Пусть  $Q_k(x, y, z)$  — совершенно произвольный многочлен от переменных  $x, y, z$  степени  $k$ . Тогда существует гармонический полином  $P_k(x, y, z)$  степени не выше  $k$ , принимающий на сфере  $x^2 + y^2 + z^2 = 1$  те же значения, что и  $Q_k(x, y, z)$ .

**Д о к а з а т е л ь с т в о.** По доказанному выше многочлен  $Q_k(x, y, z)$  может быть представлен в виде

$$Q_k = g_0(\rho^2, z) + \sum_{m=1}^k [(x+iy)^m g_{1,m}(\rho^2, z) + (x-iy)^m g_{2,m}(\rho^2, z)]$$

[см. (XXIX.3)].

Значит, на сфере  $x^2 + y^2 + z^2 = 1$  будем иметь:

$$\begin{aligned} Q_k &= \tau_0(\cos \vartheta) + \\ &+ \sum_{m=1}^k \sin^m \vartheta [\cos m\varphi \tau_{1,m}(\cos \vartheta) + \sin m\varphi \tau_{2,m}(\cos \vartheta)], \quad (\text{XXIX.8}) \end{aligned}$$

где  $\tau_0(\cos \vartheta)$  — многочлен степени не выше  $k$  от  $\cos \vartheta$ , а многочлены  $\tau_{1,m}$  и  $\tau_{2,m}$  суть многочлены степени не выше  $k-m$  от  $\cos \vartheta$ .

Но величина  $\tau_0(\cos \vartheta)$  может, очевидно, быть представлена в виде

$$\tau_0(\cos \vartheta) = \sum_{j=0}^k c_j P_j^{(0)}(\cos \vartheta), \quad (\text{XXIX.9})$$

а каждая из величин  $\sin^m \vartheta \tau_{1,m}$  и  $\sin^m \vartheta \tau_{2,m}$  может быть представлена в виде

$$\left. \begin{aligned} \sin^m \vartheta \tau_{1,m}(\cos \vartheta) &= \sum_{n=m}^k c_{n,m}^{(1)} P_n^{(m)}(\cos \vartheta), \\ \sin^m \vartheta \tau_{2,m}(\cos \vartheta) &= \sum_{n=m}^k c_{n,m}^{(2)} P_n^{(m)}(\cos \vartheta). \end{aligned} \right\} \quad (\text{XXIX.10})$$

Коэффициенты этих разложений могут быть найдены один за другим, начиная со старшего, ибо степень каждого  $P_n^{(m)}(\xi)$  возрастает на единицу вместе с номером  $n$ .

Подставляя (XXIX.9) и (XXIX.10) в (XXIX.8), мы сразу доказываем нашу лемму. Из лемм 1 и 2 немедленно следует теорема 1. В самом деле, произвольная непрерывная функция с любой точностью может быть на сфере заменена многочленом по лемме 1. По лемме 2 этот многочлен заменяется сразу гармоническим полиномом.

### § 3. Задача Дирихле для шара

Доказанная теорема дает нам новый способ решения задачи Дирихле для шара. Мы знаем из предыдущих лекций, что эта задача всегда имеет непрерывное решение и что если мы заменим предельные значения функции

$$u|_S = \varphi$$

приближенными  $\varphi'$ , так что

$$|\varphi - \varphi'| < \varepsilon,$$

то решение уравнения

$$\Delta u = 0$$

при условии

$$u|_S = \varphi'$$

отличается не больше, чем на  $\varepsilon$ , от решения этого же уравнения при условии  $u|_S = \varphi$ .

Взяв за  $\varphi'$  линейную комбинацию сферических функций, мы сразу найдем решение задачи в виде суммы соответствующих многочленов. Это и будет приближенным решением задачи Дирихле. В конце лекции мы дадим явное выражение точного решения через сферические функции.

## § 4. Дифференциальные уравнения для сферических функций

Пусть  $Y_n(\vartheta, \varphi)$  — какая-то сферическая гармоника порядка  $n$ . Произведение

$$r^n Y_n(\vartheta, \varphi)$$

есть гармонический полином. Следовательно,

$$\Delta r^n Y_n(\vartheta, \varphi) = 0.$$

Пользуясь выражением для оператора Лапласа в полярных координатах [см. (XXVIII.7)], получим:

$$\frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left[ r^2 \frac{\partial}{\partial r} (r^n Y_n(\vartheta, \varphi)) \right] + \frac{1}{r^2 \sin \vartheta} \frac{\partial}{\partial \vartheta} \left[ \sin \vartheta \frac{\partial}{\partial \vartheta} (r^n Y_n(\vartheta, \varphi)) \right] + \frac{1}{r^2 \sin^2 \vartheta} \frac{\partial^2}{\partial \varphi^2} [r^n Y_n(\vartheta, \varphi)] = 0,$$

откуда

$$\frac{1}{\sin \vartheta} \frac{\partial}{\partial \vartheta} \left[ \sin \vartheta \frac{\partial Y_n}{\partial \vartheta} \right] + \frac{1}{\sin^2 \vartheta} \frac{\partial^2 Y_n}{\partial \varphi^2} + n(n+1) Y_n = 0. \quad (\text{XXIX.11})$$

Уравнение (XXIX.11) получается из уравнения

$$\frac{1}{\sin \vartheta} \frac{\partial}{\partial \vartheta} \left( \sin \vartheta \frac{\partial Y}{\partial \vartheta} \right) + \frac{1}{\sin^2 \vartheta} \frac{\partial^2 Y}{\partial \varphi^2} + \lambda Y = 0 \quad (\text{XXIX.12})$$

при

$$\lambda = n(n+1). \quad (\text{XXIX.13})$$

Обозначим оператор

$$\frac{1}{\sin \vartheta} \frac{\partial}{\partial \vartheta} \sin \vartheta \frac{\partial}{\partial \vartheta} + \frac{1}{\sin^2 \vartheta} \frac{\partial^2}{\partial \varphi^2},$$

действующий на функцию  $\chi(\vartheta, \varphi)$ , определенную на поверхности единичной сферы, через  $D$ . Уравнение (XXIX.12) запишется при этом в виде

$$DY + \lambda Y = 0. \quad (\text{XXIX.14})$$

Оператор  $D$  на первый взгляд зависит от того, как выбран полюс сферы. Однако на самом деле он остается неизменным при всевозможном выборе координат  $\vartheta$  и  $\varphi$  на этой сфере. Действительно, пусть функция  $\chi(\vartheta, \varphi)$  задана как-нибудь на сфере. Будем считать ее заданной во всем пространстве  $r, \vartheta, \varphi$  и не зависящей от  $r$ . Тогда

$$D(\chi(\vartheta, \varphi)) = r^2 \Delta \chi.$$

Оператор Лапласа, стоящий в правой части, не зависит от выбора координатных осей, значит, и оператор  $D$  не будет зависеть от этого выбора, что и требовалось доказать.

Длина дуги некоторой линии на сфере  $ds$  выражается с помощью соотношения

$$ds^2 = d\vartheta^2 + \sin^2 \vartheta d\varphi^2,$$

или

$$ds^2 = h_1^2 d\vartheta^2 + h_2^2 d\varphi^2, \quad \text{где } h_1 = 1, \quad h_2 = \sin \vartheta.$$

Оператор  $D$  выражается через  $h_1$  и  $h_2$  формулой

$$D\chi = \frac{1}{h_1 h_2} \frac{\partial}{\partial \vartheta} \frac{h_2}{h_1} \frac{\partial \chi}{\partial \vartheta} + \frac{1}{h_1 h_2} \frac{\partial}{\partial \varphi} \frac{h_1}{h_2} \frac{\partial \chi}{\partial \varphi}$$

по аналогии с формулой (XXVIII.6), выражающей оператор Лапласа в криволинейных координатах. Выражение  $D\chi$  называют поэтому *оператором Лапласа на поверхности сферы*.

Уравнение (XXIX.12) может иметь нетривиальное решение, непрерывное на всей поверхности сферы, не при всяком значении  $\lambda$ . Задача об отыскании таких значений  $\lambda$  и самих этих решений аналогична задаче об отыскании решений уравнения

$$y'' + \lambda y = 0,$$

непрерывных на окружности. Эта последняя задача была рассмотрена нами в лекции XX. Поставленная нами сейчас задача может быть приведена к теории интегральных уравнений при помощи функции Грина. Остановимся подробнее на этом вопросе. Будем искать решение уравнения

$$Dv = \psi(\vartheta, \varphi) \quad (\text{XXIX.15})$$

на сфере. Заметим, что соответствующее однородное уравнение

$$Du = 0 \quad (\text{XXIX.16})$$

имеет нетривиальное решение  $u \equiv 1$ . Поэтому задача об отыскании решения (XXIX.15) разрешима не всегда.

Назовем функцией Грина для уравнения (XXIX.15) функцию двух переменных точек сферы:

$$G = \frac{1}{2\pi} \ln \sin \frac{\gamma}{2},$$

где через  $\gamma$  обозначено угловое расстояние между рассматриваемыми точками. Из сферической тригонометрии известно выражение для  $\cos \gamma$ :

$$\cos \gamma = \cos \vartheta_1 \cos \vartheta_2 - \sin \vartheta_1 \sin \vartheta_2 \cos(\varphi_1 - \varphi_2),$$

где  $\vartheta_1, \varphi_1$  — координаты одной из точек, а  $\vartheta_2, \varphi_2$  — координаты другой точки. Докажем, что если функция  $\psi$  удовлетворяет условию

$$\iint_S \psi dS = \int_0^{\pi} \int_0^{2\pi} \psi \sin \vartheta d\varphi d\vartheta = 0, \quad (\text{XXIX.17})$$

то решение уравнения (XXIX.15), удовлетворяющее тому же условию

$$\int_0^\pi \int_0^{2\pi} v \sin \vartheta \, d\varphi \, d\vartheta = 0, \quad (\text{XXIX.17'})$$

дается формулой

$$v(\vartheta_0, \varphi_0) = \int_0^\pi \int_0^{2\pi} G(\vartheta, \varphi, \vartheta_0, \varphi_0) \psi(\vartheta, \varphi) \sin \vartheta \, d\varphi \, d\vartheta = \iint_S G \psi \, dS, \quad (\text{XXIX.18})$$

где через  $dS$  обозначен элемент поверхности сферы. Этим будет оправдано данное нами функции  $G$  название.

Пусть решение уравнения (XXIX.15) существует. Выберем за точку  $\vartheta_0, \varphi_0$  полюс сферы. Мы будем иметь:

$$\begin{aligned} \iint_S G \psi \, dS &= \int_0^\pi \int_0^{2\pi} G Dv \sin \vartheta \, d\varphi \, d\vartheta = \int_0^\pi \left( \int_0^{2\pi} G Dv \, d\varphi \right) \sin \vartheta \, d\vartheta = \\ &= \int_0^\pi \ln \sin \frac{\vartheta}{2} \left\{ \frac{\partial}{\partial \vartheta} \sin \vartheta \frac{\partial}{\partial \vartheta} \left[ \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} v \, d\varphi \right] + \frac{1}{\sin \vartheta} \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{\partial^2 v}{\partial \varphi^2} \, d\varphi \right\} d\vartheta = \\ &= - \int_0^\pi \sin \vartheta \frac{\partial}{\partial \vartheta} \left[ \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} v \, d\varphi \right] \frac{1}{2} \frac{\cos \frac{\vartheta}{2}}{\sin \frac{\vartheta}{2}} d\vartheta + \\ &\quad + \left[ \sin \vartheta \frac{\partial}{\partial \vartheta} \left( \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} v \, d\varphi \right) \lg \sin \frac{\vartheta}{2} \right]_0^\pi = \\ &= - \frac{1}{2} \int_0^\pi \sin \vartheta \left[ \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} v \, d\varphi \right] d\vartheta - \left( \cos^2 \frac{\vartheta}{2} \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} v \, d\varphi \right) \Big|_0^\pi. \end{aligned}$$

В силу условия (XXIX.17) получим:

$$\iint_S G \psi \, dS = v|_{\vartheta=0}. \quad (\text{XXIX.19})$$

Из соображений симметрии отсюда следует справедливость формулы (XXIX.18) для любой точки сферы. Можно доказать также, что если  $\psi$  — произвольная функция, удовлетворяющая условию (XXIX.17), то функция  $v(\vartheta_0, \varphi_0)$ , определяемая равенством (XXIX.18), дает нам решение уравнения

$$Dv = \psi,$$

Доказательство этого предложения аналогично тому, которое мы проводили неоднократно, и мы его опускаем. Функция Грина, построенная нами, является симметрической функцией, и поэтому к уравнению

$$u = \lambda \int_S Gu \, dS,$$

эквивалентному (XXIX.14), применима вся теория интегральных уравнений с симметрическим ядром.

Если мы поставим себе задачу — найти все регулярные решения уравнения (XXIX.12) на сфере, то из сказанного вытекает, что значения (XXIX.13) будут собственными значениями.

Каждое собственное значение имеет  $(2n + 1)$  собственных функций. Мы получили выше, в формуле (XXIX.7), набор решений уравнения (XXIX.12). Из общей теории интегральных уравнений вытекает, что те из функций (XXIX.7), которые отвечают различным значениям  $n$ , ортогональны. Решения (XXIX.7) с одинаковыми значениями  $n$  ортогональны в силу того, что в промежутке  $0 \leq \varphi \leq 2\pi$  ортогональны все синусы и косинусы кратных дуг. Отсюда следует ортогональность всех функций (XXIX.7).

**Т е о р е м а 2.** *Функции (XXIX.7) исчерпывают все множество собственных функций уравнения (XXIX.12).*

**Доказательство.** Пусть  $Y^*(\vartheta, \varphi)$  есть какая-то собственная функция (XXIX.12), отличная от (XXIX.7), и пусть  $u_i(\vartheta, \varphi)$  есть множество функций (XXIX.7), каким-то образом перенумерованное. По теореме 1 функция  $Y^*(\vartheta, \varphi)$  может быть представлена в виде

$$Y^*(\vartheta, \varphi) = \sum_{i=1}^N c_i^{(N)} u_i(\vartheta, \varphi) + \eta_N,$$

где  $\eta_N$  сколь угодно мало.

Значит,

$$\iint_S [Y^*(\vartheta, \varphi) - \sum_{i=1}^N c_i^{(N)} u_i(\vartheta, \varphi)]^2 dS = \iint_S \eta_N^2 dS < \varepsilon(N).$$

Пусть

$$y_i = \iint_S Y^*(\vartheta, \varphi) u_i(\vartheta, \varphi) dS.$$

Тогда

$$\begin{aligned} \iint_S \left( Y^*(\vartheta, \varphi) - \sum_{i=1}^N y_i u_i(\vartheta, \varphi) \right)^2 dS &\leq \\ &\leq \iint_S \left( Y^*(\vartheta, \varphi) - \sum_{i=1}^N c_i^{(N)} u_i(\vartheta, \varphi) \right)^2 dS \end{aligned}$$

Принимая во внимание ортогональность  $Y^*(\vartheta, \varphi)$  со всеми  $u_i(\vartheta, \varphi)$ , которая следует из общей теории интегральных уравнений, и вытекающее из этого равенство

$$y_i = 0,$$

получим:

$$\iint_S [Y^*(\vartheta, \varphi)]^2 dS < \varepsilon$$

при произвольном  $\varepsilon > 0$ . Значит,  $Y^*(\vartheta, \varphi) = 0$ , что и требовалось доказать.

Из теоремы 2 сразу следует возможность представления любой функции  $\varphi(S)$  с интегрируемым квадратом по сфере, т. е. всякой функции, удовлетворяющей условию

$$\iint_S \varphi^2(S) dS < \infty,$$

в виде сходящегося в среднем ряда

$$\sum_{i=1}^{\infty} \varphi_i u_i,$$

где

$$\varphi_i = \iint_S \varphi u_i dS.$$

Сходимость ряда будет равномерной, в силу теоремы Гильберта—Шмидта, если  $\varphi$  имеет непрерывные вторые производные.

Подставим в уравнение (XXIX.12) функцию (XXIX.7). Пользуясь тем, что

$$\frac{\partial^2}{\partial \varphi^2} [\sin m\varphi P_n^{(m)}(\cos \vartheta)] = -m^2 \sin m\varphi P_n^{(m)}(\cos \vartheta),$$

мы будем иметь:

$$\begin{aligned} \frac{1}{\sin \vartheta} \frac{\partial}{\partial \vartheta} \left[ \sin \vartheta \frac{\partial P_n^{(m)}(\cos \vartheta)}{\partial \vartheta} \right] + \\ + \left[ n(n+1) - \frac{m^2}{\sin^2 \vartheta} \right] P_n^{(m)}(\cos \vartheta) = 0. \quad (\text{XXIX.20}) \end{aligned}$$

Уравнение (XXIX.20) есть дифференциальное уравнение для функций  $P_n^{(m)}(\cos \vartheta)$ . Обозначим:

$$\cos \vartheta = \mu.$$

Тогда

$$\frac{\partial}{\partial \vartheta} = -\sin \vartheta \frac{\partial}{\partial \mu},$$

и уравнение (XXIX.20) переписывается так:

$$\frac{d}{d\mu} \left[ \sin^2 \vartheta \frac{dP_n^{(m)}(\mu)}{d\mu} \right] + \left[ n(n+1) - \frac{m^2}{\sin^2 \vartheta} \right] P_n^{(m)}(\mu) = 0,$$

или

$$\frac{d}{d\mu} \left[ (1 - \mu^2) \frac{dP_n^{(m)}(\mu)}{d\mu} \right] + \left[ n(n+1) - \frac{m^2}{1 - \mu^2} \right] P_n^{(m)}(\mu) = 0. \quad (\text{XXIX.21})$$

Полученное дифференциальное уравнение есть линейное уравнение 2-го порядка. Оно получается из уравнения

$$\frac{d}{d\mu} \left[ (1 - \mu^2) \frac{dy}{d\mu} \right] + \left[ \lambda_1 - \frac{\lambda_2}{1 - \mu^2} \right] y = 0$$

при  $\lambda_1 = n(n+1)$  и  $\lambda_2 = m^2$ .

Если мы поставим задачу найти такие  $\lambda_1$  и  $\lambda_2$ , при которых решение этого последнего уравнения ограничено, то можно утверждать, что при  $\lambda_2 = m^2$  никаких других собственных значений, кроме  $\lambda_1 = n(n+1)$ , оно не будет допускать. Это вытекает из того, что мы имели бы в противном случае собственную функцию  $y^*$  уравнения (XXIX.21) и соответственную собственную функцию для (XXIX.12) в виде  $P^*(\cos \vartheta) \sin m\varphi$ , отличную от всех функций (XXIX.7), что, по доказанному, невозможно.

Полученные нами соотношения позволяют поставить вопрос о решении уравнения Лапласа для шара по методу разделения переменных. Более того, мы фактически уже провели этот метод, исходя из других предположений.

Разделяя переменные в уравнении Лапласа

$$\Delta u = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left( r^2 \frac{\partial u}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \vartheta} \frac{\partial}{\partial \vartheta} \left( \sin \vartheta \frac{\partial u}{\partial \vartheta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \vartheta} \frac{\partial^2 u}{\partial \varphi^2} = 0,$$

получим после простых выкладок, которые мы предоставляем читателю:

$$u = \sum_{\substack{n, m \\ m \leq n}} r^n P_n^{(m)}(\cos \vartheta) [a_n^{(m)} \cos m\varphi + b_n^{(m)} \sin m\varphi],$$

где  $\cos m\varphi$  и  $\sin m\varphi$  суть решения уравнения  $\frac{d^2 \Phi}{d\varphi^2} + m^2 \Phi = 0$ ,  $P_n^{(m)}$  — решение уравнения (XXIX.20) или (XXIX.21), а  $r^n$  — решение уравнения  $\frac{d}{dr} \left( r^2 \frac{dR}{dr} \right) - n(n+1)R = 0$ .

---

# ЛЕКЦИЯ XXX

## НЕКОТОРЫЕ ПРОСТЕЙШИЕ СВОЙСТВА СФЕРИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ

### § 1. Представление полиномов Лежандра

Разберем некоторые свойства сферических функций.

**Т е о р е м а 1.** *Решением уравнения*

$$\frac{d}{d\mu} \left[ (1 - \mu^2) \frac{dy}{d\mu} \right] + \left( n(n+1) - \frac{m^2}{1 - \mu^2} \right) y = 0$$

*служит функция*

$$P_n^{(m)}(\mu) = \frac{(-1)^n}{2^n n!} (1 - \mu^2)^{\frac{m}{2}} \frac{d^{n+m}(1 - \mu^2)^n}{d\mu^{n+m}}. \quad (\text{XXX.1})$$

**Д о к а з а т е л ь с т в о.** Пусть  $(1 - \mu^2)^n = \Phi$ . Непосредственно легко проверить формулу

$$(1 - \mu^2) \frac{d^2 \Phi}{d\mu^2} + 2(n-1)\mu \frac{d\Phi}{d\mu} + 2n\Phi = 0.$$

Дифференцируя ее  $m + n$  раз по  $\mu$  с помощью известного правила Лейбница, получим:

$$\begin{aligned} (1 - \mu^2) \frac{d^{m+n+2}\Phi}{d\mu^{m+n+2}} - 2(m+1)\mu \frac{d^{m+n+1}\Phi}{d\mu^{m+n+1}} + \\ + (n-m)(n+m+1) \frac{d^{n+m}\Phi}{d\mu^{n+m}} = 0, \end{aligned}$$

или, полагая  $\frac{d^{m+n}\Phi}{d\mu^{m+n}} = \psi$ ,

$$(1 - \mu^2) \psi'' - 2(m+1)\mu \psi' + (n-m)(n+m+1) \psi = 0,$$

Далее, пусть

$$P_n^{(m)}(\mu) = C (1 - \mu^2)^{\frac{m}{2}} \psi,$$

откуда прямой подстановкой получаем:

$$(1 - \mu^2) \frac{d^2 P_n^{(m)}}{d\mu^2} - 2\mu \frac{dP_n^{(m)}}{d\mu} + \left[ n(n+1) - \frac{m^2}{1-\mu^2} \right] P_n^{(m)} = \\ = C(1 - \mu^2)^{\frac{m}{2}} [(1 - \mu^2)\psi'' - 2(m+1)\mu\psi' + (n-m)(n+m+1)\psi] = 0,$$

что и требовалось доказать.

Формула (XXX.1) дает нам, очевидно, новое явное выражение для  $P_n^{(m)}(\cos \vartheta)$ , ибо  $r^n \sin m\varphi P_n^{(m)}$  есть гармонический полином, а двух полиномов такого вида быть не может.

Из этой формулы можно получить ряд удобных рекуррентных формул для вычисления функций  $P_n^{(m)}(\cos \vartheta)$ .

Многочлены

$$P_n^{(0)}(\mu) = P_n(\mu) = \frac{(-1)^n}{2^n n!} \frac{d^n (1 - \mu^2)^n}{d\mu^n}$$

носят особое название *полиномов Лежандра*. Среди других сферических функций они играют особую роль.

Строго говоря, мы не имеем пока права обозначать через  $P_n^{(m)}(\mu)$  функцию (XXX.1), которая может отличаться от введенной нами ранее функции  $P_n^{(m)}(\mu)$  постоянным множителем. Однако легко установить, что множитель этот есть единица. Из формулы (XXX.1) следует, что

$$P_n(1) = 1. \quad (\text{XXX.2})$$

В самом деле, положим  $\mu - 1 = z$ ; тогда

$$(1 - \mu^2)^n = (-1)^n z^n (2 + z)^n = (-1)^n (2^n z^n + \dots),$$

откуда сразу и вытекает (XXX.2).

Если

$$\frac{P_n^{(m)}(\cos \vartheta)}{\sin^m \vartheta} = \psi_{n,m},$$

то аналогично

$$\psi_{n,m}(1) = \frac{(n+m)!}{2^m m! (n-m)!},$$

что и доказывает наше утверждение.

## § 2. Производящая функция

**Т е о р е м а 2.** *Разложение функции*

$$\frac{1}{r_1} = \frac{1}{\sqrt{1 - 2r \cos \vartheta + r^2}}$$

по степеням  $r$  имеет вид

$$\frac{1}{r_1} = \sum_{n=0}^{\infty} r^n P_n(\cos \vartheta). \quad (\text{XXX.3})$$

Функция  $\frac{1}{r_1}$  называется поэтому *производящей функцией* полиномов Лежандра.

Эту теорему можно было бы доказать непосредственно, подсчитывая коэффициенты разложения, но можно установить ее и другим путем.

Рассматривая функцию  $\frac{1}{r_1}$  в некоторой сфере  $r \leq \rho \leq 1$ , мы можем разложить ее в ряд по степеням  $r$ , причем коэффициенты, очевидно, будут многочленами от  $\cos \vartheta$ , т. е.

$$\frac{1}{r_1} = \sum_{n=0}^{\infty} r^n Q_n(\cos \vartheta).$$

В самом деле,

$$1 - 2r \cos \vartheta + r^2 = (1 - re^{i\vartheta})(1 - re^{-i\vartheta}), \quad (\text{XXX.4})$$

откуда сразу следует, что наше разложение будет иметь радиус сходимости, равный единице. Значит, при  $r = \rho$

$$\frac{1}{r_1} = \sum_{n=0}^{\infty} \rho^n Q_n(\cos \vartheta). \quad (\text{XXX.5})$$

По доказанному в прошлой лекции, гармоническую функцию, принимающую на поверхности  $r = \rho$  заданные значения (XXX.5), можно разложить в равномерно сходящийся ряд:

$$\frac{1}{r_1} = \sum_{n=0}^{\infty} a_n r^n P_n(\cos \vartheta).$$

Из единственности разложения производящей функции в степенной ряд по  $r$  вытекает, что

$$Q_n(\cos \vartheta) = a_n P_n(\cos \vartheta).$$

Для того чтобы определить величину  $a_n$ , заметим, что при  $\cos \vartheta = 1$  имеем:

$$(1 - 2r \cos \vartheta + r^2)_{\vartheta=0} = (1 - r)^2$$

и

$$\frac{1}{r_1} = \frac{1}{1-r} = \sum_{n=0}^{\infty} r^n.$$

Сравнивая это с выражением  $\frac{1}{r_1} = \sum_{n=0}^{\infty} r^n a_n P_n(1)$ , имеем:

$$a_n = 1.$$

Теорема 2 доказана.

С л е д с т в и е 1. *Имеют место равенства*

$$\frac{1}{\sqrt{R^2 - 2Rr \cos \vartheta + r^2}} = \begin{cases} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{r^n}{R^{n+1}} P_n(\cos \vartheta), & r < R; \\ \sum_{n=0}^{\infty} \frac{R^n}{r^{n+1}} P_n(\cos \vartheta), & r > R. \end{cases} \quad (\text{XXX.6})$$

В самом деле,

$$\begin{aligned} \frac{1}{\sqrt{R^2 - 2Rr \cos \vartheta + r^2}} &= \frac{1}{R} \frac{1}{\sqrt{1 - 2 \frac{r}{R} \cos \vartheta + \left(\frac{r}{R}\right)^2}} = \\ &= \frac{1}{r} \frac{1}{\sqrt{1 - 2 \frac{R}{r} \cos \vartheta + \left(\frac{R}{r}\right)^2}}, \end{aligned}$$

откуда и следует (XXX.6).

С л е д с т в и е 2. *Справедливо соотношение*

$$\frac{\partial}{\partial \rho} \frac{1}{\sqrt{\rho^2 - 2\rho r \cos \vartheta + r^2}} = - \sum_{n=0}^{\infty} (n+1) \frac{r^n}{\rho^{n+2}} P_n(\cos \vartheta); \quad r < \rho. \quad (\text{XXX.7})$$

Заметим еще, что сходимость рядов (XXX.6) и (XXX.7) будет равномерной относительно переменного  $\vartheta$ , если соответственно  $R - r > \varepsilon$ ,  $r - R > \varepsilon$  или  $\rho - r > \varepsilon$ , при фиксированном  $R$ .

Для того чтобы доказать это утверждение, рассмотрим ряд с положительными членами

$$\frac{1}{\sqrt{1-r}} = 1 + \frac{1}{2}r + \frac{1}{4}r^2 + \dots \quad (\text{XXX.8})$$

Все члены этого ряда по абсолютной величине равны соответствующим членам рядов

$$\frac{1}{\sqrt{1-re^{i\vartheta}}} = \sum_{n=0}^{\infty} a_n r^n, \quad \frac{1}{\sqrt{1-re^{-i\vartheta}}} = \sum_{n=0}^{\infty} \bar{a}_n r^n. \quad (\text{XXX.9})$$

Следовательно, члены ряда

$$\frac{1}{1-r} = \frac{1}{\sqrt{1-r}} \cdot \frac{1}{\sqrt{1-r}} = 1 + r + r^2 + \dots,$$

который можно получить почленным умножением ряда (XXX.8) на самого себя, по абсолютной величине будут не меньше соответствующих членов ряда

$$\frac{1}{\sqrt{1-2r \cos \vartheta + r^2}} = \frac{1}{\sqrt{1-re^{i\vartheta}}} \frac{1}{\sqrt{1-re^{-i\vartheta}}} = \sum_{n=0}^{\infty} r^n P_n(\cos \vartheta),$$

получаемого почленным умножением рядов (XXX.9) друг на друга.

Таким образом, мы получаем неравенство

$$P_n(\cos \vartheta) \leq 1,$$

причем знак равенства может иметь место лишь при  $\vartheta = 0$ , т. е. при  $\cos \vartheta = 1$ , как легко видеть из доказательства. Отсюда и вытекает наше утверждение о равномерной сходимости.

### § 3. Формула Лапласа

Пусть теперь  $r^n Y_n(\vartheta, \varphi)$  — некоторый гармонический полином. Применяя к нему формулу Грина, получаем:

$$r^n Y_n(\vartheta, \varphi) = \frac{1}{4\pi} \int \int_{\rho=1} \left\{ \frac{\partial}{\partial n} \frac{1}{r_1} \rho^n Y_n(\vartheta_1, \varphi_1) - \frac{1}{r_1} \frac{\partial}{\partial n} (\rho^n Y_n(\vartheta_1, \varphi_1)) \right\} dS_1, \quad (\text{XXX.10})$$

где

$$r_1 = \sqrt{r^2 - 2r\rho \cos \gamma + \rho^2},$$

а  $dS_1$  обозначает элемент поверхности сферы в координатах  $\vartheta_1, \varphi_1$ ;  $r_1$  есть расстояние между точками  $M(r, \vartheta, \varphi)$  и  $M_1(\rho, \vartheta_1, \varphi_1)$ , а  $\gamma$  есть угол между вектором, проведенным в точку  $M$ , и вектором, проведенным в точку  $M_1$  из начала координат.

Очевидно,

$$\begin{aligned} r\rho \cos \gamma &= \\ &= r\rho \sin \vartheta \cos \varphi \sin \vartheta_1 \cos \varphi_1 + r\rho \sin \vartheta \sin \varphi \sin \vartheta_1 \sin \varphi_1 + r\rho \cos \vartheta \cos \vartheta_1 = \\ &= r\rho (\cos \vartheta \cos \vartheta_1 + \sin \vartheta \sin \vartheta_1 \cos (\varphi - \varphi_1)). \end{aligned}$$

Подставляя в формулу (XXX.10) вместо

$$\frac{1}{r_1} \quad \text{и} \quad \frac{\partial}{\partial n} \frac{1}{r_1} = -\frac{\partial}{\partial \rho} \frac{1}{r_1}$$

их выражения (XXX.6) и (XXX.7), будем иметь:

$$\begin{aligned} r^n Y_n(\vartheta, \varphi) &= \frac{1}{4\pi} \int \int_{\rho=1} Y_n(\vartheta_1, \varphi_1) \left[ \rho^n \sum_{k=0}^{\infty} (k+1) \frac{r^k}{\rho^{k+2}} P_k(\cos \gamma) + \right. \\ &\quad \left. + n\rho^{n-1} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{r^k}{\rho^{k+1}} P_k(\cos \gamma) \right] \sin \vartheta_1 d\vartheta_1 d\varphi_1. \end{aligned}$$

Очевидно, что функция  $P_j(\cos \gamma)$  при  $j \neq n$  ортогональна к функции  $Y_n(\vartheta, \varphi)$ , так как они будут гармониками разных порядков. Положив  $\rho = 1$  и интегрируя ряд почленно, что возможно благодаря его сходимости в среднем, и замечая, что в нем пропадают все слагаемые, кроме одного, получаем:

$$r^n Y_n(\vartheta, \varphi) = \frac{2n+1}{4\pi} \int_0^{2\pi} \int_0^\pi r^n Y_n(\vartheta_1, \varphi_1) P_n(\cos \gamma) \sin \vartheta_1 d\vartheta_1 d\varphi_1,$$

т. е.

$$Y_n(\vartheta, \varphi) = \frac{2n+1}{4\pi} \int_0^{2\pi} \int_0^\pi Y_n(\vartheta_1, \varphi_1) P_n(\cos \gamma) d\vartheta_1 d\varphi_1. \quad (\text{XXX.11})$$

Формула (XXX.11) позволяет сразу получать коэффициенты разложения данной функции  $F(\vartheta, \varphi)$  по сферическим гармоникам. Пусть

$$F(\vartheta, \varphi) = \sum_{n=0}^{\infty} Y_n(\vartheta, \varphi). \quad (\text{XXX.12})$$

Умножая обе части формулы (XXX.12) на  $P_k(\cos \gamma)$  и интегрируя по сфере, получим:

$$\frac{2n+1}{4\pi} \int_0^{2\pi} \int_0^\pi F(\vartheta_1, \varphi_1) P_k(\cos \gamma) \sin \vartheta_1 d\vartheta_1 d\varphi_1 = Y_k(\vartheta, \varphi). \quad (\text{XXX.13})$$

Формула (XXX.13) носит название *формулы Лапласа*.

Формула Лапласа дает возможность явно написать решение задачи Дирихле в шаре в виде ряда по гармоническим полиномам. В самом деле, умножая каждую гармонику порядка  $k$  на  $r^k$  и складывая, мы можем получить гармоническую функцию, принимающую на границе шара заданные значения  $F(\vartheta, \varphi)$ . Мы получаем решение в следующем виде:

$$u(r, \vartheta, \varphi) = \frac{1}{4\pi} \sum_{k=0}^{\infty} (2k+1) r^k \int_0^{2\pi} \int_0^\pi F(\vartheta_1, \varphi_1) P_k(\cos \gamma) \sin \vartheta_1 d\vartheta_1 d\varphi_1.$$

Заканчивая изложение теории сферических функций, приведем без доказательства еще несколько формул, которые часто могут

быть полезными:

$$\begin{aligned} \int_{-1}^{+1} [P_n(\mu)]^2 d\mu &= \frac{2}{2n+1}, \\ \int_{-1}^{+1} [P_n^{(m)}(\mu)]^2 d\mu &= \frac{2}{2n+1} \frac{(n+m)!}{(n-m)!}, \\ \int_{-1}^{+1} P_n(\mu) P_{n'}(\mu) d\mu &= 0, \quad \int_{-1}^{+1} P_n^{(m)}(\mu) P_{n'}^{(m)}(\mu) d\mu = 0, \\ &n \neq n'. \end{aligned} \quad (\text{XXX.14})$$

Формулы (XXX.14) позволяют непосредственно вычислить коэффициенты разложения функции в ряд по сферическим функциям вида (XXIX.7).

Отметим, наконец, асимптотическое представление для полиномов Лежандра при больших значениях  $n$ :

$$P_n(\cos \vartheta) = \sqrt{\frac{2}{\pi n \sin \vartheta}} \left\{ \cos \left[ \left( n + \frac{1}{2} \right) \vartheta - \frac{\pi}{4} \right] + \varepsilon_n \right\},$$

где  $\varepsilon_n \rightarrow 0$  при  $n \rightarrow \infty$  равномерно относительно  $\vartheta$  при  $\varepsilon < \vartheta < \pi - \varepsilon$ .

Мы заканчиваем на этом первоначальный курс, посвященный выяснению основных качественных свойств уравнений математической физики и классическим методам их решения.

Современное содержание математической физики, конечно, далеко не исчерпывается этим. Так, вне рамок нашего курса остались еще следующие важнейшие вопросы, которые могут составить материал по крайней мере для такой же книги:

1. Задачи математической физики для неограниченных сред и применение интегрального преобразования Фурье.
2. Специальные задачи для сред полуограниченных, дифракция волн и т. п.
3. Вариационные методы в математической физике.
4. Приближенное решение задач математической физики методом конечных разностей.

К числу важнейших вопросов следует отнести также теорию нелинейных уравнений.

Рамки нашего курса не позволили нам остановиться на перечисленных вопросах. Однако внимательный читатель, познакомившись в этих лекциях с основными идеями теории уравнений математической физики, сумеет, мы надеемся, самостоятельно проникнуть в современные книги и журнальные статьи, посвященные указанным вопросам.

## ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

- Абсолютная непрерывность интеграла Лебега 99  
Адамара пример 37  
Адиабатический процесс 26  
Арцела теорема 361
- Бесселя неравенство 374  
— уравнение 390, 409  
— функции 409  
Билинейная формула 373  
Билинейный ряд 381, 379  
Буняковского неравенство 328, 334
- Вейерштрасса теорема 82, 83  
Всковое уравнение 346  
Весовая функция 334, 354  
Вещественное симметрическое ядро 354  
Влияния функция 286  
Внешняя задача Дирихле 229  
— — — для шара 182  
— — Неймана 229  
— — —, единственность решения 269  
Внутренняя задача Дирихле 229  
— — — для шара 176, 180  
— — —, единственность решения 269  
— — Неймана 229  
— — —, существование решения 272  
Волна, передний (задний) фронт 201  
— прямая, обратная 54  
Волновое уравнение 193, 318  
— —, единственность решения задачи Коши 199  
— —, корректность постановки задачи Коши 201  
— —, — — краевых задач 321  
— — на плоскости 412  
— — неоднородное 347  
— —, обобщенное решение 324  
— —, решение задачи Коши методом Кирхгофа 194
- Волны звуковые 23—27  
— сферические 196  
Вольтерра уравнение 250  
Вполне непрерывный оператор 362  
Вырожденное ядро 251
- Гаукеля функция 1-го рода 410  
— — 2-го рода 410  
Гармоники сферические 421  
Гармоническая функция 149  
— —, поведение вблизи особой точки 163  
— —, — на бесконечности 169, 170  
Гармонические полиномы 419  
Гильберта—Шмидта теорема 378  
Гиперболического типа уравнение 43  
— — —, первая красная задача 63—67  
— — —, приведение к каноническому виду 47, 48  
Гиперболо-параболического типа уравнение 43  
Главный член оператора 2-го порядка 45  
Граница открытого множества 82  
Граничные (краевые) условия 31  
Грина формула 69, 153, 159, 226  
— — для оператора Лапласа 69  
— функция 177, 239  
— — для задачи Дирихле 302  
— — — —, симметричность 305  
— — — — Неймана 307  
— — — обыкновенного дифференциального оператора 287  
— — обобщенная 292  
— —, построение 288  
— —, свойства 289  
— —, существование 289
- Даламбера решение уравнения колебаний струны 53  
Движение установившееся 19

- Двойного слоя потенциал 154,  
 208—216, 226—228  
 Дирихле задача 31  
 — — внешняя 229  
 — — — для шара 182  
 — — —, сведение к интегральному  
 уравнению 232, 269  
 — — внутренняя 229  
 — — — для шара 176, 180  
 — — —, сведение к интегральному  
 уравнению 232, 268  
 — — для круга 238  
 — — — полуплоскости 237  
 — — — полупространства 185  
 — — — шара 424  
 — —, единственность решения 229  
 Дифференциальные операторы сопря-  
 женные 67, 274, 278  
 Дифференциальный оператор 274  
 — — самосопряженный 68  
 Егорова теорема 111  
 Задача, см. соответствующее назва-  
 ние задачи  
 —, поставленная корректно 36  
 —, — некорректно 36  
 Задний фронт волны 201  
 Замкнутое множество 80  
 Запаздывающий потенциал 198  
 Звук распространения уравнение  
 23  
 Звуковые волны 23—27  
 Измеримая функция 96, 104, 105  
 Измеримость множества 106  
 Изотропная среда 22  
 Интеграл внутренний от функции по  
 множеству 96  
 — Лебега 96, 99, 100, 102  
 — неопределенный 103  
 — несобственный 132  
 — от знакопеременной функции по  
 множеству 101  
 — — непрерывной функции по огра-  
 ниченному замкнутому множеству  
 90, 92, 93  
 — — — — — открытому множе-  
 ству 84  
 — — разрывной функции 79, 96, 99,  
 102  
 — — функции по измеримому мно-  
 жеству 108  
 — — — — области 85  
 — по открытому множеству 86  
 —, равномерно сходящийся при дан-  
 ном значении параметра 128—130  
 Интегральное уравнение Вольтерра  
 250  
 — — для внешней задачи Дирихле  
 269  
 — — — — — Неймана 268  
 — — — — — внутренней задачи Дирихле  
 268  
 — — — — — Неймана 269  
 — —, единственность решения 249  
 — — однородное, союзное с данным  
 254  
 — — с вещественным симметриче-  
 ским ядром 354  
 — — — неограниченным ядром 264  
 — — — симметрическим ядром 391  
 — — Фредгольма 2-го рода 232, 244  
 — — — — — с параметром 245  
 — — — — —, соответствующее  
 однородное уравнение 245  
 — —, частное решение 245  
 Интегральный оператор 362  
 Интегрируемая по области функция  
 85  
 — — — — в смысле Лебега 96, 102  
 — со своим квадратом функция  
 324  
 Истокообразно представленная функ-  
 ция 374  
 Канонический вид уравнения в част-  
 ных производных 43  
 Кирхгофа метод решения задачи  
 Коши для волнового уравнения 194  
 — формула 198  
 Колебание круглой мембраны 412  
 — мембраны, задача 14, 30  
 — прямоугольного параллелепипеда  
 397  
 — прямоугольной мембраны 401  
 — струны, задача 11, 12, 29  
 Колебание функции 84  
 Колебаний мембраны уравнение 15,  
 30, 43, 412  
 — стержня уравнение 351  
 — струны уравнение 13, 29, 43  
 Компактное множество функций 361  
 — — — в смысле равномерной схо-  
 димости 362  
 — — — — — сходимости в среднем  
 362  
 Коноид характеристический 193  
 Координаты нормальные 402  
 Корректность постановки задачи 36  
 — — — — — Коши для волнового урав-  
 нения 201  
 — — — — — уравнения распро-  
 странения тепла 147

Корректность постановки краевых задач для волнового уравнения 321  
 — — — — — уравнения теплопроводности 313

Коши данные 31

— задача 31, 37

— — — для волнового уравнения, метод Кирхгофа 194

— — — неограниченной струны 53

— — — струны с закрепленными концами 56

— — — уравнения 2-го порядка в общем виде 50

— — — гиперболического типа, решение методом Римана 70, 73

— — — распространения тепла 136, 142

Коэффициенты Фурье 340, 375

Краевая задача первая для гиперболических уравнений 63—67

Краевые (границные) условия 31

Лапласа оператор 16

— — на поверхности сферы 426

— — , формула Грина 69

— — уравнение 19, 37, 43, 44, 149, 417  
 — — в криволинейных координатах 408

— — — нормальных координатах 408

— — — цилиндрических координатах 409

— — — на плоскости 235

— — , обобщенное решение 329

— — , фундаментальное решение 153, 235

— формула 436

Лебега интеграл 79, 96, 99, 100, 102

Лебега—Фубини теорема 124—127

Лебегова мера множества 95

Лежандра полиномы 432

Линейно независимая система функций 251

Лиувилля теорема 171

Лиувилля—Штурма уравнение 390

Логарифмический потенциал двойного слоя 242

— — простого слоя 241

— — распределенных масс 237

Лоренца преобразования 44

Ляпунова лемма 302

— поверхность 208

— теорема 226

Максимум гармонической функции теорема 150

Мембрана 14

Мембраны круглой колебание 412

— прямоугольной колебание 401

— уравнение колебаний 15, 43

Мера множества 95, 103, 106

Мерсера теорема 381

Метод, см. соответствующее название метода

Минковского неравенство 335

Множество внутреннее сеточное 85

— замкнутое 80

— измеримое 106

— меры нуль 109

— несвязное 79

— нигде не плотное 82

— открытое 79

— пустое 80

— связное 79

— функций компактное 361

— — в смысле равномерной сходимости 362

— — — сходимости в среднем 362

— — , ограниченное в среднем 362

— — , равностепенная непрерывность 361

Нагруженное симметрическое ядро 354

Начальные условия (данные Коши) 31

Неймана задача 31

— — — внешняя 229

— — — , сведение к интегральному уравнению 233, 268

— — — внутренняя 229

— — — , необходимые и достаточные условия разрешимости 230

— — — , сведение к интегральному уравнению 233, 269

— — — для полуплоскости 238

— — — полупространства 185

— — — , единственность решения 230

— функция 409

Неоднородное волновое уравнение 347

— уравнение теплопроводности 349

Неопределенный интеграл от функции одной переменной 103

Непрерывная в точке по множеству функция 83

— зависимость в среднем порядка  $(p, k)$  35, 36

— — порядка  $(p, k)$  35, 36

— — решения от предельных данных 34, 35

— на множестве функция 83

- Непрерывность абсолютная интеграла Лебега 99  
 — в среднем 323  
 Неразрывности уравнение 19  
 Несвязное множество 79  
 Норма функции 323  
 Нормальная производная 225  
 — — потенциала двойного слоя 226  
 Нормально-гиперболического типа уравнение 43  
 Нормально-параболического типа уравнение 43  
 Нормальные координаты 402  
 Ньютонов потенциал 154, 172  
 — —, физический смысл 154  
 Область 79  
 Обобщенная функция Грина 292  
 Обобщенное решение волнового уравнения 324  
 — — уравнения Лапласа, дифференцируемость 329  
 — — — теплопроводности 315  
 — — —, дифференцируемость 329  
 Обобщенный предел последовательности 120  
 Обратная волна 54  
 Общее решение интегрального уравнения 245  
 Объединение множеств 79  
 Однородная задача 284  
 Однородное интегральное уравнение 254  
 Оператор 247  
 — вполне непрерывный 362  
 — второго порядка 45  
 — дифференциальный 274  
 — — самосопряженный 68  
 — интегральный 362  
 — Лапласа 16  
 — — на поверхности сферы 426  
 — —, формула Грина 69  
 — самосопряженный 278  
 — усиленно вполне непрерывный 362  
 Операторы дифференциальные сопряженные 68  
 Ортогональные с весом  $\rho(P)$  функции 358  
 — функции 254  
 Остроградского формула 10  
 Открытое множество 79  
 Отрицательная часть функции 101  
 Параболического типа уравнение 43  
 — — —, приведение к каноническому виду 46  
 Передачи тепла уравнение 23, 30, 43, 44  
 Передний фронт волны 201  
 Пересечение множеств 80  
 Плотность ньютонова потенциала 154, 172  
 Поверхность Ляпунова 208  
 Полиномы гармонические 419  
 — Лежандра 432  
 Положительная часть функции 101  
 Положительно определенное ядро 377  
 Последовательность сходящаяся 119  
 — — в себе 120  
 — функций, равномерная сходимость в среднем 323  
 Потенциал двойного слоя 154, 208—216  
 — — —, геометрический смысл 155, 158  
 — — — логарифмический 242  
 — — —, нормальная производная 226  
 — — —, поведение в бесконечности 228  
 — запаздывающий 198  
 — логарифмический 237  
 — ньютонов 154, 172  
 — простого слоя 154, 208—224, 226  
 — — —, логарифмический 241  
 — — —, поведение в бесконечности 228  
 — — —, физический смысл 155  
 — Робэна 272  
 — силы тяжести 154  
 Поток тепла 22  
 Правильная нормальная производная 225  
 — — — потенциала двойного слоя 226  
 Предел последовательности 119  
 — — в смысле Лебега, достаточные условия существования 123  
 — — наибольший 119  
 — — наименьший 119  
 — — обобщенный 120  
 Предельные условия 32  
 Преобразования Лоренца 44  
 Притока тепла уравнение 25, 30, 43, 44  
 Продольные колебания стержня со свободными концами 354  
 Производная от неопределенного интеграла 103  
 — правильная нормальная 225  
 Производящая функция полиномов Лежандра 433  
 Простого слоя потенциал 154, 208, 216—224, 226, 228

- Прямая волна 54  
 Прямоугольного параллелепипеда колебания 397  
 Прямоугольной мембраны колебания 401  
 Пуассона уравнение 149  
 — — в неограниченном пространстве 171  
 — —, задача Дирихле для шара 176  
 — — на плоскости 235, 237  
 — формула 180, 199, 240  
 — — для волнового уравнения 199  
 Пустое множество 80  
  
 Равновесие мембраны, уравнение 15  
 — струны при поперечной нагрузке, уравнение 13  
 Равномерная сходимости в среднем последовательности функций 323  
 — — интеграла 128—130  
 Равномерно непрерывная на множестве функция 84  
 Равностепенная непрерывность множества функций 361  
 Разделения переменных метод 338  
 Разность множеств 81  
 Ранг характеристического числа 254  
 Распространение звука, уравнение 23, 26, 27, 30  
 — тепла в неограниченной среде, задача 136, 142  
 — —, задача 20, 30  
 — —, уравнение 23, 136  
 — —, —, корректность постановки задачи Коши 147  
 — —, —, — — краевых задач 313  
 — —, —, обобщенное решение 315, 329  
 — —, —, решение задачи Коши 136, 142  
 — —, —, фундаментальное решение 137, 148  
 Расстояние между двумя системами предельных функций 33, 34  
 — точки до замкнутого множества 84  
 Резольвента 392  
 Римана метод решения уравнений гиперболического типа 70, 73  
 — формула 72, 76  
 — функция 72, 74, 76  
 — — для сопряженного уравнения 75, 76  
 Рисса—Фишера теорема 325, 335  
 Робэна задача 272  
 — потенциал 272  
  
 Ряд билинейный 381, 379  
 — сходящийся в себе в смысле Лебега 122  
 — — в смысле Лебега 122  
  
 Самосопряженное семейство функций 278  
 Самосопряженный оператор 278  
 Свободных колебаний струны уравнение, решение Даламбера 52, 53  
 Связное множество 79  
 Семейства функций сопряженные 275, 278  
 Семейство функций самосопряженное 278  
 Силы тяжести потенциал 154  
 Симметрическое ядро вещественное 354  
 — — нагруженное 354  
 Скалярное произведение двух функций 357  
 Собственная функция 272, 339, 340  
 — —, непрерывность 369  
 — —, существование 366  
 Собственное значение интегрального уравнения 254  
 — — краевой задачи 339, 340  
 — —, существование 366  
 Соответствующее однородное уравнение для интегрального уравнения Фредгольма 2-го рода 245  
 Сопряженные дифференциальные операторы 67, 274, 278  
 — семейства функций 275, 278  
 — точки относительно сферы 168  
 Состояния газов уравнение 25  
 Союзное интегральное уравнение 254  
 Спектр собственных частот колебаний 350  
 Стержень со свободными концами, продольные колебания 351  
 Струна 11  
 — неограниченная 53  
 — с закрепленными концами 55  
 Струны уравнение колебаний 13, 43, 52—62  
 — — равновесия при поперечной нагрузке 13  
 Сумма множеств 79  
 Суммируемая функция 79, 96, 101—105, 108  
 Сферические волны 196  
 — гармоника 421  
 — функции 421, 425—437  
 Сходимость в себе 120, 122  
 — — среднем 114, 362  
 — — — равномерная 323

Сходимость последовательности 119  
 — почти всюду 110, 111  
 — равномерная интеграла при дан-  
 ном значении параметра 128—130

Теорема, см. соответствующее назва-  
 ние теоремы

Тепла поток 22

Теплопроводности уравнение 23, 30,  
 43, 44, 136, 311

— —, корректность постановки за-  
 дачи Коши 147

— —, — — краевых задач 313

— — неоднородное 349

— —, обобщенное решение 315, 329

Тип уравнения в частных производ-  
 ных 43

Типы уравнений: эллиптический,  
 гиперболический, параболический,  
 нормально-гиперболический, нор-  
 мально-параболический, эллипти-  
 ко-параболический, гиперболю-па-  
 раболический 43

Уравнение, см. соответствующее на-  
 звание уравнения

Усиленно вполне непрерывный опе-  
 ратор 362

Установившееся движение 19

Устойчивость по Ляпунову 38

Фишера—Рисса теорема 325, 335

Формула, см. соответствующее на-  
 звание формулы

Фредгольма интегральное уравнение  
 2-го рода 232, 244

— теоремы 259

Фронт волны 201

Фубини—Лебега теорема 124—127

Фундаментальная функция 270, 359

Фундаментальное решение уравнения  
 Лапласа 153

Фундаментальное решение уравне-  
 ния распространения тепла 137, 148  
 Функция, см. соответствующее на-  
 звание функции

Фурье коэффициенты 340, 375

— метод 338—353

— —, обоснование 381

— —, приложение к интегрирова-  
 нию неоднородного волнового  
 уравнения 347

— —, применение к решению за-  
 дачи о колебании прямоугольного  
 параллелепипеда 397

Характеристики 49, 51, 63, 77

— волнового уравнения 193

Характеристическая функция мно-  
 жества 106

Характеристические числа однород-  
 ного интегрального уравнения 254

Характеристический коноид 193

Частное решение интегрального  
 уравнения 245

Шмидта—Гильберта теорема 378

Штурма—Лиувилля уравнение 390

Эйлерова постоянная 410

Эквивалентные функции 110, 325

Эллиптико-параболического типа  
 уравнение 43

Эллиптического типа уравнения 43

— — —, приведение к канониче-  
 скому виду 46

Ядро 244

— вырожденное 251

— положительно определенное 377

— почти регулярное 363

— симметрическое вещественное 354

— — нагруженное 354

*Сергей Львович Соболев*

Уравнения математической физики

М., 1966 г., 444 стр. с илл.

Редакторы В. С. Рябенкий, Ю. А. Горьков

Художник Ю. И. Соколов

Техн. редактор Л. А. Пыжова

Корректор Т. Д. Доверман

---

Сдано в набор 3/II 1966 г. Подписано к печати 10/VI 1966 г. Бумага 60×90<sup>1</sup>/<sub>16</sub>. Физ. печ. л. 27,75. Условн. печ. л. 27,75. Уч.-изд. л. 26,65. Тираж 40 000 экз. Т-08247. Цена книги 1 р. 11 к. Заказ № 205.

---

Издательство «Наука»

Главная редакция

физико-математической литературы

Москва, В-71, Ленинский проспект, 15.

---

Ленинградская типография № 1 «Печатный Двор» имени А. М. Горького Главполиграфпрома Комитета по печати при Совете Министров СССР, Гатчинская, 26.