

А.А. Васин В.В. Морозов

ВВЕДЕНИЕ В ТЕОРИЮ ИГР
с приложениями к экономике

учебное пособие

Москва
2003

УДК 519.6
ББК 22.18
М 80

Васин А.А., Морозов В.В. "Введение в теорию игр с приложениями к экономике" (учебное пособие). — М.: 2003. — 278 с.

Книга представляет собой учебное пособие, пригодное как для первоначального, так и углублённого изучения теории игр и ее экономических приложений. В ее первой части приводятся основные понятия, модели и результаты для антагонистических, некооперативных и кооперативных игр. Во второй части излагаются модели, связанные с теорией экономических рынков и задачами налогового регулирования.

Для студентов математических и экономических специальностей, а также специалистов в области исследования операций, теории игр и математической экономики.

Библиогр. 110.

ISBN 5–89407–120–8

Содержание

Предисловие	4
§ 1. Введение	5
ГЛАВА I. АНТАГОНИСТИЧЕСКИЕ ИГРЫ	8
§ 2. Седловые точки и антагонистические игры	8
§ 3. Смешанные расширения антагонистических игр	17
§ 4. Свойства решений в смешанных стратегиях	28
§ 5. Методы решения матричных игр	37
§ 6. Игры с вогнутой функцией выигрыша	58
§ 7. Исследование игровых моделей	68
§ 8. Многошаговые антагонистические игры	75
Комментарий и библиография к главе I	87
ГЛАВА II. ИГРЫ ДВУХ ЛИЦ	91
§ 9. Ситуации равновесия в играх двух лиц	91
§ 10. Ситуации равновесия в биматричных играх	103
§ 11. Иерархические игры двух лиц	122
Комментарий и библиография к главе II	132
ГЛАВА III. ИГРЫ МНОГИХ ЛИЦ	134
§ 12. Равновесие по Нэшу. Решение игр в нормальной форме . . .	134
§ 13. Позиционные игры с полной информацией	145
§ 14. Позиционные игры общего вида	153
§ 15. Кооперативные игры	164
Комментарий и библиография к главе III	172
ГЛАВА IV. ВВЕДЕНИЕ В МАТЕМАТИЧЕСКУЮ ЭКОНОМИКУ	174
§ 16. Модели нерегулируемых рынков	174
§ 17. Монополизированный рынок	186
§ 18. Модель двухотраслевой экономики	190
§ 19. Модели олигополии	197
§ 20. Налоговое регулирование	213
§ 21. Модели организации налоговой инспекции	224
Комментарий и библиография к главе IV	230
§ 22. Решение упражнений	235
Приложение	259
Список литературы	268
Указатель обозначений	277

Предисловие

Содержание предлагаемого пособия основано на материалах лекционных курсов по теории игр и математической экономике, читавшихся авторами в течение ряда лет на факультете вычислительной математики и кибернетики МГУ им. М.В. Ломоносова.

В отличие от изданной ранее учебной литературы основное внимание уделяется теории некооперативных игр и ее экономическим приложениям. Излагаются новые разделы теории: иерархические и статистические игры, методы поиска ситуаций равновесия, доказательство сходимости метода Брауна для матричных игр и др. Рассматриваются модели несовершенной конкуренции, задачи оптимального налогообложения и организации налоговой инспекции. Для читателей, интересующихся математическими основаниями теории игр, в приложении даны доказательства теоремы об отделяющей гиперплоскости, теоремы Хелли о пересечении выпуклых компактов евклидова пространства, теоремы Брауэра и Какутани о неподвижной точке.

Пособие может быть использовано для чтения курсов по теории игр и математической экономике студентам, обучающимся по специальностям "Прикладная математика" и "Экономическая кибернетика". Предполагается знакомство читателей с начальными курсами математического анализа, линейной алгебры и теории вероятностей. Предлагаемые в каждом параграфе примеры и упражнения способствуют активному усвоению материала и позволяют использовать пособие также для проведения семинарских занятий. Последний раздел содержит решение всех упражнений. Каждая глава снабжена библиографическим комментарием, позволяющим заинтересованному читателю более глубоко изучить соответствующую тему.

Авторы признательны всем коллегам по кафедре исследования операций за поддержку и советы, во многом определившие структуру книги и стиль ее изложения. Мы также благодарны Полине Васиной, Евгению Жиглову, Юлии Сосиной, Алексею Теплову, Елене Тыртышниковой и Кириллу Чокпарову за помощь при подготовке пособия.

§ 1. Введение

Теорией игр называется математическая теория принятия решения в конфликтных ситуациях. Поясним это определение. Простейшие модели принятия решений рассматриваются в курсах математического анализа и оптимизации. В этих моделях лицо, принимающее решения (ЛПР), выбирает свое действие из некоторого множества стратегий (например, множество планов производства в задаче линейного программирования). Задана целевая функция, которая отражает интересы ЛПР и зависит от выбранной им стратегии (например, функция прибыли, зависящая от назначенного плана производства). Задача принятия решений в этой постановке состоит, как правило, в том, чтобы найти стратегию, доставляющую максимум целевой функции.

Отличие конфликтной ситуации в том, что решение принимается не одним индивидуумом, а несколькими участниками, и функция выигрыша каждого индивидуума зависит не только от его стратегии, но также и от решений других участников. Математическая модель такого рода конфликта называется *игрой*, а участники конфликта — *игроками*.

В рамках теории игр существуют два основных направления. *Теория некооперативных игр* изучает принятие решений в предположении, что существует механизм, обеспечивающий выполнение совместно принятого решения. При этом основная проблема — указать множество взаимовыгодных решений с учетом интересов и самостоятельных возможностей отдельных игроков и *коалиций*, то есть групп совместно действующих игроков. Если это множество включает несколько вариантов решения, то возникает также задача выработки критерия оптимальности, который позволил бы найти единственное, наилучшее в некотором смысле решение. В настоящем пособии основные понятия и некоторые результаты теории кооперативных игр изложены в § 15.

Некооперативные игры отражают ситуации, в которых игроки действуют самостоятельно, независимо друг от друга, и если какие-то соглашения заключаются, то они не являются обязывающими: каждый игрок может отклониться от договоренности. Таким играм уделяется основное внимание в данном пособии.

Если игроков двое, а интересы их противоположны, то игра называется *антагонистической*. Типичными примерами антагонистических игр являются шахматы, шашки, "крестики-нолики", а также азартные игры типа "орлянки". При проведении военных операций нападающая

сторона обычно стремится нанести противнику максимальный ущерб, а противник стремится этот ущерб минимизировать. Поэтому в таких случаях военную операцию можно изучать как антагонистическую игру.

В некоторых задачах целевая функция ЛПР зависит от неопределенного фактора (например, погодных условий). Рассчитывая на "худший случай", предполагают, что этот фактор — стратегия противника, имеющего противоположные интересы. Возникает игра против "природы", также относящаяся к антагонистическим играм. Такие игры рассматриваются в первой главе.

Вторая и третья главы посвящены *неантагонистическим играм*. Экономика и социальная сфера дают многочисленные примеры таких игр. Пусть несколько фирм конкурируют на товарном рынке и заинтересованы в увеличении своих доходов. Цена на продукцию определяется спросом на товар и количеством выпущенной продукции. Теория игр предписывает фирмам-игрокам назначать выпуск продукции в таких количествах, при которых каждому отдельно взятому игроку было бы невыгодно отклоняться от предписанного объема. Соответствующий набор стратегий называют *равновесием по Нэшу*. Другим примером являются *иерархические игры*, отражающие взаимодействие между верхним и нижним звеньями управления (начальником и подчиненным, заказчиком и производителем продукции и т.п.). Здесь обычно интересуются не равновесием в игре, а *наилучшим гарантированным результатом*, который может себе обеспечить игрок-лидер, первым сообщаящий свою стратегию другому игроку. Значительное внимание в указанных главах уделяется также *решениям по доминированию*.

В четвертой главе дается краткое введение в математическую экономику и рассматриваются приложения теории некооперативных игр к анализу актуальных экономических проблем. Одна из них — исследование экономических рынков в условиях несовершенной конкуренции и оценка отклонения ожидаемого состояния рынка от конкурентного равновесия. Изложенная в § 18 теорема благосостояния для однопродуктовой экономики показывает, что состояние конкурентного равновесия является оптимальным с точки зрения суммарного выигрыша всех участников. В § 19 рассматриваются модели рыночной конкуренции по Курно и Бертрону, а также аукцион функций предложения. Проводится сравнение равновесий по Нэшу и решений по доминированию с конкурентным равновесием.

В §§ 20, 21 обсуждаются модели, связанные с функционированием

налоговой системы. Рассматриваются простейшие задачи оптимального выбора налоговых ставок для финансирования бюджетного сектора, а также модели организации налоговых проверок в условиях уклонения и коррупции.

ГЛАВА I. АНТАГОНИСТИЧЕСКИЕ ИГРЫ

§ 2. Седловые точки и антагонистические игры

Пусть функция $F(x, y)$ определена на декартовом произведении $X \times Y$, где X, Y — множества произвольной природы.

Определение. Пара $(x^0, y^0) \in X \times Y$ называется *седловой точкой* функции $F(x, y)$ на $X \times Y$, если

$$F(x, y^0) \leq F(x^0, y^0) \leq F(x^0, y) \quad \forall x \in X, \quad \forall y \in Y \quad (2.1)$$

или, эквивалентно,

$$\max_{x \in X} F(x, y^0) = F(x^0, y^0) = \min_{y \in Y} F(x^0, y).$$

Понятие седловой точки используется в определении решения антагонистической игры.

Опишем антагонистическую игру. В ней принимают участие два игрока 1 и 2 (первый и второй). Игрок 1 выбирает стратегию x из множества стратегий X , игрок 2 выбирает стратегию y из множества стратегий Y . Нормальная форма игры подразумевает, что каждый игрок выбирает свою стратегию независимо, не зная выбора партнера. Задана *функция выигрыша* $F(x, y)$ первого игрока, определенная на $X \times Y$. Выигрыш $F(x, y)$ первого игрока является проигрышем для второго. Цель первого игрока состоит в увеличении своего выигрыша $F(x, y)$, а цель второго — в уменьшении $F(x, y)$.

Таким образом, антагонистическая игра задается набором $\Gamma = \langle X, Y, F(x, y) \rangle$. Термины "выигрыш" и "игрок" сложились исторически, когда анализировались преимущественно азартные игры. Эти термины не совсем точные. Например, если значение $F(x, y) < 0$, то "выигрыш" первого игрока является фактически его проигрышем. Кроме того, рассматривают игры, где $F(x, y)$ является не денежным выигрышем, а, скажем, вероятностью поражения цели. Игрок 2 может не быть интеллектуальным противником. Часто рассматривают игры против "природы".

Вернемся к определению седловой точки, которой можно придать следующий игровой смысл. Если игроки выбрали в качестве стратегий компоненты x^0, y^0 седловой точки, то каждому из них невыгодно отклоняться от выбранной стратегии. Поэтому седловая точка является формализацией концепции равновесия в игре.

Определение. Говорят, что антагонистическая игра Γ имеет *решение*, если функция $F(x, y)$ имеет на $X \times Y$ седловую точку. Пусть (x^0, y^0) — седловая точка функции $F(x, y)$. Тогда тройка $(x^0, y^0, v = F(x^0, y^0))$ называется решением игры, x^0, y^0 — *оптимальными* стратегиями игроков, а v — *значением* игры.

Покажем, что значение игры не зависит от выбора седловой точки.

Лемма 2.1. Если $(x^0, y^0), (x^*, y^*)$ — две седловые точки функции $F(x, y)$ на $X \times Y$, то $F(x^0, y^0) = F(x^*, y^*)$.

Доказательство. Наряду с (2.1), выпишем аналогичные неравенства для седловой точки (x^*, y^*)

$$F(x, y^*) \leq F(x^*, y^*) \leq F(x^*, y) \quad \forall x \in X, \quad \forall y \in Y. \quad (2.2)$$

Имеем

$$F(x^*, y^*) \stackrel{(2.2)}{\leq} F(x^*, y^0) \stackrel{(2.1)}{\leq} F(x^0, y^0) \stackrel{(2.1)}{\leq} F(x^0, y^*) \stackrel{(2.2)}{\leq} F(x^*, y^*).$$

Здесь все неравенства выполнены как равенства. ■

Важнейший класс антагонистических игр образуют матричные игры.

Определение. Антагонистическая игра Γ называется *матричной*, если множества стратегий игроков конечны: $X = \{1, \dots, m\}$, $Y = \{1, \dots, n\}$. При этом принято обозначать стратегию первого игрока через i , стратегию второго через j , а выигрыш первого $F(i, j)$ через a_{ij} . Матрица $A = (a_{ij})_{m \times n}$ называется матрицей игры. Первый игрок выбирает в ней номер строки i , а второй — номер столбца j .

В обозначениях матричной игры (i^0, j^0) — седловая точка матрицы A , если

$$a_{ij^0} \leq a_{i^0 j^0} \leq a_{i^0 j}, \quad i = 1, \dots, m, \quad j = 1, \dots, n.$$

Пример 2.1. $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}.$

Здесь (1,1) и (2,1) — две седловые точки и значение игры v равно нулю. Заметим, что $a_{12} = v$, но (1,2) не является седловой точкой матрицы.

Пример 2.2. Игра "орлянка". Первый игрок закладывает монету орлом (О) или решкой (Р), а второй пытается отгадать. Если второй игрок отгадает, то первый платит ему единицу, если не отгадает, то — наоборот.

Здесь $A = \begin{matrix} & O & P \\ \begin{matrix} O \\ P \end{matrix} & \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \end{matrix}$. Нетрудно видеть, что эта матрица не имеет седловой точки.

Вернемся к общему определению седловой точки и антагонистической игры. Возникают два вопроса. Когда антагонистическая игра имеет решение, т.е. когда функция $F(x, y)$ имеет седловую точку на $X \times Y$? Как искать седловые точки, если известно, что они существуют?

Рассмотрим игру Γ с точки зрения первого игрока. Пусть он выбрал стратегию x . Ясно, что его выигрыш будет не меньше, чем $\inf_{y \in Y} F(x, y)$. Величину $\inf_{y \in Y} F(x, y)$ назовем *гарантированным результатом (выигрышем)* для первого игрока. Наилучший гарантированный результат для первого игрока $\underline{v} = \sup_{x \in X} \inf_{y \in Y} F(x, y)$ называется *нижним значением* игры.

Определение. Стратегия x^0 первого игрока называется *максиминной*, если $\inf_{y \in Y} F(x^0, y) = \underline{v}$.

Рассмотрим игру Γ с точки зрения второго игрока. Если он выбрал стратегию y , то для него естественно считать гарантированным результатом величину $\sup_{x \in X} F(x, y)$. Проигрыш второго игрока будет не больше, чем эта величина. Наилучший гарантированный результат для второго игрока $\bar{v} = \inf_{y \in Y} \sup_{x \in X} F(x, y)$ называется *верхним значением* игры.

Определение. Стратегия y^0 второго игрока называется *минимаксной*, если $\sup_{x \in X} F(x, y^0) = \bar{v}$.

Лемма 2.2. В любой антагонистической игре Γ справедливо неравенство $\underline{v} \leq \bar{v}$.¹

Доказательство. Возьмем произвольные стратегии игроков x и y . Тогда

$$\inf_{y \in Y} F(x, y) \leq F(x, y) \leq \sup_{x \in X} F(x, y) \Rightarrow \inf_{y \in Y} F(x, y) \leq \sup_{x \in X} F(x, y).$$

Левая часть последнего неравенства зависит от x , а правая часть — нет.

¹Этому неравенству можно дать следующую интерпретацию: "лучше быть плохим среди хороших, чем хорошим среди плохих".

Поэтому

$$\sup_{x \in X} \inf_{y \in Y} F(x, y) \leq \sup_{x \in X} F(x, y) \quad \forall y \in Y \Rightarrow \underline{v} \leq \bar{v}. \blacksquare$$

Теперь сформулируем необходимое и достаточное условие существования седловой точки для функции двух переменных.

Теорема 2.1. 1) Для того чтобы функция $F(x, y)$ на $X \times Y$ имела седловую точку, необходимо и достаточно, чтобы было выполнено равенство

$$\max_{x \in X} \inf_{y \in Y} F(x, y) = \min_{y \in Y} \sup_{x \in X} F(x, y). \quad (2.3)$$

2) Пусть выполнено равенство (2.3). Пара (x^0, y^0) тогда и только тогда является седловой точкой, когда x^0 — максиминная, а y^0 — минимаксная стратегии игроков.

Доказательство. Утверждения 1) и 2) будем доказывать одновременно.

Необходимость. Пусть (x^0, y^0) — седловая точка функции $F(x, y)$. Покажем, что выполнено равенство (2.3), а x^0, y^0 — максиминная и минимаксные стратегии. Имеем

$$\bar{v} \leq \sup_{x \in X} F(x, y^0) = F(x^0, y^0) = v = \inf_{y \in Y} F(x^0, y) \leq \underline{v} \Rightarrow \bar{v} \leq \underline{v}.$$

Но неравенство $\underline{v} \leq \bar{v}$ верно в силу леммы 2.2. Поэтому $\bar{v} = \underline{v}$ и в последних неравенствах всюду можно поставить знаки равенств. Из полученных равенств следует, что x^0 — максиминная, а y^0 — минимаксная стратегии игроков.

Достаточность. Пусть равенство (2.3) выполнено. Возьмем x^0, y^0 — максиминную и минимаксную стратегии и покажем, что они образуют седловую точку. Имеем

$$F(x^0, y^0) \geq \inf_{y \in Y} F(x^0, y) = \underline{v} \stackrel{(2.3)}{=} \bar{v} = \sup_{x \in X} F(x, y^0) \geq F(x^0, y^0).$$

Во всех неравенствах можно поставить знаки равенств и получаем, что (x^0, y^0) — седловая точка функции $F(x, y)$. $\blacksquare$

Замечание. Если выполнено равенство (2.3), то множество всех седловых точек прямоугольно и совпадает с $X^0 \times Y^0$, где X^0 и Y^0 — множества всех максиминных и минимаксных стратегий игроков.

Упражнение 2.1. Докажите, что 3×3 -матрица не может иметь ровно 7 седловых точек.

Пример 2.3. Найдем все седловые точки матрицы

$$A = \begin{pmatrix} 7 & -1 & -4 & 1 \\ 4 & 2 & 3 & 2 \\ 2 & 2 & 5 & 2 \\ 4 & -3 & 7 & -2 \end{pmatrix}.$$

Здесь $(\min_{1 \leq j \leq 4} a_{ij}) = (-4, 2, 2, -3)$ и $(\max_{1 \leq i \leq 4} a_{ij}) = (7, 2, 7, 2)$. Отсюда $\bar{v} = \underline{v} = 2$, $X^0 = \{2, 3\}$, $Y^0 = \{2, 4\}$. Четыре седловые точки образуют множество $X^0 \times Y^0$.

Пример 2.4. Пусть $X = Y = [0, 1]$, $F(x, y) = 2x^2 - 3xy + 2y^2$. Найдем величины $\underline{v}$ и $\bar{v}$. При фиксированном x минимум по y функции $F(x, y)$ достигается в точке $y(x) = 3x/4 \in Y$. Поэтому функция минимума — $W(x) = \min_{0 \leq y \leq 1} F(x, y) = 7x^2/8$. Отсюда $\underline{v} = 7/8$ и $x^0 = 1$ — максиминная стратегия. Зафиксируем y . Максимум функции $F(x, y)$ по x достигается в концах отрезка $[0, 1]$ и равен

$$\begin{aligned} M(y) &\stackrel{\text{def}}{=} \max_{0 \leq x \leq 1} F(x, y) = \max[F(0, y), F(1, y)] = \\ &= \max[2y^2, 2 - 3y + 2y^2] = \begin{cases} 2 - 3y + 2y^2, & 0 \leq y \leq 2/3, \\ 2y^2, & 2/3 < y \leq 1. \end{cases} \end{aligned}$$

Минимум функции $M(y)$ достигается при $y^0 = 2/3$ и $\bar{v} = M(y^0) = 8/9 > \underline{v} = 7/8$. Следовательно, функция $F(x, y)$ не имеет седловой точки.

Упражнение 2.2. Найдите максиминную и минимаксную стратегии, а также нижнее и верхнее значения игры Γ , в которой

$$X = [-2, 3], Y = [-1, 2], F(x, y) = -x^2 + 4xy - 5y^2 + 3x - 2y.$$

Иногда в выражениях

$$\underline{v} = \sup_{x \in X} \inf_{y \in Y} F(x, y), \quad \bar{v} = \inf_{y \in Y} \sup_{x \in X} F(x, y)$$

внешние $\sup$ и $\inf$ не достигаются, но

$$\sup_{x \in X} \inf_{y \in Y} F(x, y) = \inf_{y \in Y} \sup_{x \in X} F(x, y). \quad (2.4)$$

Тогда максиминная (или минимаксная) стратегия не существует и седловой точки нет. Возможен другой случай, когда $\underline{v} < \bar{v}$, но эти величины близки. В подобных случаях используют понятие ε -седловой точки.

Определение. Пусть задано $\varepsilon > 0$. Пара $(x^\varepsilon, y^\varepsilon) \in X \times Y$ называется ε -седловой точкой функции $F(x, y)$ на $X \times Y$, если

$$F(x, y^\varepsilon) - \varepsilon \leq F(x^\varepsilon, y^\varepsilon) \leq F(x^\varepsilon, y) + \varepsilon \quad \forall x \in X, \quad \forall y \in Y.$$

Упражнение 2.3. Пусть x^0, y^0 — максиминная и минимаксная стратегии, а $\varepsilon = \bar{v} - \underline{v} > 0$. Доказать, что (x^0, y^0) — ε -седловая точка функции $F(x, y)$.

Определение. Пусть задано $\varepsilon > 0$. Стратегия первого игрока x^ε называется ε -максиминной, если $\inf_{y \in Y} F(x^\varepsilon, y) \geq \underline{v} - \varepsilon$. Стратегия второго игрока y^ε называется ε -минимаксной, если $\sup_{x \in X} F(x, y^\varepsilon) \leq \bar{v} + \varepsilon$.

Эти стратегии обеспечивают игрокам получение своих наилучших гарантированных результатов с точностью до ε . Сформулируем аналог теоремы 2.1.

Теорема 2.1'. 1) Для того чтобы при любом $\varepsilon > 0$ функция $F(x, y)$ на $X \times Y$ имела ε -седловую точку, необходимо и достаточно, чтобы было выполнено равенство (2.4).

2) Пусть равенство (2.4) выполнено. Тогда компоненты ε -седловой точки являются 2ε -максиминной и 2ε -минимаксной стратегиями. Обратно, ε -максиминная и ε -минимаксная стратегии образуют 2ε -седловую точку.

Упражнение 2.4. Докажите теорему 2.1'.

Представляют интерес условия топологического характера, при которых существуют максиминные и минимаксные стратегии.

Теорема 2.2. Пусть функция $F(x, y)$ непрерывна на $X \times Y$, где X, Y — компакты метрических пространств¹. Положим $Y(x) \stackrel{\text{def}}{=} \operatorname{Argmin}_{y \in Y} F(x, y)$. Тогда

¹Недостаточно подготовленный читатель здесь и далее может заменить выражение "компакт метрического пространства" на выражение "замкнутое ограниченное множество евклидова пространства".

1) Функция минимума $W(x) = \min_{y \in Y} F(x, y)$ непрерывна на X .

2) Предположим дополнительно, что при каждом $x \in X$ множество $Y(x)$ состоит из единственного элемента $y(x)$. Тогда функция $y(x)$ непрерывна на X .

Доказательство. 1) Возьмем произвольную последовательность $\{x^k\}$ элементов из X , сходящуюся к x^0 . Покажем, что $\lim_{k \rightarrow \infty} W(x^k)$ существует и равен $W(x^0)$. Предположим противное. Тогда найдется такая подпоследовательность $\{k_l\}$, что $\lim_{l \rightarrow \infty} W(x^{k_l}) = A \neq W(x^0)$. Возьмем последовательность $\{y^{k_l} \in Y(x^{k_l})\}$. В силу компактности множества Y можно считать, что $\lim_{l \rightarrow \infty} y^{k_l} = y^0$. Покажем, что $y^0 \in Y(x^0)$. Действительно, по определению y^{k_l}

$$W(x^{k_l}) = F(x^{k_l}, y^{k_l}) \leq F(x^{k_l}, y) \quad \forall y \in Y.$$

Переходя в этом неравенстве к пределу при $l \rightarrow \infty$ и используя непрерывность функции $F(x, y)$, получим

$$F(x^0, y^0) \leq F(x^0, y) \quad \forall y \in Y \Rightarrow y^0 \in Y(x^0).$$

Наконец, $A = \lim_{l \rightarrow \infty} F(x^{k_l}, y^{k_l}) = F(x^0, y^0) = W(x^0)$ (противоречие).

2) Покажем, что функция $y(x)$ непрерывна на X . Предположим, что она разрывна в некоторой точке $x^0 \in X$. Тогда найдется такая последовательность $\{x^k\}$ элементов из X , сходящаяся к x^0 , что соответствующая последовательность $\{y(x^k)\}$ не сходится к $y(x^0)$. Поэтому существует окрестность U точки $y(x^0)$, вне которой находится бесконечное число членов последовательности $\{y(x^k)\}$. В силу компактности множества $Y \setminus U$ из этой последовательности можно выделить подпоследовательность $\{y(x^{k_l})\} \subset Y \setminus U$, сходящуюся к некоторому элементу $y' \neq y(x^0)$. Но, как и в части 1), нетрудно доказать, что $y' \in Y(x^0)$. Получили противоречие с тем, что множество $Y(x^0)$ состоит из единственного элемента. ■

Замечание. В процессе доказательства теоремы мы также установили замкнутость множества $\{(x, y) \mid x \in X, y \in Y(x)\}$. Отметим также, что в теореме 2.2 компактность множества Y существенна.

²Здесь использовано следующее свойство компакта метрического пространства: из любой последовательности элементов компакта Y можно выделить подпоследовательность, сходящуюся к некоторому элементу из Y . Считаем, что $\{y^{k_l}\}$ и есть соответствующая выделенная подпоследовательность.

Пример 2.5. Пусть

$$X = [-1, 1], \quad Y = (-\infty, +\infty), \quad F(x, y) = (y^2 + 1)(xy - 1)^2.$$

Здесь множество Y не является компактом, а функции

$$y(x) = \begin{cases} 1/x, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0, \end{cases} \quad W(x) = \min_{y \in Y} F(x, y) = \begin{cases} 0, & x \neq 0, \\ 1, & x = 0, \end{cases}$$

разрывны.

Определение. Антагонистическая игра Γ называется *непрерывной*, если X, Y — параллелепипеды евклидовых пространств, а функция $F(x, y)$ непрерывна на $X \times Y$. В частности, при

$X = [a, b], \quad Y = [c, d]$ будем говорить о непрерывной игре на прямоугольнике.

Из теоремы 2.2 следует, что в непрерывной игре Γ существуют максиминные и минимаксные стратегии игроков.

Теперь займемся достаточными условиями существования седловой точки функции двух переменных. Их можно сформулировать в терминах выпуклого анализа. Напомним некоторые определения.

Определение. Множество Z евклидова пространства называется *выпуклым*, если для любых точек $z' \neq z''$ из Z и любого числа $0 < \lambda < 1$ точка $\lambda z' + (1 - \lambda)z''$ также принадлежит множеству Z .

Определение. Функция $h(z)$, определенная на выпуклом множестве Z , называется *выпуклой*, если для любых точек $z' \neq z''$ из Z и любого числа $0 < \lambda < 1$ выполнено неравенство

$$h(\lambda z' + (1 - \lambda)z'') \leq \lambda h(z') + (1 - \lambda)h(z''). \quad (2.4)$$

Если последнее неравенство выполнено как строгое, то функция $h(z)$ называется *строго выпуклой*. Если вместо неравенства $\leq$ в (2.4) фигурирует неравенство $\geq$ ($>$), то функция $h(z)$ называется *вогнутой* (*строго вогнутой*).

Упражнение 2.5. Докажите, что функция $\sum_{i=1}^m z_i^2$ строго выпукла.

Упражнение 2.6. Докажите, что строго выпуклая непрерывная функция на выпуклом компакте¹ евклидова пространства достигает минимума в единственной точке.

¹Замкнутом ограниченном множестве.

Теорема 2.3. Пусть $X \subset E^m$ и $Y \subset E^n$ — выпуклые компакты евклидовых пространств, а функция $F(x, y)$ непрерывна на $X \times Y$. Предположим, что при любом $y \in Y$ функция $F(x, y)$ вогнута по x и при любом $x \in X$ она выпукла по y . Тогда функция $F(x, y)$ имеет на $X \times Y$ седловую точку.

Доказательство. Вначале докажем существование седловой точки в случае, когда функция $F(x, y)$ строго выпукла по y . Тогда для всякого $x \in X$ функция $F(x, y)$ достигает минимума на Y в единственной точке $y(x)$. По теореме 2.2 функции $W(x) = \min_{y \in Y} F(x, y)$ и $y(x)$ непрерывны на X . Возьмем точку x^* , максимизирующую функцию $W(x)$ на X , и докажем, что пара $(x^*, y(x^*))$ является седловой точкой функции $F(x, y)$. Для любых x и $0 < t < 1$ положим $\tilde{y} = y((1-t)x^* + tx)$. В силу вогнутости по x функции $F(x, y)$ имеем

$$\begin{aligned} W(x^*) &\geq W((1-t)x^* + tx) = F((1-t)x^* + tx, \tilde{y}) \geq \\ &\geq (1-t)F(x^*, \tilde{y}) + tF(x, \tilde{y}) \geq (1-t)W(x^*) + tF(x, \tilde{y}). \end{aligned}$$

Отсюда $tF(x, \tilde{y}) \leq tW(x^*)$. Сократив на положительное t и устремив $t \rightarrow 0+$, получим неравенства для седловой точки

$$F(x, y(x^*)) \leq W(x^*) = F(x^*, y(x^*)) \leq F(x^*, y) \quad \forall x \in X, \quad \forall y \in Y.$$

Докажем теорему в общем случае. При $\varepsilon > 0$ функция

$F_\varepsilon(x, y) \stackrel{\text{def}}{=} F(x, y) + \varepsilon \sum_{j=1}^n y_j^2$ непрерывна, вогнута по x и строго выпукла по y . По доказанному функция $F_\varepsilon(x, y)$ имеет седловую точку $(x^\varepsilon, y^\varepsilon)$ на $X \times Y$:

$$F_\varepsilon(x, y^\varepsilon) \leq F_\varepsilon(x^\varepsilon, y^\varepsilon) \leq F_\varepsilon(x^\varepsilon, y) \quad \forall x \in X, \quad \forall y \in Y.$$

Возьмем последовательность положительных чисел $\{\varepsilon_k\}$, сходящуюся к нулю. Из компактности множеств X и Y следует, что без потери общности $x^{\varepsilon_k} \rightarrow x^0$, $y^{\varepsilon_k} \rightarrow y^0$. Полагая в последних неравенствах $\varepsilon = \varepsilon_k$ и переходя к пределу при $k \rightarrow \infty$, получим неравенства (2.1) из определения седловой точки. ■

Заметим, что первая часть доказательства теоремы конструктивна: для поиска седловой точки функции $F(x, y)$, строго выпуклой по y , достаточно найти максиминную стратегию x^* и наилучший ответ на нее

$y(x^*)$ второго игрока. Аналогично, пусть в условиях теоремы 2.3 функция $F(x, y)$ строго вогнута по y , y^* — минимаксная стратегия, а $x(y^*) \in \operatorname{Arg\,max}_{x \in X} F(x, y^*)$ — наилучший ответ на нее первого игрока. Тогда $(x(y^*), y^*)$ — седловая точка функции $F(x, y)$.

Из первой части доказательства вытекает, что для существования седловой точки вместо строгой выпуклости функции $F(x, y)$ по переменной y достаточно потребовать при любом $x \in X$ единственность наилучшего ответа $y(x)$ второго игрока. Если последнее условие не выполнено, то пара (x^*, y^*) , где $y^* \in Y(x^*)$, может не быть седловой точкой. Например, для функции $F(x, y) = xy$ на $X \times Y = [0, 1] \times [0, 1]$ пара $(x^*, y^*) = (0, 1)$ седловой точкой не является.

Пример 2.6. $X = Y = [0, 1]$, $F(x, y) = -x^2 + y^3 + xy^2 - 4y$. Здесь функция $F(x, y)$ выпукла по y и строго вогнута по x . Функция наилучшего ответа первого игрока — $x(y) = y^2/2$ и

$$M(y) = \max_{0 \leq x \leq 1} F(x, y) = F(x(y), y) = y^4/4 + y^3 - 4y.$$

Производная $M'(y) = y^3 + 3y^2 - 4$ обращается в нуль в точках 1, −2. Отсюда $y^0 = 1$ — минимаксная стратегия и $x(y^0) = 1/2$. Следовательно, $(1/2, 1)$ — седловая точка функции $F(x, y)$.

§ 3. Смешанные расширения антагонистических игр

В предыдущем параграфе приводился пример антагонистической игры, не имеющей решения ("орлянка"). Играть в подобные игры весьма непросто. Проигравшему игроку каждый раз хочется сменить свою стратегию, но он будет бояться это сделать (а вдруг партнер догадается?). Теория игр предлагает игрокам использовать *смешанные* стратегии.

Определение. Смешанной стратегией первого игрока в игре Γ называется вероятностное распределение φ на множестве стратегий X .

Для первого игрока применить смешанную стратегию φ — это выбрать стратегию $x \in X$ как реализацию случайной величины, имеющей закон распределения φ . Далее рассматриваются три вида смешанных стратегий.

1) Пусть $X = \{1, \dots, m\}$, как это имеет место в матричной игре. Тогда вместо φ для обозначения смешанной стратегии будем использовать "вероятностный" вектор $p = (p_1, \dots, p_m)$, удовлетворяющий ограничениям

$\sum_{i=1}^m p_i = 1, p_i \geq 0, i = 1, \dots, m$. Если применяется p , то стратегия i выбирается с вероятностью p_i . Например, в игре "орлянка" опытные игроки используют смешанную стратегию $p^0 = (1/2, 1/2)$, подбрасывая монету и выбирая "орел" или "решку" в зависимости результата бросания.

Вообще, одна из возможных реализаций смешанной стратегии — это бросание монет. С помощью одного бросания одной монеты можно осуществить только вероятность $1/2$. С помощью двух монет или двукратного бросания одной монеты можно уже реализовать вероятности $1/2, 1/4$ и $3/4$. Ясно, что бросанием нескольких монет или многократным бросанием одной монеты можно реализовать широкий спектр вероятностей. Другой возможный и более удобный способ реализации смешанной стратегии — использовать рулетку. Делим круг рулетки на сектора с площадями, пропорциональными заданным вероятностям использования чистых стратегий. Затем вращаем стрелку и используем ту стратегию, в секторе которой она остановится.

2) Пусть $X = [a, b]$, как это имеет место в непрерывной игре на прямоугольнике. Здесь смешанная стратегия — функция распределения φ на отрезке $[a, b]$.

Пример 3.1. Пусть $X = [0, 1]$, $c(x)$ — неубывающая дифференцируемая функция, определенная на отрезке $[1/2, 1]$ и удовлетворяющая условиям $c(1/2) = 1/2, c(1) = 1$. Определим функцию распределения

$$\varphi_0(x) = \begin{cases} 0, & -\infty < x < 0, \\ 1/4, & 0 \leq x < 1/2, \\ c(x), & 1/2 \leq x \leq 1, \\ 1, & 1 < x < +\infty. \end{cases}$$

Интеграл Стильеса от непрерывной функции $h(x)$ по функции распределения $\varphi_0(x)$ вычисляется по формуле

$$\int_0^1 h(x) d\varphi_0(x) = \frac{1}{4}h(0) + \frac{1}{4}h(1/2) + \int_{1/2}^1 h(x)c'(x)dx.$$

3) Пусть X — выпуклый компакт евклидова пространства. Здесь примером смешанной стратегии может служить вероятностная мера, сосре-

доточенная в конечном числе точек:

$$\varphi(x) = \sum_{i=1}^m p_i I_{x^{(i)}}(x), \quad \sum_{i=1}^m p_i = 1, \quad p_i \geq 0, \quad x^{(i)} \in X, \quad i = 1, \dots, m,$$

где

$$I_{x^{(i)}}(x) = \begin{cases} 1, & x = x^{(i)}, \\ 0, & x \neq x^{(i)}. \end{cases}$$

Отметим, что для любого борелевского множества B $\varphi(B) = \sum_{i: x^{(i)} \in B} p_i$.

При использовании меры φ стратегия $x^{(i)}$ выбирается с вероятностью p_i . Интеграл от непрерывной функции $h(x)$ по рассматриваемой мере имеет вид

$$\int_X h(x) d\varphi(x) = \sum_{i=1}^m p_i h(x^{(i)}).$$

Обозначим через $\{\varphi\}$ – множество всех смешанных стратегий первого игрока на множестве X . Можно считать, что $X \subset \{\varphi\}$. Действительно, в последнем случае стратегию x можно отождествить с вероятностной мерой I_x . Если множество X конечно, то выбор i эквивалентен выбору смешанной стратегии $p = (0, \dots, 0, 1, 0, \dots, 0)$, где единица стоит на i -м месте, а при $X = [a, b]$ стратегию $x \in [a, b]$ можно отождествить с функцией распределения, имеющей скачок 1 в точке x .

Множество X будем называть множеством *чистых* стратегий первого игрока (в противовес смешанным).

Займемся построением *смешанного расширения* антагонистической игры $\Gamma = \langle X, Y, F(x, y) \rangle$. Мы определили множество $\{\varphi\}$ смешанных стратегий первого игрока. Аналогично, пусть $\{\psi\}$ – множество смешанных стратегий второго игрока, т.е. вероятностных распределений ψ на множестве Y его чистых стратегий. При заданных стратегиях φ и ψ математическое ожидание выигрыша первого игрока определяется формулой

$$F(\varphi, \psi) = \int_X \int_Y F(x, y) d\varphi(x) d\psi(y).$$

Здесь предполагается, что двойной интеграл существует.

Определение. Антагонистическая игра

$$\bar{\Gamma} = \langle \{\varphi\}, \{\psi\}, F(\varphi, \psi) \rangle$$

называется смешанным расширением игры Γ .

Определение. Решение $(\varphi^0, \psi^0, v = F(\varphi^0, \psi^0))$ игры $\bar{\Gamma}$ называется решением исходной игры Γ в смешанных стратегиях. При этом φ^0, ψ^0 называются *оптимальными смешанными* стратегиями игроков, а v — *значением* игры Γ .

Далее будут построены смешанные расширения матричных и непрерывных игр и будет показано, что эти игры всегда имеют решение в смешанных стратегиях.

Напомним, что матричная игра Γ задается матрицей $A = (a_{ij})_{m \times n}$. Множество смешанных стратегий первого игрока —

$$P = \{p = (p_1, \dots, p_m) \mid \sum_{i=1}^m p_i = 1, p_i \geq 0, i = 1, \dots, m\},$$

множество смешанных стратегий второго игрока —

$$Q = \{q = (q_1, \dots, q_n) \mid \sum_{j=1}^n q_j = 1, q_j \geq 0, j = 1, \dots, n\},$$

а математическое ожидание выигрыша первого игрока —

$$A(p, q) = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n p_i a_{ij} q_j.$$

Таким образом, $\bar{\Gamma} = \langle P, Q, A(p, q) \rangle$ — смешанное расширение матричной игры Γ .

Теорема 3.1 (Основная теорема матричных игр). Всякая матричная игра имеет решение в смешанных стратегиях.

Доказательство. Достаточно доказать, что функция $A(p, q)$ имеет седловую точку на $P \times Q$. Множества P, Q — многогранники евклидовых пространств, а функция $A(p, q)$ билинейна и поэтому непрерывна на $P \times Q$, вогнута по p и выпукла по q . По теореме 2.3 функция $A(p, q)$ имеет на $P \times Q$ седловую точку. ■

Упражнение 3.1. Покажите, что тройка

$$(p^0, q^0, v) = ((1/2, 1/2), (1/2, 1/2), 0)$$

— решение в смешанных стратегиях игры "орлянка".

Отметим типичные случаи, когда применяются смешанные стратегии.

1) Игра повторяется много раз. В этом случае за большое число повторений игры средний выигрыш первого игрока, использующего оптимальную смешанную стратегию, будет близок к значению игры или будет превышать его.

2) Смешанная стратегия реализуется в виде "физической смеси" чистых стратегий. Что это означает, поясним на примерах.

Пример 3.2. Игра против природы. Фермер (игрок 1) имеет участок земли, который можно засеять тремя сельскохозяйственными культурами. Год может быть нормальным, засушливым и дождливым (это три стратегии игрока 2 — природы). Пусть $H = (h_{ij})_{3 \times 3}$ — матрица урожайности, а b_i — цена за единицу продукции i -го вида. Тогда $A = (b_i h_{ij})_{3 \times 3}$ — матрица игры, где выигрыш фермера — стоимость произведенной продукции. Пусть $p^0 = (1/2, 1/4, 1/4)$ — оптимальная смешанная стратегия первого игрока. Реализовать ее можно, засеяв половину участка первой культурой, а оставшиеся две четверти — второй и третьей культурами.

Пример 3.3. Некоторая страна (игрок 1) использует три типа истребителей для борьбы с самолетами противника (игрока 2). Если истребитель типа i первого игрока встречается с самолетом типа j второго игрока, то он побеждает противника с вероятностью a_{ij} . Смешанная стратегия $p^0 = (1/2, 1/4, 1/4)$ первого игрока может быть реализована в виде парка истребителей с пропорциями типов 2:1:1.

3) Смешанные стратегии можно применять и при однократном повторении игры, когда игрок действует в условиях риска. При этом необходимо выигрыши заменить на их "полезности", учитывающие отношение игрока к риску.

Пример 3.4. Пусть игрок вынужден один раз сыграть в игру с матрицей $A = \begin{pmatrix} 10 & 0 \\ 0 & 5 \end{pmatrix}$. Выигрышам 10 и 0 припишем полезности 1 и 0. Определим полезность выигрыша 5. Пусть в некоторой лотерее выигрыш 10 ожидается с вероятностью $0 < a < 1$. Первому игроку предлагается выбрать такое значение a , при котором игрок согласен купить лотерейный билет по цене 5. Выбранное значение a и будет полезностью выигрыша 5. Если $a = 1/2$, то отношение игрока к риску нейтральное, если $a > 1/2$, то игрок осторожен, а если $a < 1/2$, то игрок азартен.

Элементы теории полезности см. в конце данного параграфа.

Займемся смешанным расширением непрерывной игры Г. Ограни-

чимся игрой на прямоугольнике $X \times Y = [a, b] \times [c, d]$. При заданных стратегиях φ и ψ — функциях распределения на отрезках X и Y — ожидаемый выигрыш $F(\varphi, \psi)$ первого игрока равен

$$F(\varphi, \psi) = \int_a^b \int_c^d F(x, y) d\varphi(x) d\psi(y).$$

Здесь двойной интеграл от непрерывной функции $F(x, y)$ существует. Более того, по теореме Фубини он равен повторному

$$F(\varphi, \psi) = \int_a^b F(x, \psi) d\varphi(x) = \int_c^d F(\varphi, y) d\psi(y),$$

где

$$F(x, \psi) = \int_c^d F(x, y) d\psi(y), \quad F(\varphi, y) = \int_a^b F(x, y) d\varphi(x).$$

Итак, построено смешанное расширение $\bar{\Gamma} = \langle \{\varphi\}, \{\psi\}, F(\varphi, \psi) \rangle$ непрерывной игры Γ на прямоугольнике. Наша ближайшая цель — доказать существование решения игры $\bar{\Gamma}$.

Нам потребуется известный результат.

Теорема 3.2. Множество смешанных стратегий $\{\varphi\}$ на отрезке $[a, b]$ является слабым компактом. Это означает, что из любой последовательности смешанных стратегий $\{\varphi^k\}$ можно выделить подпоследовательность $\{\varphi^{k_l}\}$, слабо сходящуюся к некоторой стратегии φ^0 , т.е. такую, что для любой непрерывной на отрезке $[a, b]$ функции $h(x)$ выполнено

$$\lim_{l \rightarrow \infty} \int_a^b h(x) d\varphi^{k_l}(x) = \int_a^b h(x) d\varphi^0(x).$$

Лемма 3.1. В непрерывной игре Γ на прямоугольнике существуют максиминная и минимаксная смешанные стратегии игроков.

Доказательство. Рассмотрим выражения

$$\underline{v} = \sup_{\varphi \in \{\varphi\}} \inf_{\psi \in \{\psi\}} F(\varphi, \psi), \quad \bar{v} = \inf_{\psi \in \{\psi\}} \sup_{\varphi \in \{\varphi\}} F(\varphi, \psi)$$

и докажем, что внешние $\sup$ и $\inf$ в них достигаются. По определению верхней грани $\underline{v}$ найдется такая последовательность смешанных стратегий $\{\varphi^k\}$, что

$$\inf_{\psi \in \{\psi\}} F(\varphi^k, \psi) \geq \underline{v} - \varepsilon_k, \quad \varepsilon_k \rightarrow 0+,$$

или

$$\int_X F(x, \psi) d\varphi^k(x) \geq \underline{v} - \varepsilon_k \quad \forall \psi \in \{\psi\}, \quad k = 1, 2, \dots \quad (3.1)$$

Выделим из $\{\varphi^k\}$ подпоследовательность $\{\varphi^{k_l}\}$, слабо сходящуюся к смешанной стратегии φ^0 . Заметим, что при фиксированной стратегии ψ функция $F(x, \psi)$ непрерывна по x . Переходя в (3.1) к пределу по подпоследовательности $\{k_l\}$, получим неравенство $F(\varphi^0, \psi) \geq \underline{v} \quad \forall \psi \in \{\psi\}$. Отсюда

$$\inf_{\psi \in \{\psi\}} F(\varphi^0, \psi) \geq \underline{v} \Rightarrow \inf_{\psi \in \{\psi\}} F(\varphi^0, \psi) = \underline{v}$$

и φ^0 — максиминная смешанная стратегия первого игрока. Аналогично доказывается существование минимаксной смешанной стратегии. ■

Лемма 3.2. Рассмотрим две антагонистические игры

$$\Gamma = \langle X, Y, F(x, y) \rangle, \quad \Gamma' = \langle X, Y, F'(x, y) \rangle,$$

в которых функции $F(x, y)$ и $F'(x, y)$ ограничены на $X \times Y$ и при $\varepsilon > 0$ выполнено условие

$$|F(x, y) - F'(x, y)| \leq \varepsilon \quad \forall (x, y) \in X \times Y.$$

Тогда $|\underline{v} - \underline{v}'| \leq \varepsilon, \quad |\bar{v} - \bar{v}'| \leq \varepsilon$.

Доказательство. Для всякого $x \in X$ справедливы неравенства

$$\inf_{y \in Y} F(x, y) - \inf_{y \in Y} F'(x, y) \geq \inf_{y \in Y} (F(x, y) - F'(x, y)) \geq -\varepsilon.$$

Можно получить аналогичные неравенства, меняя местами функции $F(x, y)$ и $F'(x, y)$. В результате находим, что

$$|\inf_{y \in Y} F(x, y) - \inf_{y \in Y} F'(x, y)| \leq \varepsilon \quad \forall x \in X.$$

Далее,

$$\sup_{x \in X} \inf_{y \in Y} F(x, y) - \sup_{x \in X} \inf_{y \in Y} F'(x, y) \leq \sup_{x \in X} (\inf_{y \in Y} F(x, y) - \inf_{y \in Y} F'(x, y)) \leq \varepsilon.$$

Как и выше, находим, что $|\underline{v} - \underline{v}'| \leq \varepsilon$. Аналогично доказывается неравенство $|\bar{v} - \bar{v}'| \leq \varepsilon$. ■

Теорема 3.3 (Основная теорема непрерывных игр). Всякая непрерывная игра Γ на прямоугольнике имеет решение в смешанных стратегиях.

Доказательство. По теореме 2.1 достаточно доказать равенство величин $\underline{v} = \max_{\varphi \in \{\varphi\}} \inf_{\psi \in \{\psi\}} F(\varphi, \psi)$ и $\bar{v} = \min_{\psi \in \{\psi\}} \sup_{\varphi \in \{\varphi\}} F(\varphi, \psi)$.

Заметим, что достижимость здесь внешних максимумов и минимумов вытекает из леммы 3.1. Возьмем произвольное $\varepsilon > 0$. Из непрерывности функции $F(x, y)$ следует существование такого разбиения отрезка $X = [a, b]$ на непересекающиеся промежутки (отрезок и полуинтервалы) X^i , $i = 1, \dots, m$ и такого разбиения отрезка $Y = [c, d]$ на аналогичные промежутки Y^j , $j = 1, \dots, n$, что

$$|F(x, y) - F(x', y')| \leq \varepsilon \quad \forall (x, y), (x', y') \in X^i \times Y^j, \quad \forall i, j. \quad (3.2)$$

Для любых i, j возьмем точки $x^i \in X^i$, $y^j \in Y^j$ и определим ступенчатую функцию

$$F_1(x, y) = F(x^i, y^j) \quad \forall (x, y) \in X^i \times Y^j, \quad i = 1, \dots, m, \quad j = 1, \dots, n.$$

Тогда из (3.2) следует, что

$$|F(x, y) - F_1(x, y)| \leq \varepsilon \quad \forall (x, y) \in X \times Y. \quad (3.3)$$

Итак, функция $F_1(x, y)$ аппроксимирует функцию $F(x, y)$ с точностью до $\varepsilon > 0$. Непрерывная игра Γ фактически приближена игрой с матрицей $A = (a_{ij})_{m \times n} = (F(x^i, y^j))_{m \times n}$.

Всякой смешанной стратегии φ поставим в соответствие вектор

$$p = (p_1, \dots, p_m) : p_i = \int_{X^i} d\varphi(x), \quad i = 1, \dots, m,$$

где p_i — вероятность попадания реализации смешанной стратегии в множество X^i (мера множества X^i). Очевидно, что p является смешанной стратегией первого игрока в матричной игре, т.е. $p \in P$. Построенное отображение $\mathcal{P} : \{\varphi\} \rightarrow P$ является отображением на P . Действительно, для любой стратегии $p \in P$ функция распределения φ со скачками

p_i в точках x^i является прообразом p при отображении $\mathcal{P}$. Аналогично определяется отображение $\mathcal{Q} : \{\psi\} \rightarrow Q$, где Q – множество смешанных стратегий второго игрока матричной игры. Далее, для любых стратегий φ , ψ и соответствующих стратегий $p = \mathcal{P}(\varphi)$, $q = \mathcal{Q}(\psi)$ справедлива формула

$$F_1(\varphi, \psi) = \int_a^b \int_c^d F_1(x, y) d\varphi(x) d\psi(y) = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n p_i F(x^i, y^j) q_j = A(p, q). \quad (3.4)$$

Кроме того, используя (3.3), получим

$$\begin{aligned} |F(\varphi, \psi) - F_1(\varphi, \psi)| &= \left| \int_a^b \int_c^d (F(x, y) - F_1(x, y)) d\varphi(x) d\psi(y) \right| \leq \\ &\leq \int_a^b \int_c^d |F(x, y) - F_1(x, y)| d\varphi(x) d\psi(y) \leq \int_a^b \int_c^d \varepsilon d\varphi(x) d\psi(y) = \varepsilon. \end{aligned}$$

Последнее неравенство означает, что для функций $F(\varphi, \psi)$, $F_1(\varphi, \psi)$ выполнены условия леммы 3.2. Из нее вытекают неравенства

$$\left| \max_{\varphi \in \{\varphi\}} \inf_{\psi \in \{\psi\}} F(\varphi, \psi) - \max_{\varphi \in \{\varphi\}} \min_{\psi \in \{\psi\}} F_1(\varphi, \psi) \right| \leq \varepsilon, \quad (3.5)$$

$$\left| \min_{\psi \in \{\psi\}} \sup_{\varphi \in \{\varphi\}} F(\varphi, \psi) - \min_{\psi \in \{\psi\}} \max_{\varphi \in \{\varphi\}} F_1(\varphi, \psi) \right| \leq \varepsilon. \quad (3.6)$$

Из (3.4) и основной теоремы матричных игр следует, что

$$\begin{aligned} \max_{\varphi \in \{\varphi\}} \min_{\psi \in \{\psi\}} F_1(\varphi, \psi) &= \max_{p \in P} \min_{q \in Q} A(p, q) = \\ &= \min_{q \in Q} \max_{p \in P} A(p, q) = \min_{\psi \in \{\psi\}} \max_{\varphi \in \{\varphi\}} F_1(\varphi, \psi). \end{aligned}$$

Отсюда и из неравенств (3.5), (3.6) следует $|\underline{v} - \bar{v}| \leq 2\varepsilon$. В силу произвольности $\varepsilon > 0$ получаем $\underline{v} = \bar{v}$. ■

Элементы теории полезности

Правомерность использования математического ожидания выигрыша в смешанном расширении игры вызывает сомнения. Когда игроки

применяют заданные смешанные стратегии, то выигрыш каждого является случайной величиной с заданным законом распределения. В теории полезности такую величину называют *лотереей*. Формально она задается набором параметров $(A_1, \dots, A_k; x_1, \dots, x_k)$, где выигрыш A_l возникает с вероятностью x_l , $l = 1, \dots, k$, и $\sum_{l=1}^k x_l = 1$.

Упражнение 3.2. Указать параметры лотереи, которая соответствует паре смешанных стратегий (p, q) в матричной игре.

Оценка исхода любой игры по математическому ожиданию предполагает, что лотереи $(0; 1)$, $(\$5000, \$ - 5000; 1/2, 1/2)$ и $(-1 \text{ руб.}, 10000 \text{ руб.}; 10000/10001, 1/10001)$ эквиваленты для индивидуума. Можно предположить, что для многих читателей это не так. Далеко не все могут себе позволить сыграть во вторую лотерею, даже если несколько увеличить размер выигрыша. В то же время значительная часть населения участвует в лотереях, подобных третьей, даже при отрицательном среднем выигрыше: многие готовы рискнуть маленькой суммой в расчете на счастливый случай. Вообще, отношение людей к риску достаточно сложно и не до конца исследовано. Его изучением занимается теория *полезности* (в экономике функции выигрыша обычно называют функциями полезности).

Один из важнейших результатов этой теории состоит в следующем. Предположим, что у индивидуума есть отношение предпочтения на множестве всевозможных лотерей, т.е. для любых двух лотерей L_1, L_2 он может указать, какое из соотношений (причем только одно) выполняется: $L_1 \succ L_2$ (L_1 предпочтительней L_2), $L_2 \succ L_1$ или $L_1 \sim L_2$ (лотереи эквивалентны). Пусть эти соотношения удовлетворяют следующим (довольно естественным) аксиомам:

I. Если $L_1 \succ L_2$ и $L_2 \succ L_3$, то $L_1 \succ L_3$.

II. Если $L_1 \sim L_2$ и $L_2 \sim L_3$, то $L_1 \sim L_3$.

III. Если $L_1 \sim L_2$ и $L_2 \succ L_3$, то $L_1 \succ L_3$.

IV. Если $L_1 \succ L_2$ и $L_2 \sim L_3$, то $L_1 \succ L_3$.

V. Лотереи, которым соответствует одинаковое распределение вероятностей, являются эквивалентными.

Пусть L_1, L_2 — две лотереи, $0 \leq r \leq 1$. Обозначим через $rL_1 + (1 - r)L_2$ лотерею, в которой с вероятностью r разыгрывается лотерея L_1 , а с вероятностью $1 - r$ — лотерея L_2 .

Из аксиомы V вытекает, что для любых лотерей L_1, L_2, L_3 и вероятностей r, s справедливы соотношения

$$rL_1 + (1 - r)L_2 \sim (1 - r)L_2 + rL_1,$$

$$rL_1 + (1 - r)(L_2 + (1 - s)L_3) \sim rL_1 + (1 - r)L_2 + (1 - r)(1 - s)L_3.$$

VI . Если $L_1 \sim L_2$ ($L_1 \succ L_2$), то для любой лотереи L_3 и любой вероятности $r > 0$ выполнено соотношение

$$rL_1 + (1 - r)L_3 \sim rL_2 + (1 - r)L_3 \quad (rL_1 + (1 - r)L_3 \succ rL_2 + (1 - r)L_3).$$

VII . Если $L_1 \succ L_2 \succ L_3$, то найдется такая вероятность r , что $rL_1 + (1 - r)L_3 \sim L_2$.

Аксиома VII похожа на теорему о промежуточном значении для непрерывной функции на отрезке и означает, что отношение предпочтения непрерывно в некотором смысле. Пусть, наконец, справедлива аксиома

$VIII$. Если $A_l > A_h$, то $(A_l; 1) \succ (A_h; 1)$.

Лемма 3.3. Пусть на множестве лотерей предпочтение индивидуума удовлетворяет аксиомам $I - VIII$ и $L_1 \succ L_2$. Тогда для любых вероятностей $\beta < \alpha$ выполнено соотношение $\alpha L_1 + (1 - \alpha)L_2 \succ \beta L_1 + (1 - \beta)L_2$.

Доказательство. По аксиоме VI при $L_3 = L_2$ получаем $\alpha L_1 + (1 - \alpha)L_2 \succ L_2$. Представим β в виде $\beta = \gamma\alpha$, где $\gamma \in [0, 1)$. Тогда по аксиомам VI и V

$$\begin{aligned} \alpha L_1 + (1 - \alpha)L_2 &\succ \gamma(\alpha L_1 + (1 - \alpha)L_2) + (1 - \gamma)L_2 \sim \\ &\sim \gamma\alpha L_1 + [\gamma(1 - \alpha) + 1 - \gamma]L_2 \sim \beta L_1 + (1 - \beta)L_2. \blacksquare \end{aligned}$$

Теорема 3.4. При выполнении указанных аксиом $I - VIII$ существует функция полезности $u(L)$, определенная на множестве лотерей вида $(A_1, \dots, A_k; x_1, \dots, x_k)$ и такая, что выполнены следующие свойства:

1) Для любых лотерей L_1, L_2 $u(L_1) > u(L_2) \Leftrightarrow L_1 \succ L_2$.

2) Для любой лотереи $L = (A_1, \dots, A_k; x_1, \dots, x_k)$ $u(L) = \sum_{l=1}^k x_l u(A_l)$.

3) Функция $u(A; 1)$ монотонно возрастает по A .

Более того, эта функция единственна с точностью до линейного преобразования: если другая функция $v(L)$ удовлетворяет тем же свойствам 1)–3), то существуют такие константы $c > 0$ и b , что для любой лотереи L $v(L) = cu(L) + b$.

Утверждение теоремы означает, что для каждого индивидуума (при выполнении аксиом $I - VIII$) существует монотонное преобразование

функции выигрыша, которое позволяет оценивать любую лотерею, исходя из математического ожидания выигрыша. В частности, если в матричной игре взять преобразованную функцию выигрыша $u(a_{ij})$, то случайный исход при использовании смешанных стратегий p и q можно оценивать по математическому ожиданию $\sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n p_i u(a_{ij}) q_j$. Отметим, что функция полезности $u(L)$ — своя для каждого индивидуума, поэтому игра с преобразованными матрицами выигрышей $(u_1(a_{ij}))$ и $(u_2(a_{ij}))$ вполне может оказаться неантагонистической.

Упражнение 3.3. Докажите теорему 3.4.

Указание. Без потери общности можно считать, что $A_1 \succ A_2 \succ \dots \succ A_k$. Положим $u(A_1) = r_1 = 1$, $u(A_k) = r_k = 0$, а величины $u(A_l) = r_l$, $l = 2, \dots, k-1$ определим из соотношений $r_l(A_1) + (1 - r_l)A_l \sim A_l$, $0 < r_l < 1$, используя аксиому VII. С помощью леммы 3.3 покажите, что функция

$$u(L) = u(A_1, \dots, A_k; x_1, \dots, x_k) = \sum_{l=1}^k x_l r_l$$

удовлетворяет всем утверждениям теоремы.

§ 4. Свойства решений в смешанных стратегиях

В данном параграфе рассматриваются свойства решений в смешанных стратегиях матричных игр и непрерывных игр на прямоугольнике. Эти свойства в частных случаях позволяют находить оптимальные смешанные стратегии.

Теорема 4.1. Для того чтобы тройка (φ^0, ψ^0, v) была решением в смешанных стратегиях непрерывной игры Γ , необходимо и достаточно, чтобы было выполнено условие

$$F(x, \psi^0) \leq v \leq F(\varphi^0, y) \quad \forall x \in X, \quad \forall y \in Y. \quad (*)$$

Доказательство. Необходимость. Пусть (φ^0, ψ^0, v) — решение непрерывной игры в смешанных стратегиях. Тогда $v = F(\varphi^0, \psi^0)$ и по определению седловой точки

$$F(\varphi, \psi^0) \leq F(\varphi^0, \psi^0) = v \leq F(\varphi^0, \psi) \quad \forall \varphi \in \{\varphi\}, \quad \forall \psi \in \{\psi\}.$$

Возьмем в последних неравенствах вместо φ и ψ чистые стратегии x и y . В результате получим условие $(*)$.

Достаточность. Пусть для тройки (φ^0, ψ^0, v) выполнено условие (*). Проинтегрируем первое неравенство этого условия по любой стратегии φ , а второе — по любой стратегии ψ и получим

$$F(\varphi, \psi^0) \leq v \leq F(\varphi^0, \psi) \quad \forall \varphi \in \{\varphi\}, \quad \forall \psi \in \{\psi\}.$$

Подставляя, в частности, $\varphi = \varphi^0$ и $\psi = \psi^0$, находим, что $F(\varphi^0, \psi^0) = v$ и пара (φ^0, ψ^0) — седловая точка функции $F(\varphi, \psi)$ на $\{\varphi\} \times \{\psi\}$. ■

Отметим, что теорема 4.1 справедлива для произвольных смешанных расширений антагонистических игр.

Сформулируем аналогичную теорему для матричных игр.

Теорема 4.1'. Для того чтобы тройка (p^0, q^0, v) была решением в смешанных стратегиях игры с матрицей A , необходимо и достаточно, чтобы было выполнено условие

$$A(i, q^0) \leq v \leq A(p^0, j), \quad i = 1, \dots, m, \quad j = 1, \dots, n. \quad (*)$$

Упражнение 4.1. Докажите теорему 4.1'.

Отметим, что проверка выполнения условия (*) теоремы 4.1' сводится к подсчету скалярных произведений вектора p^0 на столбцы, а также вектора q^0 на строки матрицы A и сравнению их с числом v .

Пример 4.1. Пусть матрица игры — циклическая:

$$A = \begin{pmatrix} c_1 & c_2 & \dots & c_n \\ c_n & c_1 & \dots & c_{n-1} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ c_2 & \dots & c_n & c_1 \end{pmatrix}.$$

Покажем, что $p^0 = q^0 = (1/n, \dots, 1/n)$, $v = \sum_{k=1}^n c_k/n$ — решение игры в смешанных стратегиях. Действительно, условие (*) здесь выполнено, поскольку все неравенства в нем выполнены как равенства. В качестве конкретного примера рассмотрим игру "мешок, камень, ножницы" с матрицей

$$A = \begin{matrix} & \begin{matrix} \text{М} & \text{К} & \text{Н} \end{matrix} \\ \begin{matrix} \text{М} \\ \text{К} \\ \text{Н} \end{matrix} & \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ -1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix} \end{matrix}.$$

Можно дать следующую интерпретацию этой игры. Двое выбирают один из трех предметов: мешок, камень или ножницы. Каждый предмет против самого себя никакого выигрыша не дает, поэтому на диагонали стоят 0. Ножницы тупятся о камень, поэтому они проигрывают камню 1, а тот в свою очередь выигрывает у ножниц 1. Камень можно поместить в мешок, поэтому мешок выигрывает у камня 1, а камень проигрывает мешку 1. Ножницы режут мешок, поэтому они выигрывают у мешка 1, а мешок проигрывает ножницам 1.

Упражнение 4.2. Пусть B — матрица, полученная прибавлением константы c ко всем элементам матрицы A . Показать, что значения соответствующих матричных игр связаны соотношением $v(B) = v(A) + c$, а оптимальные смешанные стратегии игроков совпадают.

Пример 4.2. Продавец выставляет на продажу три предмета, не представляющие для него особой ценности (старые телевизоры и т.п.). Он готов их продать даже за незначительную цену. Имеются два покупателя (игрока), располагающие одинаковыми суммами денег A . Игрок становится обладателем предмета, если предлагает за него сумму, большую, чем партнер. Цель первого игрока состоит в покупке двух каких-либо предметов из трех. Цель второго игрока — воспрепятствовать этому.

Пусть $x = (x_1, x_2, x_3) \in X = \{x \mid \sum_{i=1}^3 x_i = A, \quad x_1, x_2, x_3 \geq 0\}$ — стратегия первого игрока, состоящая в предложении суммы x_i за i -ый предмет. Аналогичную стратегию $y = (y_1, y_2, y_3) \in Y = X$ использует второй игрок.

Будем писать $x \succ y$, если какие-либо две компоненты вектора x больше соответствующих компонент вектора y . Определим функцию выигрыша первого игрока

$$F(x, y) = \begin{cases} 1, & x \succ y, \\ 0, & \text{в противном случае.} \end{cases}$$

Заметим, что

$$\begin{aligned} \forall x \in X \exists y \in Y : \neg(x \succ y) &\Rightarrow \underline{v} = 0; \\ \forall y \in Y \exists x \in X : x \succ y &\Rightarrow \bar{v} = 1. \end{aligned}$$

Отсюда следует, что игра не имеет решения в чистых стратегиях. Найдем ее решение в смешанных стратегиях.

Множество стратегий X (совпадающее с Y) изобразим на плоскости в виде равностороннего треугольника высоты A . Точка y имеет *барицентрические* координаты y_1, y_2, y_3 , определяющие ее расстояния от

трех сторон треугольника. На рис. 4.1 изображены линии $x_1 = y_1$, $x_2 = y_2$, $x_3 = y_3$.




Рис. 4.1

Множество стратегий вне этих линий разобьем на два подмножества

$$X_1(y) = \{x \in X \mid x \succ y\}, \quad X_2(y) = \{x \in X \mid y \succ x\}.$$

Заметим, что $X_1(y)$ является объединением трех треугольников. Например, нижний треугольник на рис. 4.1 состоит из таких векторов x , для которых $x_2 > y_2, x_3 > y_3$.

Множество

$$C = \{x \in X \mid 0 \leq x_i \leq 2A/3, i = 1, 2, 3\}$$

представляет собой правильный шестиугольник с центром y^0 , совпадающим с центром треугольника X (рис. 4.2).




Рис. 4.2

Пусть φ^0 — равномерное распределение на C . Докажем, что тройка

$(\varphi^0, \varphi^0, 1/2)$ — решение игры в смешанных стратегиях. Для этого достаточно проверить условие (*) теоремы 4.1.

Обозначим через $mes(S)$ площадь фигуры $S \subset X$. Тогда

$$F(\varphi^0, y) = \frac{mes(X_1(y) \cap C)}{mes(C)} \quad \forall y \in Y.$$

Нетрудно показать, что $mes(X_1(y) \cap C) = 0.5mes(C)$ для всех $y \in C$. Действительно, для центра шестиугольника y^0 это утверждение очевидно. Пусть $y \neq y^0$. Определим вектор $y^1 \in C$:

$$y_1^1 = y_1, \quad y_2^1 = y_2^0 = A/3, \quad y_3^1 = 2A/3 - y_1.$$

Сравнивая фигуры $X_1(y) \cap C$, $X_1(y^1) \cap C$ и $X_1(y^0) \cap C$, убеждаемся, что их площади равны. Следовательно, при $y \in C$ $F(\varphi^0, y) = 1/2$. Методом сравнения площадей можно также показать, что $mes(X_1(y) \cap C) > 0.5mes(C)$, если $y \notin C$. Итак, доказано, что $F(\varphi^0, y) \geq 1/2 \quad \forall y \in Y$. Поскольку

$$F(x, \varphi^0) = \frac{mes(X_2(x) \cap C)}{mes(C)} \quad \forall x \in X,$$

для доказательства неравенства $F(x, \varphi^0) \leq 1/2 \quad \forall x \in X$ достаточно заметить, что

$$mes(X_1(x) \cap C) + mes(X_2(x) \cap C) = mes(C) \quad \forall x \in X. \blacksquare$$

Пусть $\bar{\Gamma}$ — смешанное расширение произвольной антагонистической игры Γ .

Определение. Смешанная стратегия ψ^0 второго игрока называется *выравнивающей*, если $F(x, \psi^0) \equiv const$ на множестве X .

Аналогично определяется выравнивающая стратегия первого игрока.

Утверждение 4.1. Если в игре $\bar{\Gamma}$ у обоих игроков существуют выравнивающие стратегии φ^0, ψ^0 , то они оптимальны.

Доказательство. Действительно, по определению

$$F(\varphi^0, y) = c_1 \quad \forall y \in Y, \quad F(x, \psi^0) = c_2 \quad \forall x \in X.$$

Интегрируя эти равенства по ψ^0 и φ^0 соответственно, получим $F(\varphi^0, \psi^0) = c_1 = c_2$. При $v = F(\varphi^0, \psi^0)$ неравенства из условия (*) теоремы 4.1 для тройки (φ^0, ψ^0, v) выполнены как равенства. $\blacksquare$

Доказанное утверждение можно усилить.

Упражнение 4.3. Пусть в игре $\bar{\Gamma}$ ψ^0 — выравнивающая стратегия второго игрока и найдется такая смешанная стратегия φ^0 первого игрока, что $F(\varphi^0, \psi^0) = \min_{\psi \in \{\psi\}} F(\varphi^0, \psi)$. Докажите, что φ^0, ψ^0 — оптимальные смешанные стратегии игроков.

Упражнение 4.4. Приведите пример игры с матрицей размеров 2×3 , в которой второй игрок имеет выравнивающую, но не оптимальную смешанную стратегию.

Пример 4.3. Первый игрок ведет стрельбу по цели, которая может находиться в одной из трех точек: либо в концах отрезка $[B, C]$ длины 2, либо в его середине D . Первый игрок выбирает точку прицела B, C или D . Пусть d — расстояние от точки прицела до положения цели, а вероятности ее поражения равны 1, a , 0 для расстояний $d = 0, 1, 2$ соответственно. Выигрыш первого игрока — вероятность поражения цели. Требуется определить оптимальную стратегию стрельбы в зависимости от значения параметра $a \in (0, 1)$.

$$\text{Составим матрицу игры } A = \begin{matrix} & \begin{matrix} B & C & D \end{matrix} \\ \begin{matrix} B \\ C \\ D \end{matrix} & \begin{pmatrix} 1 & a & 0 \\ a & 1 & a \\ 0 & a & 1 \end{pmatrix} \end{matrix}.$$

Пусть $q^0 = (q_1^0, q_2^0, q_3^0)$ — выравнивающая стратегия второго игрока. Матрица A симметрична и смешанная стратегия $p^0 = q^0$ первого игрока также является выравнивающей. Из утверждения 4.1 вытекает, что стратегии p^0 и q^0 оптимальны. Найдем q^0 . В силу симметрии концов отрезка $[B, C]$ по отношению к его середине D можно считать, что $q_1^0 = q_3^0$. Следовательно,

$$2q_1^0 + q_2^0 = 1, \quad q_1^0 + aq_2^0 = v, \quad 2aq_1^0 + q_2^0 = v.$$

Выпишем решение полученной системы уравнений

$$q_1^0 = \frac{1-a}{3-4a}, \quad q_2^0 = \frac{1-2a}{3-4a}, \quad v = \frac{1-2a^2}{3-4a}.$$

Из условия неотрицательности q_1^0, q_2^0 находим, что $a \leq 1/2$. При $a > 1/2$ покажите, что тройка $(p^0, q^0, v) = ((0, 1, 0), (1/2, 0, 1/2), a)$ — решение игры в смешанных стратегиях.

Упражнение 4.5. Используя выравнивающие стратегии, решите ана-

логичную игру с матрицей

$$A = \begin{pmatrix} 1 & a & 0 & 0 \\ a & 1 & a & 0 \\ 0 & a & 1 & a \\ 0 & 0 & a & 1 \end{pmatrix}, \quad 0 < a < 1.$$

Теорема 4.2. Для непрерывной игры Γ справедливы следующие два утверждения:

- 1) $\inf_{\psi \in \{\psi\}} F(\varphi, \psi) = \min_{y \in Y} F(\varphi, y) \quad \forall \varphi \in \{\varphi\};$
- 2) $\sup_{\varphi \in \{\varphi\}} F(\varphi, \psi) = \max_{x \in X} F(x, \psi) \quad \forall \psi \in \{\psi\}.$

Доказательство. Докажем 1). Возьмем любую стратегию φ . Заметим, что $\min_{y \in Y} F(\varphi, y)$ достигается, поскольку функция $F(\varphi, y)$ непрерывна по y . Далее,

$$\inf_{\psi \in \{\psi\}} F(\varphi, \psi) \leq \min_{y \in Y} F(\varphi, y) \quad (4.1)$$

и для любого $\psi \in \{\psi\}$

$$F(\varphi, \psi) = \int_Y F(\varphi, y) d\psi(y) \geq \int_Y \min_{y \in Y} F(\varphi, y) d\psi(y) = \min_{y \in Y} F(\varphi, y).$$

Отсюда

$$\inf_{\psi \in \{\psi\}} F(\varphi, \psi) \geq \min_{y \in Y} F(\varphi, y). \quad (4.2)$$

Из (4.1) и (4.2) следует первое утверждение теоремы. Утверждение 2) доказывается аналогично. ■

Следствие. Значение v непрерывной игры Γ может быть представлено в виде следующих двух формул:

$$v = \max_{\varphi \in \{\varphi\}} \min_{y \in Y} F(\varphi, y) = \min_{\psi \in \{\psi\}} \max_{x \in X} F(x, \psi).$$

Доказательство. По теоремам 2.1, 3.2 и 4.2 получаем

$$v = \max_{\varphi \in \{\varphi\}} \inf_{\psi \in \{\psi\}} F(\varphi, y) \Rightarrow v = \max_{\varphi \in \{\varphi\}} \inf_{y \in Y} F(\varphi, y).$$

Вторая формула выводится аналогично.

Упражнение 4.6. Докажите, что значение v непрерывной игры Γ удовлетворяет неравенствам

$$\underline{v} = \max_{x \in X} \min_{y \in Y} F(x, y) \leq v \leq \min_{y \in Y} \max_{x \in X} F(x, y) = \bar{v}.$$

Теорема 4.2'. Для игры с матрицей A справедливы следующие два утверждения:

- 1) $\min_{q \in Q} A(p, q) = \min_{1 \leq j \leq n} A(p, j) \quad \forall p \in P;$
- 2) $\max_{p \in P} A(p, q) = \max_{1 \leq i \leq m} A(i, q) \quad \forall q \in Q.$

Докажите самостоятельно.

Следствие. Значение v игры с матрицей A может быть представлено в виде следующих двух формул:

$$v = \max_{p \in P} \min_{1 \leq j \leq n} A(p, j) = \min_{q \in Q} \max_{1 \leq i \leq m} A(i, q).$$

Теперь обсудим так называемое свойство *дополняющей нежесткости*. Определим множество $Sp(\varphi) \subset X$ – спектр смешанной стратегии φ , заданной на отрезке X .

Определение. Будем говорить, что точка $x' \in X = [a, b]$ принадлежит спектру стратегии φ , если для всякого $\varepsilon > 0$ существует такой отрезок $[a', b']$, содержащий x' , что $b' - a' < \varepsilon$ и $\varphi(b') - \varphi(a') > 0$. Множество всех точек спектра обозначим через $Sp(\varphi)$.

Упражнение 4.7. Докажите, что точки скачка функции распределения φ и точки, где ее производная существует и положительна, принадлежат спектру $Sp(\varphi)$.

Теорема 4.3 (Свойство дополняющей нежесткости). Пусть (φ^0, ψ^0, v) – решение в смешанных стратегиях непрерывной игры Γ . Тогда

- 1) $x \in Sp(\varphi^0) \Rightarrow F(x, \psi^0) = v;$
- 2) $y \in Sp(\psi^0) \Rightarrow F(\varphi^0, y) = v.$

Доказательство. Докажем утверждение 1). Предположим противное, т.е. найдется такая точка $x' \in Sp(\varphi^0)$, что $F(x', \psi^0) \neq v$. Тогда по свойству (*) теоремы 4.1 будет выполнено неравенство $F(x', \psi^0) < v$. Из непрерывности функции $F(x, \psi^0)$ и определения спектра стратегии φ^0

вытекает, что для всякого $\varepsilon > 0$ найдется такой отрезок $[a', b']$, содержащий точку x' , и такое число $v' < v$, что для всех $x \in [a', b']$

$$F(x, \psi^0) \leq v' < v, \quad b' - a' < \varepsilon, \quad \varphi^0(b') - \varphi^0(a') > 0.$$

Теперь

$$\begin{aligned} F(\varphi^0, \psi^0) &= \int_X F(x, \psi^0) d\varphi^0(x) = \\ &= \int_{(a', b']} F(x, \psi^0) d\varphi^0(x) + \int_{X \setminus (a', b']} F(x, \psi^0) d\varphi^0(x) \leq \int_{(a', b']} v' d\varphi^0(x) + \\ &+ \int_{X \setminus (a', b']} v d\varphi^0(x) < (\varphi^0(b') - \varphi^0(a'))v + \int_{X \setminus (a', b']} v d\varphi^0(x) = v, \end{aligned}$$

что противоречит определению значения игры. Утверждение 2) доказывается аналогично. ■

Следствие. Пусть (φ^0, ψ^0, v) — решение в смешанных стратегиях непрерывной игры Γ . Тогда

- 1) $F(x, \psi^0) < v \Rightarrow x \notin Sp(\varphi^0)$;
- 2) $F(\varphi^0, y) > v \Rightarrow y \notin Sp(\psi^0)$.

Сформулируем аналогичную теорему для матричных игр.

Теорема 4.3' (Свойство дополняющей нежесткости). Пусть (p^0, q^0, v) — решение в смешанных стратегиях игры с матрицей A . Тогда

- 1) $p_i^0 > 0 \Rightarrow A(i, q^0) = v$;
- 2) $q_j^0 > 0 \Rightarrow A(p^0, j) = v$.

Упражнение 4.8. Докажите теорему 4.3'.

Следствие. Пусть (p^0, q^0, v) — решение в смешанных стратегиях игры с матрицей A . Тогда

- 1) $A(i, q^0) < v \Rightarrow p_i^0 = 0$;
- 2) $A(p^0, j) > v \Rightarrow q_j^0 = 0$.

Поясним выражение "дополняющая нежесткость", заимствованное из теории двойственности линейного программирования. Поставим в соответствие неравенству $A(i, q^0) \leq v$ ($A(p^0, j) \geq v$) из условия (*) неравенство $p_i^0 \geq 0$ ($q_j^0 \geq 0$) с тем же номером. Тогда если одно из этих неравенств выполнено строго ("нежестко"), то по теореме 4.3' и ее следствию

соответствующее неравенство выполнено как равенство ("жестко"). Все это можно записать в следующей краткой форме: для решения (p^0, q^0, v) в смешанных стратегиях игры с матрицей A справедливы равенства

$$p_i^0(v - A(i, q^0)) = q_j^0(A(p^0, j) - v) = 0, \quad i = 1, \dots, m, \quad j = 1, \dots, n.$$

Пример 4.4. Решим игру с диагональной матрицей A , в которой диагональные элементы $a_i > 0$. Предположим, что все компоненты оптимальных смешанных стратегий p^0, q^0 положительны. Тогда по теореме 4.3'

$$A(i, q^0) = a_i q_i^0 = v, \quad i = 1, \dots, n, \quad \sum_{i=1}^n q_i^0 = 1.$$

Решая эту систему относительно $n + 1$ неизвестных $q_i^0, i = 1, \dots, n, v$, получим $q_i^0 = v/a_i, i = 1, \dots, n$, где $v = 1 / \sum_{k=1}^n \frac{1}{a_k}$.

Аналогично можно найти, что $p^0 = q^0$.

Приведем одну интерпретацию этой игры. Пусть милиционер (первый игрок) ищет преступника (второго игрока) в одном из n баров. Если милиционер приходит в бар i , где находится преступник, то вероятность его задержания равна a_i . Оптимальные смешанные стратегии предписывают игрокам идти с большей вероятностью в тот бар, где вероятность задержания меньше. Поэтому оптимальная стратегия преступника естественна, а милиционера — парадоксальна. Отметим также, что мы одновременно решили следующую задачу поиска максимина:

$$v = \max_{p \in P} \min_{1 \leq i \leq n} A(p, i) = \max_{p \in P} \min_{1 \leq i \leq n} a_i p_i.$$

§ 5. Методы решения матричных игр

В этом параграфе изложены некоторые методы решения матричных игр в смешанных стратегиях. При этом наша цель будет состоять в поиске хотя бы одного решения игры.

1. Доминирование строк и столбцов.

Если элементы некоторой строки i_1 матрицы A меньше соответствующих элементов другой строки i_2 , то интуитивно ясно, что строку i_1 первому игроку можно не использовать. Сформулируем условия доминирования строк и столбцов матрицы игры, позволяющие уменьшить ее размеры.

Определение. Будем говорить, что вектор $a = (a_1, \dots, a_l)$ слабо доминирует вектор $b = (b_1, \dots, b_l)$, если $a_i \geq b_i$, $i = 1, \dots, l$. Будем говорить о строгом доминировании, если все нестрогие неравенства $\geq$ заменены на строгие $>$. Заметим, что слабое доминирование возможно даже в случае равенства векторов a и b .

Определение. Для векторов $a^{(i)}$, $i = 1, \dots, m$, евклидова пространства и чисел $p_i \geq 0$, $i = 1, \dots, m$, $\sum_{i=1}^m p_i = 1$, линейная комбинация $\sum_{i=1}^m p_i a^{(i)}$ называется выпуклой комбинацией векторов $a^{(i)}$ с коэффициентами p_i .

Теорема 5.1 (О доминировании строк). Пусть некоторая строка матрицы A слабо доминируется выпуклой комбинацией остальных строк. Тогда эта строка входит с нулевой вероятностью в некоторую оптимальную смешанную стратегию первого игрока. Если указанное доминирование строгое, то эта строка входит с нулевой вероятностью в любую оптимальную смешанную стратегию первого игрока. Доминируемые строки можно вычеркнуть из матрицы игры.

Доказательство. Пусть строка матрицы A с номером i_1 слабо доминируется выпуклой комбинацией остальных строк с коэффициентами $p_i \geq 0$, $i \neq i_1$:

$$a_{i_1 j} \leq \sum_{i \neq i_1} p_i a_{ij}, \quad j = 1, \dots, n, \quad \sum_{i \neq i_1} p_i = 1. \quad (5.1)$$

Рассмотрим матрицу $\hat{A}$, полученную из A вычеркиванием (исключением) i_1 -ой строки. Пусть $(\hat{p}, q^0, v)$ — решение игры с матрицей $\hat{A}$. Положим $p^0 = (\hat{p}_1, \dots, \hat{p}_{i_1-1}, 0, \hat{p}_{i_1+1}, \dots, \hat{p}_m)$ и докажем, что тройка (p^0, q^0, v) — решение игры с матрицей A . Тем самым будет доказано второе утверждение теоремы и обосновано вычеркивание i_1 -ой строки. Действительно, решая игру с матрицей $\hat{A}$, мы находим решение исходной игры, добавляя в $\hat{p}$ нулевую i_1 -ую компоненту.

Проверим условие $(*)$ для тройки (p^0, q^0, v) в игре с матрицей A . Имеем

$$A(p^0, j) = \hat{A}(\hat{p}, j) \geq v, \quad j = 1, \dots, n; \quad A(i, q^0) = \hat{A}(i, q^0) \leq v \quad \forall i \neq i_1.$$

Пусть $i = i_1$. Тогда, полагая $p' = (p_i, i \neq i_1)$, получим

$$A(i_1, q^0) = \sum_{j=1}^n a_{i_1 j} q_j^0 \leq \sum_{j=1}^n \left(\sum_{i \neq i_1} a_{ij} p_i \right) q_j^0 = \hat{A}(p', q^0) \leq v,$$

поскольку стратегия q^0 второго игрока оптимальна в игре с матрицей $\hat{A}$. Итак, (p^0, q^0, v) — решение игры с матрицей A .

Предположим, что неравенства в (5.1) строгие. Тогда в последних выкладках первое неравенство также строгое и $A(i_1, q^0) < v$. Пусть p^* — произвольная оптимальная смешанная стратегия первого игрока. Тогда (p^*, q^0, v) — решение игры с матрицей A . Из последнего неравенства по свойству дополняющей нежесткости получаем $p_{i_1}^* = 0$. ■

Отметим, что при исключении строго доминируемых строк оптимальные смешанные стратегии первого игрока сохраняются. При слабом доминировании оптимальные стратегии могут теряться. В качестве примера достаточно рассмотреть матрицу игры с равными элементами.

Следующую теорему докажите самостоятельно.

Теорема 5.1' (О доминировании столбцов). Пусть некоторый столбец матрицы A слабо доминирует выпуклую комбинацию остальных столбцов этой матрицы. Тогда этот столбец входит с нулевой вероятностью в *некоторую* оптимальную смешанную стратегию второго игрока. Если указанное доминирование строгое, то этот столбец входит с нулевой вероятностью в *любую* оптимальную смешанную стратегию второго игрока. Доминирующие столбцы можно вычеркнуть из матрицы игры.

Пример 5.1. Решить игру с матрицей

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 5 \\ 1 & 3 & 3 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

Здесь полусумма первых двух строк слабо доминирует третью строку и ее можно вычеркнуть. В полученной матрице третий столбец слабо доминирует второй. После его вычеркивания получим циклическую матрицу $\hat{A} = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$ с решением $(\hat{p}, \hat{q}, v) = ((1/2, 1/2), (1/2, 1/2), 2)$. Поэтому исходная игра имеет решение

$$(p^0, q^0, v) = ((1/2, 1/2, 0), (1/2, 1/2, 0), 2).$$

Упражнение 5.1. Пусть матрица A имеет седловую точку. Показать, что после исключения слабо доминируемых строк и слабо доминирующих столбцов без использования выпуклых комбинаций редуцированная матрица имеет седловую точку матрицы A .

Упражнение 5.2. Полковнику Блотто¹ (первому игроку) поставлена задача прорыва тремя полками через два горных перевала, охраняемых двумя полками противника (второго игрока). Стратегия Блотто $(k_1, k_2) \in X = \{(3, 0), (2, 1), (1, 2), (0, 3)\}$ состоит в том, что k_1 полков направляются на первый перевал, а k_2 — на второй. Противник располагает аналогичными стратегиями $(l_1, l_2) \in Y = \{(2, 0), (1, 1), (0, 2)\}$. Полки Блотто и противника, встретившись на перевале, взаимно уничтожают друг друга. Выигрышем Блотто является общее число его полков, прорвавшихся через два перевала, т.е. величина $\max[k_1 - l_1, 0] + \max[k_2 - l_2, 0]$. Решить матричную игру и найти оптимальную стратегию Блотто.

II. *Графический метод решения игр с матрицами размеров $2 \times n$ и $m \times 2$.*

Рассмотрим игру с $2 \times n$ -матрицей A . Смешанная стратегия первого игрока $p = (p_1, 1 - p_1)$ определяется величиной $p_1 \in [0, 1]$. Значение игры, согласно следствию теоремы 4.2', представимо в виде

$$v = \max_{p \in P} \min_{1 \leq j \leq n} A(p, j) = \max_{0 \leq p_1 \leq 1} \min_{1 \leq j \leq n} [a_{1j}p_1 + a_{2j}(1 - p_1)].$$

Для нахождения значения игры и оптимальной смешанной стратегии первого игрока достаточно на отрезке $[0, 1]$ построить графики семейства линейных функций $l_j(p_1) = a_{1j}p_1 + a_{2j}(1 - p_1)$ с угловыми коэффициентами $k_j = a_{1j} - a_{2j}$, $j = 1, \dots, n$, и найти точку максимума p_1^0 функции $\min_{1 \leq j \leq n} l_j(p_1)$ — нижней огибающей семейства (рис. 5.1).




Рис. 5.1

¹Полковник Блотто — анекдотический персонаж, действующее лицо многих иллюстративных примеров из области антагонистических игр.

Найдем оптимальную смешанную стратегию второго игрока. Разберем следующие возможности.

а) $0 < p_1^0 < 1$.

Этот случай представлен на рис. 5.1. Возьмем две прямые l_{j_1} и l_{j_2} , проходящие через точку (p_1^0, v) и имеющие угловые коэффициенты $k_{j_1} \geq 0$, $k_{j_2} \leq 0$. Рассмотрим уравнение

$$k_{j_1}q^* + k_{j_2}(1 - q^*) = 0. \quad (5.2)$$

Оно имеет решение q^* , принадлежащее отрезку $[0, 1]$. Из (5.2) следует, что угловой коэффициент прямой $l_{j_1}(p_1)q^* + l_{j_2}(p_1)(1 - q^*)$ равен нулю. Смешанная стратегия второго игрока

$$q^0 : q_j^0 = \begin{cases} q^*, & j = j_1, \\ 1 - q^*, & j = j_2, \\ 0, & j \neq j_1, j_2, \end{cases}$$

оптимальна, поскольку при всех $p_1 \in [0, 1]$

$$A(p, q^0) = l_{j_1}(p_1)q^* + l_{j_2}(p_1)(1 - q^*) = v.$$

б) $p_1^0 = 0$.

В этом случае чистая стратегия 2 первого игрока является оптимальной. Покажем, что у второго игрока также имеется чистая оптимальная стратегия. Действительно, найдется прямая l_{j_1} , проходящая через точку $(0, v)$ и имеющая угловой коэффициент $k_{j_1} \leq 0$. Выбирая чистую стратегию j_1 , второй игрок не позволит первому выиграть больше, чем v , поскольку $A(p, j_1) = l_{j_1}(p_1) \leq v$ при всех $p_1 \in [0, 1]$. Итак, матрица игры имеет седловую точку $(2, j_1)$.

в) $p_1^0 = 1$.

В этом случае, аналогичном б), матрица игры также имеет седловую точку.

Пример 5.2. Решим игру с матрицей $A = \begin{pmatrix} -1 & -2 & 3 \\ 2 & 4 & 1 \end{pmatrix}$.

Построив три прямые (рис. 5.2)

$$l_1(p_1) = (-1)p_1 + 2(1 - p_1) = 2 - 3p_1,$$

$$l_2(p_1) = (-2)p_1 + 4(1 - p_1) = 4 - 6p_1,$$

$$l_3(p_1) = 3p_1 + 1(1 - p_1) = 1 + 2p_1,$$

найдем, что максимум нижней огибающей достигается в $p_1^0 = 1/5$ — точке пересечения прямых l_1 и l_3 .




Рис. 5.2

Значение игры $v = l_1(p_1^0) = 7/5$ и $p^0 = (1/5, 4/5)$. Здесь $j_1 = 3$, $k_3 = 2$, $j_2 = 1$, $k_1 = -3$. Из уравнения $2q^* + (-3)(1 - q^*) = 0$ находим $q^* = 3/5$. Отсюда $q^0 = (2/5, 0, 3/5)$ — оптимальная стратегия второго игрока. Сделайте проверку условия (*) теоремы 4.1' для найденного решения (p^0, q^0, v) .

Упражнение 5.3. Найдите все оптимальные стратегии игроков в игре с матрицей $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}$.

Теперь рассмотрим игру с $m \times 2$ -матрицей A . Смешанная стратегия $q = (q_1, 1 - q_1)$ второго игрока определяется величиной $q_1 \in [0, 1]$. Значение игры, согласно следствию теоремы 4.2', представимо в виде

$$v = \min_{q \in Q} \max_{1 \leq i \leq m} A(i, q) = \min_{0 \leq q_1 \leq 1} \max_{1 \leq i \leq m} [a_{i1}q_1 + a_{i2}(1 - q_1)].$$

Поэтому необходимо построить верхнюю огибающую $\max_{1 \leq i \leq m} l_i(q_1)$ семейства прямых $l_i(q_1) = a_{i1}q_1 + a_{i2}(1 - q_1)$, $i = 1, \dots, m$, и найти на отрезке $[0, 1]$ точку q_1^0 ее минимума. Она будет соответствовать оптимальной смешанной стратегии второго игрока. Оптимальная стратегия первого игрока строится с использованием уравнения, аналогичного (5.2).

III. *Сведение решения матричной игры к паре двойственных задач линейного программирования.*

Сведение решения матричной игры к задачам линейного программирования — наиболее эффективный прием, позволяющий использовать алгоритм симплекс-метода.

Без потери общности будем предполагать, что значение матричной игры v положительно. Согласно следствию теоремы 4.2', оно представимо в виде

$$v = \max_{p \in P} \min_{1 \leq j \leq n} A(p, j) = \max_{p \in P} \min_{1 \leq j \leq n} \sum_{i=1}^m p_i a_{ij}.$$

Введем вспомогательную переменную u и запишем задачу нахождения максимина как задачу линейного программирования

$$v = \max_{(u, p) \in B} u, \text{ где}$$

$$B = \{(u, p) \mid \sum_{i=1}^m p_i a_{ij} \geq u, j = 1, \dots, n, \sum_{i=1}^m p_i = 1, p_i \geq 0, i = 1, \dots, m\}.$$

Действительно, при фиксированном $p \in P$ максимальное значение u при ограничениях $(u, p) \in B$ равно $\min_{1 \leq j \leq n} A(p, j)$.

Поскольку $v > 0$, можно считать, что u принимает положительные значения. Сделаем замену переменных $z_i = p_i/u$, $z = (z_1, \dots, z_m)$. Тогда, учитывая ограничения $(u, p) \in B$, получим

$$\sum_{i=1}^m z_i = 1/u, \quad \sum_{i=1}^m a_{ij} z_i \geq 1, \quad j = 1, \dots, n, \quad z_i \geq 0, \quad i = 1, \dots, m.$$

Отсюда

$$v = \max_{(u, p) \in B} u = \frac{1}{\sum_{i=1}^m z_i^0},$$

где z^0 — оптимальное решение задачи линейного программирования

$$\sum_{i=1}^m z_i \rightarrow \min$$

$$\sum_{i=1}^m a_{ij} z_i \geq 1, \quad j = 1, \dots, n, \quad z_i \geq 0, \quad i = 1, \dots, m. \quad (I)$$

По z^0 находим значение игры и оптимальную смешанную стратегию первого игрока: $v = 1/\sum_{i=1}^m z_i^0$, $p^0 = v z^0$.

Аналогично можно получить, что

$$v = \min_{q \in Q} \max_{1 \leq i \leq m} A(i, q) = \frac{1}{\sum_{j=1}^n w_j^0},$$

где w^0 — оптимальное решение задачи линейного программирования

$$\sum_{j=1}^n w_j \rightarrow \max$$

$$\sum_{j=1}^n a_{ij} w_j \leq 1, \quad i = 1, \dots, m, \quad w_j \geq 0, \quad j = 1, \dots, n. \quad (II)$$

Здесь $q^0 = vw^0$ — оптимальная смешанная стратегия второго игрока. Задачи (I) и (II) двойственны одна по отношению к другой.

Отметим свойство дополняющей нежесткости для оптимальных решений z^0 и w^0 задач (I) и (II) :

$$1) \quad z_i^0 > 0 \Rightarrow \sum_{j=1}^n a_{ij} w_j^0 = 1;$$

$$2) \quad w_j^0 > 0 \Rightarrow \sum_{i=1}^m a_{ij} z_i^0 = 1.$$

Оно непосредственно вытекает из утверждения теоремы 4.3' после замены переменных $p^0 = vz^0$, $q^0 = vw^0$.

Пример 5.3. Решить игру с матрицей $A = \begin{pmatrix} 0 & 3 & 4 \\ 2 & 1 & -3 \end{pmatrix}$. Отметим, что стратегия $p = (1/2, 1/2)$ обеспечивает первому игроку положительный выигрыш. Поэтому $v > 0$. Выпишем задачи линейного программирования

$$z_1 + z_2 \rightarrow \min$$

$$2z_2 \geq 1, \quad 3z_1 + z_2 \geq 1, \quad 4z_1 - 3z_2 \geq 1, \quad (I)$$

$$z_1, z_2 \geq 0;$$

$$w_1 + w_2 + w_3 \rightarrow \max$$

$$3w_2 + 4w_3 \leq 1, \quad 2w_1 + w_2 - 3w_3 \leq 1, \quad (II)$$

$$w_1, w_2, w_3 \geq 0.$$

Используя графические построения на плоскости, нетрудно найти, что $z^0 = (5/8, 1/2)$ — оптимальное решение задачи (I). Отсюда

$$v = 1/(z_1^0 + z_2^0) = 8/9, \quad p^0 = vz^0 = (5/9, 4/9).$$

Найдем оптимальное решение w^0 задачи (II). Поскольку $z_1^0, z_2^0 > 0$ и $3z_1^0 + z_2^0 > 1$, по свойству дополняющей нежесткости

$$3w_2^0 + 4w_3^0 = 1, \quad 2w_1^0 + w_2^0 - 3w_3^0 = 1, \quad w_2^0 = 0.$$

Поэтому $w^0 = (7/8, 0, 1/4)$, $q^0 = vw^0 = (7/9, 0, 2/9)$.

IV. *Необходимые условия для крайних оптимальных смешанных стратегий.*

Здесь рассматривается комбинаторного типа алгоритм решения игры, основанный на переборе подматриц матрицы A .

Определение. Пусть Z — выпуклое множество евклидова пространства. Точка $z^0 \in Z$ называется *крайней точкой* множества Z , если не существует таких точек $z' \neq z'' \in Z$ и такого числа $0 < \lambda < 1$, что $z^0 = \lambda z' + (1 - \lambda)z''$.

Другими словами, крайняя точка выпуклого множества Z не является внутренней точкой никакого отрезка, соединяющего две точки этого множества. Нетрудно видеть, что крайняя точка не может быть внутренней точкой множества Z . Однако не всякая граничная точка множества Z является крайней точкой этого множества. Например, у квадрата крайними точками являются только его вершины.

Упражнение 5.4. Пусть Z — выпуклый компакт евклидова пространства и $z^0 \in \operatorname{Argmax}_{z \in Z} |z|^2$. Докажите, что z^0 — крайняя точка множества Z .

Упражнение 5.5. Пусть $h(z)$ — линейная функция, определенная на выпуклом компакте Z евклидова пространства. Докажите, что $h(z)$ достигает максимума в некоторой крайней точке множества Z .

Если множество Z — многогранник, то его крайние точки называются *вершинами*. Вернемся к игре с матрицей A и рассмотрим множество оптимальных смешанных стратегий первого игрока

$$P^0 = \{p^0 \in P \mid \sum_{i=1}^m p_i^0 a_{ij} \geq v, \quad j = 1, \dots, n\},$$

где v — значение матричной игры. Нетрудно видеть, что P^0 — многогранник евклидова пространства.

Определение. *Крайней* оптимальной смешанной стратегией первого игрока будем называть вершину многогранника P^0 .

Множество оптимальных смешанных стратегий второго игрока

$$Q^0 = \{q^0 \in Q \mid \sum_{j=1}^n a_{ij}q_j^0 \leq v, \quad i = 1, \dots, m\}$$

также является многогранником и его вершины — крайние оптимальные смешанные стратегии.

Теорема 5.2. Пусть в игре с матрицей $A = (a_{ij})_{m \times n}$ значение $v \neq 0$. Тогда для любой пары p^0, q^0 крайних оптимальных смешанных стратегий игроков найдется такая невырожденная подматрица $\bar{A} = (a_{i_l j_t})_{k \times k}$ матрицы A , что выполнены условия

$$\sum_{l=1}^k p_{i_l}^0 a_{i_l j_t} = v, \quad t = 1, \dots, k, \quad \sum_{l=1}^k p_{i_l}^0 = 1, \quad (5.3)$$

$$\sum_{t=1}^k a_{i_l j_t} q_{j_t}^0 = v, \quad l = 1, \dots, k, \quad \sum_{t=1}^k q_{j_t}^0 = 1. \quad (5.4)$$

Доказательство. Определим следующие множества чистых стратегий игроков:

$$I_1 = \{i \mid p_i^0 > 0\}, \quad I_2 = \{i \mid \sum_{j=1}^n a_{ij}q_j^0 = v\},$$

$$J_1 = \{j \mid q_j^0 > 0\}, \quad J_2 = \{j \mid \sum_{i=1}^m p_i^0 a_{ij} = v\}.$$

Из свойства дополняющей нежесткости (теорема 4.3') следует, что $I_1 \subset I_2$, $J_1 \subset J_2$. Без потери общности будем считать, что

$$I_1 = \{1, \dots, r\}, \quad I_2 = \{1, \dots, d\}, \quad J_1 = \{1, \dots, s\}, \quad J_2 = \{1, \dots, h\},$$

где $r \leq d$ и $s \leq h$. Этого всегда можно добиться подходящей перестановкой строк и столбцов матрицы A .

Рассмотрим подматрицу $\tilde{A} = (a_{ij})_{d \times h}$ матрицы A . Докажем, что первые r строк матрицы $\tilde{A}$ линейно независимы. Предположим противное. Тогда найдутся такие числа α_i , $i = 1, \dots, r$, не все равные нулю, что

$$\sum_{i=1}^r \alpha_i a_{ij} = 0, \quad j = 1, \dots, h. \quad (5.5)$$

Покажем, что при этом

$$\sum_{i=1}^r \alpha_i = 0. \quad (5.6)$$

Действительно, из (5.5) и из определения множества I_2 следует, что

$$0 = \sum_{j=1}^h \left(\sum_{i=1}^r \alpha_i a_{ij} \right) q_j^0 = \sum_{i=1}^r \alpha_i \left(\sum_{j=1}^h a_{ij} q_j^0 \right) = v \sum_{i=1}^r \alpha_i.$$

Поскольку $v \neq 0$, отсюда следует (5.6). Чтобы придти к противоречию, рассмотрим ненулевой вектор $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_r, 0, \dots, 0) \in E^m$ и при $\varepsilon \neq 0$ определим вектор $p^\varepsilon = p^0 + \varepsilon \alpha$. Из (5.6) следует, что сумма компонент вектора p^ε равна единице и при достаточно малом ε эти компоненты можно сделать неотрицательными. Таким образом, при малом ε вектор p^ε является смешанной стратегией первого игрока. Покажем, что при достаточно малом ε стратегия p^ε оптимальна. Действительно, используя (5.5) и определение множества J_2 , при малом ε получим

$$A(p^\varepsilon, j) = \sum_{i=1}^m p_i^\varepsilon a_{ij} = \sum_{i=1}^m p_i^0 a_{ij} + \varepsilon \sum_{i=1}^r \alpha_i a_{ij} \begin{cases} = v, & j=1, \dots, h, \\ > v, & j > h. \end{cases}$$

Следовательно, смешанная стратегия p^ε при малых ε оптимальна. Наконец, $p^0 = (p^\varepsilon + p^{-\varepsilon})/2$, что противоречит определению стратегии p^0 .

Аналогично доказывается, что первые s столбцов матрицы $\tilde{A}$ линейно независимы. Обозначим через k ранг матрицы $\tilde{A}$. Из доказанного вытекает, что $k \geq \max[r, s]$. Без потери общности можно считать базисными первые k строк и первые k столбцов матрицы $\tilde{A}$. На их пересечении стоит невырожденная подматрица $\bar{A} = (a_{ij})_{k \times k}$. Для этой подматрицы справедливы равенства

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^k p_i^0 a_{ij} &= v, \quad j = 1, \dots, k, & \sum_{i=1}^k p_i^0 &= 1, \\ \sum_{j=1}^k a_{ij} q_j^0 &= v, \quad i = 1, \dots, k, & \sum_{j=1}^k q_j^0 &= 1, \end{aligned}$$

которые представляют собой системы (5.3) и (5.4), если вернуться к исходной нумерации строк и столбцов. ■

Упражнение 5.6. Докажите, что условия (5.3) и (5.4) достаточны для того, чтобы оптимальные смешанные стратегии p^0 и q^0 были крайними оптимальными.

Покажем, что система $k + 1$ линейных уравнений (5.3) относительно $k + 1$ неизвестных $p_{i_l}^0$, $l = 1, \dots, k$, v либо не имеет решения, либо имеет единственное решение. Действительно, расширенная матрица системы (5.3) имеет вид

$$\left(\begin{array}{cccc|c} a_{i_1 j_1} & \cdots & a_{i_k j_1} & -1 & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & -1 & 0 \\ a_{i_1 j_k} & \cdots & a_{i_k j_k} & -1 & 0 \\ 1 & \cdots & 1 & 0 & 1 \end{array} \right).$$

Нетрудно видеть, что ее ранг равен $k + 1$. Если система (5.3) имеет решение, то по теореме Кренекера-Капелли ранг матрицы системы также равен $k + 1$ и она — невырожденная. Отсюда следует единственность решения системы (5.3).

Выпишем в последнем случае решения систем (5.3) и (5.4) в явном виде. Для этого введем векторы

$$\bar{p} = (p_{i_l}^0, l = 1, \dots, k), \bar{q} = (q_{j_t}^0, t = 1, \dots, k), e = (1, \dots, 1) \in E^k$$

и запишем систему (5.3) в матричных обозначениях

$$\bar{p}\bar{A} = ve, \quad \langle \bar{p}, e \rangle = 1.$$

Умножая первое равенство справа на матрицу $(\bar{A})^{-1}$, выразим вектор $\bar{p}$ через v : $\bar{p} = v e (\bar{A})^{-1}$. Подставляя это выражение в уравнение $\langle \bar{p}, e \rangle = 1$, получим

$$\bar{p} = \frac{e(\bar{A})^{-1}}{\langle e(\bar{A})^{-1}, e \rangle}, \quad v = \frac{1}{\langle e(\bar{A})^{-1}, e \rangle}.$$

Аналогично из системы (5.4) находится

$$\bar{q} = \frac{(\bar{A})^{-1}e}{\langle (\bar{A})^{-1}e, e \rangle}.$$

Упражнение 5.7. Приведите пример 2×2 -матрицы $\bar{A}$, для которой система (5.3) не имеет решения.

Рассмотрим теперь алгоритм решения матричной игры. Перебираем все невырожденные $k \times k$ -подматрицы $\bar{A}$ матрицы A , начиная с $k = 2$.

Для каждой подматрицы $\bar{A}$ решаем системы уравнений (5.3) и (5.4). Если решения не существует или некоторые компоненты

$$p_{i_l}^0, \quad l = 1, \dots, k, \quad q_{j_t}^0, \quad t = 1, \dots, k$$

отрицательны, то переходим к следующей подматрице $\bar{A}$. Пусть указанные компоненты решений неотрицательны. Тогда определим смешанные стратегии

$$p^0 : p_i^0 = \begin{cases} p_{i_l}^0, & i = i_l, \\ 0, & i \neq i_l; \end{cases} \quad q^0 : q_j^0 = \begin{cases} q_{j_t}^0, & j = j_t, \\ 0, & j \neq j_t. \end{cases}$$

Теперь для тройки (p^0, q^0, v) необходимо проверить условие (*) теоремы 4.1'. Если оно выполнено, то искомое решение (p^0, q^0, v) найдено. В противном случае переходим к следующей подматрице $\bar{A}$.

Пример 5.4. Рассмотрим матрицу вида

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Здесь нет слабо доминируемых строк (даже никакими выпуклыми комбинациями — докажите!) и слабо доминирующих столбцов. Если применить указанный выше алгоритм, то подматрица

$$\bar{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{15} \\ a_{41} & a_{45} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

даст решение в смешанных стратегиях

$$p^0 = (1/2, 0, 0, 1/2), \quad q^0 = (1/2, 0, 0, 0, 1/2), \quad v = 1/2.$$

V. Метод Брауна.

В этом параграфе мы рассмотрим итерационный метод приближенного решения игры с матрицей A . Пусть задано число $\varepsilon > 0$. Требуется найти значение игры с точностью до величины ε , а также ε -максиминную и ε -минимаксную смешанные стратегии игроков.

Метод Брауна состоит в многократном фиктивном разыгрывании матричной игры, при котором игроки по определенным правилам выбирают свои чистые стратегии. Пусть за k повторений игры первый игрок r_i

раз выбрал стратегию i , $i = 1, \dots, m$, а второй l_j раз выбрал стратегию j , $j = 1, \dots, n$. Векторы частот выбора чистых стратегий

$$p(k) = \left(\frac{r_1}{k}, \dots, \frac{r_m}{k} \right), \quad q(k) = \left(\frac{l_1}{k}, \dots, \frac{l_n}{k} \right)$$

являются смешанными стратегиями игроков.

Определим итерационный процесс Брауна.

Шаг 1. Игроки выбирают произвольно стратегии i_1 и j_1 .

Пусть за k повторений игры первый игрок выбрал стратегии $i_1, \dots, i_k$, а второй — стратегии $j_1, \dots, j_k$. При этом $p(k)$ и $q(k)$ — соответствующие векторы частот.

Шаг $k + 1$. Игроки выбирают стратегии i_{k+1} и j_{k+1} из условий

$$A(i_{k+1}, q(k)) = \max_{1 \leq i \leq m} A(i, q(k)) = v_1(k),$$

$$A(p(k), j_{k+1}) = \min_{1 \leq j \leq n} A(p(k), j) = v_2(k).$$

Каждый игрок выбирает свою чистую стратегию как наилучший ответ на соответствующий вектор частот партнера. Если наилучших ответов несколько, то выбирается любой из них.

Покажем, что $v_1(k)$ и $v_2(k)$ — оценки для значения v матричной игры:

$$v_2(k) \leq v \leq v_1(k), \quad k = 1, 2, \dots \quad (5.7)$$

Действительно, используя следствие теоремы 4.2', получим

$$\begin{aligned} v_2(k) &= \min_{1 \leq j \leq n} A(p(k), j) \leq \max_{p \in P} \min_{1 \leq j \leq n} A(p, j) = v = \\ &= \min_{q \in Q} \max_{1 \leq i \leq m} A(i, q) \leq \max_{1 \leq i \leq m} A(i, q(k)) = v_1(k). \end{aligned}$$

Для доказательства сходимости последовательностей $\{v_1(k)\}$, $\{v_2(k)\}$ к значению игры v нам потребуется обобщенный итерационный процесс.

Пусть $c(0) \in E^m$, $d(0) \in E^n$ — два вектора, удовлетворяющие условию $\max_{1 \leq i \leq m} c_i(0) = \min_{1 \leq j \leq n} d_j(0)$. Возьмем

$$i_1 \in \text{Arg} \max_{1 \leq i \leq m} c_i(0), \quad j_1 \in \text{Arg} \min_{1 \leq j \leq n} d_j(0).$$

Пусть определены стратегии $i_1, \dots, i_k, j_1, \dots, j_k$ и векторы $c(0), c(1), \dots, c(k), d(0), d(1), \dots, d(k)$. Возьмем

$$i_{k+1} \in \text{Arg} \max_{1 \leq i \leq m} c_i(k), \quad j_{k+1} \in \text{Arg} \min_{1 \leq j \leq n} d_j(k)$$

и положим для всех $i = 1, \dots, m, j = 1, \dots, n$

$$c_i(k+1) = c_i(k) + a_{ij_k}, \quad d_j(k+1) = d_j(k) + a_{i_k j}.$$

Таким образом, вектор $c(k+1)$ есть сумма вектора $c(0)$ и столбцов матрицы A с номерами $j_1, \dots, j_k$. Аналогично, вектор $d(k+1)$ есть сумма вектора $d(0)$ и строк матрицы A с номерами $i_1, \dots, i_k$. Нетрудно видеть, что

$$c_i(k) = c_i(0) + \sum_{t=1}^k a_{ij_t} = c_i(0) + \sum_{j=1}^n a_{ij} l_j = c_i(0) + kA(i, q(k)),$$

$$d_j(k) = d_j(0) + kA(p(k), j).$$

При нулевых векторах $c(0)$ и $d(0)$ построенный итерационный процесс совпадает с процессом Брауна. Поскольку множества $\text{Arg} \max_{1 \leq i \leq m} c_i(k)$ и $\text{Arg} \min_{1 \leq j \leq n} d_j(k)$ могут содержать более одного элемента, последовательности $\{c(k)\}, \{d(k)\}$ определяются в ходе итерационного процесса не однозначно.

Определим, как и ранее, последовательности величин

$$v_1(k) = \max_{1 \leq i \leq m} \frac{c_i(k)}{k}, \quad v_2(k) = \min_{1 \leq j \leq n} \frac{d_j(k)}{k}, \quad k = 1, 2, \dots$$

Далее будет доказана их сходимость к значению игры v для любых векторов $c(0), d(0)$.

Из неравенств (см. доказательство неравенства (5.7))

$$\max_{1 \leq i \leq m} A(i, q(k)) \geq v \geq \min_{1 \leq j \leq n} A(p(k), j), \quad k = 1, 2, \dots,$$

следует, что

$$\lim_{k \rightarrow \infty} v_1(k) = \lim_{k \rightarrow \infty} \max_{1 \leq i \leq m} \left[\frac{c_i(0)}{k} + A(i, q(k)) \right] \geq v \geq$$

$$\geq \overline{\lim}_{k \rightarrow \infty} \min_{1 \leq j \leq n} \left[\frac{d_j(0)}{k} + A(p(k), j) \right] = \overline{\lim}_{k \rightarrow \infty} v_2(k).$$

Отсюда

$$\lim_{k \rightarrow \infty} (v_1(k) - v_2(k)) \geq 0. \quad (5.8)$$

Покажем, что

$$\overline{\lim}_{k \rightarrow \infty} (v_1(k) - v_2(k)) \leq 0. \quad (5.9)$$

Будем использовать обозначение

$$\Delta(k) = \max_{1 \leq i \leq m} c_i(k) - \min_{1 \leq j \leq n} d_j(k).$$

С помощью него условие $\max_{1 \leq i \leq m} c_i(0) = \min_{1 \leq j \leq n} d_j(0)$ можно записать в виде $\Delta(0) = 0$.

Определение. Будем говорить, что i -ая строка (j -й столбец) матрицы A существенна (существенен) на отрезке шагов $[s, s+t]$, если для некоторого шага $t' \in [s, s+t]$ $i_{t'} = i$ ($j_{t'} = j$).

Лемма 5.1. Пусть все строки и столбцы матрицы A существенны на отрезке шагов $[s, s+t]$. Тогда

$$\max_{1 \leq i \leq m} c_i(s+t) - \min_{1 \leq j \leq n} d_j(s+t) \leq 4at, \quad (5.10)$$

где $a = \max_{1 \leq i \leq m} \max_{1 \leq j \leq n} |a_{ij}|$.

Доказательство. Покажем сначала, что в условиях леммы справедливы неравенства

$$\max_{1 \leq i \leq m} c_i(s+t) - \min_{1 \leq i \leq m} c_i(s+t) \leq 2at, \quad (5.11)$$

$$\max_{1 \leq j \leq n} d_j(s+t) - \min_{1 \leq j \leq n} d_j(s+t) \leq 2at. \quad (5.12)$$

Докажем (5.11). Пусть для l -ой строки выполнено равенство $\min_{1 \leq i \leq m} c_i(s+t) = c_l(s+t)$. Из условия леммы вытекает, что найдется такой номер шага $t' \in [s, s+t]$, что $\max_{1 \leq i \leq m} c_i(t') = c_l(t')$. Тогда

$$\max_{1 \leq i \leq m} c_i(s+t) - \min_{1 \leq i \leq m} c_i(s+t) =$$

$$\begin{aligned}
 &= \max_{1 \leq i \leq m} c_i(s+t) - \max_{1 \leq i \leq m} c_i(t') + c_l(t') - c_l(s+t) \leq \\
 &\leq \max_{1 \leq i \leq m} (c_i(s+t) - c_i(t')) + c_l(t') - c_l(s+t) \leq 2at,
 \end{aligned}$$

поскольку все последние разности на превосходят at . Неравенство (5.12) доказывается аналогично. Покажем также, что справедливо неравенство

$$\min_{1 \leq i \leq m} c_i(s+t) - \max_{1 \leq j \leq n} d_j(s+t) \leq 0. \quad (5.13)$$

Пусть v^T — значение игры с матрицей A^T , транспонированной к A . Тогда

$$\begin{aligned}
 \min_{1 \leq i \leq m} A(i, q(s+t)) &\leq \max_{q \in Q} \min_{1 \leq i \leq m} A(i, q) = v^T = \\
 &= \min_{p \in P} \max_{1 \leq j \leq n} A(p, j) \leq \max_{1 \leq j \leq n} A(p(s+t), j).
 \end{aligned}$$

Отсюда

$$\begin{aligned}
 \min_{1 \leq i \leq m} \left[\frac{c_i(0)}{s+t} + A(i, q(s+t)) \right] &\leq \max_{1 \leq i \leq m} \frac{c_i(0)}{s+t} + \min_{1 \leq i \leq m} A(i, q(s+t)) \leq \\
 &\leq \min_{1 \leq j \leq n} \frac{d_j(0)}{s+t} + \max_{1 \leq j \leq n} A(p(s+t), j) \leq \max_{1 \leq j \leq n} \left[\frac{d_j(0)}{s+t} + A(p(s+t), j) \right]
 \end{aligned}$$

Домножая это неравенство на $s+t$, выводим (5.13). Неравенство (5.10) получается сложением неравенств (5.11)–(5.13). ■

Лемма 5.2. Для произвольной матрицы A и произвольного $\varepsilon > 0$ найдется такой номер шага k_0 , что для любых последовательностей $c(k), d(k)$, $k = 0, 1, \dots$ итерационного процесса $\Delta(k) \leq \varepsilon k$ при $k \geq k_0$.

Доказательство. Утверждение леммы верно для 1×1 -матриц A , поскольку тогда $c(k) = d(k)$ для всех $k \geq 1$. Примем, что лемма верна для всех подматриц матрицы A и докажем, что она верна и для A . Выберем k_1 таким образом, чтобы для любых последовательностей $c^1(k), d^1(k)$, $k = 0, 1, \dots$ итерационного процесса, соответствующего подматрице $A^1 = (a_{ij})_{i \in I, j \in J}$, полученной из A вычеркиванием строки или столбца, было выполнено неравенство

$$\Delta^1(k) \stackrel{\text{def}}{=} \max_{i \in I} c_i^1(k) - \min_{j \in J} d_j^1(k) \leq \frac{1}{2} \varepsilon k, \quad k \geq k_1.$$

Докажем, что если для матрицы A некоторая строка (столбец) несущественна (несущественен) на отрезке $[s, s + k_1]$, то справедливо неравенство

$$\Delta(s + k_1) \leq \Delta(s) + \frac{1}{2}\varepsilon k_1. \quad (5.14)$$

Предположим, например, что подматрица A^1 получается вычеркиванием из A несущественной l -й строки. Положим $I = \{1, \dots, m\} \setminus \{l\}$,

$$d_j^1(0) = d_j(s) + \Delta(s), \quad j = 1, \dots, n, \quad c_i^1(0) = c_i(s), \quad i \in I.$$

Поскольку l -ая строка матрицы A несущественна, $\Delta^1(0) = 0$ и в итерационном процессе можно взять $i_k^1 = i_{s+k}$, $j_k^1 = j_{s+k}$, $k = 1, \dots, k_1$. Следовательно, $d_j^1(k) = d_j(s + k) + \Delta(s)$, $j = 1, \dots, n$, $c^1(k) = (c_i(s + k), i \in I)$, $k = 1, \dots, k_1$. Итерационный процесс для матрицы A^1 можно продолжать и при $k > k_1$.

На основании выбора k_1 $\Delta^1(k_1) \leq \frac{1}{2}\varepsilon k_1$. Поэтому

$$\Delta(s + k_1) = \Delta^1(k_1) + \Delta(s) \leq \Delta(s) + \frac{1}{2}\varepsilon k_1$$

и неравенство (5.14) доказано.

Мы можем теперь показать, что для любых последовательностей $c(k), d(k)$, $k = 0, 1, \dots$, итерационного процесса $\Delta(k) \leq \varepsilon k$ при $k \geq 8ak_1/\varepsilon$.

Рассмотрим целое $k > k_1$ и представим его в виде $k = (\theta + t)k_1$, где $0 \leq \theta < 1$, а $t > 0$ — целое (θk_1 — остаток от деления k на k_1).

Случай 1. Найдется такое целое положительное число $h \leq t$, что все строки и столбцы матрицы A на отрезке $[(\theta + h - 1)k_1, (\theta + h)k_1]$ существенны. Беря наибольшее из таких h , имеем

$$\Delta(k) \leq \Delta((\theta + h)k_1) + \frac{1}{2}\varepsilon(t - h)k_1. \quad (5.15)$$

Это неравенство получено повторным применением неравенства (5.14), поскольку на каждом из отрезков

$$[(\theta + r - 1)k_1, (\theta + r)k_1], \quad r = h + 1, \dots, t,$$

некоторая строка или столбец матрицы A несущественны.

Из леммы 5.1 на основании выбора h имеем

$$\Delta((\theta + h)k_1) \leq 4ak_1. \quad (5.16)$$

Из (5.15) и (5.16) получаем

$$\Delta(k) \leq 4ak_1 + \frac{1}{2}\varepsilon(t-h)k_1 \leq (4a + \frac{1}{2}\varepsilon t)k_1.$$

Случай 2. В каждом отрезке $[(\theta + h - 1)k_1, (\theta + h)k_1]$, $h = 1, \dots, t$, некоторая строка или столбец несущественны. Следовательно, как и при выводе (5.15),

$$\Delta(k) \leq \Delta(\theta k_1) + \frac{1}{2}\varepsilon t k_1 \leq (2a\theta + \frac{1}{2}\varepsilon t)k_1.$$

В обоих случаях, используя неравенство $tk_1 \leq k$, получим $\Delta(k) \leq (4a + \frac{1}{2}\varepsilon t)k_1 \leq 4ak_1 + \frac{1}{2}\varepsilon k \leq \varepsilon k$ при $k \geq 8ak_1/\varepsilon$. ■

Из леммы 5.2 вытекает неравенство (5.9) и сходимость последовательностей $v_1(k), v_2(k)$, $k = 0, 1, \dots$, к значению игры v .

Вернемся к методу Брауна. Сформулируем правило остановки. Пусть задано число $\varepsilon > 0$. Будем останавливаться на шаге k_0 , когда впервые выполнено неравенство

$$v_1(k_0) - v_2(k_0) \leq \varepsilon. \quad (5.17)$$

Из (5.7) и (5.17) следует, что величины $v_1(k_0), v_2(k_0)$ приближают значение v матричной игры с точностью до ε . Покажем, что $p(k_0)$ — ε -максиминная стратегия первого игрока. Действительно,

$$\min_{1 \leq j \leq n} A(p(k_0), j) = v_2(k_0) \geq v - \varepsilon.$$

Аналогично, $q(k_0)$ —

ε -минимаксная стратегия второго игрока.

Теорема 5.3. В методе Брауна $\lim_{k \rightarrow \infty} v_1(k) = \lim_{k \rightarrow \infty} v_2(k) = v$, а любые предельные точки p^0, q^0 последовательностей $\{p(k)\}, \{q(k)\}$ являются оптимальными смешанными стратегиями игроков.

Доказательство. Сходимость последовательностей $\{v_1(k)\}$ и $\{v_2(k)\}$ к значению игры v вытекает из леммы 5.2. Пусть p^0 — любая предельная точка последовательности $\{p(k)\}$. Покажем, что p^0 — оптимальная смешанная стратегия первого игрока. Действительно, поскольку последовательность $\{p(k)\}$ принадлежит компакту P , без потери общности (выделяя соответствующую подпоследовательность) можно считать, что она сходится к p^0 . Тогда

$$\min_{1 \leq j \leq m} A(p(k), j) \geq v - \varepsilon_k, \quad k = 1, 2, \dots,$$

где $\varepsilon_k \rightarrow 0 +$. Переходя в этих неравенствах к пределу при $k \rightarrow \infty$, получим неравенство $\min_{1 \leq j \leq m} A(p^0, j) \geq v$, что означает оптимальность стратегии p^0 . Аналогично доказывается оптимальность для второго игрока любой предельной точки q^0 последовательности $\{q(k)\}$. ■

Оценим скорость сходимости последовательностей $\{v_1(k)\}$ и $\{v_2(k)\}$ к значению игры v .

Пусть A^l , $l \geq 0$ — подматрица, полученная из матрицы A вычеркиванием каких-либо l строк или столбцов, а $\{v_1^l(k)\}$, $\{v_2^l(k)\}$ — последовательности обобщенного итерационного процесса, соответствующего подматрице A^l . Обозначим через k_l число повторений игры, при котором для любой подматрицы A^l и любых начальных векторов $c^l(0), d^l(0)$ выполнено неравенство $v_1^l(k) - v_2^l(k) \leq 2^{-l}\varepsilon \quad \forall k \geq k_l$. Просматривая доказательство леммы 5.2, замечаем, что $k_{m+n-1} = 1$ и $k_0 \geq 8ak_1\varepsilon^{-1}$. Аналогичным неравенством связаны k_l и k_{l+1} : $k_l \geq 2^l 8ak_{l+1}\varepsilon^{-1}$, $l = 0, 1, \dots, m+n-2$. Отсюда

$$\begin{aligned} k_0 &\geq \frac{8a}{\varepsilon} k_1 \geq \left(\frac{8a}{\varepsilon}\right)^2 2k_2 \geq \left(\frac{8a}{\varepsilon}\right)^3 2 \cdot 2^2 k_3 \geq \dots \\ &\geq \left(\frac{8a}{\varepsilon}\right)^{m+n-1} 2^{1+2+\dots+m+n-2} k_{m+n-1} = \left(\frac{8a}{\varepsilon}\right)^{m+n-1} 2^{\frac{(m+n-2)(m+n-1)}{2}}. \end{aligned}$$

Таким образом, при любом $k \geq k_0$ выполнены неравенства

$$v_1(k) - v_2(k) \leq \varepsilon \stackrel{def}{=} 2^{\frac{m+n-2}{2}} 8a \left(\frac{1}{k}\right)^{\frac{1}{m+n-1}}.$$

Итак, полученная оценка скорости сходимости процесса Брауна малоэффективна при больших размерах матрицы A . Практически наблюдаемая скорость сходимости существенно выше.

В заключение рассмотрим модификацию правила остановки по методу Брауна. Положим

$$v_1^*(k) = \min_{1 \leq t \leq k} v_1(t), \quad v_2^*(k) = \max_{1 \leq t \leq k} v_2(t), \quad k = 1, 2, \dots$$

Из неравенств (5.7) следует, что

$$v_2^*(k) \leq v \leq v_1^*(k), \quad k = 1, 2, \dots \quad (5.18)$$

Таким образом, $v_2^*(k), v_1^*(k)$ — наилучшие оценки снизу и сверху для значения игры v за k ее повторений. При заданном $\varepsilon > 0$ будем останавливать процесс на шаге k_0 , когда впервые выполнено неравенство $v_1^*(k_0) - v_2^*(k_0) \leq \varepsilon$. При этом величины $v_1^*(k_0), v_2^*(k_0)$ приближают значение игры v с точностью до ε . Пусть $v_1^*(k_0) = v_1(t_1)$, $v_2^*(k_0) = v_2(t_2)$. Покажем, что $p(t_2)$ — ε -максиминная стратегия первого игрока. Действительно, используя неравенство (5.18) при $k = k_0$, получим

$$\min_{1 \leq j \leq n} A(p(t_2), j) = v_2(t_2) = v_2^*(k_0) \geq v - \varepsilon.$$

Аналогично, $q(t_1)$ — ε -минимаксная стратегия второго игрока.

Пример 5.5. Пусть $\varepsilon = 1/5$, а матрица игры —

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 3 \\ -1 & 3 & -3 \end{pmatrix}.$$

Отметим, что решение игры в смешанных стратегиях имеет вид

$$p^0 = q^0 = (0, 2/3, 1/3), \quad v = 1.$$

Применяя метод Брауна, найдем приближенное значение игры, а также ε -максиминную и ε -минимаксную смешанные стратегии игроков. Вычисления удобно производить в форме таблицы. В каждой ее k -ой строке подчеркнуты наибольшие значения величин $c_i(k)$, $i = 1, 2, 3$ и наименьшие значения величин $d_j(k)$, $j = 1, 2, 3$.

Табл. 5.1

k	i_k	$c_1(\cdot)$	$c_2(\cdot)$	$c_3(\cdot)$	$v_1(\cdot)$	j_k	$d_1(\cdot)$	$d_2(\cdot)$	$d_3(\cdot)$	$v_2(\cdot)$
1	1	<u>2</u>	2	-1	2	1	2	1	<u>0</u>	0
2	1	2	<u>5</u>	-4	5/2	3	4	2	<u>0</u>	0
3	2	2	<u>8</u>	-7	8/3	3	6	<u>2</u>	3	2/3
4	2	3	<u>8</u>	-4	2	2	8	<u>2</u>	6	1/2
5	2	4	<u>8</u>	-1	8/5	2	10	<u>2</u>	9	2/5
6	2	5	<u>8</u>	2	4/3	2	12	<u>2</u>	12	1/3
7	2	6	<u>8</u>	5	8/7	2	14	<u>2</u>	15	2/7
8	2	7	<u>8</u>	<u>8</u>	1	2	16	<u>2</u>	18	1/4
9	3	8	8	<u>11</u>	11/9	2	15	<u>5</u>	15	5/9
10	3	9	8	<u>14</u>	7/5	2	14	<u>8</u>	12	4/5

$$v_1^*(10) = 1, \quad v_2^*(10) = 4/5, \quad t_1 = 8, \quad t_2 = 10, \\ p(10) = (1/5, 3/5, 1/5), \quad q(8) = (1/8, 5/8, 1/4).$$

Упражнение 5.8. Проверить $1/5$ -оптимальность полученных стратегий. Сделать еще 8 шагов по алгоритму и улучшить точность до $\varepsilon = 1/18$.

§ 6. Игры с вогнутой функцией выигрыша

Определение. Антагонистическая игра $\Gamma = \langle X, Y, F(x, y) \rangle$ называется игрой с *вогнутой функцией выигрыша*, если $X \subset E^m$, $Y \subset E^n$ — выпуклые компакты евклидовых пространств, функция $F(x, y)$ непрерывна на $X \times Y$ и при любом $y \in Y$ она вогнута по x .

Игра Γ называется игрой с *выпуклой функцией выигрыша*, если (вместо требования вогнутости) при любом $x \in X$ функция $F(x, y)$ выпукла по y .

Теорема 6.1 (Хелли). В евклидовом пространстве E^m имеется семейство D_α , $\alpha \in \{\alpha\}$ выпуклых компактов, обладающее следующим свойством: для любых $\alpha_1, \dots, \alpha_{m+1}$ $\bigcap_{j=1}^{m+1} D_{\alpha_j} \neq \emptyset$. Тогда

$$\bigcap_{\alpha \in \{\alpha\}} D_\alpha \neq \emptyset.$$

Доказательство теоремы см. в Приложении П2.

Упражнение 6.1. Докажите теорему при $m = 1$.

Теорема 6.2. Для игры Γ с вогнутой функцией выигрыша справедливо равенство

$$\underline{v} = \max_{x \in X} \min_{y \in Y} F(x, y) = \min_{\substack{y^j \in Y \\ j=1, \dots, m+1}} \max_{x \in X} \min_{1 \leq j \leq m+1} F(x, y^j).$$

Доказательство. Обозначим последнюю величину через w . Для любых $y^1, \dots, y^{m+1} \in Y$ справедливо неравенство

$$\max_{x \in X} \min_{1 \leq j \leq m+1} F(x, y^j) \geq \max_{x \in X} \min_{y \in Y} F(x, y) = \underline{v}.$$

Следовательно, $w \geq \underline{v}$. Докажем неравенство $w \leq \underline{v}$. По определению w для любых $y^1, \dots, y^{m+1} \in Y$

$$\max_{x \in X} \min_{1 \leq j \leq m+1} F(x, y^j) \geq w \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \exists x \in X : F(x, y^j) \geq w, \quad j = 1, \dots, m+1.$$

Введем множества $D_y = \{x \in X \mid F(x, y) \geq w\}$, $y \in Y$, представляющие собой выпуклые компакты в E^m . Из последних неравенств вытекает, что $\bigcap_{j=1}^{m+1} D_{y_j} \neq \emptyset$ при любых $y^1, \dots, y^{m+1} \in Y$. Следовательно, выполнены условия теоремы 6.1 и $\bigcap_{y \in Y} D_y \neq \emptyset$, т.е.

$$\exists x \in \bigcap_{y \in Y} D_y \Rightarrow F(x, y) \geq w \quad \forall y \in Y \Rightarrow \min_{y \in Y} F(x, y) \geq w.$$

Отсюда $\underline{v} \geq w \Rightarrow \underline{v} = w$. ■

Положим $Q = \{q \in E^{m+1} \mid \sum_{j=1}^{m+1} q_j = 1, \quad q_j \geq 0, \quad j = 1, \dots, m+1\}$.

Теорема 6.3. Игра Γ с вогнутой функцией выигрыша имеет решение в смешанных стратегиях вида $(x^0, \psi^0, \underline{v})$, где x^0 — максиминная стратегия первого игрока,

$$\psi^0 = \sum_{j=1}^{m+1} q_j^0 I_{\bar{y}_j}, \quad q^0 = (q_1^0, \dots, q_{m+1}^0) \in Q,$$

$$(\bar{y}_j, j = 1, \dots, m+1) \in \text{Arg} \min_{\substack{y^j \in Y \\ j=1, \dots, m+1}} \max_{x \in X} \min_{1 \leq j \leq m+1} F(x, y^j),$$

а q^0 — минимаксная стратегия в задаче

$$\min_{q \in Q} \max_{x \in X} \Phi(x, q), \quad \Phi(x, q) = \sum_{j=1}^{m+1} F(x, \bar{y}^j) q_j.$$

Доказательство. По теореме 6.2 и по выбору

$$\bar{y}_j, j = 1, \dots, m+1, \quad \underline{v} = w = \max_{x \in X} \min_{1 \leq j \leq m+1} F(x, \bar{y}^j).$$

Функция $\Phi(x, q)$ непрерывна, линейна по q и вогнута по x . Следовательно, по теореме 2.3 она имеет седловую точку. Поэтому

$$\begin{aligned} \underline{v} &= \max_{x \in X} \min_{1 \leq j \leq m+1} F(x, \bar{y}^j) = \max_{x \in X} \min_{q \in Q} \Phi(x, q) = \\ &= \min_{q \in Q} \max_{x \in X} \Phi(x, q) = \max_{x \in X} \Phi(x, q^0) = \end{aligned}$$

$$= \max_{x \in X} \sum_{j=1}^{m+1} F(x, \bar{y}^j) q_j^0 = \max_{x \in X} \int_Y F(x, y) d\psi^0(y) = \max_{x \in X} F(x, \psi^0).$$

Отсюда следуют равенства

$$\max_{x \in X} F(x, \psi^0) = \underline{v} = \min_{y \in Y} F(x^0, y)$$

и по теореме 4.1 тройка $(x^0, \psi^0, \underline{v})$ — решение игры в смешанных стратегиях. ■

Замечание. В доказательствах теорем 5.2 и 5.3 выпуклость множества Y не использовалась. Y можно было считать компактом метрического пространства.

Аналогично доказывается следующее утверждение.

Положим $P = \{p \in E^{n+1} \mid \sum_{i=1}^{n+1} p_i = 1, p_i \geq 0, i = 1, \dots, n+1\}$.

Теорема 5.4. Игра Γ с выпуклой функцией выигрыша имеет решение в смешанных стратегиях вида $(\varphi^0, y^0, \bar{v})$, где y^0 — минимаксная стратегия первого игрока,

$$\varphi^0 = \sum_{i=1}^{n+1} p_i^0 I_{\bar{x}_i}, \quad p^0 = (p_i^0, i = 1, \dots, n+1) \in P,$$

$$(\bar{x}_i, i = 1, \dots, n+1) \in \text{Arg} \max_{\substack{x^i \in X \\ i=1, \dots, n+1}} \min_{y \in Y} \max_{1 \leq i \leq n+1} F(x^i, y),$$

а p^0 — максиминная стратегия в задаче

$$\max_{p \in P} \min_{y \in Y} \Phi^1(p, y), \quad \Phi^1(p, y) = \sum_{i=1}^{n+1} p_i F(\bar{x}^i, y).$$

Пример 6.1. Пусть $X = Y = [0, 1]$, $F(x, y) = 1 - (x - y)^2$ — игра с вогнутой функцией выигрыша. Здесь

$$v = \underline{v} = \max_{0 \leq x \leq 1} \min_{0 \leq y \leq 1} [1 - (x - y)^2] = \frac{3}{4}, \quad x^0 = \frac{1}{2}, \quad \psi^0 = q_1^0 I_{\bar{y}^1} + q_2^0 I_{\bar{y}^2},$$

$$q_1^0 + q_2^0 = 1, \quad q_1^0, q_2^0 \geq 0, \quad 0 \leq \bar{y}^1 \leq \bar{y}^2 \leq 1.$$

Найдем величину

$$w = \min_{0 \leq y^1 \leq y^2 \leq 1} \max_{0 \leq x \leq 1} \min[F(x, y^1), F(x, y^2)].$$

При фиксированных y^1, y^2

$$\max_{0 \leq x \leq 1} \min[1 - (x - y^1)^2, 1 - (x - y^2)^2] = 1 - \left(\frac{y^1 - y^2}{2} \right)^2.$$

Отсюда

$$w = \min_{0 \leq y^1 \leq y^2 \leq 1} 1 - \left(\frac{y^1 - y^2}{2} \right)^2 = \frac{3}{4}, \quad \bar{y}^1 = 0, \quad \bar{y}^2 = 1.$$

Найдем теперь q_1^0, q_2^0 , решая задачу

$$\min_{0 \leq q_1 \leq 1} \max_{0 \leq x \leq 1} \Phi(x, q) = \min_{0 \leq q_1 \leq 1} \max_{0 \leq x \leq 1} [(1 - x^2)q_1 + (1 - (x - 1)^2)q_2].$$

Имеем $\Phi'_x(x, q) = -2xq_1 - 2(x - 1)q_2 = 0$. Отсюда стратегия $\bar{x} = q_2$ максимизирует функцию $\Phi(x, q)$ по переменной x . Следовательно,

$$\max_{0 \leq x \leq 1} \Phi(x, q) = 1 - q_1(1 - q_1) \Rightarrow q_1^0 = q_2^0 = \frac{1}{2} \Rightarrow \psi^0 = \frac{1}{2}I_0 + \frac{1}{2}I_1.$$

Отметим, что полученное решение игры можно было предугадать и проверить лишь условие (*).

Упражнение 6.2. Решите игру с вогнутой функцией выигрыша

$$X = \{(x_1, x_2) \mid 0 \leq x_i \leq 1, i = 1, 2\}, \quad Y = X,$$

$$F(x_1, x_2, y_1, y_2) = 1 - (x_1 - y_1)^2 - (x_2 - y_2)^2.$$

Широкий класс игр с выпуклыми функциями выигрыша образуют *статистические игры*. Дадим необходимые определения.

Статистик наблюдает реализации z_i независимых, одинаково распределенных случайных величин $\mathbf{Z}_i$, $i = 1, \dots, n$, имеющих плотность распределения $g(z_i|x)$, зависящую от вектора неизвестных параметров $x \in X$. Здесь X — выпуклое множество евклидова пространства. Пусть $\mathbf{Z} =$

$(\mathbf{Z}_1, \dots, \mathbf{Z}_n)$ — векторная случайная величина, принимающая значения $z = (z_1, \dots, z_n) \in Z$ и имеющая плотность распределения $\bar{g}(z|x) = \prod_{i=1}^n g(z_i|x)$.

Статистик оценивает вектор x , используя *решающую функцию* $y : Z \rightarrow A = X$. Величина $a = y(z)$ называется *оценкой* вектора x из множества оценок A . Ошибка в определении вектора x задается с помощью *функции потерь* $L(x, a)$. Математическое ожидание этой функции

$$F(x, y) \stackrel{\text{def}}{=} E[L(x, y(\mathbf{Z}))] = \int_Z L(x, y(z)) \bar{g}(z|x) dz$$

называется *функцией риска*.

Статистик (второй игрок) использует решающее правило (стратегию) y из некоторого множества Y и стремится минимизировать функцию риска. Природа (первый игрок) стремится ее максимизировать, выбирая $x \in X$. Построенная антагонистическая игра $\Gamma = \langle X, Y, F(x, y) \rangle$ называется статистической.

Пусть оцениваемый вектор является случайной величиной $\mathbf{X}$, принимающей значения $x \in X$ и имеющей плотность распределения f . С игровой точки зрения это означает, что природа использует смешанные стратегии $f \in \{f\}$.

Обычно используется следующий метод решения статистической игры. Сначала строится уравнивающая риск решающая функция статистика $y^0 : F(x, y^0) \equiv \text{const}$ на X . Затем подбирается стратегия природы — плотность распределения f^0 , относительно которой решающая функция y^0 является *байесовской*, т.е. минимизирующей функцию риска: $F(f^0, y^0) = \min_{y \in Y} F(f^0, y)$. Тогда в соответствии с результатом упражнения 4.3 f^0, y^0 — оптимальные стратегии природы и статистика. Плотность распределения f^0 называется *априорной*.

Покажем, что для плотности распределения f^0 при квадратичной функции потерь $L(x, a) = |x - a|^2$ байесовская решающая функция y^0 определяется однозначно. Определим *апостериорную* плотность распределения $f^0(x|z) = \bar{g}(z|x)f^0(x)/p(z)$, где

$$p(z) = \int_X \bar{g}(z|x) f^0(x) dx.$$

Утверждение 6.1. Пусть y^0 — байесовская решающая функция относительно плотности распределения f^0 . Тогда при квадратичной функции

потерь

$$y^0(z) = E[\mathbf{X}|z] \stackrel{def}{=} \int_X x f^0(x|z) dx \quad \forall z \in Z. \quad (6.1)$$

Доказательство. Поскольку множество X выпукло, можно показать, что $y^0(z) \in A = X \quad \forall z \in Z$. Для произвольной решающей функции $y \in Y$

$$\begin{aligned} F(f^0, y) &= \int_X \int_Z L(x, y(z)) \bar{g}(z|x) dz f^0(x) dx = \\ &= \int_Z \left[\int_X |x - y(z)|^2 f^0(x|z) dx \right] p(z) dz. \end{aligned}$$

При фиксированном $z \in Z$ внутренний интеграл является квадратичной функцией от $a = y(z)$. Поэтому его минимум достигается при $a^0 = y^0(z)$ из (6.1). ■

В дальнейшем будем считать, что функция распределения g каждой случайной величины $\mathbf{Z}_i$ зависит только от одного неизвестного параметра — математического ожидания x . Дисперсию случайной величины $\mathbf{Z}_i$ обозначим через $D(x)$. Для математического ожидания часто используется *несмещенная* оценка $\bar{z} = \sum_{i=1}^n z_i/n$. Свойство несмещенности означает, что

$$E\bar{\mathbf{Z}} = \frac{E \sum_{i=1}^n \mathbf{Z}_i}{n} = x.$$

Поэтому естественно рассмотреть множество решающих правил вида

$$Y = \{y \mid y(z) = c_1 \bar{z} + c_2, \quad c_1, c_2 \geq 0\}.$$

Функцию потерь будем предполагать квадратичной:
 $L(x, a) = (x - a)^2$. Положим $c = (c_1, c_2)$. Тогда функция риска

$$\begin{aligned} \bar{F}(x, c) &\stackrel{def}{=} F(x, y) = E(x - c_1 \bar{\mathbf{Z}} - c_2)^2 = c_1^2 E\bar{\mathbf{Z}}^2 + 2c_1(c_2 - x)E\bar{\mathbf{Z}} + (x - c_2)^2 = \\ &= c_1^2 \left(\frac{D(x)}{n} + x^2 \right) + 2c_1(c_2 - x)x + (x - c_2)^2 = c_1^2 \frac{D(x)}{n} + (c_1 x - x + c_2)^2 \end{aligned}$$

выпукла по c .

Рассмотрим конкретные примеры статистических игр.

Пример 6.2. Пусть случайные величины $\mathbf{Z}_i$ имеют *биномиальное* распределение:

$$g(z_i|x) = \begin{cases} x, & z_i = 1, \\ 1 - x, & z_i = 0; \end{cases}$$

$$D(x) = x(1 - x), \quad x \in X = [0, 1].$$

Положим $k = \sum_{i=1}^n z_i = n\bar{z}$. Тогда

$$\bar{g}(z|x) = x^k(1 - x)^{n-k},$$

$$\bar{F}(x, c) = c_1^2 \left(\frac{x(1-x)}{n} + x^2 \right) - 2c_1x^2 + 2c_1c_2x + x^2 - 2c_2x + c_2^2 =$$

$$= \left(\frac{n-1}{n}c_1^2 - 2c_1 + 1 \right) x^2 + \left(\frac{c_1^2}{n} + 2c_1c_2 - 2c_2 \right) x + c_2^2.$$

Найдем выравнивающую решающую функцию $y^0(z) = c_1^0\bar{z} + c_2^0$. Для этого решим систему уравнений

$$\frac{n-1}{n}c_1^2 - 2c_1 + 1 = 0, \quad \frac{c_1^2}{n} + 2c_1c_2 - 2c_2 = 0 \quad (6.2)$$

и получим

$$c_1^0 = \frac{\sqrt{n}}{\sqrt{n} + 1}, \quad c_2^0 = \frac{1}{2(\sqrt{n} + 1)}.$$

Второе решение

$$c_1 = \frac{\sqrt{n}}{\sqrt{n} - 1}, \quad c_2 = \frac{1}{2(\sqrt{n} - 1)}$$

отбросим.

Рассмотрим на отрезке $X = [0, 1]$ *бета-распределение* с плотностью

$$f^0(x) = \frac{x^{p-1}(1-x)^{q-1}}{B(p, q)},$$

где $B(p, q) = \int_0^1 x_1^{p-1}(1-x_1)^{q-1}dx_1$ — *бета-функция*, а параметры p и q положительны. Интегрируя по частям, нетрудно вывести, что

$$EX = \int_0^1 x f^0(x) dx = \frac{p}{p+q}.$$

Покажем, что при подходящем выборе параметров p и q решающая функция y^0 является байесовской относительно бета-распределения f^0 . Найдем

$$\begin{aligned} p(z) &= \int_0^1 \bar{g}(z|x) f^0(x) dx = \\ &= \int_0^1 \frac{x^k (1-x)^{n-k} x^{p-1} (1-x)^{q-1}}{B(p, q)} dx = \frac{B(k+p, n+q-k)}{B(p, q)}. \end{aligned}$$

Отсюда условная плотность

$$f^0(x|z) = \frac{\bar{g}(z|x) f^0(x)}{p(z)} = \frac{x^{k+p-1} (1-x)^{n-k+q-1}}{B(k+p, n+q-k)}$$

задает бета-распределение с параметрами $p^* = k+p$ и $q^* = n+q-k$. Байесовская решающая функция

$$E[X|z] = \int_X x f^0(x|z) dx = \frac{p^*}{p^* + q^*} = \frac{k+p}{n+p+q} = \frac{n\bar{z} + p}{n+p+q}$$

совпадает с выравнивающей функцией y^0 при $p = q = \frac{\sqrt{n}}{2}$.

Итак, доказано, что для оценки параметра биномиального распределения

$$y^0(z) = \frac{\sqrt{n}\bar{z} + 0.5}{\sqrt{n} + 1}$$

— минимаксная решающая функция.

Интересно сравнить значения функции риска при минимаксной y^0 и классической $\bar{z}$ решающих функциях. Имеем

$$F(x, y^0) \equiv \bar{v} = \frac{1}{4(1 + \sqrt{n})^2}, \quad F(x, \bar{z}) = \frac{x(1-x)}{n}.$$

Неравенство $F(x, y^0) < F(x, \bar{z})$ выполнено лишь при

$$\left| x - \frac{1}{2} \right| < \varepsilon \stackrel{\text{def}}{=} \frac{\sqrt{1 + 2\sqrt{n}}}{2(1 + \sqrt{n})}.$$

Если n велико, то минимаксная оценка лучше классической лишь при значениях x , принадлежащих малой ε -окрестности точки $1/2$. Однако,

при малых n интервал значений x , где минимаксная оценка лучше, значительно увеличивается.

Во многих задачах не существует выравнивающей решающей функции и указанный выше метод решения статистической игры использовать нельзя. В таких случаях минимаксную стратегию статистика y^0 можно найти, решая непосредственно задачу

$$\bar{v} = \min_{y \in Y} \max_{x \in X} F(x, y) = \max_{x \in X} F(x, y^0).$$

Пример 6.3. Страховая компания осуществляет страхование гражданской ответственности автомобилистов. Водители обычно разбиваются на группы по нескольким признакам (профессия, стаж вождения и т.п.). Рассмотрим некоторую группу, состоящую из n водителей. Требуется оценить среднее число x дорожных происшествий в расчете на одного водителя, которые произойдут в течение ближайшего года, исходя из информации о происшествиях прошедшего года. Задачу можно свести к решению статистической игры.

Пусть число дорожных происшествий с водителем i является случайной величиной $\mathbf{Z}_i$, распределенной по закону Пуассона

$$g(z_i|x) = \frac{x^{z_i} e^{-x}}{z_i!}, \quad z_i \in Z = \{0, 1, 2, \dots\}.$$

Здесь $E\mathbf{Z}_i = x$, $Var\mathbf{Z}_i = D(x) = x$, $x \in X = [0, x^*]$, где x^* — верхняя грань возможных значений параметра x . Имеем

$$\bar{F}(x, c) = c_1^2 \frac{D(x)}{n} + (c_1 x - x + c_2)^2 = c_1^2 \frac{x}{n} + (c_1 x - x + c_2)^2.$$

Нетрудно проверить, что не существует выравнивающей решающей функции.

Обозначим $M(c) = \sup_{0 \leq x \leq x^*} F(x, c)$ и найдем

$$\bar{v} = \min_{c_1, c_2 \geq 0} M(c) = M(c^0).$$

Поскольку $\bar{F}(x, c)$ выпукла по x , $M(c) = \max[\bar{F}(0, c), \bar{F}(x^*, c)]$.

Утверждение 6.2. Для минимаксной стратегии $y^0(z) = c_1^0 \bar{z} + c_2^0$ выполнено условие $\bar{F}(0, c^0) = \bar{F}(x^*, c^0)$ или

$$c_2^0 = \frac{\frac{1}{n}(c_1^0)^2 + (c_1^0 - 1)^2 x^*}{2(1 - c_1^0)}.$$

Доказательство. Допустим, что $\bar{F}(x^*, c^0) > \bar{F}(0, c^0)$. Если $c_1^0 > 0$, то при малом $\varepsilon > 0$

$$\begin{aligned}\bar{F}(x^*, c^0) &= \frac{(c_1^0)^2 x^*}{n} + (c_1^0 x^* + c_2^0 - x^*)^2 > \bar{F}(x^*, c_1^0 - \varepsilon, c_2^0 + \varepsilon x^*) = \\ &= \frac{(c_1^0 - \varepsilon)^2 x^*}{n} + (c_1^0 x^* + c_2^0 - x^*)^2 > \bar{F}(0, c_1^0 - \varepsilon, c_2^0 + \varepsilon x^*) = (c_2^0 + \varepsilon x^*)^2\end{aligned}$$

и $M(c_1^0 - \varepsilon, c_2^0 + \varepsilon x^*) < M(c^0)$ (противоречие).

Если $c_1^0 = 0$, то

$$\bar{F}(x^*, c^0) = (c_2^0 - x^*)^2 > \bar{F}(0, c^0) = (c_2^0)^2.$$

Отсюда следует, что $c_2^0 < x^*/2$. Увеличивая c_2^0 на малое $\varepsilon > 0$, придем к противоречию. Случай $\bar{F}(x^*, c^0) < \bar{F}(0, c^0)$ разбирается аналогично. ■

Из доказанного утверждения вытекает, что

$$\min_{c_1, c_2 \geq 0} M(c) = \min_{0 \leq c_1 < 1} \left(\frac{\frac{1}{n}(c_1)^2 + (c_1 - 1)^2 x^*}{2(1 - c_1)} \right)^2.$$

Последний минимум достигается при

$$c_1^0 = \frac{x^* n + 1 - \sqrt{x^* n + 1}}{x^* n + 1} \Rightarrow c_2^0 = \frac{\sqrt{x^* n + 1} - 1}{n}.$$

Таким образом, при оценке параметра распределения Пуассона

$$y^0(z) = \frac{x^* n + 1 - \sqrt{x^* n + 1}}{x^* n + 1} \bar{z} + \frac{\sqrt{x^* n + 1} - 1}{n}$$

— минимаксная стратегия статистика. В частном случае при $n = 30$, $x^* = 0.5$, $\bar{z} = 0.2$ получаем оценку $y^0(z) = 0.16$.

Упражнение 6.3. Пусть все случайные величины $\mathbf{Z}_i$ имеют нормальное распределение с плотностью

$$g(z_i|x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(z_i-x)^2}{2\sigma^2}}, \quad z_i \in E^1,$$

где дисперсия σ^2 статистику известна, а математическое ожидание x — нет: $x \in X = E^1$.

Показать, что классическая решающая функция $\bar{z}$ является выравнивающей и минимаксной стратегией статистика.

§ 7. Исследование игровых моделей

Модель "нападение-оборона".

Имеется n обороняемых пунктов с номерами $i = 1, \dots, n$ возможного прорыва средств нападения. Пусть A и B — количества средств нападения и обороны. Эти средства предполагаются бесконечно-делимыми. Стратегия первого игрока (нападения) состоит в распределении своих средств по пунктам в соответствии с вектором

$$x = (x_1, \dots, x_n) \in X = \{x \mid \sum_{i=1}^n x_i = A, \quad x_i \geq 0, \quad i = 1, \dots, n\}.$$

Второй игрок (оборона) использует аналогичную стратегию

$$y = (y_1, \dots, y_n) \in Y = \{y \mid \sum_{i=1}^n y_i = B, \quad y_i \geq 0, \quad i = 1, \dots, n\}.$$

Пусть μ_i — количество средств нападения, которое может уничтожить одна единица средств обороны на i -ом пункте. Если $x_i > \mu_i y_i$, то через i -й пункт прорывается $x_i - \mu_i y_i$ средств нападения. Если $x_i \leq \mu_i y_i$, то через этот пункт нападение не прорвется. Объединяя оба случая, находим формулу для количества средств нападения, прорвавшегося через i -й пункт: $\max[x_i - \mu_i y_i, 0]$. Определим функцию выигрыша первого игрока

$$F(x, y) = \sum_{i=1}^n \max[x_i - \mu_i y_i, 0]$$

— общее количество средств нападения, прорвавшееся через все пункты.

Заметим, что функция $F(x, y)$ выпукла по y . По теореме 6.4 значение игры $v = \bar{v}$ и минимаксная стратегия y^0 обороны оптимальна. Займемся исследованием этой игры в чистых и смешанных стратегиях. Без потери общности предположим, что коэффициенты эффективности обороны μ_i упорядочены: $\mu_1 \geq \mu_2 \geq \dots \geq \mu_n$ и n -й пункт обороны является слабейшим.

а) Покажем, что

$$\underline{v} = \max_{x \in X} \min_{y \in Y} F(x, y) = \max[A - \mu_n B, 0], \quad x^{(n)} = (0, \dots, 0, A)$$

— максиминная стратегия нападения, состоящая в нанесении "концентрированного" удара по слабейшему пункту.

Для любой стратегии нападения x определим вспомогательную стратегию обороны $\bar{y}$:

$$\bar{y}_i = Bx_i \left(\mu_i \sum_{k=1}^n \frac{x_k}{\mu_k} \right)^{-1}, \quad i = 1, \dots, n.$$

Тогда

$$\min_{y \in Y} F(x, y) \leq F(x, \bar{y}) = \sum_{i=1}^n \max[x_i - \mu_i \bar{y}_i, 0].$$

Если $B \geq \sum_{k=1}^n \frac{x_k}{\mu_k}$, то $\bar{y}_i \geq x_i / \mu_i$, $i = 1, \dots, n \Rightarrow F(x, \bar{y}) = 0$.

В противном случае $\bar{y}_i \leq x_i / \mu_i$, $i = 1, \dots, n$, и

$$F(x, \bar{y}) = \sum_{i=1}^n (x_i - \mu_i \bar{y}_i) \leq A - \mu_n \sum_{i=1}^n \bar{y}_i = A - \mu_n B.$$

Таким образом, для любой стратегии x

$$\min_{y \in Y} F(x, y) \leq \max[A - \mu_n B, 0] = \min_{y \in Y} \max[A - \mu_n y_n, 0] = \min_{y \in Y} F(x^{(n)}, y)$$

и $x^{(n)}$ — максиминная стратегия нападения.

б) Покажем, что

$$\bar{v} = \min_{y \in Y} \max_{x \in X} F(x, y) = \max[A - B \left(\sum_{k=1}^n \frac{1}{\mu_k} \right)^{-1}, 0],$$

а

$$y^0 : y_i^0 = B \left(\mu_i \sum_{k=1}^n \frac{1}{\mu_k} \right)^{-1}, \quad i = 1, \dots, n,$$

— минимаксная стратегия обороны.

Сначала докажем равенство

$$\max_{x \in X} F(x, y) = \max_{1 \leq i \leq n} F(x^{(i)}, y) \quad \forall y \in Y, \quad (7.1)$$

где $x^{(i)} = (0, \dots, \underbrace{A}_i, 0, \dots, 0)$ — стратегия нападения, состоящая в нанесении концентрированного удара по i -му пункту.

Представим стратегию x в виде $x = \sum_{i=1}^n \frac{x_i}{A} x^{(i)}$. По определению выпуклой функции

$$F(x, y) \leq \sum_{i=1}^n \frac{x_i}{A} F(x^{(i)}, y) \leq \max_{1 \leq i \leq n} F(x^{(i)}, y).$$

Следовательно,

$$\max_{x \in X} F(x, y) \leq \max_{1 \leq i \leq n} F(x^{(i)}, y) \leq \max_{x \in X} F(x, y)$$

и (7.1) доказано. Далее имеем

$$\begin{aligned} \bar{v} &= \min_{y \in Y} \max_{x \in X} F(x, y) = \min_{y \in Y} \max_{1 \leq i \leq n} F(x^{(i)}, y) = \\ &= \min_{y \in Y} \max_{1 \leq i \leq n} [A - \mu_i y_i, 0] = \min_{y \in Y} [A - \min_{1 \leq i \leq n} \mu_i y_i, 0] = \\ &= \max [A - B \max_{y \in Y} \min_{1 \leq i \leq n} \mu_i y_i / B, 0] = [\text{замена переменных} \\ p &= y/B \in P = \{p = (p_1, \dots, p_n) \mid \sum_{i=1}^n p_i = 1, p_i \geq 0, i = 1, \dots, n\}] = \\ &= \max [A - B \max_{p \in P} \min_{1 \leq i \leq n} \mu_i p_i, 0] = \\ &= [\text{см. пример 4.4}] = \max [A - B \left(\sum_{k=1}^n \frac{1}{\mu_k} \right)^{-1}, 0]. \end{aligned}$$

При этом

$$y_i^0 = B p_i^0 = B \left(\mu_i \sum_{k=1}^n \frac{1}{\mu_k} \right)^{-1}, \quad i = 1, \dots, n.$$

Когда в игре существует решение в чистых стратегиях?

Если $B \geq A \sum_{k=1}^n \frac{1}{\mu_k}$, то $\bar{v} = 0 \geq \underline{v} \geq 0$ и, следовательно, $\bar{v} = \underline{v} = 0$.

Для нападения любая стратегия оптимальна. В этом случае оборона так может распределить свои силы, чтобы не позволить нападению, использующему концентрированный удар, прорваться на каком-либо пункте.

Если $B < A \sum_{k=1}^n \frac{1}{\mu_k}$, то функция $F(x, y)$ седловой точки не имеет. Действительно,

$$\bar{v} = A - B \left(\sum_{k=1}^n \frac{1}{\mu_k} \right)^{-1} > A - B \left(\frac{1}{\mu_n} \right)^{-1} = A - \mu_n B.$$

Заметим, что $\bar{v} > 0$. Поэтому $\bar{v} > \max[A - \mu_n B, 0] = \underline{v}$.

в) Покажем, что в игре существует решение в смешанных стратегиях вида $(\varphi^0, y^0, \bar{v})$, где y^0 — чистая минимаксная стратегия обороны, а оптимальная смешанная стратегия для нападения имеет вид

$$\varphi^0 = \sum_{i=1}^n p_i^0 I_{x^{(i)}}, \quad p_i^0 = \left(\mu_i \sum_{k=1}^n \frac{1}{\mu_k} \right)^{-1}, \quad i = 1, \dots, n.$$

Поскольку функция $F(x, y)$ выпукла по y , достаточно проверить условие (*) для смешанной стратегии φ^0 :

$$F(\varphi^0, y) \geq \bar{v} \quad \forall y \in Y.$$

Имеем

$$\begin{aligned} F(\varphi^0, y) &= \int_X F(x, y) d\varphi^0(x) = \sum_{i=1}^n p_i^0 F(x^{(i)}, y) = \\ &= \sum_{i=1}^n p_i^0 \max[A - \mu_i y_i, 0] = \sum_{i=1}^n \max[p_i^0 A - \mu_i p_i^0 y_i, 0] \geq \\ &\geq \max\left[\sum_{i=1}^n (p_i^0 A - \mu_i p_i^0 y_i), 0\right] = \max\left[A - \sum_{i=1}^n y_i \left(\sum_{k=1}^n \frac{1}{\mu_k}\right)^{-1}, 0\right] = \\ &= \max\left[A - B \left(\sum_{k=1}^n \frac{1}{\mu_k}\right)^{-1}, 0\right] = \bar{v}. \end{aligned}$$

Здесь мы воспользовались элементарным неравенством

$$\sum_{i=1}^n \max[a_i, b_i] \geq \max\left[\sum_{i=1}^n a_i, \sum_{i=1}^n b_i\right],$$

справедливым для любых вещественных чисел a_i, b_i , $i = 1, \dots, n$.

Модель дуэли.

В дуэли принимают участие два дуэлянта (первый и второй игроки). В начальный момент времени дуэлянты находятся на расстоянии d_0 и по команде начинают сближаться. В распоряжении каждого дуэлянта имеется один выстрел, который он может произвести в противника с любого расстояния (конечно, при условии, что дуэлянт жив), он даже может подойти к противнику вплотную.

Пусть $p_k(d)$ — функция меткости k -го дуэлянта, равная вероятности поражения противника, если выстрел был произведен с расстояния d . Предположим, что функции $p_k(d)$ непрерывны и убывают на отрезке $[0, d_0]$ и без потери общности $p_k(0) = 1$, $p_k(d_0) = 0$, $k = 1, 2$.

Определим антагонистическую игру. Пусть $x \in X = [0, d_0]$ — расстояние, с которого первый игрок намечает произвести свой выстрел. Аналогично, $y \in Y = [0, d_0]$ — расстояние, с которого намечает свой выстрел второй игрок. Определим функцию выигрыша $F(x, y)$ первого игрока.

Рассмотрим сначала *шумную дуэль*, когда противники слышат выстрелы друг друга. Тогда

$$F(x, y) = \begin{cases} p_1(x), & 0 \leq y \leq x \leq d_0, \\ 1 - p_2(y), & 0 \leq x < y \leq d_0. \end{cases}$$

По смыслу $F(x, y)$ есть вероятность поражения первым игроком второго. Если $x < y$ и второй игрок промахнется, то первый, услышав выстрел противника, стреляет в него с расстояния 0 вместо x . Отметим, что $F(x, y)$ является осреднением функции, принимающей значение 1 или 0 в зависимости от того, убит второй дуэлянт или нет. Итак, шумная дуэль определена как игра в нормальной форме $\Gamma = \langle X, Y, F(x, y) \rangle$.

Покажем, что шумная дуэль имеет решение в чистых стратегиях $(d^*, d^*, v = p_1(d^*))$, где d^* — единственный корень уравнения $p_1(d) = 1 - p_2(d)$. Проверим неравенства из определения седловой точки

$$F(x, d^*) \leq p_1(d^*) = F(d^*, d^*) \leq F(d^*, y) \quad \forall x \in X, \quad \forall y \in Y.$$

Имеем

$$F(x, d^*) = \begin{cases} p_1(x) \leq p_1(d^*), & d^* \leq x \leq d_0, \\ 1 - p_2(d^*) = p_1(d^*), & 0 \leq x < d^*, \end{cases}$$

$$F(d^*, y) = \begin{cases} p_1(d^*), & 0 \leq y \leq d^*, \\ 1 - p_2(y) \geq 1 - p_2(d^*) = p_1(d^*), & d^* < y \leq d_0. \end{cases}$$

Если функции меткости игроков одинаковы, то из уравнения $p_1(d) = 1 - p_1(d)$ находим, что значение игры равно $1/2$, а d^* является корнем уравнения $p_1(d) = 1/2$.

В *бесшумной дуэли* игроки не слышат выстрелы друг друга и

$$F(x, y) = \begin{cases} p_1(x), & 0 \leq y \leq x \leq d_0, \\ p_1(x)(1 - p_2(y)), & 0 \leq x < y \leq d_0. \end{cases}$$

Покажем, что бесшумная дуэль не имеет решения в чистых стратегиях. Найдем величину $\underline{v} = \sup_{0 \leq x \leq d_0} \inf_{0 \leq y \leq d_0} F(x, y)$. Стратегия $x = d_0$ не может быть максиминной, поскольку $F(d_0, y) = p_1(d_0) = 0$ при всех $y \in Y$. Пусть $0 \leq x < d_0$. Тогда

$$\begin{aligned} \inf_{0 \leq y \leq d_0} F(x, y) &= \min \left[\inf_{0 \leq y \leq x} F(x, y), \inf_{x < y \leq d_0} F(x, y) \right] = \\ &= \min[p_1(x), p_1(x)(1 - p_2(x))] = p_1(x)(1 - p_2(x)). \end{aligned}$$

Отсюда $\underline{v} = \max_{0 \leq x \leq d_0} p_1(x)(1 - p_2(x))$.

Упражнение 7.1. Докажите, что

$$\bar{v} = \inf_{0 \leq y \leq d_0} \sup_{0 \leq x \leq d_0} F(x, y) = p_1(d^*).$$

Таким образом, $\underline{v} = \max_{0 \leq x \leq d_0} p_1(x)(1 - p_2(x)) <$

$$< \max_{0 \leq x \leq d_0} \min[p_1(x), 1 - p_2(x)] = p_1(d^*) = \bar{v}.$$

Решение бесшумных дуэлей обычно сводится к интегрированию обыкновенных дифференциальных уравнений. Мы ограничимся исследованием конкретного примера.

Пример 7.1. Рассмотрим бесшумную дуэль с одинаковыми функциями меткости игроков $p_1(d) = p_2(d) = 1 - d$, $0 \leq d \leq d_0 = 1$. Тогда

$$F(x, y) = \begin{cases} 1 - x, & 0 \leq y \leq x \leq 1, \\ (1 - x)y, & 0 \leq x < y \leq 1. \end{cases}$$

Предположим, что оптимальные смешанные стратегии игроков $\varphi^0(x)$ и $\psi^0(y)$ имеют совпадающие спектры $Sp(\varphi^0) = Sp(\psi^0) = [0, a]$, где $a \leq 1$ – параметр, подлежащий определению. Пусть на отрезке $[0, a]$ функции распределения $\varphi^0(x)$ и $\psi^0(y)$ непрерывны и имеют производные (плотности распределения) $f(x)$ и $g(y)$.

По свойству дополняющей нежесткости (теорема 4.3) $F(\varphi^0, y) = v \quad \forall y \in [0, a]$ или

$$\int_0^a F(x, y) f(x) dx = \int_0^y (1 - x) y f(x) dx + \int_y^a (1 - x) f(x) dx = v. \quad (7.2)$$

Дифференцируя дважды по y интегральное уравнение (7.2), получим дифференциальное уравнение $3f(y) = (1 - y)f'(y)$, имеющее (после замены y на x) общее решение вида $f(x) = c(1 - x)^{-3}$. По определению плотности $\int_0^1 f(x)dx = 1$ (условие нормировки). Отсюда

$$c \int_0^a \frac{1}{(1 - x)^3} dx = \frac{c}{2} \left[\frac{1}{(1 - a)^2} - 1 \right] = 1. \quad (7.3)$$

Найденная плотность $f(x)$ должна также удовлетворять исходному интегральному уравнению (7.2), т.е.

$$c \left[\frac{1}{1 - a} - 1 - y \right] = v. \quad (7.4)$$

Поскольку уравнение (7.4) не является тождеством по y , смешанная стратегия $\varphi^0(x)$ указанного вида не существует. Поэтому предположим, что функция распределения $\varphi^0(x)$ имеет скачок величины σ в нуле. Тогда уравнения (7.2)–(7.4) изменятся:

$$\sigma y + \int_0^y (1 - x)yf(x)dx + \int_y^a (1 - x)f(x)dx = v, \quad (7.2)'$$

$$\sigma + \frac{c}{2} \left[\frac{1}{(1 - a)^2} - 1 \right] = 1, \quad (7.3)'$$

$$\sigma y + c \left[\frac{1}{1 - a} - 1 - y \right] = v. \quad (7.4)'$$

Для того чтобы уравнение (7.4)' выполнялось как тождество, необходимо положить $\sigma = c$. Из уравнений (7.3)', (7.4)' получаем

$$\frac{c}{2} \left[\frac{1}{(1 - a)^2} + 1 \right] = 1, \quad \frac{ca}{1 - a} = v. \quad (7.5)$$

Из свойства дополняющей нежесткости также следует, что $F(x, \psi^0) = v \quad \forall x \in [0, a]$ или

$$\int_0^a F(x, y)g(y)dy = \int_0^x (1 - x)g(y)dy + \int_x^a (1 - x)yg(y)dy = v. \quad (7.6)$$

Отсюда, как и выше, получим $g(y) = c_1(1 - y)^{-3}$. Подставляя $g(y)$ в уравнение (7.6), находим

$$c_1(1 - x) \left[\int_0^x \frac{1}{(1 - y)^3} dy + \int_x^a \frac{y}{(1 - y)^3} dy \right] = v$$

или, используя условие нормировки $\int_0^1 g(y) dy = c_1 \int_0^a (1 - y)^{-3} dy = 1$,

$$(1 - x) \left[1 - \frac{c_1}{1 - a} + \frac{c_1}{1 - x} \right] = v.$$

Для того чтобы последнее равенство выполнялось тождественно, необходимо, чтобы $c_1 = v = 1 - a$. Отсюда и из (7.5) находим

$$a = 2 - \sqrt{2}, \quad c_1 = v = \sqrt{2} - 1, \quad c = \sigma = \frac{2 - \sqrt{2}}{2}.$$

Окончательно

$$\varphi^0(x) = \begin{cases} \frac{2 - \sqrt{2}}{4} \left(\frac{1}{(x - 1)^2} + 1 \right), & 0 \leq x \leq 2 - \sqrt{2}, \\ 1, & 2 - \sqrt{2} < x \leq 1, \end{cases}$$

$$\psi^0(y) = \begin{cases} \frac{\sqrt{2} - 1}{2} \left(\frac{1}{(y - 1)^2} - 1 \right), & 0 \leq y \leq 2 - \sqrt{2}, \\ 1, & 2 - \sqrt{2} < y \leq 1. \end{cases}$$

Особенность оптимальной смешанной стратегии φ^0 состоит в том, что первый игрок с вероятностью $\sigma = \frac{2 - \sqrt{2}}{2}$ ждет до полного сближения с противником. Отметим также, что значение игры $v = \sqrt{2} - 1$ бесшумной дуэли меньше значения игры $v = 1/2$ шумной дуэли, что объясняется уменьшением информированности первого игрока.

§ 8. Многошаговые антагонистические игры

Определим многошаговую антагонистическую игру с *полной информацией*. Игра происходит в течение T шагов с номерами $t = 1, \dots, T$. На

каждом шаге t игроки выбирают по очереди альтернативы — значения переменных x_t, y_t .

Шаг 1. Сначала первый игрок выбирает альтернативу $x_1 \in U_1$, затем второй игрок, зная выбор первого, выбирает альтернативу $y_1 \in V_1(x_1) = V_1(\cdot)$.

Пусть игроки в течение $t - 1$ шагов выбрали альтернативы $x_1, \dots, x_{t-1}, y_1, \dots, y_{t-1}$. Положим $\bar{x}_t = (x_1, \dots, x_t)$, $\bar{y}_t = (y_1, \dots, y_t)$.

Шаг t . Сначала первый игрок, зная предысторию $\bar{x}_{t-1}, \bar{y}_{t-1}$, выбирает альтернативу $x_t \in U_t(\bar{x}_{t-1}, \bar{y}_{t-1}) = U_t(\cdot)$. Затем второй игрок выбирает альтернативу $y_t \in V_t(\bar{x}_t, \bar{y}_{t-1}) = V_t(\cdot)$, зная предысторию $\bar{x}_t, \bar{y}_{t-1}$, включая выбор x_t первого игрока на данном шаге.

После завершения шага T возникает пара $(\bar{x}_T, \bar{y}_T)$, называемая *партией* игры. По смыслу партия игры — это запись всех альтернатив, выбранных игроками. Для любой партии $(\bar{x}_T, \bar{y}_T)$ задается выигрыш $F(\bar{x}_T, \bar{y}_T)$ первого игрока.

Определим теперь игру в нормальной форме. На шаге t первый игрок может выбрать альтернативу x_t как значение функции $\tilde{x}_t : x_t = \tilde{x}_t(\bar{x}_{t-1}, \bar{y}_{t-1})$, которая должна быть определена при всевозможных значениях аргументов $\bar{x}_{t-1}, \bar{y}_{t-1}$. Обозначим множество всех таких функций $\tilde{x}_t$ через $\tilde{U}_t$. Заметим, что $\tilde{x}_1 = x_1$, поскольку на первом шаге первый игрок никакой информацией не располагает.

Стратегия первого игрока представляет собой набор функций

$$\tilde{x} = (\tilde{x}_t, t = 1, \dots, T) \in \tilde{X} = \prod_{t=1}^T \tilde{U}_t.$$

Аналогично, на шаге t второй игрок может выбирать альтернативу y_t как значение функции $\tilde{y}_t : y_t = \tilde{y}_t(\bar{x}_t, \bar{y}_{t-1})$, которая должна быть определена при всевозможных значениях аргументов $\bar{x}_t, \bar{y}_{t-1}$. Обозначим множество всех таких функций $\tilde{y}_t$ через $\tilde{V}_t$. Стратегия второго игрока представляет собой набор функций

$$\tilde{y} = (\tilde{y}_t, t = 1, \dots, T) \in \tilde{Y} = \prod_{t=1}^T \tilde{V}_t.$$

Игроки могут выбрать стратегии $\tilde{x}, \tilde{y}$ независимо друг от друга до игры, а во время игры — применять их "автоматически." Любой паре стратегий $(\tilde{x}, \tilde{y})$ однозначно соответствует партия игры:

$x_1 = \tilde{x}_1$, $y_1 = \tilde{y}_1(x_1)$, $x_2 = \tilde{x}_2(x_1, y_1)$ и т.д.

Далее $F(\tilde{x}, \tilde{y}) \stackrel{\text{def}}{=} F(\bar{x}_T, \bar{y}_T)$, где $(\bar{x}_T, \bar{y}_T)$ — партия, соответствующая стратегиям $\tilde{x}$ и $\tilde{y}$. Итак, многошаговая игра с полной информацией определена в нормальной форме $\Gamma = \langle \tilde{X}, \tilde{Y}, F(\tilde{x}, \tilde{y}) \rangle$.

В дальнейшем будем рассматривать два класса игр:

игра Γ' , в которой все множества $U_t(\cdot)$, $V_t(\cdot)$ конечны;

игра Γ'' , в которой все множества $U_t(\cdot) \equiv U_t$, $V_t(\cdot) \equiv V_t$ не зависят от предыстории и являются компактами метрических пространств, а функция $F(\bar{x}_T, \bar{y}_T)$ непрерывна на произведении

$$U_1 \times \cdots \times U_T \times V_1 \times \cdots \times V_T.$$

Определим пару стратегий

$$\tilde{x}^0 = (\tilde{x}_t^0, t = 1, \dots, T), \quad \tilde{y}^0 = (\tilde{y}_t^0, 1, \dots, T),$$

используя метод *динамического программирования*. Доопределим функцию F на всех отрезках партии вида $(\bar{x}_t, \bar{y}_{t-1})$ или $(\bar{x}_t, \bar{y}_t)$ и назовем ее *функцией Беллмана*. Компоненты стратегий $\tilde{x}_t^0$, $\tilde{y}_t^0$ будем задавать в порядке, обратном выбору игроков.

Определим сначала $\tilde{y}_T^0$. Для этого зафиксируем произвольное значение аргументов $(\bar{x}_T, \bar{y}_{T-1})$ и зададим значение функции

$$\tilde{y}_T^0(\bar{x}_T, \bar{y}_{T-1}) \stackrel{\text{def}}{=} y_T^0 :$$

$$F(\bar{x}_T, \bar{y}_{T-1}, y_T^0) = \min_{y_T \in V_T(\cdot)} F(\bar{x}_T, \bar{y}_{T-1}, y_T) \stackrel{\text{def}}{=} F(\bar{x}_T, \bar{y}_{T-1}).$$

Определим функцию $\tilde{x}_T^0$. Зафиксируем произвольное значение аргументов $(\bar{x}_{T-1}, \bar{y}_{T-1})$ и зададим значение функции

$$\tilde{x}_T^0(\bar{x}_{T-1}, \bar{y}_{T-1}) \stackrel{\text{def}}{=} x_T^0 :$$

$$F(\bar{x}_{T-1}, x_T^0, \bar{y}_{T-1}) = \max_{x_T \in U_T(\cdot)} F(\bar{x}_{T-1}, x_T, \bar{y}_{T-1}) \stackrel{\text{def}}{=} F(\bar{x}_{T-1}, \bar{y}_{T-1}).$$

Пусть определены компоненты стратегий и значения функции Беллмана

$$\tilde{y}_T^0, \tilde{x}_T^0, \dots, \tilde{y}_{t+1}^0, \tilde{x}_{t+1}^0, F(\bar{x}_T, \bar{y}_{T-1}), \dots, F(\bar{x}_t, \bar{y}_t).$$

Тогда $\tilde{y}_t^0, \tilde{x}_t^0$, $F(\bar{x}_t, \bar{y}_{t-1})$, $F(\bar{x}_{t-1}, \bar{y}_{t-1})$ задаются по приведенным выше формулам с заменой T на t .

Покажем, что стратегии $\tilde{x}^0$, $\tilde{y}^0$ определены корректно для игр Γ' и Γ'' . Действительно, в игре Γ' все множества $U_t(\cdot)$, $V_t(\cdot)$ конечны и поэтому

максимумы и минимумы, фигурирующие в определениях $\tilde{x}^0, \tilde{y}^0$, достигаются. Аналогичное утверждение справедливо и для игры Γ'' , поскольку по теореме 2.2 функция Беллмана непрерывна на соответствующих компактах.

Определим величину

$$\begin{aligned}\tilde{v} &= \max_{x_1 \in U_1} F(x_1) \stackrel{\text{def}}{=} \max_{x_1 \in U_1} \min_{y_1 \in V_1(\cdot)} F(x_1, y_1) = \dots \\ &= \max_{x_1 \in U_1} \min_{y_1 \in V_1(\cdot)} \dots \max_{x_T \in U_T(\cdot)} \min_{y_T \in V_T(\cdot)} F(\bar{x}_T, \bar{y}_T).\end{aligned}$$

Справедлива следующая

Теорема 8.1 (Цермело). Всякая многошаговая антагонистическая игра с полной информацией Γ' (или Γ'') имеет решение $(\tilde{x}^0, \tilde{y}^0, \tilde{v})$.

Доказательство. Докажем, что функция $F(\tilde{x}, \tilde{y})$ имеет седловую точку $(\tilde{x}^0, \tilde{y}^0)$ на $\tilde{X} \times \tilde{Y}$. Для этого достаточно доказать, что

- 1) $F(\tilde{x}^0, \tilde{y}) \geq \tilde{v} \quad \forall \tilde{y} \in \tilde{Y}$;
- 2) $F(\tilde{x}, \tilde{y}^0) \leq \tilde{v} \quad \forall \tilde{x} \in \tilde{X}$.

Докажем неравенство 1). Имеем

$$\begin{aligned}F(\tilde{x}^0, \tilde{y}) &\geq \min_{y_T \in V_T(\cdot)} F(\tilde{x}^0, \tilde{y}_1, \dots, \tilde{y}_{T-1}, y_T) = F(\tilde{x}^0, \tilde{y}_1, \dots, \tilde{y}_{T-1}) = \\ &\stackrel{\text{def}}{=} \max_{x_T \in U_T(\cdot)} F(\tilde{x}_1^0, \dots, \tilde{x}_{T-1}^0, x_T, \tilde{y}_1, \dots, \tilde{y}_{T-1}) = \\ &= F(\tilde{x}_1^0, \dots, \tilde{x}_{T-1}^0, \tilde{y}_1, \dots, \tilde{y}_{T-1}) \geq \dots \geq F(\tilde{x}_1^0, \tilde{y}_1) \geq \max_{x_1 \in U_1} F(x_1) = \tilde{v}.\end{aligned}$$

Неравенство 2) доказывается аналогично. ■

Пример 8.1. Покажем, что игра "шахматы" имеет решение. Существует такое целое число T , что в соответствии с правилами игры любая шахматная партия заканчивается не позднее хода T . Поэтому без потери общности можно считать, все партии продолжаются T ходов¹. Шахматы являются игрой вида Γ' . $U_t(\bar{x}_{t-1}, \bar{y}_{t-1})$ есть множество разрешенных правилами альтернативных выборов хода белыми (первым игроком) на t -м ходу в позиции, определяемой предыдущими ходами игроков $(\bar{x}_{t-1}, \bar{y}_{t-1})$.

¹Если партия заканчивается раньше, то игроки делают необходимое число фиктивных ходов, не влияющих на исход игры.

Аналогично интерпретируется множество $V_t(\bar{x}_t, \bar{y}_{t-1})$ выборов хода черными на t -м ходу. Выигрыш белых определяется по правилу

$$F(\bar{x}_T, \bar{y}_T) = \begin{cases} 1, & \text{если выиграли белые,} \\ 0, & \text{если выиграли черные,} \\ 1/2, & \text{если сыграли вничью.} \end{cases}$$

По теореме Цермело игра "шахматы" имеет решение. Практическое значение этот результат имеет для позиций эндшпиля, где обычно ищут форсированный выигрыш, либо ничью.

Пример 8.2. Рассмотрим матрицу

$$A = \begin{pmatrix} 5 & 3 & 1 & 4 \\ 2 & 7 & 2 & 0 \\ 3 & 2 & 3 & 3 \\ 4 & 0 & 2 & 5 \end{pmatrix}.$$

Разобьем множество ее строк на подмножества $M_1 = \{1, 2\}$ и $M_2 = \{3, 4\}$, а множество столбцов — на подмножества $N_1 = \{1, 2\}$ и $N_2 = \{3, 4\}$. Определим двухшаговую игру с полной информацией.

Шаг 1. Сначала первый игрок выбирает номер $\alpha \in \{1, 2\}$ множества M_α , из которого он будет на втором шаге делать выбор строки матрицы A . Затем второй игрок, зная α , выбирает номер $\beta \in \{1, 2\}$ множества N_β , из которого он будет на втором шаге выбирать номер столбца матрицы A .

Шаг 2. Первый игрок выбирает номер строки $i \in M_\alpha$, зная α, β , затем второй игрок выбирает номер столбца $j \in N_\beta$, зная α, β, i .

Выигрыш первого игрока равен a_{ij} .

Для решения задачи воспользуемся *позиционной формой* игры, которую будем отображать на плоскости в виде дерева.




Рис. 8.1

Начальная (корневая) вершина дерева¹ соответствует первому ходу первого игрока (выбор альтернативы α), в вершинах второго уровня альтернативу β выбирает второй игрок и т.д. В финальных вершинах, отвечающих различным партиям игры, указаны выигрыши первого игрока $F(\alpha, \beta, i, j) = a_{ij}$. В вершинах четвертого уровня указаны значения функции Беллмана $F(\alpha, \beta, i) = \min_{j \in N_\beta} F(\alpha, \beta, i, j)$, в вершинах третьего уровня — $F(\alpha, \beta) = \max_{i \in M_\alpha} F(\alpha, \beta, i)$, в вершинах второго уровня — $F(\alpha) = \min_{\beta=1,2} F(\alpha, \beta)$, а в начальной вершине — значение игры $\tilde{v} = \max_{\alpha=1,2} F(\alpha) = 2$.

Укажем оптимальные стратегии игроков

$$\tilde{x}^0 = (\alpha^0, \tilde{i}^0(\alpha, \beta)), \quad \tilde{y}^0 = (\tilde{\beta}^0(\alpha), \tilde{j}^0(\alpha, \beta, i)) :$$

$$\alpha^0 = 2, \quad \tilde{i}^0(2, 1) = 3, \quad \tilde{i}^0(2, 2) = 3, \quad \tilde{\beta}^0(1) = 2, \quad \tilde{\beta}^0(2) = 1,$$

$$\tilde{j}^0(1, 2, 1) = 3, \quad \tilde{j}^0(1, 2, 2) = 4, \quad \tilde{j}^0(2, 1, 3) = \tilde{j}^0(2, 1, 4) = 2.$$

Отметим, что сначала мы подсчитали функцию Беллмана, а затем построили в естественном порядке компоненты оптимальных стратегий. В результате была достигнута некоторая экономия вычислений, поскольку эти компоненты необязательно следует определять при всех значениях

¹Дерево изображено в перевернутом виде, поскольку так его удобнее рисовать.

аргументов. Например, $\alpha^0 = 2$ и значения функции $\tilde{i}^0(\alpha, \beta)$ нужно находить только при $\alpha = 2$.

Еще более существенное сокращение вычислений достигается с использованием приемов теории *искусственного интеллекта*.

Рассмотрим вопрос о программировании шахмат. В текущей позиции шахматной партии при ходе, скажем, белых дерево игры порождается на глубину нескольких ходов. В финальных вершинах дерева выигрыш белых задается с помощью *оценочной функции*, учитывающей материальные и позиционные особенности финальной позиции. После этого решается получившаяся игра с полной информацией и находится оптимальный ход белых в текущей позиции.

Обычно дерево игры порождается с помощью рекурсивной процедуры построения поддеревьев. При этом в вершинах дерева вычисляются значения функции Беллмана. Рассмотрим возможный ход белых a_1 в текущей позиции. Пусть построено поддерево игры, соответствующее этому ходу и получена оценка хода a_1 (точнее, позиции, возникающей после этого хода), равная 4. Рассмотрим другой ход белых a_2 в текущей позиции. Теперь пусть черные выбрали ход b_1 и установлено, что его оценка равна 1. Тогда оценка хода a_2 будет не больше 1 и его можно отбросить, поскольку он хуже хода a_1 . Таким образом, здесь не потребовалось полное построение поддерева хода a_2 . Оценка хода a_1 в данном случае называется α -отсечением.

Если в текущей позиции ход черных, то аналогично можно определить понятие β -отсечения.

Многошаговые антагонистические игры с неполной информацией.

Определим теперь более общую модель многошаговой игры, в процессе которой игроки могут не иметь полной информации о сделанных выборах. Ограничимся играми Γ' с конечными множествами $U_t(\cdot), V_t(\cdot)$, $t = 1, \dots, T$.

Пусть $H_t^1(H_t^2)$ — множество всех отрезков партий вида $(\bar{x}_{t-1}, \bar{y}_{t-1})$ (вида $(\bar{x}_t, \bar{y}_{t-1})$). Предположим, что множество H_t^1 разбито на непересекающиеся подмножества $H_t^1(\alpha_t)$, $\alpha_t \in \mathcal{L}_t$. Перед выбором x_t первому игроку известно, что $(\bar{x}_{t-1}, \bar{y}_{t-1}) \in H_t^1(\alpha_t)$. Аналогично, пусть множество H_t^2 разбито на непересекающиеся подмножества $H_t^2(\beta_t)$, $\beta_t \in \mathcal{B}_t$. Перед выбором y_t второму игроку известно, что $(\bar{x}_t, \bar{y}_{t-1}) \in H_t^2(\beta_t)$. Если, в частности, $\alpha_t = (\bar{x}_{t-1}, \bar{y}_{t-1})$, $\beta_t = (\bar{x}_t, \bar{y}_{t-1})$, а множества $H_t^1(\alpha_t)$ и $H_t^2(\beta_t)$ содержат по одному элементу α_t и β_t соответственно, то получим игру с

полной информацией.

Стратегия $\tilde{x} \in \tilde{X}$ первого игрока задается набором функций $\tilde{x}_t$ от α_t , принимающих значения $\tilde{x}_t(\alpha_t) \in U_t(\alpha_t)$, $t = 1, \dots, T$. Стратегия $\tilde{y} \in \tilde{Y}$ второго игрока задается набором функций $\tilde{y}_t$ от β_t , принимающих значения $\tilde{y}_t(\beta_t) \in V_t(\beta_t)$, $t = 1, \dots, T$. По определению $F(\tilde{x}, \tilde{y}) = F(\bar{x}_T, \bar{y}_T)$, где партия игры $(\bar{x}_T, \bar{y}_T)$ однозначно задается стратегиями игроков $\tilde{x}$ и $\tilde{y}$. Итак, определена игра $\Gamma = \langle \tilde{X}, \tilde{Y}, F(\tilde{x}, \tilde{y}) \rangle$ в нормальной форме.

Пример 8.3. Пусть $\alpha_t = \beta_t = (\bar{x}_{t-1}, \bar{y}_{t-1})$,

$$H_t^1(\alpha_t) = \{\alpha_t\}, \quad H_t^2(\beta_t) = \{(\bar{x}_t, \bar{y}_{t-1}) \mid x_t \in U_t(\beta_t)\}.$$

Здесь на каждом текущем шаге игроки не знают выбора друг друга, но они знают все выборы, сделанные на предыдущих шагах. При этом будем говорить об игре *с полной информацией о предыдущих шагах*. Конкретным примером может служить повторяющаяся игра "орлянка".

Упражнение 8.1. Показать, что в игре Γ с полной информацией о предыдущих шагах (пример 8.3) нижнее и верхнее значения игры задаются следующими выражениями:

$$\underline{v} = \max_{x_1 \in U_1} \min_{y_1 \in V_1} \max_{x_2 \in U_2(x_1, y_1)} \min_{y_2 \in V_2(x_1, y_1)} \cdots \max_{x_T \in U_T(\alpha_T)} \min_{y_T \in V_T(\beta_T)} F(\bar{x}_T, \bar{y}_T),$$

$$\bar{v} = \min_{y_1 \in V_1} \max_{x_1 \in U_1} \min_{y_2 \in V_2(x_1, y_1)} \max_{x_2 \in U_2(x_1, y_1)} \cdots \min_{y_T \in V_T(\beta_T)} \max_{x_T \in U_T(\alpha_T)} F(\bar{x}_T, \bar{y}_T).$$

Упражнение 8.2. Найти верхнее и нижнее значения игры из примера 8.2, предполагая полную информированность игроков о предыдущих шагах.

Если в игре Γ $\underline{v} < \bar{v}$, то игроки должны использовать смешанные стратегии. Ограничимся примерами.

Пример 8.4. Найдем решение в смешанных стратегиях игры из примера 8.2, предполагая полную информированность игроков о предыдущих шагах. На втором шаге значения α, β игрокам известны и возникает подыгра с 2×2 -подматрицей $(a_{ij})_{i \in M_\alpha, j \in N_\beta}$ матрицы A . Пусть $(p^0(\alpha, \beta), q^0(\alpha, \beta), v(\alpha, \beta))$ — решение в смешанных стратегиях указанной подыгры. В следующей таблице эти решения приведены при всех значениях α и β .

Табл. 8.1

α	β	$p^0(\alpha, \beta)$	$q^0(\alpha, \beta)$	$v(\alpha, \beta)$
1	1	(5/7, 2/7)	(4/7, 3/7)	29/7
1	2	(2/5, 3/5)	(4/5, 1/5)	8/5
2	1	(1, 0)	(0, 1)	2
2	2	(1, 0)	(1, 0)	3

На первом шаге первый игрок стремится увеличить свой ожидаемый выигрыш, получаемый на втором шаге, а второй игрок стремится этот выигрыш уменьшить. Поэтому на первом шаге игроки участвуют в игре с матрицей

$$(v(\alpha, \beta))_{2 \times 2} = \begin{pmatrix} 29/7 & 8/5 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}.$$

Решение этой игры в смешанных стратегиях имеет вид

$$(p^0, q^0, v) = ((35/124, 89/124), (49/124, 75/124), 323/124).$$

Итак, первый игрок должен выбирать $\alpha = 1$ с вероятностью 35/124, а второй игрок должен выбирать $\beta = 1$ с вероятностью 49/124. Значение игры Γ равно 323/124.

Пример 8.5. Ведущий телевизионного шоу предлагает участнику показать на одну из трех закрытых дверей, за которыми размещены "Мерседес" и два козла. После этого ведущий открывает какую-либо из двух невыбранных дверей, за которой находится козел, и вторично (шаг 2) предлагает участнику открыть одну из оставшихся дверей. Если за дверью стоит "Мерседес", то участник получает его в качестве приза, если — козел, то участник ничего не получает. Пусть выигрыш участника равен 1 или 0 в зависимости от того, получен им приз или нет. Найдём оптимальные стратегии участника (первого игрока) и ведущего шоу (второго игрока), а также значение игры.

Если на первом шаге первый игрок показал на дверь, за которой стоит козел, то ясно, что на втором шаге он должен открыть другую дверь и наверняка получить приз. Отсюда, используя соображения симметрии, укажем оптимальные смешанные стратегии игроков.

Определим стратегию p^0 первого игрока: на первом шаге он должен выбрать одну из трех дверей с вероятностью 1/3, а на втором шаге открывать другую оставшуюся дверь.

Определим стратегию q^0 второго игрока: он должен поместить "Мерседес" за одной дверью из трех с вероятностью 1/3. Если первый игрок

показал на дверь с "Мерседесом", то второй игрок должен открыть одну из двух других дверей с вероятностью $1/2$.

Значение игры равно $2/3$.

Для доказательства оптимальности указанных стратегий проверим условие (*). При любой чистой стратегии второго игрока первый игрок, применяя p^0 , показывает на дверь с козлом с вероятностью $2/3$. На втором шаге он указывает на другую дверь и выигрывает приз. С другой стороны, пусть второй игрок применяет стратегию q^0 . Покажем, что первый игрок не может выиграть приз с вероятностью, большей, чем $2/3$. Рассмотрим типичную чистую стратегию первого игрока: сначала он выбирает первую дверь, на втором шаге он открывает вторую дверь, если второй игрок открыл третью и открывает первую дверь, если второй игрок открыл вторую. Нетрудно подсчитать, что вероятности его выигрыша при размещениях МКК, КМК и ККМ равны $1/6$, $1/3$ и 0 соответственно. Таким образом, данная чистая стратегия обеспечивает выигрыш приза с вероятностью $1/2$. Если на втором шаге первый игрок указывает не на первую дверь, то выигрыш приза (только в этом случае) увеличивается до $2/3$.

Отметим, что в этом примере мы обошлись без полного описания множеств стратегий игроков и матрицы игры. Это представляет собой весьма непростую задачу, если рассмотреть обобщение игры на случай, когда имеется n дверей, за которыми располагаются один "Мерседес" и $n - 1$ козел. Игра происходит в течение $n - 1$ шагов. На каждом из первых $n - 2$ шагов участник показывает на какую-либо закрытую дверь, а ведущий открывает другую дверь, за которой стоит козел. На шаге $n - 1$ все происходит так же, как и при $n = 3$. Значение игры здесь равно $(n - 1)/n$. Докажите оптимальность следующей стратегии первого игрока. С равной вероятностью $1/n$ он выбирает одну из дверей, на которую показывает в течение первых $n - 2$ шагов. На последнем $(n - 1)$ -м шаге, когда останутся две закрытые двери, он открывает другую дверь.

Пусть многошаговая игра задана в позиционной форме. Тогда информированность игроков задается с помощью *информационных множеств*.

Определение. Информационным множеством игрока называется множество вершин дерева игры, в которых очередь хода принадлежит данному игроку и имеется одинаковое число альтернатив. Игрок знает, что позиция игры соответствует одной из вершин информационного множества, но не знает какой именно. На информационное множество накла-

дывается следующее ограничение: оно не может содержать двух вершин лежащих на одном пути, ведущим из начальной вершины в финальную.

Будем считать, что все информационные множества первого игрока $I_1, \dots, I_k$ пронумерованы таким образом, что если какая-то вершина множества I_i реализуется в игре раньше некоторой вершины множества I_j , то $i < j$. Все информационные множества второго игрока $J_1, \dots, J_l$ пронумерованы аналогичным образом.

Стратегией первого игрока является вектор $x = (x_1, \dots, x_k) \in X$, где x_i — либо альтернатива, выбираемая игроком в множестве I_i , либо $x_i = *$. Последнее означает, что выбор альтернатив $x_1, \dots, x_{i-1}$ гарантирует, что в игре заведомо не будет реализована никакая вершина из множества I_i . Аналогичным образом определяются стратегии $y = (y_1, \dots, y_l) \in Y$ второго игрока.

Отметим, что в игре могут встречаться *позиции случая*. Это означает, что в некоторых вершинах дерева игры выбор альтернативы не принадлежит игрокам, а осуществляется случайным образом с известным законом распределения (см. пример ниже). Тогда при выбранных стратегиях игроков x и y выигрыш первого игрока, определяемый по финальной вершине, будет случайной величиной и значение $F(x, y)$ следует определить как математическое ожидание этого выигрыша. Таким образом, мы свели позиционную форму игры к нормальной форме.

Пример 8.6. Игра "покер". Колода состоит из двух карт: старшей (с) и младшей (м). Игрокам сдается по одной карте рубашкой вверх. Первый игрок берет свою карту и имеет две альтернативы: либо пасовать (п), выплачивая второму игроку сумму $a > 0$, либо увеличивать ставку (y) до суммы $b > a$. Если первый игрок увеличивает, то второй игрок, не зная расклада карт, может либо пасовать, выплачивая первому a , либо увеличивать ставку до b . Если оба игрока увеличивают ставку, то карты открываются и игрок со старшей картой получает сумму b от партнера. На рис. 8.2 изображено дерево игры.




Рис. 8.2

Первый игрок имеет два информационных множества, отвечающих двум равновероятным раскладам карт. Поэтому у первого игрока четыре стратегии: $(\pi, \pi), (\pi, y), (y, \pi), (y, y)$. Второй игрок не знает расклада карт. Он имеет единственное информационное множество и две стратегии: π и y . Матрица игры в нормальной форме имеет вид

$$A = \begin{matrix} & \begin{matrix} \pi & y \end{matrix} \\ \begin{matrix} (\pi, \pi) \\ (\pi, y) \\ (y, \pi) \\ (y, y) \end{matrix} & \begin{pmatrix} -a & -a \\ \frac{1}{2}(-a) + \frac{1}{2}a & \frac{1}{2}(-a) + \frac{1}{2}(-b) \\ \frac{1}{2}a + \frac{1}{2}(-a) & \frac{1}{2}b + \frac{1}{2}(-a) \\ \frac{1}{2}a + \frac{1}{2}a & \frac{1}{2}b + \frac{1}{2}(-b) \end{pmatrix} \end{matrix} = \begin{pmatrix} -a & -a \\ 0 & -\frac{a+b}{2} \\ 0 & \frac{b-a}{2} \\ a & 0 \end{pmatrix}.$$

Нетрудно видеть, что третья строка матрицы доминирует первую и вторую строки. Вычеркивая их и решая игру с 2×2 -матрицей, получим решение в смешанных стратегиях

$$p^0 = \left(0, 0, \frac{2a}{b+a}, \frac{b-a}{b+a} \right), \quad q^0 = \left(\frac{b-a}{b+a}, \frac{2a}{b+a} \right), \quad v = \frac{a(b-a)}{b+a}.$$

Можно сделать вывод, что чем больше значение b/a , тем с большей вероятностью первый игрок должен блефовать (увеличивать на младшей карте), а второй — ему не верить (пасовать).

Комментарий и библиография к главе I

§ 2. Основные понятия теории антагонистических игр были введены Э.Борелем (см. английский перевод [15] трех его работ 1920-х годов). Термин "физическая смесь стратегий" использовала Е.С. Вентцель в [29]. Пример 3.2 взят из книги Г.Н. Дюбина и В.Г. Суздаля [46]. Еще один пример 9.7 использования "физической смеси стратегий" в биматричной игре см. во второй главе. Основы теории полезности заложены в фундаментальном труде Дж. фон Неймана и О. Моргенштерна [72]. О методах построения *функций полезности* см. [49].

Интересно проанализировать поведение первого игрока, использующего оптимальную смешанную стратегию $(a/(1+a), 1/(1+a))$ в игре с матрицей полезностей $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & a \end{pmatrix}$ примера 3.4, в зависимости от его отношения к риску. Чем более осторожен игрок (с ростом полезности a), тем ближе его стратегия к $(1/2, 1/2)$. Азартный игрок выбирает чистую вторую стратегию с тем большей вероятностью, чем меньше значение a . Сходное поведение мы наблюдали у милиционера в примере 4.4.

Теорема 2.1 доказана в книге Дж. фон Неймана и О. Моргенштерна [72]. Теорема 2.2 получена М. Шифманом [104] в ходе доказательства теоремы 2.3. Пример 2.5 был сообщен автору С.А. Ашмановым. Аналогичный пример см. в [6] (с.237). Теорема 2.3 доказана С. Какутани [47] с использованием обобщения теоремы Л. Брауэра о неподвижной точке. Однако она вытекает из полученного четырьмя годами раньше следующего результата [74].

Теорема (Дж. фон Нейман). Пусть $X \subset E^m$ и $Y \subset E^n$ — выпуклые компакты евклидовых пространств, а компакты $U, V \subset X \times Y$ удовлетворяют следующему условию: для любых $x \in X$ и $y \in Y$ множества $Y(x) = \{y \in Y \mid (x, y) \in V\}$ и $X(y) = \{x \in X \mid (x, y) \in U\}$ являются непустыми выпуклыми компактами. Тогда $U \cap V \neq \emptyset$.

Действительно, полагая в условиях теоремы 2.3

$$X(y) = \operatorname{Arg} \max_{x \in X} F(x, y), \quad U = \{(x, y) \in X \times Y \mid x \in X(y)\},$$

$$Y(x) = \operatorname{Arg} \min_{y \in Y} F(x, y), \quad V = \{(x, y) \in X \times Y \mid y \in Y(x)\},$$

получим, что существует пара $(x^0, y^0) \in U \cap V$ — седловая точка функции $F(x, y)$. Поэтому теорему 2.3 обычно связывают с именем Дж. фон Неймана.

Доказательства С. Какутани и М. Шифмана теоремы 2.3 можно прочесть в книге С. Карлина [48].

§ 3. С теорией интеграла Стилтеса можно ознакомиться по учебнику А.Н. Колмогорова и С.В. Фомина [50]. Основная теорема матричных игр (теорема 3.1) была доказана Дж.фон Нейманом в 1928 году [73] методом математической индукции по размерам матрицы игры. Ранее Э. Борель [15] продемонстрировал ее справедливость для кососимметрической 3×3 -матрицы. Приведенное доказательство теоремы 3.1 принадлежит С. Какутани [47]. Теорема 3.2 объединяет две теоремы Э. Хелли ([50]). Основная теорема непрерывных игр (теорема 3.3) была доказана Ж. Виллем [30].

§ 4. Свойства решений в смешанных стратегиях матричных и непрерывных игр излагаются в большинстве книг по теории игр (см., например, [45, 63]). Пример 4.2 принадлежит Э. Борелю [16]. Он также рассматривал дискретный вариант игры с $A = 7$, которому дал следующую интерпретацию. Игроки набирают по семь карт. Каждая карта может быть одной из трех мастей (содержащих по 14 карт): трефы, бубны или червы. Первый игрок побеждает, если в каждой из каких-либо двух мастей он имеет больше карт, чем противник. О других решениях этой игры см. [78].

Выравнивающие стратегии впервые использовал Э. Борель [15] для доказательства существования решения в смешанных стратегиях игры с кососимметрической 3×3 -матрицей. Игры с диагональными и циклическими матрицами, а также некоторые их обобщения см. в [48].

§ 5. Понятия доминирования строк и столбцов в матричных играх использовались многими авторами. В форме теорем они, по-видимому, впервые были сформулированы М. Дрешером в 1951 году в отчете корпорации РЭНД (см. его книгу [45]). Графический метод решения игр с 2×2 -матрицами использовал еще Э. Борель. Более общий метод "двойного описания" см. в работе [70]. Эквивалентность решения матричной игры задаче линейного программирования была продемонстрирована Г. Данцигом [43]. Теорема 5.2 о крайних оптимальных смешанных стратегиях доказана Л.С. Шепли и Р. Сноу [101].

Итерационный метод решения матричной игры был сформулирован Г. Брауном в [17]. Сходимость процесса Брауна доказана Джулией Робинсон [84]. Она использовала более общий итерационный процесс с ненулевыми начальными векторами $s(0)$ и $d(0)$, называемый в литературе

процессом Брауна-Робинсон. Оценка скорости сходимости $O(k^{-\frac{1}{m+n-2}})$ была получена Г.Н. Шапиро в [100]. Модификация условия останова по методу Брауна была предложена Ю.Б. Гермейером в [36]. О других игровых процессах типа Брауна-Робинсон см. [8].

§ 6. Теорема 6.1 о пересечении выпуклых компактов евклидова пространства была открыта Э. Хелли в 1913 году и сообщена И. Радону, опубликовавшему ее доказательство в [83] как следствие собственных результатов. Геометрическое (и более наглядное) доказательство методом математической индукции по размерности пространства было опубликовано Э. Хелли в [94]. Многочисленные обобщения и приложения теоремы Хелли см. в [42].

Структура решений в смешанных стратегиях игр с вогнутыми и выпуклыми выигрышами установлена Х.Ф. Боненбласом, С. Карлином и Л.С. Шепли в [12]. Приводимые здесь конструктивные доказательства теорем 6.2 и 6.3 принадлежат Э.Г. Давыдову [41], который опирался на результат 1938 года Л.Г. Шнирельмана [106], придав ему современный вид ¹.

Основы теории статистических решений были заложены А. Вальдом [21] (см. также [11, 20]), где, в частности, введена функция риска. С приложениями теории статистических игр можно ознакомиться в [40]. Минимаксная оценка параметра биномиального распределения получена Дж. Ходжесом и Е. Леманом [96], а аналогичная оценка математического ожидания нормального распределения при известной дисперсии получена И. Вольфовицем [33].

§ 7. Модель "нападение-оборона" определена и изучена Ю.Б. Гермейером [36]. Она является модификацией модели О. Гросса, в которой функция выигрыша нападения имеет вид $F(x, y) = \sum_{i=1}^n k_i \max[x_i - y_i, 0]$, а k_i интерпретируются как коэффициенты важности пунктов. В.А. Горелик предложил сходную игровую модель производства бензина [39].

Приводимые здесь шумная и бесшумная модели дуэлей исследованы Ю.Б. Гермейером [36]. В классических моделях [48] $F(x, y)$ получается осреднением функции, принимающей значение 1, если убит второй дуэлянт, а первый остался жив, значение -1 , если убит первый дуэлянт, а второй остался жив и значение 0 в остальных случаях (оба дуэлянта

¹Шнирельман доказал теорему 6.2 в терминах выпуклых множеств, не используя понятие вогнутой функции.

живы или оба убиты). Методы решения игр с *выбором момента времени* (дуэльного типа), основанные на использовании интегральных и дифференциальных уравнений, см. в [9, 48].

§ 8. Теорема существования решения многошаговой игры с полной информацией с целью применения к шахматной игре доказана Э.Цермело в 1912 году [97]. Основные понятия теории позиционных игр определены Дж. фон Нейманом и О. Моргенштерном в [72]. Полная формализация этих игр проведена Г.У. Куном [58]. Пример 8.5 был сообщен автору Н.М. Новиковой. Пример 8.6 простейшей модели покера принадлежит Э. Борелю [16].

ГЛАВА II. ИГРЫ ДВУХ ЛИЦ

§ 9. Ситуации равновесия в играх двух лиц

Понятие антагонистической игры можно значительно расширить. В игре двух лиц интересы игроков необязательно бывают противоположными. Рассматривают и игры многих лиц. Им посвящена третья глава.

Определим игру двух лиц. Пусть первый игрок имеет в своем распоряжении стратегии x из множества стратегий X , а второй игрок — стратегии y из множества стратегий Y . Будем рассматривать игру в *нормальной форме*. Это означает, что каждый из игроков выбирает стратегию, не зная выбора партнера. Пару стратегий (x, y) будем называть *ситуацией*. У первого игрока имеется функция выигрыша $F(x, y)$, а у второго — функция выигрыша $G(x, y)$, определенные на множестве всех ситуаций $X \times Y$. Каждый игрок стремится, по возможности, максимизировать свою функцию выигрыша. Таким образом, игра двух лиц в нормальной форме задается набором $\Gamma = \langle X, Y, F(x, y), G(x, y) \rangle$.

В антагонистической игре понятие решения мы связывали с седловой точкой функции выигрыша первого игрока. В произвольной игре двух лиц аналогом седловой точки является понятие *ситуации равновесия*.

Определение. Ситуация (x^0, y^0) называется ситуацией равновесия (равновесием по Нэшу) игры Γ , если

$$\max_{x \in X} F(x, y^0) = F(x^0, y^0), \quad \max_{y \in Y} G(x^0, y) = G(x^0, y^0).$$

Стратегии x^0 и y^0 , составляющие ситуацию равновесия, будем называть *равновесными*. Если оба игрока придерживаются ситуации равновесия, то одному игроку от нее невыгодно отклоняться.

Упражнение 9.1. Если $F(x, y) \equiv -G(x, y)$, то игра Γ — антагонистическая. Докажите, что в антагонистической игре ситуации равновесия — это седловые точки функции $F(x, y)$ на $X \times Y$.

Обсудим, как можно использовать понятие равновесия по Нэшу с точки зрения принятия решений. В теории игр, как и во многих других теориях, можно выделить два подхода: *нормативный* и *позитивный*. Нормативный подход состоит в том, что теория дает рекомендации, как следует действовать в той или иной конфликтной ситуации. А при позитивном подходе теория пытается описать, как на самом деле происходит

взаимодействие между игроками. Изначально теория игр развивалась как нормативная. И сейчас мы обсудим понятие равновесия по Нэшу именно с такой точки зрения. В этом случае правило принятия решения можно сформулировать следующим образом: в конфликтной ситуации, описываемой игрой в нормальной форме, каждому участнику следует использовать стратегию, которая входит в равновесие по Нэшу. Позитивный подход обсуждается в конце § 10.

Ситуация равновесия в произвольной игре двух лиц может не обладать теми свойствами, которые характерны для седловой точки антагонистической игры.

В антагонистической игре, имеющей решение, компоненты седловой точки являются максиминной и минимаксной стратегиями игроков и, наоборот, любая пара таких стратегий образует седловую точку. Таким образом, в антагонистической игре принцип равновесия согласуется с принципом оптимизации игроками своих гарантированных результатов. Кроме того, во всех седловых точках выигрыш первого игрока один и тот же и равен значению игры. К сожалению, в общем случае ситуации равновесия не обладают указанными свойствами. Убедимся в этом на примерах. Предварительно введем понятие *биматричной игры*.

Определение. Игра двух лиц Γ называется биматричной, если множества стратегий игроков конечны:

$$X = \{1, \dots, m\}, \quad Y = \{1, \dots, n\}.$$

Здесь $i \in X$, $j \in Y$ — стратегии первого и второго игроков. Выигрыши игроков задаются двумя матрицами

$$A = (F(i, j))_{m \times n} = (a_{ij})_{m \times n}, \quad B = (G(i, j))_{m \times n} = (b_{ij})_{m \times n}.$$

Запишем определение ситуации равновесия в обозначениях биматричной игры.

Определение. Ситуация (i^0, j^0) биматричной игры Γ называется ситуацией равновесия (равновесием по Нэшу), если

$$a_{i^0 j^0} \leq a_{i^0 j}, \quad i = 1, \dots, m, \quad b_{i^0 j^0} \leq b_{i^0 j}, \quad j = 1, \dots, n.$$

Всегда ли в игре двух лиц существует ситуация равновесия? В общем случае ответ — отрицательный, поскольку, например, в антагонистической игре не всегда существует седловая точка.

Приведем пример неантагонистической игры, не имеющей ситуации равновесия.

Пример 9.1. Покупатель (игрок 2) приходит на рынок за яблоками. Продавец, торгующий яблоками (игрок 1), использует пружинные весы. У него есть две стратегии:

- 1) честно взвесить 1 кг яблок;
- 2) подкрутить пружинку и обвесить покупателя на 200 грамм.

Назовем эти стратегии "честность" и "обман" соответственно.

Покупатель также имеет две стратегии:

- 1) поверив продавцу, заплатить деньги и уйти;
- 2) взвесить купленные яблоки на контрольных весах и в случае обнаружения обмана звать кого-то и доказывать, что его обвесили.

Назовем эти стратегии "поверить" и "проверить" соответственно.

Определим выигрыши продавца и покупателя в каждой ситуации:

а) Продавец честно взвесил, а покупатель ему поверил. Соответствующие выигрыши обоих, равные 0, выберем в качестве начала отсчета.

б) Продавец обманул, а покупатель ему поверил. Выигрыш продавца равен 1, так как он получил дополнительную прибыль. Выигрыш покупателя равен -1 , поскольку он получил меньше яблок.

в) Продавец честно взвесил, а покупатель его проверил. Выигрыш продавца равен 0. Выигрыш покупателя равен $-1/2$: он, во-первых, зря потратил время, а, во-вторых, глупо себя чувствует.

г) Продавец обманул, а покупатель его проверил. Выигрыш продавца равен -1 , так как обнаружение обмана грозит ему определенными неприятностями (например, его могут лишить лицензии на торговлю на этом рынке). Выигрыш покупателя равен $1/2$, так как, во-первых, ему возместили обвес, а, во-вторых, он испытывает моральное удовлетворение от разоблачения обманщика.

Получается следующая биматричная игра:

$$A = \begin{array}{c} \text{честн} \\ \text{обман} \end{array} \begin{array}{cc} \text{пов} & \text{пров} \\ \left(\begin{array}{cc} 0 & 0 \\ 1 & -1 \end{array} \right), & B = \begin{array}{c} \text{честн} \\ \text{обман} \end{array} \begin{array}{cc} \text{пов} & \text{пров} \\ \left(\begin{array}{cc} 0 & -1/2 \\ -1 & 1/2 \end{array} \right).$$

Легко проверить, что здесь нет равновесий по Нэшу.

В приведенном примере элементы матриц A и B удовлетворяют следующим неравенствам:

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ \wedge & \vee \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} b_{11} & > & b_{12} \\ b_{21} & < & b_{22} \end{pmatrix}.$$

Упражнение 9.2. Проверить, что если элементы в матрицах выигрышей игроков связаны такими соотношениями, то в игре не существует равновесий по Нэшу.

Игры, подобные примеру 9.1, распространены в моделях, описывающих экономические и экологические взаимодействия. Рассмотрим пример игры, имеющей две ситуации равновесия.

Пример 9.2. Игра "семейный спор":

$$A = \begin{matrix} & \begin{matrix} \text{Ф} & \text{Т} \end{matrix} \\ \begin{matrix} \text{Ф} \\ \text{Т} \end{matrix} & \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \end{matrix}, \quad B = \begin{matrix} & \begin{matrix} \text{Ф} & \text{Т} \end{matrix} \\ \begin{matrix} \text{Ф} \\ \text{Т} \end{matrix} & \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \end{matrix}.$$

Интерпретация. Жена и муж (первый и второй игроки) обсуждают вопрос, куда пойти развлечься: на футбол (стратегия 1) или в театр (стратегия 2). Если идут на футбол, то жена получает 1 единицу, а муж — 2 единицы "удовольствия". Если идут в театр, то выигрыш жены — 2, а мужа — 1. Если оба идут в разные места, то выигрыши игроков — нулевые.

В игре существует две ситуации равновесия: (1,1) и (2,2). Первая из них предпочтительней второму игроку, а вторая — первому. Если игроки будут действовать независимо, то первый выберет стратегию 2, а второй — стратегию 1. В результате оба получают по нулю. Пример 9.2 показывает, что необходим какой-то механизм координации при выборе стратегии, если существует несколько равновесий по Нэшу. Поэтому игры, подобные примеру 9.2, называют также "играми на координацию".

Использование ситуаций равновесия на практике часто связывается со следующим сценарием поведения игроков. Они сначала должны договориться о ситуации равновесия, затем всякие переговоры запрещаются и игроки независимо выбирают свои стратегии, возможно нарушая принятое соглашение. Заметим, что одному игроку будет невыгодно отклоняться от своей равновесной стратегии. Если игроки придерживаются в игре такого сценария поведения, то игра Γ называется *бескоалиционной*.

Приведем еще один пример "игры на координацию".

Пример 9.3. Игроками являются два водителя, которым надо проехать через перекресток, к которому они подъехали одновременно. Есть две стратегии пересечения перекрестка: использовать "правило правой руки", согласно которому водитель должен пропустить помеху справа

(стратегия 1), или "правило левой руки", согласно которому водитель должен пропустить помеху слева (стратегия 2). Если оба водителя придерживаются одного правила, то они успешно разъедутся, но если один из них использует "правило правой руки", а другой "правило левой руки", то может возникнуть авария. Следовательно, для благоприятного исхода в таких играх у всех игроков должен быть одинаковый подход к выбору правил поведения.

Упражнение 9.3. Объяснить (см. рис. 9.1), почему выигрыши игроков в последнем примере можно задать следующими матрицами:

$$A = \begin{matrix} & \text{пр.р} & \text{лев.р} \\ \begin{matrix} \text{пр.р} \\ \text{лев.р} \end{matrix} & \begin{pmatrix} 1 & -10 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \end{matrix}, \quad B = \begin{matrix} & \text{пр.р} & \text{лев.р} \\ \begin{matrix} \text{пр.р} \\ \text{лев.р} \end{matrix} & \begin{pmatrix} 0 & -10 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \end{matrix}.$$




Рис. 9.1

Рассмотренные в примерах 9.2 и 9.3 игры характеризуются следующими соотношениями элементов матриц выигрыша:

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ \vee & \wedge \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} b_{11} > b_{12} \\ b_{21} < b_{22} \end{pmatrix}.$$

Упражнение 9.4. Проверить, что при выполнении таких соотношений в игре всегда существует два равновесия по Нэшу.

Приведем пример, который показывает, что равновесие по Нэшу может быть неэффективным с точки зрения интересов игроков.

Пример 9.4. Игра "дилемма заключенного":

$$A = \begin{matrix} & \text{пр} & \text{нет} \\ \begin{matrix} \text{пр} \\ \text{нет} \end{matrix} & \begin{pmatrix} -8 & 0 \\ -10 & -1 \end{pmatrix} \end{matrix}, \quad B = \begin{matrix} & \text{пр} & \text{нет} \\ \begin{matrix} \text{пр} \\ \text{нет} \end{matrix} & \begin{pmatrix} -8 & -10 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \end{matrix}.$$

Интерпретация. Два бандита (игроки 1 и 2), подозреваемые в совершении тяжкого преступления, находятся изолированно друг от друга в предварительном заключении. Ввиду отсутствия прямых улик успех или неуспех обвинения зависит от признания (стратегия 1) или непризнания (стратегия 2) самих бандитов. Если оба бандита признаются (ситуация (1,1)), то они будут признаны виновными и приговорены к 8 годам тюрьмы. Если ни один из них не признается (ситуация (2,2)), то по обвинению в главном преступлении они будут оправданы, но обвинителю все-таки удастся доказать их виновность в некотором сопутствующем менее тяжком преступлении, например, в ношении оружия, в результате чего они будут приговорены к 1 году тюрьмы. Если, наконец, признается только один из них (ситуации (2,1) и (1,2)), то признавшийся будет освобожден (за помощь следствию), а непризнавшийся будет приговорен к отбытию максимального срока — 10 лет.

В этой игре имеется единственная ситуация равновесия (1,1): обоим признаться. Однако есть ситуация (2,2), более выгодная обоим игрокам, но не являющаяся ситуацией равновесия. Следовательно, равновесия по Нэшу могут быть неэффективны в том смысле, что за счет отклонения обоих игроков от ситуации равновесия можно улучшить выигрыши каждого из них.

Описанная в примере 9.4 игра имеет следующую структуру:

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ \vee & \vee \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} b_{11} & > & b_{12} \\ & & & \\ b_{21} & > & b_{22} \end{pmatrix}.$$

Упражнение 9.5. Проверить, что при выполнении таких соотношений в игре всегда существует единственное равновесие по Нэшу.

В связи с последним примером дадим определение ситуации, *оптимальной по Парето*.

Определение. Ситуация (x^0, y^0) игры Γ называется оптимальной по Парето, если не существует такой ситуации (x, y) что выполнены неравенства

$$F(x, y) \geq F(x^0, y^0), \quad G(x, y) \geq G(x^0, y^0)$$

и при этом хотя бы одно из них — строгое.

В примере 9.4 в ситуации (2,2) оба игрока получают по -1 , что больше, чем их выигрыш -8 в ситуации равновесия (1,1). Следовательно, ситуация равновесия не является оптимальной по Парето.

Упражнение 9.6. Докажите, что в антагонистической игре любая ситуация оптимальна по Парето.

Следующий пример показывает, что не всегда равновесные стратегии являются максиминными.

Пример 9.5. Пусть

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 5 \\ 2 & 2 & 3 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 0 & 7 & 8 \end{pmatrix}.$$

Здесь $(1,1)$ — единственная ситуация равновесия, но стратегия 1 первого игрока не является максиминной. Действительно,

$$W(1) = \min_{1 \leq j \leq 3} a_{1j} = 0, \quad W(2) = \min_{1 \leq j \leq 3} a_{2j} = 2.$$

Стратегия 1 второго игрока также не является максиминной. Если игрок неблагоприятно настроен по отношению к партнеру, то он может нарушить соглашение и вместо равновесной стратегии выбрать максиминную. В результате он получит тот же выигрыш 2, что и в ситуации равновесия, а партнер получит 0.

Мы отметили три недостатка понятия равновесия по Нэшу:

- 1) равновесий по Нэшу в игре может не существовать;
- 2) равновесие по Нэшу может быть не единственным;
- 3) равновесие по Нэшу может быть неэффективно.

Но, несмотря на эти недостатки, указанное понятие играет центральную роль в теории принятия решений в конфликтных ситуациях.

Приведем теорему существования ситуации равновесия в игре двух лиц, которая является обобщением теоремы 2.3. Предварительно сформулируем топологическую теорему о *неподвижной точке*.

Теорема 9.1 (Брауэр). Пусть $f : Z \rightarrow Z$ — непрерывное отображение в себя выпуклого компакта Z конечномерного евклидова пространства. Тогда у него существует неподвижная точка $z^0 : f(z^0) = z^0$.

Доказательство теоремы см. в Приложении (ПЗ,П4).

Упражнение 9.7. Докажите теорему для $X = [0, 1]$.

Отметим, что все условия теоремы существенны. Например, если множество Z — невыпуклое, то утверждение теоремы может быть неверным. Действительно, если Z — окружность, а f — ее поворот на угол $\alpha < 2\pi$, то f неподвижной точки не имеет.

Упражнение 9.8. Постройте контрпримеры к утверждению теоремы, если

- 1) $Z = [0, \infty)$;
- 2) $Z = (0, 1]$;
- 3) $Z = [0, 1]$, но функция f разрывна.

Теорема 9.2. Пусть в игре двух лиц Γ множества X и Y — выпуклые компакты евклидовых пространств E^m и E^n . Предположим, что функции $F(x, y)$ и $G(x, y)$ непрерывны на $X \times Y$, функция $F(x, y)$ вогнута по x при любом фиксированном y , а функция $G(x, y)$ вогнута по y при любом фиксированном x . Тогда в игре Γ существует ситуация равновесия.

Доказательство. Вначале предположим, что функции $F(x, y)$ и $G(x, y)$ непрерывны на $X \times Y$ и строго вогнуты по "своим" переменным x и y соответственно. Тогда для любых стратегий y и x множества наилучших ответов игроков

$$X(y) \stackrel{\text{def}}{=} \text{Arg max}_{x \in X} F(x, y) = \{x(y)\}, \quad Y(x) \stackrel{\text{def}}{=} \text{Arg max}_{y \in Y} G(x, y) = \{y(x)\}$$

содержат по одному элементу $x(y)$ и $y(x)$. Согласно теореме 2.2, функции $x(y)$ и $y(x)$ непрерывны. Будем называть их *функциями наилучшего ответа* первого и второго игроков соответственно.

Положим $Z = X \times Y$ и рассмотрим отображение $f : Z \rightarrow Z$, $f(x, y) = (x(y), y(x))$. По теореме 9.1 отображение f имеет неподвижную точку $z^0 = (x^0, y^0) : f(z^0) = z^0$ или $x(y^0) = x^0$, $y(x^0) = y^0$. Следовательно, (x^0, y^0) — ситуация равновесия.

Теперь предположим, что функции $F(x, y)$ и $G(x, y)$ вогнуты по "своим" переменным x и y , но необязательно строго. Положим

$$F_\varepsilon(x, y) = F(x, y) - \varepsilon \sum_{i=1}^m x_i^2, \quad G_\varepsilon(x, y) = G(x, y) - \varepsilon \sum_{j=1}^m y_j^2,$$

где $\varepsilon > 0$. Функции $F_\varepsilon(x, y)$ и $G_\varepsilon(x, y)$ непрерывны на $X \times Y$, $F_\varepsilon(x, y)$ строго вогнута по x , а $G_\varepsilon(x, y)$ строго вогнута по y . По доказанному в игре $\Gamma^\varepsilon = \langle X, Y, F_\varepsilon(x, y), G_\varepsilon(x, y) \rangle$ существует ситуация равновесия $(x^\varepsilon, y^\varepsilon)$. Пусть $\{\varepsilon_h\}$ — такая последовательность чисел, что $\varepsilon_h \rightarrow 0+$ и соответствующая последовательность ситуаций равновесия $\{(x^{\varepsilon_h}, y^{\varepsilon_h})\}$ сходится к некоторой ситуации (x^0, y^0) . По определению $(x^{\varepsilon_h}, y^{\varepsilon_h})$

$$F_{\varepsilon_h}(x, y^{\varepsilon_h}) \leq F_{\varepsilon_h}(x^{\varepsilon_h}, y^{\varepsilon_h}) \quad \forall x \in X,$$

$$G_{\varepsilon_h}(x^{\varepsilon_h}, y) \leq G_{\varepsilon_h}(x^{\varepsilon_h}, y^{\varepsilon_h}) \quad \forall y \in Y.$$

Переходя в этих неравенствах при фиксированных x и y к пределу при $h \rightarrow \infty$, получим

$$F(x, y^0) \leq F(x^0, y^0) \quad \forall x \in X, \quad G(x^0, y) \leq G(x^0, y^0) \quad \forall y \in Y,$$

Это означает, что (x^0, y^0) — ситуация равновесия игры Γ . ■

Рассмотрим метод поиска ситуации равновесия с использованием множеств наилучших ответов $X(y) = \text{Arg max}_{x \in X} F(x, y)$ и $Y(x) = \text{Arg max}_{y \in Y} G(x, y)$.

Он состоит в решении системы включений

$$x^0 \in X(y^0), \quad y^0 \in Y(x^0). \quad (9.1)$$

В случае, когда у игроков существуют непрерывные функции наилучшего ответа $x(y)$ и $y(x)$ (см. первую часть доказательства теоремы 9.2), система включений (9.1) эквивалентна системе уравнений $x(y^0) = x^0, y(x^0) = y^0$.

Пример 9.6. Найдём все ситуации равновесия игры Γ :

$$A = \begin{pmatrix} 2 & \underline{3} & \underline{5} & -1 \\ \underline{4} & -2 & 3 & \underline{4} \\ 2 & 1 & \underline{5} & \underline{4} \\ -1 & 2 & 5 & 3 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} \underline{7} & 5 & 4 & \underline{7} \\ 4 & \underline{5} & \underline{5} & 4 \\ -3 & \underline{6} & \underline{6} & 2 \\ \underline{8} & 7 & 3 & 6 \end{pmatrix}.$$

В матрице A подчеркнуты наибольшие элементы в столбцах, а в матрице B — наибольшие элементы в строках. Общий подчеркнутый элемент соответствует $(3, 3)$ — единственной ситуации равновесия.

Пример 9.7. Рассмотрим игру двух лиц

$\Gamma = \langle X, Y, F(x, y), G(x, y) \rangle$, где X, Y и $F(x, y), G(x, y)$ — множества стратегий и функции выигрыша первого и второго игроков. Пусть

$$X = Y = [0, 1], \quad F(x, y) = -3x^2 + 2y^2 + 7xy, \quad G(x, y) = -(x + y - 1)^2.$$

Функции $F(x, y)$ и $G(x, y)$ строго вогнуты по переменным x и y соответственно. Функции наилучшего ответа —

$$x(y) = \begin{cases} 7y/6, & 0 \leq y \leq 6/7, \\ 1, & 6/7 < y \leq 1, \end{cases} \quad y(x) = 1 - x.$$

Решая систему $x(y) = x$, $y(x) = y$, находим $x^0 = 7/13$, $y^0 = 6/13$.

Для численного решения системы включений (9.1) часто применяется *процедура нащупывания по Курно*. Она заключается в построении последовательности стратегий:

$$x^1 \in X, y^1 \in Y(x^1), x^2 \in X(y^1), y^2 \in Y(x^2) \text{ и т.д.}$$

Пусть последовательности стратегий $\{x^k\}$, $\{y^k\}$ сходятся соответственно к x^0 и y^0 . Тогда (x^0, y^0) — ситуация равновесия, поскольку для (x^0, y^0) справедлива система включений (9.1) (см. доказательство теоремы 2.2). Однако последовательности $\{x^k\}$, $\{y^k\}$ сходятся не всегда.

Пример 9.8. Рассмотрим антагонистическую игру $\Gamma = \langle X, Y, F(x, y) \rangle$, в которой

$$X = Y = [-1, 1], F(x, y) = -x^2 + 2axy + y^2,$$

где $a \in (0, 1]$ — параметр. Функция $F(x, y)$ строго вогнута по x , строго выпукла по y и имеет единственную седловую точку $(0, 0)$. Функции наилучшего ответа игроков равны $x(y) = ay$, $y(x) = -ax$. Пусть $x^1 \neq 0$. Тогда процедура нащупывания по Курно порождает последовательности $\{x^k = (-a)^{k-1}x^1\}$, $\{y^k = (-a)^kx^1\}$, сходящиеся при $0 < a < 1$ и расходящиеся при $a = 1$.

Следующий пример показывает, что для поиска равновесия по Нэшу можно использовать необходимые условия оптимальности первого порядка.

Пример 9.9. Модель *дуополии*. Две фирмы выпускают бесконечно-делимый товар для продажи на рынке. Пусть x и y — количества товара, выпускаемого первой и второй фирмами, а $0 < c_1 \leq c_2$ — затраты на его производство, т.е. себестоимости единицы товара для обеих фирм. Цена товара $p(x + y)$ зависит от общего выпуска $x + y$. Функции выигрыша фирм $F(x, y) = (p(x + y) - c_1)x$ и $G(x, y) = (p(x + y) - c_2)y$ — прибыли, полученные от реализации произведенной продукции.

Пусть цена на продукцию определяется по следующей формуле $p(x + y) = K/(x + y)^\alpha$, где $1 \geq \alpha > 0$. Тогда можно считать, что $X = [0, (K/c_1)^{1/\alpha}]$, поскольку при $x > (K/c_1)^{1/\alpha}$ первая фирма терпит убытки. Аналогично $Y = [0, (K/c_2)^{1/\alpha}]$.

Заметим, что для полученной игры выполнены условия теоремы 9.2 и ситуация равновесия (x^0, y^0) существует. Пусть $x^0 > 0$, $y^0 > 0$. Тогда

равновесные стратегии x^0, y^0 находятся из системы уравнений

$$F'_x(x^0, y^0) = \frac{K}{(x^0 + y^0)^\alpha} - c_1 - \frac{\alpha K x^0}{(x^0 + y^0)^{\alpha+1}} = 0,$$

$$G'_y(x^0, y^0) = \frac{K}{(x^0 + y^0)^\alpha} - c_2 - \frac{\alpha K y^0}{(x^0 + y^0)^{\alpha+1}} = 0.$$

Складывая уравнения, находим сначала сумму

$$x^0 + y^0 = \left(\frac{(2 - \alpha)K}{c_1 + c_2} \right)^{1/\alpha}, \quad \text{а затем}$$

$$(x^0, y^0) = \frac{1}{\alpha(2 - \alpha)K} \left(\frac{(2 - \alpha)K}{c_1 + c_2} \right)^{(\alpha+1)/\alpha} \left(c_2 + (\alpha - 1)c_1, c_1 + (\alpha - 1)c_2 \right).$$

Поскольку $y^0 > 0$, то необходимо $c_1 + (\alpha - 1)c_2 > 0$. Если выполнено неравенство $c_1 + (\alpha - 1)c_2 \leq 0$, то первая фирма является на рынке монополистом и равновесные стратегии имеют вид

$$x^0 = \left(\frac{(1 - \alpha)K}{c_1} \right)^{1/\alpha}, \quad y^0 = 0.$$

Байесовское равновесие

Пусть в игре двух лиц $\Gamma = \langle X, Y, F(x, y, c), G(x, y, c) \rangle$ функции выигрыша игроков $F(x, y, c)$ и $G(x, y, c)$ зависят не только от ситуации (x, y) , но и от случайного вектора параметров $c = (c_1, c_2) \in C$. Предположим, что множество C конечно и $p(c), c \in C$ — вероятностное распределение на C , известное всем игрокам. Пусть C_k — множество значений, принимаемых параметром c_k , когда вектор c пробегает множество C . Игроку k перед выбором стратегии становится известным значение "своего" параметра $c_k, k = 1, 2$. Поэтому стратегией первого игрока является функция $\tilde{x} : C_1 \rightarrow X$, а второго — функция $\tilde{y} : C_2 \rightarrow Y$. Множество всех таких функций $\tilde{x}$ обозначим через $\tilde{X}$, а функций $\tilde{y}$ — через $\tilde{Y}$.

Определим осредненные функции выигрыша игроков

$$\tilde{F}(\tilde{x}, \tilde{y}) = \sum_{c \in C} p(c) F(\tilde{x}(c), \tilde{y}(c), c), \quad \tilde{G}(\tilde{x}, \tilde{y}) = \sum_{c \in C} p(c) G(\tilde{x}(c), \tilde{y}(c), c).$$

Определение. Игра $\tilde{\Gamma} = \langle \tilde{X}, \tilde{Y}, \tilde{F}(\tilde{x}, \tilde{y}), \tilde{G}(\tilde{x}, \tilde{y}) \rangle$ и ситуации равновесия в ней называются *байесовскими*.

Пример 9.10. В продолжение примера 9.9 рассмотрим модель *дуполии* с функциями выигрыша игроков $F(x, y, c_1) = (p(x + y) - c_1)x$, $G(x, y, c_2) = (p(x + y) - c_2)y$ и линейной функцией цены $p(x + y) = a - x - y$. Пусть себестоимость c_1 известна обоим игрокам, а себестоимость c_2 представляет собой случайную величину, принимающую значения c_2^1 и c_2^2 с вероятностью $1/2$. В этих предположениях стратегия $\tilde{x}$ игрока 1 является функцией-константой и совпадает с x . Положим $y^i = \tilde{y}(c_2^i)$, $i = 1, 2$. Тогда в байесовской игре функции выигрыша игроков имеют вид

$$\tilde{F}(\tilde{x}, \tilde{y}) = \left(a - x - \left(\frac{y^1 + y^2}{2} \right) - c_1 \right) x,$$

$$\tilde{G}(\tilde{x}, \tilde{y}) = \frac{1}{2}(a - x - y^1 - c_2^1)y^1 + \frac{1}{2}(a - x - y^2 - c_2^2)y^2.$$

Найдем байесовскую ситуацию равновесия $(x^0, (y^{01}, y^{02}))$ при $a > 2 \max[c_1, c_2^1, c_2^2]$. Функции наилучшего ответа игроков имеют вид

$$\tilde{x}^*(y^1, y^2) = \max \left[\frac{a - c_1}{2} - \frac{y^1 + y^2}{4}, 0 \right],$$

$$\tilde{y}^*(c_2^i, x) = \max \left[\frac{a - c_2^i}{2} - \frac{x}{2}, 0 \right], \quad i = 1, 2.$$

Решая систему уравнений

$$\tilde{x}^*(y^1, y^2) = x, \quad \tilde{y}^*(c_2^i, x) = y^i, \quad i = 1, 2,$$

находим ситуацию равновесия

$$x^0 = \frac{1}{3} \left(a - 2c_1 + \frac{c_2^1 + c_2^2}{2} \right),$$

$$y^{01} = \frac{1}{3} \left(a + c_1 - \frac{7}{4}c_2^1 - \frac{1}{4}c_2^2 \right), \quad y^{02} = \frac{1}{3} \left(a + c_1 - \frac{7}{4}c_2^2 - \frac{1}{4}c_2^1 \right).$$

§ 10. Ситуации равновесия в биматричных играх

Перейдем к смешанным расширениям биматричных игр Γ , задаваемых матрицами

$$A = (a_{ij})_{m \times n}, \quad B = (b_{ij})_{m \times n}.$$

Смешанные стратегии игроков здесь такие же, как и в матричной игре: $p \in P, \quad q \in Q$. Ожидаемые выигрыши игроков —

$$A(p, q) = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n p_i a_{ij} q_j, \quad B(p, q) = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n p_i b_{ij} q_j.$$

В результате получили смешанное расширение биматричной игры

$$\bar{\Gamma} = \langle P, Q, A(p, q), B(p, q) \rangle.$$

Ситуации равновесия игры $\bar{\Gamma}$ будем называть ситуациями равновесия в смешанных стратегиях (или смешанными равновесиями по Нэшу) исходной игры Γ .

Множества смешанных стратегий P и Q — выпуклые компакты евклидовых пространств, а функции $A(p, q)$ и $B(p, q)$ билинейны. По теореме 9.2 в игре Γ существует ситуация равновесия с смешанных стратегиях (p^0, q^0) . Для нее по определению выполнены неравенства

$$A(p, q^0) \leq A(p^0, q^0) \quad \forall p \in P, \quad B(p^0, q) \leq B(p^0, q^0) \quad \forall q \in Q.$$

Рассмотрим свойства ситуаций равновесия в смешанных стратегиях, аналогичные свойствам решений матричных игр.

Лемма 10.1. Для того чтобы ситуация (p^0, q^0) была ситуацией равновесия в смешанных стратегиях биматричной игры Γ , необходимо и достаточно, чтобы было выполнено условие

$$\begin{cases} A(i, q^0) \leq A(p^0, q^0), & i = 1, \dots, m, \\ B(p^0, j) \leq B(p^0, q^0), & j = 1, \dots, n. \end{cases} \quad (*)$$

Доказательство. Необходимость. Пусть (p^0, q^0) — ситуация равновесия. Тогда $A(p, q^0) \leq A(p^0, q^0) \quad \forall p \in P$. Полагая $p = (0, \dots, 0, 1, 0, \dots, 0)$, получим неравенства условия (*) для матрицы A . Аналогично выводятся неравенства для матрицы B .

Достаточность. Пусть ситуация (p^0, q^0) удовлетворяет условию (*). Возьмем произвольную смешанную стратегию p первого игрока, домножим неравенства $A(i, q^0) \leq A(p^0, q^0)$ на p_i и сложим их. В результате получим неравенство $A(p, q^0) \leq A(p^0, q^0)$. Аналогично, для любой смешанной стратегии q второго игрока справедливо неравенство $B(p^0, q) \leq B(p^0, q^0)$. ■

Теорема 10.1 (свойство дополняющей нежесткости). Пусть (p^0, q^0) — ситуация равновесия в смешанных стратегиях биматричной игры Γ . Тогда

- 1) $p_i^0 > 0 \Rightarrow A(i, q^0) = A(p^0, q^0)$;
- 2) $q_j^0 > 0 \Rightarrow B(p^0, j) = B(p^0, q^0)$.

Доказательство. Докажем утверждение 1). Предположим, что для некоторого i_1 $p_{i_1}^0 > 0$ и $A(i_1, q^0) < A(p^0, q^0)$. В условии (*) каждое неравенство $A(i, q^0) \leq A(p^0, q^0)$, $i = 1, \dots, t$ умножим на p_i^0 и сложим их. Поскольку i_1 -е неравенство сохранится строгим, получим $A(p^0, q^0) < A(p^0, q^0)$ (противоречие). Утверждение 2) доказывается аналогично. ■

Следствие. Пусть (p^0, q^0) — ситуация равновесия в смешанных стратегиях биматричной игры Γ . Тогда

- 1) $A(i, q^0) < A(p^0, q^0) \Rightarrow p_i^0 = 0$;
- 2) $B(p^0, j) < B(p^0, q^0) \Rightarrow q_j^0 = 0$.

Теорема 10.2. Для того чтобы ситуация (p^0, q^0) была ситуацией равновесия в смешанных стратегиях биматричной игры Γ , необходимо и достаточно, чтобы нашлись множества $X^0 \subseteq X$, $Y^0 \subseteq Y$ и числа v_1, v_2 , для которых выполнены условия

$$\begin{cases} \sum_{j \in Y^0} a_{ij} q_j^0 = v_1 & \forall i \in X^0, \\ \sum_{j \in Y^0} a_{ij} q_j^0 \leq v_1 & \forall i \notin X^0, \\ \sum_{j \in Y^0} q_j^0 = 1, \quad q_j^0 \geq 0 & \forall j \in Y^0, \end{cases} \quad (10.1)$$

$$\begin{cases} \sum_{i \in X^0} p_i^0 b_{ij} = v_2 & \forall j \in Y^0, \\ \sum_{i \in X^0} p_i^0 b_{ij} \leq v_2 & \forall j \notin Y^0, \\ \sum_{i \in X^0} p_i^0 = 1, \quad p_i^0 \geq 0 & \forall i \in X^0. \end{cases} \quad (10.2)$$

Доказательство. Необходимость. Пусть (p^0, q^0) – ситуация равновесия. Положим $v_1 = A(p^0, q^0)$, $v_2 = B(p^0, q^0)$,

$$X^0 = \{i \in X \mid p_i^0 > 0\}, \quad Y^0 = \{j \in Y \mid q_j^0 > 0\}.$$

Условия (10.1) и (10.2) вытекают из леммы 10.1 и теоремы 10.1.

Достаточность. Пусть для ситуации (p^0, q^0) выполнены условия (10.1) и (10.2). Покажем, что тогда необходимо $A(p^0, q^0) = v_1$. Действительно, из (10.1)

$$\sum_{j \in Y^0} a_{ij} q_j^0 = \sum_{j=1}^n a_{ij} q_j^0 = v_1 \quad \forall i \in X^0.$$

Умножая эти равенства на p_i^0 , $i \in X^0$, и складывая их, получим $A(p^0, q^0) = v_1$. Аналогично доказывается, что $B(p^0, q^0) = v_2$. По лемме 10.1 (p^0, q^0) является ситуацией равновесия. ■

Упражнение 10.1. Докажите, что в игре Γ с матрицами

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

существует единственное равновесие по Нэшу

$$(p^0, q^0) = ((1/3, 1/3, 1/3), (1/3, 1/3, 1/3)).$$

Сформулируем условие, обеспечивающее равенство $|X^0| = |Y^0|^1$. В этом случае матрицы систем (9.7) и (9.8)

$$\bar{A} = (a_{ij})_{i \in X^0, j \in Y^0}, \quad \bar{B} = (b_{ij})_{i \in X^0, j \in Y^0}$$

являются квадратными.

Определение. Говорят, что система векторов $a^{(i)} \in E^m$, $i \in X^0$, $|X^0| \geq m + 1$ имеет *максимальный аффинный ранг*, если найдутся такой номер $i_0 \in X^0$ и такое множество $X^1 \subset X^0$, $i_0 \notin X^1$, $|X^1| = m$, что векторы $a^{(i)} - a^{(i_0)}$, $i \in X^1$ линейно независимы. Например, при $m = 2$ система точек на плоскости тогда и только тогда имеет максимальный аффинный ранг, когда точки не лежат на одной прямой.

Определение. Говорят, что матрица A (матрица B) находится в *общем положении*, если система строк (столбцов) любой ее подматрицы $\bar{A} =$

¹Множества X^0 и Y^0 содержат равное число элементов.

$(a_{ij})_{i \in X^0, j \in Y^0}$ с $|X^0| > |Y^0|$ (подматрицы $\bar{B} = (b_{ij})_{i \in X^0, j \in Y^0}$ с $|X^0| < |Y^0|$) имеет максимальный аффинный ранг.

Отметим, что для любых двух матриц A и B найдутся сколь угодно поэлементно близкие матрицы A' и B' , для которых выполнено условие общности положения. Это утверждение можно доказать, используя непрерывность определителя матрицы как функции ее элементов.

Теорема 10.3. Пусть матрицы A и B игры Γ находятся в общем положении. Тогда для *любой* ситуации равновесия (p^0, q^0) в смешанных стратегиях найдутся такие множества $X^0 \subseteq X$, $Y^0 \subseteq Y$ и такие числа v_1, v_2 , что выполнены условия (10.1), (10.2) и $|X^0| = |Y^0|$.

Доказательство. Пусть (p^0, q^0) – произвольная ситуация равновесия в смешанных стратегиях. Тогда по теореме 10.2 найдутся такие множества $X^0 \subseteq X$, $Y^0 \subseteq Y$ и такие числа v_1, v_2 , что выполнены условия (10.1) и (10.2).

Докажем, что $|X^0| = |Y^0|$. Предположим, что $|X^0| > |Y^0|$. Рассмотрим подматрицу $\bar{A} = (a_{ij})_{i \in X^0, j \in Y^0}$, отвечающую системе уравнений (10.1). Из условия общности положения найдутся такой номер $i_0 \in X^0$ и такое множество $X^1 \subset X^0$, $i_0 \notin X^1$, $|X^1| = |Y^0|$, что матрица $(a_{ij} - a_{i_0j})_{i \in X^1, j \in Y^0}$ – невырожденная.

Из (10.1) получаем систему уравнений

$$\sum_{j \in Y^0} (a_{ij} - a_{i_0j}) q_j^0 = 0 \quad \forall i \in X^1,$$

имеющую нулевое решение $q_j^0 = 0$, $j \in Y^0$, что противоречит равенству $\sum_{j \in Y^0} q_j^0 = 1$.

Аналогично приходим к противоречию, предполагая, что $|X^0| < |Y^0|$.

■

Условие общности положения для матриц A и B трудно проверить. Отказавшись от него, можно получить утверждение, более слабое, чем теорема 10.3.

Теорема 10.3'. В любой биматричной игре Γ для *некоторой* ситуации равновесия (p^0, q^0) в смешанных стратегиях найдутся такие множества $X^0 \subseteq X$, $Y^0 \subseteq Y$ и такие числа v_1, v_2 , что выполнены условия (10.1), (10.2) и $|X^0| = |Y^0|$.

Доказательство. Для матриц A и B найдутся такие последовательности матриц $\{A^k\}$, $\{B^k\}$, удовлетворяющих условию общности положения, что поэлементно $A^k \rightarrow A$, $B^k \rightarrow B$.

Возьмем последовательность ситуаций равновесия $\{(p^k, q^k)\}$ игр Γ^k с матрицами A^k, B^k . По теореме 10.3 найдутся такие множества $X^k \subseteq X$, $Y^k \subseteq Y$ и числа v_1^k, v_2^k , что $|X^k| = |Y^k|$ и выполнены условия

$$\begin{cases} \sum_{j \in Y^k} a_{ij} q_j^k = v_1^k & \forall i \in X^k, \\ \sum_{j \in Y^k} a_{ij} q_j^k \leq v_1^k & \forall i \notin X^k, \\ \sum_{j \in Y^k} q_j^k = 1, q_j^k \geq 0 & \forall j \in Y^k, \end{cases} \quad \begin{cases} \sum_{i \in X^k} p_i^k b_{ij}^k = v_2^k & \forall j \in Y^k, \\ \sum_{i \in X^k} p_i^k b_{ij}^k \leq v_2^k & \forall j \notin Y^k, \\ \sum_{i \in X^k} p_i^k = 1, p_i^k \geq 0 & \forall i \in X^k. \end{cases}$$

Без потери общности (выделяя соответствующие подпоследовательности) можно считать, что $p^k \rightarrow p^0$, $q^k \rightarrow q^0$ и $X^k = X^0$, $Y^k = Y^0$ при всех k . Переходя в последних уравнениях и неравенствах к пределу при $k \rightarrow \infty$, получим условия (10.1), (10.2) для смешанных стратегий p^0, q^0 . По теореме 10.2 ситуация (p^0, q^0) будет равновесием по Нэшу. ■

Рассмотрим алгоритм поиска ситуаций равновесия в смешанных стратегиях. Перебираем квадратные подматрицы

$$\bar{A} = (a_{ij})_{i \in X^0, j \in Y^0}, \quad \bar{B} = (b_{ij})_{i \in X^0, j \in Y^0}$$

и решаем системы уравнений из (10.1), (10.2). Если решения этих систем p_i^0 , $i \in X^0$, v_1 и q_j^0 , $j \in Y^0$, v_2 удовлетворяют неравенствам из условий 10.1 и 10.2, то, добавляя компоненты $p_i = 0$, $i \notin X^0$, $q_j = 0$, $j \notin Y^0$, получим ситуацию равновесия (p^0, q^0) . Из теоремы 10.3' вытекает, что через конечное число шагов алгоритм приводит к ситуации равновесия.

Проиллюстрируем работу алгоритма для игр с матрицами размеров $2 \times n$:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & \cdots & a_{2n} \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} b_{11} & \cdots & b_{1n} \\ b_{21} & \cdots & b_{2n} \end{pmatrix}.$$

В данном случае смешанная стратегия первого игрока имеет вид $p = (p_1, 1 - p_1)$, где $0 \leq p_1 \leq 1$. Перебирать нужно 2×2 -подматрицы. Каждая из них задается номерами двух столбцов j_1, j_2 . Запишем систему (10.2)

$$\begin{aligned} p_1^0 b_{1j_1} + (1 - p_1^0) b_{2j_1} &= v_2, & p_1^0 b_{1j_2} + (1 - p_1^0) b_{2j_2} &= v_2, \\ p_1^0 b_{1j} + (1 - p_1^0) b_{2j} &\leq v_2 & \forall j \neq j_1, j_2, & 0 \leq p_1^0 \leq 1. \end{aligned}$$

Если эта система несовместна, то перейдем к другой паре j_1, j_2 . Если решение p_1^0, v_1 системы (10.2) существует, то рассмотрим систему (10.1)

$$a_{1j_1} q^* + a_{1j_2} (1 - q^*) = v_1, \quad a_{2j_1} q^* + a_{2j_2} (1 - q^*) = v_1, \quad 0 \leq q^* \leq 1.$$

Пусть существует ее решение¹ q^*, v_1 . Определим стратегию

$$q^0 : q_j^0 = \begin{cases} q^*, & j = j_1, \\ 1 - q^*, & j = j_2, \\ 0, & j \neq j_1, j_2, \end{cases}$$

и ситуация (p^0, q^0) будет смешанным равновесием по Нэшу.

Здесь алгоритму можно дать геометрическую интерпретацию. На отрезке $0 \leq p_1 \leq 1$ строим прямые $l_j(p_1) = b_{1j}p_1 + b_{2j}(1 - p_1)$, $j = 1, \dots, n$. Точки излома верхней огибающей семейства прямых l_j соответствуют парам j_1, j_2 , для которых существует решение p_1^0, v_2 системы (10.2). Поэтому последовательно перебираем точки верхней огибающей и решаем систему уравнений из (10.1) с проверкой неравенств $0 \leq q^* \leq 1$.

При $n = 2$ обе матрицы A и B имеют размеры 2×2 . В этом случае прямые $l_1(p_1) = b_{11}p_1 + b_{21}(1 - p_1)$ и $l_2(p_1) = b_{12}p_1 + b_{22}(1 - p_1)$ тогда и только тогда пересекаются в точке $0 \leq p_1^0 \leq 1$, когда выполнено неравенство (рис. 10.1)

$$(b_{22} - b_{21})(b_{11} - b_{12}) \geq 0. \quad (10.3)$$




Рис. 10.1

Если столбцы матрицы B (и соответствующие прямые l_1 и l_2) не совпадают, то компоненты смешанной стратегии p^0 , удовлетворяющей системе (10.2), можно записать в явном виде

$$p_1^0 = \frac{b_{22} - b_{21}}{b_{22} - b_{21} + b_{11} - b_{12}}, \quad p_2^0 = \frac{b_{11} - b_{12}}{b_{22} - b_{21} + b_{11} - b_{12}}. \quad (10.4)$$

¹В противном случае переходим к другой паре j_1, j_2 .

Для системы (10.1), из которой вычисляется смешанная стратегия второго игрока, все рассуждения проводятся аналогичным образом. В результате мы получим следующее условие на матрицу первого игрока, обеспечивающее существование решения системы (10.1):

$$(a_{22} - a_{12})(a_{11} - a_{21}) \geq 0. \quad (10.5)$$

Это условие можно выписать и сразу, исходя из следующих соображений: надо заменить второго игрока первым и учесть, что второй игрок выбирал свои стратегии по столбцам, а первый выбирает их по строкам. Поэтому, чтобы выписать условие существования решения, надо выписать условие (10.3), заменив одну матрицу на другую, а строки на столбцы. Если строки матрицы A не совпадают, то компоненты смешанной стратегии q^0 , удовлетворяющей системе (10.1), можно записать в явном виде

$$q_1^0 = \frac{a_{22} - a_{12}}{a_{22} - a_{12} + a_{11} - a_{21}}, \quad q_2^0 = \frac{a_{11} - a_{21}}{a_{22} - a_{12} + a_{11} - a_{21}}. \quad (10.6)$$

Пример 10.1. Модель технического контроля за качеством продукции.

Завод выпускает автомобили партиями по 100 штук. За каждую автомашину завод получает от концерна 1.3 ед. оплаты, из которых 1 ед. составляют премиальные, а 0.3 ед. предназначены для операций технического контроля (ОТК). Завод (игрок 1) может выпускать партию автомобилей либо с ОТК (стратегия 1), либо без ОТК (стратегия 2), увеличивая сумму премиальных. При использовании первой стратегии итоговая сумма премиальных, полученная заводом за партию, составляет 100 ед., при использовании второй стратегии — 130 ед.

С целью уменьшения производственного брака концерн решил привлечь независимую фирму, осуществляющую технический контроль за качеством продукции. Стоимость проверки автомобиля для фирмы составляет 0.12 ед. Если ОТК заводом не проводится, то автомобиль неисправен с вероятностью $4/5$. В случае обнаружения неисправностей завод обязан их устранить, затратив 0.3 ед., и заплатить дополнительно фирме 0.2 ед. из своих премиальных. Фирма (игрок 2) может либо проверить партию (стратегия 1), либо отказаться от ее проверки (стратегия 2).

Выигрышем первого игрока является ожидаемая сумма премиальных, полученная заводом от концерна за партию автомобилей с учетом

издержек на ОТК и возможных выплат фирме. Выигрышем второго игрока является ожидаемая сумма выплат, полученных от завода при проверке партии автомобилей с учетом затрат на эту проверку. Выпишем матрицы игры

$$A = \begin{pmatrix} 100 & 100 \\ 90 & 130 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} -12 & 0 \\ 4 & 0 \end{pmatrix}.$$

Например, если завод не проводит ТК, а фирма проверяет партию, то средние премиальные равны $100(0.8(4/5) + 1.3(1/4)) = 90$ ед., а ожидаемая прибыль фирмы составит $100(0.08(4/5) - 0.12(1/5)) = 4$ ед. Нетрудно видеть, что в данной игре не существует ситуации равновесия в чистых стратегиях. Условия (10.3) и (10.5) выполнены и ситуацию равновесия находим по формулам (10.4) и (10.6)

$$(p^0, q^0) = ((1/4, 3/4), (3/4, 1/4)).$$

Равновесные стратегии p^0 и q^0 могут быть реализованы в виде "физических смесей": первый игрок "должен" 25 автомобилей каждой партии выпускать с ОТК, второй игрок должен проверять по 75 автомобилей каждой партии.

Пример 10.2. Пусть

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 5 \\ 4 & 2 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 3 \end{pmatrix}.$$




Рис. 10.2

Здесь $l_1(p_1) = 3p_1$, $l_2(p_1) \equiv 2$, $l_3(p_1) = 3(1 - p_1)$. Первая точка верхней огибающей (пересечение прямых l_2 и l_3 на рис. 10.2) имеет абсциссу

$p_1^0 = 1/3$. Рассмотрим систему уравнений из 10.1

$$4q^* + 5(1 - q^*) = v_1, \quad 2q^* + (1 - q^*) = v_1.$$

Из нее находим $q^* = 2 > 1$, что невозможно. Переходим ко второй точке огибающей, лежащей на пересечении прямых l_1 и l_2 . Она имеет абсциссу $p_1^0 = 2/3$. Система

$$2q^* + 4(1 - q^*) = v_1, \quad 4q^* + 2(1 - q^*) = v_1$$

имеет решение $q^* = 1/2$, $v_1 = 3$. Поэтому

$$(p^0, q^0) = ((2/3, 1/3), (1/2, 1/2, 0))$$

— искомая ситуация равновесия в смешанных стратегиях.

Отметим, что рассматриваемый алгоритм не всегда приводит к нахождению всех ситуаций равновесия.

Пример 10.3. Пусть

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}.$$

Здесь пересечение прямых l_1 и l_2 дает стратегию $p^0 = (1, 0)$ с нулевой компонентой (вырожденный случай). Решая систему уравнений из (10.1), находим $q^0 = (1/2, 1/2)$. Полученная ситуация равновесия не единственна. Действительно, запишем условие (10.1) для стратегии $(q^*, 1 - q^*)$ второго игрока с учетом свойства дополняющей нежесткости

$$1 - q^* = v_1, \quad q^* \leq v_1, \quad 0 \leq q^* \leq 1.$$

Отсюда $0 \leq q^* \leq 1/2$. Таким образом, в данном примере получили целый отрезок ситуаций равновесия $\{((1, 0), (q^*, 1 - q^*)) \mid 0 \leq q^* \leq 1/2\}$.

Для игры с матрицами размеров 3×3 поиск смешанных равновесий по Нэшу уже требует достаточно большого перебора всевозможных подматриц исходных матриц A и B . Однако в некоторых случаях, обсуждаемых в следующих двух параграфах, этот перебор можно значительно сократить.

Вполне смешанное равновесие

Определение. Ситуация равновесия называется *вполне смешанной*, если все чистые стратегии используются с положительными вероятностями.

В общих предположениях (для "почти любой биматричной игры") вполне смешанное равновесие может существовать, только если $m = n$. Это интуитивно понятно: для нахождения смешанной стратегии второго игрока, в которой все компоненты отличны от нуля, требуется решить систему уравнений из (10.1), содержащую $m + 1$ уравнение с $n + 1$ неизвестным (число элементов во множестве Y плюс еще одно неизвестное v_1). Следовательно, для существования решения должно выполняться условие $n \geq m$. Аналогично, смешанная стратегия первого игрока удовлетворяет системе уравнений из (10.2), содержащей $n + 1$ уравнение с $m + 1$ неизвестным, и для существования решения должно быть $m \geq n$. В результате получаем, что для существования решения обеих систем должно быть $m = n$, если обе системы невырожденные.

Выпишем для вполне смешанного равновесия (p^0, q^0) системы уравнений из (10.1) и (10.2) в матричном виде

$$Aq^0 = v_1 e, \quad \langle q^0, e \rangle = 1, \quad p^0 B = v_2 e, \quad \langle p^0, e \rangle = 1,$$

где $e = (1, \dots, 1) \in E^m$.

Аналогичные системы (5.3) и (5.4) справедливы для крайних оптимальных смешанных стратегий из 5. (Там же см. и способ нахождения решения этих систем.) Пусть матрицы A и B — невырожденные. Тогда

$$q^0 = \frac{A^{-1}e}{\langle A^{-1}e, e \rangle}, \quad v_1 = \frac{1}{\langle A^{-1}e, e \rangle},$$

$$p^0 = \frac{eB^{-1}}{\langle eB^{-1}, e \rangle}, \quad v_2 = \frac{1}{\langle eB^{-1}, e \rangle}.$$

Доминирование в биматричных играх

При поиске ситуаций равновесия в биматричных играх можно использовать доминирование строк матрицы A и столбцов матрицы B .

Определение. Будем говорить, что в биматричной игре Γ стратегия первого игрока i_1 *строго доминирует* стратегию i_2 ($i_1 \succ i_2$) на множестве $\bar{Y} \subseteq Y$, если $a_{i_1j} > a_{i_2j} \forall j \in \bar{Y}$. Будем говорить о *слабом доминировании* ($i_1 \succeq i_2$), если $a_{i_1j} \geq a_{i_2j} \forall j \in \bar{Y}$.

По смыслу при строгом доминировании стратегия i_1 приносит первому игроку больший выигрыш, чем стратегия i_2 , как бы ни играл второй

игрок, используя стратегии из множества $\bar{Y}$. Аналогично вводятся понятия строгого и слабого доминирования для стратегий второго игрока.

Определение. Будем говорить, что в биматричной игре Γ стратегия второго игрока j_1 строго доминирует стратегию j_2 ($j_1 \succ j_2$) на множестве $\bar{X} \subseteq X$, если $b_{ij_1} > b_{ij_2} \forall i \in \bar{X}$. Будем говорить о слабом доминировании ($j_1 \succeq j_2$), если $b_{ij_1} \geq b_{ij_2} \forall i \in \bar{X}$.

Определим *процедуру последовательного исключения строго доминируемых стратегий*. Эта процедура состоит в построении двух последовательностей вложенных множеств $X = X_1 \supseteq X_2 \supseteq \dots \supseteq X_k$ и $Y = Y_1 \supseteq Y_2 \supseteq \dots \supseteq Y_k$. При этом для $l = 1, \dots, k - 1$ выполнены следующие условия:

$$\begin{aligned} \forall i_2 \in X_l \setminus X_{l+1} \quad \exists i_1 \in X_{l+1} : i_1 \succ i_2 \text{ на } Y_l; \\ \forall j_2 \in Y_l \setminus Y_{l+1} \quad \exists j_1 \in Y_{l+1} : j_1 \succ j_2 \text{ на } X_l. \end{aligned}$$

Мы описали процедуру последовательного исключения стратегий формально. Посмотрим, как эта процедура осуществляется на практике.

Шаг 1. Из множеств $X = X_1$ и $Y = Y_1$ строим множества X_2 и Y_2 . Для этого выкидываем из множества X_1 все строго доминируемые на множестве Y_1 стратегии, т.е. мы ищем такие пары стратегий i_1, i_2 , что строка i_1 поэлементно больше строки i_2 в матрице $A : a_{ij} > a_{i_2j}, j = 1, \dots, n$. Вычеркиваем все такие найденные строки i_2 в обеих матрицах. Аналогично ищем столбцы j_2 в матрице B второго игрока, которые строго доминируются другими столбцами $j_1 : b_{ij_1} > b_{ij_2}, i = 1, \dots, m$. Вычеркиваем все такие доминируемые столбцы j_2 из обеих матриц. Предположим, что нам удалось вычеркнуть хотя бы одну строку или столбец. Тогда переходим к шагу 2.

Шаг 2. После вычеркивания строк и столбцов на первом шаге мы получили редуцированные матрицы, в которых множество строк — X_2 , а множество столбцов — Y_2 . При этом либо $X_2 \neq X_1$, либо $Y_2 \neq Y_1$, либо оба множества не совпадают с предыдущими. Может получиться так, что в редуцированных матрицах окажутся новые доминируемые строки и столбцы. Вычеркиваем их и переходим к следующему шагу.

И так далее. Продолжаем процедуру до тех пор, пока не вычеркнем все, что можно. Ниже доказано, что при этом сохраняются все смешанные равновесия по Нэшу.

Определение. Будем говорить, что множество $\bar{Z} = \bar{X} \times \bar{Y}$ строго доминирует множество $Z = X \times Y$ ($\bar{Z} \succ Z$), если оно получено из множества

Z последовательным исключением строго доминируемых стратегий, т.е. в описанной выше процедуре $\bar{X} = X_k$, $\bar{Y} = Y_k$. Будем говорить о слабом доминировании ($\bar{Z} \succeq Z$), если множество $\bar{Z}$ получено из множества Z последовательным исключением слабо доминируемых стратегий.

Рассмотрим понятие доминирования в смешанных стратегиях.

Определение. Будем говорить, что смешанная стратегия p строго доминирует чистую стратегию i на множестве $\bar{Y} \subseteq Y$ ($p \succ i$), если $A(p, j) > a_{ij} \forall j \in \bar{Y}$. Будем говорить о слабом доминировании на множестве $\bar{Y} \subseteq Y$ ($p \succeq i$), если $A(p, j) \geq a_{ij} \forall j \in \bar{Y}$.

Аналогично определяется доминирование в смешанных стратегиях второго игрока.

Как искать строго доминируемую стратегию?

Пример 10.4. Рассмотрим игру Γ с матрицами

$$A = \begin{pmatrix} -4 & 0 & 2 \\ 4 & -1 & 7 \\ -5 & 3 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 4 & 4 & 4 \\ -1 & 3 & 1 \\ -4 & -2 & 1 \end{pmatrix}.$$

Найдём в каждом столбце первой матрицы максимальный элемент. Если максимум единственный и стоит в некоторой строке, то она не может быть строго доминируемой. Следовательно, строго доминируемой может быть только первая строка. В чистых стратегиях доминирования нет. Исследуем доминирование в смешанных стратегиях. Возьмём вторую и третью строки с коэффициентами $1/2$. Видно, что эта комбинация строго доминирует первую строку.

Введём понятия доминирующих множеств для смешанных стратегий.

Определение. Будем говорить, что множество $\bar{Z} = \bar{X} \times \bar{Y}$ строго доминирует множество $Z = X \times Y$ в смешанных стратегиях ($\bar{Z} \succ Z$), если оно получено из множества Z последовательным исключением строго доминируемых по смешанному доминированию стратегий, т.е.

$$\bar{Z} = Z_k \subset Z_{k-1} \subset \dots \subset Z_1 = Z, \quad Z_l = X_l \times Y_l, \quad l = 1, \dots, k,$$

и выполнены условия

$$\forall i \in X_l \setminus X_{l+1} \exists p \in P : p \succ i \text{ на } Y_l, \quad p_s = 0 \quad \forall s \notin X_{l+1};$$

$$\forall j \in Y_l \setminus Y_{l+1} \exists q \in Q : q \succ j \text{ на } X_l, \quad q_k = 0 \quad \forall k \notin Y_{l+1}.$$

Будем говорить, что множество $\bar{Z} = \bar{X} \times \bar{Y}$ слабо доминирует множество $Z = X \times Y$ в смешанных стратегиях ($\bar{Z} \succeq Z$), если оно получено


из множества Z последовательным исключением слабо доминируемых по смешанному доминированию стратегий, т.е.

$$\bar{Z} = Z_k \subset Z_{k-1} \subset \dots \subset Z_1 = Z, \quad Z_l = X_l \times Y_l, \quad l = 1, \dots, k,$$

и выполнены условия

$$\begin{aligned} \forall i \in X_l \setminus X_{l+1} \quad \exists p \in P : p \succeq i \text{ на } Y_l, \quad p_s = 0 \quad \forall s \notin X_{l+1}; \\ \forall j \in Y_l \setminus Y_{l+1} \quad \exists q \in Q : q \succeq j \text{ на } X_l, \quad q_k = 0 \quad \forall k \notin Y_{l+1}. \end{aligned}$$

Как связаны различные отношения доминирования?



Вернёмся к примеру 10.4 и найдём доминирующие множества. Первую строку мы вычеркнули, так как она строго доминируема комбинацией второй и третьей строк. Рассмотрим вторую матрицу. Можно заметить, что первый столбец строго доминируется, например, вторым столбцом. Следовательно, первый столбец можно вычеркнуть. Получаем, что

$$\{2, 3\} \times \{2, 3\} \succ Z.$$

Теперь сформулируем теорему о связи исключения доминируемых стратегий и поиска смешанных равновесий по Нэшу.

Теорема 10.4. 1) Пусть множество $\bar{Z} = \bar{X} \times \bar{Y}$ строго доминирует множество $Z = X \times Y$ в смешанных стратегиях. Тогда для любой ситуации равновесия (p^0, q^0) выполнены условия

$$i \notin \bar{X} \Rightarrow p_i^0 = 0;$$

$$j \notin \bar{Y} \Rightarrow q_j^0 = 0.$$

2) Пусть множество $\bar{Z} = \bar{X} \times \bar{Y}$ слабо доминирует множество $Z = X \times Y$ в смешанных стратегиях и $(\bar{p}, \bar{q})$ — ситуация равновесия в игре с матрицами

$$\bar{A} = (a_{ij})_{i \in \bar{X} \quad j \in \bar{Y}}, \quad \bar{B} = (b_{ij})_{i \in \bar{X} \quad j \in \bar{Y}}.$$

Определим смешанные стратегии

$$p^0 : p_i^0 = \begin{cases} \bar{p}_i, & i \in \bar{X}, \\ 0, & i \in X \setminus \bar{X}; \end{cases} \quad q^0 : q_j^0 = \begin{cases} \bar{q}_j, & j \in \bar{Y}, \\ 0, & j \in Y \setminus \bar{Y}. \end{cases}$$

Тогда (p^0, q^0) — ситуация равновесия в исходной игре Γ .

Упражнение 10.2. Докажите теорему 10.4.

Обсудим смысл теоремы. Второе утверждение говорит о том, что если редуцированная игра получена путем исключения слабо доминируемых стратегий, то каждому смешанному равновесию по Нэшу $(\bar{p}, \bar{q})$ в этой редуцированной игре будет соответствовать смешанное равновесие по Нэшу (p^0, q^0) в исходной игре, определяемое по указанному правилу. Первое утверждение теоремы показывает, что при вычёркивании строк и столбцов по строгому доминированию мы не теряем равновесий по Нэшу.

Таким образом, при поиске всех равновесий по Нэшу можно вычеркнуть все строго доминируемые строки и столбцы и искать равновесие в редуцированной игре. Дополнив нулями найденное равновесие, мы получим равновесие смешанное в исходной игре. Если необходимо найти хотя бы одно смешанное равновесие по Нэшу, тогда можно вычёркивать строки и столбцы по нестроному доминированию. Исключение строк и столбцов позволяет сократить перебор подматриц для поиска равновесий по Нэшу. В примере 10.4 после исключения строго доминируемых стратегий получим редуцированную игру

$$\bar{A} = \begin{pmatrix} -1 & 7 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}, \quad \bar{B} = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}.$$

В этой игре ситуация $(\bar{p}, \bar{q}) = ((3/5, 2/5), (7/11, 4/11))$ является единственным смешанным равновесием по Нэшу. Следовательно, ситуация $(p^0, q^0) = ((0, 3/5, 2/5), (0, 7/11, 4/11))$ является смешанным равновесием по Нэшу в исходной игре Γ .

Пример 10.5. Рассмотрим игру Γ с матрицами

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 6 & 0 \\ 3 & 2 & 0 & 4 \\ 0 & 3 & 7 & 0 \\ 1 & 1 & 3 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 7 & 2 & 6 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 4 \\ 0 & 2 & 2 & 3 \\ 5 & 3 & 4 & 3 \end{pmatrix}.$$

Ищем максимальные элементы в столбцах первой матрицы. В чистых стратегиях доминирования нет. Рассмотрим доминирование в смешанных стратегиях. Видно, что четвёртая строка строго доминируется комбинацией второй и третьей строк с весами $1/2$. Поэтому ее можно вычеркнуть.

Теперь найдём максимальные элементы в строках второй (редуцированной) матрицы. Вторым столбец строго доминируется комбинацией первого и четвёртого столбцов с весами $1/3 - \varepsilon$ и $2/3 + \varepsilon$ при малых $\varepsilon > 0$. Мы можем вычеркнуть второй столбец. Следовательно, $\{1, 2, 3\} \times \{1, 3, 4\} \succ Z$. В результате исключения четвертой строки и второго столбца получим следующие редуцированные матрицы:

$$\bar{A} = \begin{pmatrix} 2 & 6 & 0 \\ 3 & 0 & 4 \\ 0 & 7 & 0 \end{pmatrix}, \quad \bar{B} = \begin{pmatrix} 7 & 6 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \\ 0 & 2 & 3 \end{pmatrix}.$$

Повторяем процедуру последовательного исключения стратегий для редуцированных матриц. Ищем максимальные элементы в столбцах первой матрицы. В чистых стратегиях доминирования нет. Рассмотрим доминирование в смешанных стратегиях. Вторую и третью строку исключить невозможно, так как в них содержатся максимальные по столбцам элементы. Первая строка не содержит ни одного максимального по столбцу элемента, однако, ее также невозможно исключить, так как она не доминируется ни одной линейной комбинацией второй и третьей строки. Аналогично, невозможно исключить ни один столбец во второй матрице. Следовательно, процедура исключения по доминированию смешанными стратегиями завершена и $\{1, 2, 3\} \times \{1, 3, 4\} = \bar{Z}$.

Позитивный подход к понятию равновесия

Следует отметить, что использование смешанных стратегий с помощью механизма бросания монет или других подобных механизмов не характерно для реального поведения людей. Другая интерпретация смешанных равновесий относятся к играм, соответствующим типичным конфликтным ситуациям, в которых принимают участие много индивидуумов. Такие ситуации описаны в примерах 9.1-4: множество покупателей приходит на рынок и сталкивается с множеством продавцов; различные пары водителей сталкиваются у перекрестков и т.п. Позитивный подход к равновесию в смешанных стратегиях предполагает, что каждая такая стратегия описывает распределение индивидуумов в соответствующей

роли. Например, если (p^0, q^0) — ситуация равновесия в игре "продавец-покупатель" (пример 9.1), то на практике доля p_1^0 продавцов ведет себя честно, а доля p_2^0 обманывает, доля q_1^0 покупателей не проверяет купленный товар, а остальные проверяют, и т.п. Очевидно, что лишь если распределения по стратегиям в каждой роли соответствуют смешанным равновесиям по Нэшу, то ни у кого не будет стимула поменять стратегию поведения. Формально это отражено в лемме 10.1 и теореме 10.1. Поэтому можно ожидать, что стабильные распределения по стратегиям в реальных взаимодействиях больших групп отвечают смешанным равновесиям по Нэшу. Теоретическое обоснование этого тезиса дают динамические модели поведения (см. § 14). Примером модели поведения игроков может служить метод Брауна фиктивного разыгрывания матричной игры, изложенный в § 5. Аналогичный метод можно применять и для поиска ситуаций равновесия в биматричных играх специального вида.

Определение. Игру Γ с матрицами A и B назовем *эквивалентной антагонистической*, если найдется такая матрица $A' = (a'_{ij})_{m \times n}$ (антагонистической игры) и найдутся такие числа $f_j, j = 1, \dots, n, g_i, i = 1, \dots, m$, что

$$a_{ij} = a'_{ij} + f_j, \quad b_{ij} = -a'_{ij} + g_i, \quad i = 1, \dots, m, \quad j = 1, \dots, n. \quad (10.7)$$

Заметим, что матрица A' и коэффициенты f_j, g_i здесь определяются не однозначно. Действительно, если они удовлетворяют равенствам (10.7), то для любого числа c матрица с элементами $a'_{ij} + c$ и коэффициенты $f_j - c, g_i + c$ также удовлетворяют (10.7).

Если игра Γ эквивалентна антагонистической, то сумма ее матриц представима в виде $A + B = (g_i + f_j)_{m \times n}$. Обратно, если такое представление имеет место, то Γ эквивалентна антагонистической игре с матрицей $A' = (a_{ij} - f_j)_{m \times n} = (-b_{ij} + g_i)_{m \times n}$.

Упражнение 10.3. Пусть биматричная игра Γ эквивалентна антагонистической игре с матрицей A' , а $f_1 = 0$. Выразите элементы матрицы A' через элементы матриц A и B .

Упражнение 10.4. Пусть биматричная игра Γ эквивалентна антагонистической игре Γ' . Для того чтобы пара (p^0, q^0) была седловой точкой в смешанных стратегиях игры Γ' , необходимо и достаточно, чтобы (p^0, q^0) была ситуацией равновесия игры Γ . Докажите.

Определим итерационный процесс, аналогичный процессу Брауна из § 5.

Шаг 1. Игроки выбирают произвольно стратегии i_1 и j_1 .

Пусть за k повторений игры первый игрок выбрал стратегии $i_1, \dots, i_k$, а второй — стратегии $j_1, \dots, j_k$. При этом $p(k)$ и $q(k)$ — соответствующие векторы частот.

Шаг $k + 1$. Игроки выбирают стратегии i_{k+1} и j_{k+1} из условий

$$A(i_{k+1}, q(k)) = \max_{1 \leq i \leq m} A(i, q(k)), \quad B(p(k), j_{k+1}) = \max_{1 \leq j \leq n} B(p(k), j).$$

Каждый игрок выбирает свою чистую стратегию как наилучший ответ на соответствующий вектор частот партнера. Если наилучших ответов несколько, то выбирается любой из них.

Теорема 10.5. Пусть биматричная игра Γ эквивалентна антагонистической. Тогда любая предельная точка (p^0, q^0) последовательности $\{(p(k), q(k))\}$ итерационного процесса является ситуацией равновесия игры Γ .

Упражнение 10.5. Докажите теорему 10.5.

Если биматричная игра Γ не эквивалентна антагонистической, то утверждение теоремы 10.5 может быть неверным. Вся оставшаяся часть параграфа будет посвящена доказательству этого факта. В качестве примера рассмотрим игру Γ из упражнения 10.1 с матрицами

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix},$$

в которой существует единственное смешанное равновесие по Нэшу

$$(p^0, q^0) = ((1/3, 1/3, 1/3), (1/3, 1/3, 1/3)).$$

Пусть $e^i \in E^3$ — вектор, i -ая компонента которого равна 1, а две другие равны нулю. Пусть с $(k + 1)$ -го по $(k + s)$ -ый шаг первый игрок выбирал чистую стратегию i . Тогда

$$p(k + s) = \frac{kp(k) + se^i}{k + s} = \frac{k}{k + s}p(k) + \frac{s}{k + s}e^i.$$

Нетрудно видеть, что точка $p(k + t)$ при изменении $t = 0, 1, \dots, s$, перемещается вдоль отрезка $[p(k), e^i]$ от точки $p(k)$ до точки $p(k + s)$. Аналогичная формула может быть записана и для векторов частот второго игрока.

Пусть на некотором k -ом шаге ($k > 1$) возникла пара $(i_k, j_k) = (1, 1)$. Это означает, что выполнены неравенства

$$\begin{aligned} A(1, q(k-1)) &\geq A(i, q(k-1)), \quad i = 2, 3, \\ B(p(k-1), 1) &\geq B(p(k-1), j), \quad j = 2, 3. \end{aligned}$$

Тогда

$$\begin{aligned} A(1, q(k)) &= \frac{(k-1)A(1, q(k-1)) + A(1, e^1)}{k} = \\ &= \frac{(k-1)A(1, q(k-1)) + 2}{k} > \frac{(k-1)A(2, q(k-1)) + 1}{k} = A(2, q(k)). \end{aligned}$$

Аналогично доказывается, что $A(1, q(k)) > A(3, q(k))$. Поэтому необходимо $i_{k+1} = 1$. Далее,

$$\begin{aligned} B(p(k), 1) &= \frac{(k-1)B(p(k-1), 1) + B(e^1, 1)}{k} = \\ &= \frac{(k-1)B(p(k-1), 1) + 1}{k} > \frac{(k-1)B(p(k-1), 2)}{k} = B(p(k), 2) \end{aligned}$$

и, следовательно, $j_{k+1} \neq 2$.

Таким образом, на $(k+1)$ -м шаге возникнет пара $(1, 1)$ или $(1, 3)$. Причем после нескольких возможных повторений пара $(1, 1)$ обязательно перейдет в пару $(1, 3)$. Аналогично доказывается, что после пары $(1, 3)$ процесс обязательно перейдет в пару $(3, 3)$ и т.д. по схеме

$$(1, 1) \rightarrow (1, 3) \rightarrow (3, 3) \rightarrow (3, 2) \rightarrow (2, 2) \rightarrow (2, 1) \rightarrow (1, 1).$$

Пусть на $(k+1)$ -м шаге процесс перешел с пары $(2, 1)$ на пару $(1, 1)$ (т.е. $i_k = 2$, $j_k = 1$, $i_{k+1} = j_{k+1} = 1$), на $(k+s+1)$ -м шаге — с пары $(1, 1)$ на пару $(1, 3)$, а на $(k+s+t+1)$ -м шаге — с пары $(1, 3)$ на пару $(3, 3)$:

$$..., (2, 1), (1, 1), ..., (1, 1), (1, 3), ..., (1, 3), (3, 3), ...$$

Тогда $A(1, q(k)) \geq A(3, q(k))$ и

$$\begin{aligned} A(3, q(k+s+t)) &= \frac{kA(3, q(k)) + sa_{31} + ta_{33}}{k+s+t} \geq A(1, q(k+s+t)) = \\ &= \frac{kA(1, q(k)) + sa_{11} + ta_{13}}{k+s+t} \geq \frac{kA(3, q(k)) + sa_{11} + ta_{13}}{k+s+t}. \end{aligned}$$

Отсюда получаем неравенство $sa_{31} + ta_{33} \geq sa_{11} + ta_{13}$ или $t \geq 2s$.

Итак, "пребывание" процесса в его остановке на паре (1,3) будет по крайней мере в два раза продолжительнее, чем на непосредственно предшествовавшей остановке на паре (1,1). Точно так же последующая остановка на паре (3,3) по крайней мере в два раза продолжительнее, чем на паре (1,3) и т.д.

Теперь рассмотрим, как меняются стратегии игроков. Если первый игрок на некотором шаге использует стратегию 1, то в дальнейшем он ее сменит на стратегию 3, потом стратегию 3 на стратегию 2 и т.д. по следующему циклу: $1 \rightarrow 3 \rightarrow 2 \rightarrow 1$. Разобьем рассматриваемый процесс на отрезки шагов постоянного использования первым игроком своих чистых стратегий. Длина такого отрезка — это число содержащихся в нем шагов.

Лемма 10.1. Длина отрезка постоянного использования первым игроком любой чистой стратегии более, чем в три раза превышает число шагов процесса, предшествовавших данному отрезку.

Доказательство. Без потери общности будем считать, что процесс начинается с пары стратегий $(i_1, j_1) = (1, 1)$. Пусть первый игрок $l_1 = 1 + s$ раз подряд, начиная с первого шага, выбирал стратегию 1 (один раз при паре (1,1) и s раз при паре (1,3)). Далее, пусть он $l_3 = t + h$ раз выбирал стратегию 3 (t раз при паре (3,3) и h раз при паре (3,2)). Затем он l_2 раза подряд выбирал стратегию 2. Тогда, согласно ранее доказанному, $s \geq 2$, $t \geq 2s$, $h \geq 2t \geq 4s \Rightarrow l_3 = t + h \geq 6s$. Но $l_1 = 1 + s \leq 3s/2 \leq l_3/4$. Следовательно, $l_3 \geq 4l_1 > 3l_1$. Аналогично можно доказать неравенство $l_2 \geq 4l_3 > 3(l_1 + l_3)$.

Итак, утверждение леммы доказано для начальных отрезков использования стратегий 1,3 и 2. Завершим доказательство индукцией по числу отрезков использования первым игроком своих стратегий.

Пусть $i_k = 3$ и, начиная с $(k + 1)$ -го шага, первый игрок l'_2 раз использовал стратегию 2, затем с $(k + l'_2 + 1)$ -го шага он l'_1 раз использовал стратегию 1 и далее стратегию 3. Тогда $l'_1 \geq 4l'_2$ (это доказывается аналогично неравенству $l_1 \geq 4l_2$). Индуктивное предположение состоит в выполнении неравенства $l'_2 > 3k$. Но тогда $l'_1 \geq 4l'_2 > 3(l'_2 + k)$. ■

Из леммы непосредственно вытекает, что если в момент $k + 1$ первый игрок меняет свою стратегию i ($i_k = i$, $i_{k+1} \neq i$), то i -ая компонента вектора $p(k)$ больше $3/4$.

Посмотрим, как перемещается точка $p(k)$ в симплексе P — множестве всех смешанных стратегий первого игрока. Используя барицентрические

координаты, симплекс P можно изобразить на плоскости в виде равностороннего треугольника (см. комментарий к рис. 4.1). На рис. 10.3 точки M , N , и K разбивают стороны треугольника P в отношении 3:1. Отрезки $[e^1, M]$, $[e^2, K]$ и $[e^3, N]$, пересекаясь, образуют внутренний треугольник ABC .




Рис. 10.3

В течение нескольких начальных шагов точка $p(k)$ находится в вершине e^1 . Затем она перемещается вдоль отрезка $[e^1, e^3]$ до некоторой точки p' , минуя при этом точку K . Далее точка $p(k)$ движется вдоль отрезка $[p', e^2]$ до некоторой точки p'' , пересекая отрезок $[e^1, M]$. Затем она перемещается вдоль отрезка $[p'', e^1]$ до некоторой точки p''' , пересекая отрезок $[e^3, N]$, и т.д. При этом точка $p(k)$ никогда не будет находиться внутри треугольника ABC , содержащего точку $p^0 = (1/3, 1/3, 1/3)$. Поэтому p^0 не является предельной точкой последовательности $\{p(k)\}$. Аналогично доказывается, что $q^0 = (1/3, 1/3, 1/3)$ не является предельной точкой последовательности $\{q(k)\}$.

§ 11. Иерархические игры двух лиц

Здесь мы рассматриваем игры двух лиц, в которых игроки прежде, чем выбрать стратегии $x \in X$, $y \in Y$, предварительно обмениваются информацией о своих выборах. Такого рода игры описывают взаимодействие между верхним и нижним звеньями управления (начальником и подчиненным, центром и производителем продукции и т.п.) и называются *иерархическими*. Будем считать, что первый игрок осуществляет управление вторым игроком и делает сообщение первым.

Рассмотрим исходную игру двух лиц в нормальной форме $\Gamma = \langle X, Y, F(x, y), G(x, y) \rangle$, на основе которой будем строить иерархические игры. При этом нас будет интересовать наилучший гарантированный результат (выигрыш), который может получить в игре первый игрок. В данном параграфе предполагается, что функции $F(x, y)$ и $G(x, y)$ непрерывны на произведении $X \times Y$ компактов метрических пространств.

Игра Γ_1 . Первый игрок выбирает стратегию $x \in X$ и сообщает ее второму. Затем второй игрок выбирает стратегию $y \in Y$, зная x . При этом будем использовать схематичную запись $x \xrightarrow{2} y$. Смысл подобных сообщений очевиден в тех случаях, когда интересы игроков близки. Например, если вы решили с кем-нибудь встретиться, то сообщаете, куда придете. Игра Γ_1 является неантагонистической одношаговой игрой с полной информацией.

Экономическая интерпретация: первый игрок (центр) сообщает второму игроку (производителю продукции) цену x на продукцию. Второй игрок выпускает продукцию в количестве y , зная цену x .

Полезно записать игру Γ_1 в нормальной форме. Второй игрок использует стратегии вида $g : X \rightarrow Y$. Множество всех таких стратегий обозначим через $\{g\}$. Тогда

$$\Gamma_1 = \langle X, \{g\}, F(x, g), G(x, g) \rangle,$$

где $F(x, g) \stackrel{\text{def}}{=} F(x, g(x))$, $G(x, g) \stackrel{\text{def}}{=} G(x, g(x))$.

Найдем наилучший гарантированный результат F_1 первого игрока в игре Γ_1 . Предположим, что второй игрок, зная x , выбирает

$$y \in Y(x) = \operatorname{Arg} \max_{y \in Y} G(x, y),$$

т.е. максимизирует свою функцию выигрыша $G(x, y)$. Первый игрок знает функцию выигрыша второго игрока, ему также известно, что второй будет выбирать стратегию из множества $Y(x)$, но он не знает конкретного выбора $y \in Y(x)$.

Величина $W(x) = \min_{y \in Y(x)} F(x, y)$ называется *оценкой эффективности* (гарантированным результатом) стратегии x .

Заметим, что множество $Y(x)$ — непустое и является компактом. Следовательно, $\min_{y \in Y(x)}$ достигается и наилучший гарантированный результат имеет вид

$$F_1 = \sup_{x \in X} \min_{y \in Y(x)} F(x, y).$$

Определение. Пусть задано $\varepsilon > 0$. Стратегия первого игрока x^ε называется ε -оптимальной в игре Γ_1 , если $W(x^\varepsilon) \geq F_1 - \varepsilon$.

В дальнейшем мы приведем пример, в котором $\sup_{x \in X}$ не достигается. Решить игру Γ_1 — это значит найти величину F_1 и ε -оптимальную стратегию x^ε при заданном $\varepsilon > 0$.

Игра Γ_2 . Первый игрок перед выбором x имеет полную информацию об y . Он ходит первый и сообщает второму игроку стратегию вида $f : Y \rightarrow X$. Множество всех таких стратегий обозначим через $\{f\}$. Схема сообщений в игре Γ_2 : $f \xrightarrow{2} y \xrightarrow{1} x = f(y)$.

Экономическая интерпретация: $f(y)$ — величина премии, обещаема центром за произведенную продукцию y .

Найдем выражение для наилучшего гарантированного результата F_2 первого игрока в игре Γ_2 . Предположим, что второй игрок, зная f , выбирает y из множества $Y(f) = \operatorname{Argmax}_{y \in Y} G(f(y), y)$. Множество $Y(f)$ может оказаться пустым, если функция f разрывна. В случае пустого $Y(f)$ будем считать, что второй игрок может выбрать любую стратегию $y \in Y$. Определим множество

$$Y^*(f) = \begin{cases} Y(f), & Y(f) \neq \emptyset, \\ Y, & Y(f) = \emptyset. \end{cases}$$

В сделанных предположениях второй игрок выбирает $y \in Y^*(f)$ и оценка эффективности стратегии f задается формулой

$$W(f) = \inf_{y \in Y^*(f)} F(f(y), y).$$

Наилучший гарантированный результат первого игрока имеет вид

$$F_2 = \sup_{f \in \{f\}} \inf_{y \in Y^*(f)} F(f(y), y).$$

Определение. Пусть задано $\varepsilon > 0$. Стратегия f^ε называется ε -оптимальной в игре Γ_2 , если $W(f^\varepsilon) \geq F_2 - \varepsilon$.

Поиск величины F_2 по указанной формуле весьма сложен, так как связан с решением оптимизационной задачи на множестве функций $\{f\}$. Мы далее упростим формулу для F_2 таким образом, чтобы оптимизация велась по исходным множествам X и Y .

Игра Γ_3 . Пусть второй игрок играет против первого в игру Γ_2^* , т.е.

сообщает ему стратегию $g : X \rightarrow Y$ (функцию ответа). Первый игрок в игре Γ_3 первым сообщает второму стратегию $f_1 : \{g\} \rightarrow X$. Схема сообщений в игре $\Gamma_3 : f_1 \xrightarrow{2} g \xrightarrow{1} x = f_1(g) \xrightarrow{2} y = g(x)$.

Экономическая интерпретация: $f_1(g)$ — величина ресурса, который выделяет центр производителю продукции, когда тот сообщает ему свои производственные возможности (функцию g).

Наилучший гарантированный результат первого игрока в игре Γ_3 имеет вид

$$F_3 = \sup_{f_1 \in \{f_1\}} \inf_{g \in Y^*(f_1)} F(f_1(g), g),$$

где

$$Y^*(f_1) = \begin{cases} Y(f_1), & Y(f_1) \neq \emptyset, \\ \{g\}, & Y(f_1) = \emptyset, \end{cases} \quad Y(f_1) = \text{Arg} \max_{g \in \{g\}} G(f_1(g), g).$$

Вернемся к игре Γ_2 . Найдём более простую формулу для F_2 . Положим $X(y) = \text{Argmax}_{x \in X} F(x, y)$ — множество наилучших ответов первого игрока, $X^*(y) = \text{Arg} \max_{x \in X(y)} G(x, y)$ — множество наилучших ответов первого игрока, благожелательных по отношению ко второму. Определим стратегию первого игрока $f^* : f^*(y) \in X^*(y) \forall y \in Y$.

Лемма 11.1. Функция $G(f^*(y), y)$ полунепрерывна сверху в любой точке $y^0 \in Y$, т.е. для любой последовательности $\{y^k\}$, сходящейся к y^0 , выполнено неравенство

$$\overline{\lim}_{k \rightarrow \infty} G(f^*(y^k), y^k) \leq G(f^*(y^0), y^0). \quad (11.1)$$

Доказательство. Пусть в некоторой точке $y^0 \in Y$ функция $G(f^*(y), y)$ не является полунепрерывной сверху. Тогда найдётся такая последовательность $\{y^k\}$, сходящаяся к y^0 , что

$$G' \stackrel{\text{def}}{=} \overline{\lim}_{k \rightarrow \infty} G(f^*(y^k), y^k) > G(f^*(y^0), y^0). \quad (11.2)$$

Без потери общности считаем (выделяя соответствующую подпоследовательность), что $f^*(y^k) \rightarrow x'$. Из непрерывности функции $G(x, y)$ следует

$$G' = \lim_{k \rightarrow \infty} G(f^*(y^k), y^k) = G(x', y^0).$$

Покажем, что $x' \in X(y^0)$. Действительно, по определению функции f^* имеем $F(f^*(y^k), y^k) \geq F(x, y^k) \quad \forall x \in X, k = 1, 2, \dots$. Отсюда, переходя в последнем неравенстве к пределу при $k \rightarrow \infty$, получим

$$F(x', y^0) \geq F(x, y^0) \quad \forall x \in X \Rightarrow x' \in X(y^0).$$

Итак, неравенство (11.2) можно записать в виде

$G' = G(x', y^0) > G(f^*(y^0), y^0)$. Оно противоречит тому, что $f^*(y^0) \in X^*(y^0)$. ■

Нам потребуется следующие величины и множества:

$G_2 = \max_{y \in Y} \min_{x \in X} G(x, y)$ — наилучший гарантированный результат второго игрока при условии, что первый применяет по отношению к нему стратегию "наказания" $f^H : f^H(y) \in \operatorname{Argmin}_{x \in X} G(x, y) \quad \forall y \in Y$;

$E = \operatorname{Argmax}_{y \in Y} \min_{x \in X} G(x, y)$ — множество максиминных стратегий второго игрока;

$$D = \{(x, y) \in X \times Y \mid G(x, y) > G_2\};$$

$$K = \begin{cases} \sup_{(x, y) \in D} F(x, y), & D \neq \emptyset, \\ -\infty, & D = \emptyset; \end{cases}$$

$$M = \min_{y \in E} \max_{x \in X} F(x, y).$$

Теорема 11.1 (Гермейер). В сделанных предположениях наилучший гарантированный результат первого игрока в игре Γ_2 равен $F_2 = \max[K, M]$.

Замечание. Для нахождения F_2 необходимо решить оптимизационные задачи на исходных множествах X и Y . Оптимальные (ε -оптимальные) стратегии, обеспечивающие $\max[K, M]$, будут указаны в первой части доказательства теоремы. Результат $\max[K, M]$ довольно велик. Чтобы в этом убедиться, рассмотрим частный случай. Допустим, что существует пара $(x^0, y^0) \in \operatorname{Arg} \max_{(x, y) \in X \times Y} F(x, y) \cap D$. Тогда

$$K = \sup_{(x, y) \in D} F(x, y) = \max_{(x, y) \in X \times Y} F(x, y) = F_2,$$

т.е. результат F_2 равен максимуму функции $F(x, y)$ на $X \times Y$.

Доказательство. Первая часть. Построим стратегии первого игрока, обеспечивающие ему результат $\max[K, M]$. Рассмотрим два случая.

1) $K > M \Rightarrow D \neq \emptyset$. Покажем, что для всякого $\varepsilon > 0$ найдется такая стратегия f^ε , что $W(f^\varepsilon) \geq K - \varepsilon$. По определению верхней грани K найдется такая пара $(x^\varepsilon, y^\varepsilon) \in D$, что $F(x^\varepsilon, y^\varepsilon) \geq K - \varepsilon$. Положим

$$f^\varepsilon(y) = \begin{cases} x^\varepsilon, & y = y^\varepsilon, \\ f^H(y), & y \neq y^\varepsilon. \end{cases}$$

Покажем, что $W(f^\varepsilon) = F(x^\varepsilon, y^\varepsilon) \geq K - \varepsilon$. Действительно, второй игрок, получив сообщение о f^ε , выберет $y = y^\varepsilon$, так как в противном случае он получит выигрыш $G(f^H(y), y) = \min_{x \in X} G(x, y) \leq G_2 < G(x^\varepsilon, y^\varepsilon)$. Поскольку второй игрок максимизирует свой выигрыш, он выберет $y = y^\varepsilon$, т.е. $Y^*(f^\varepsilon) = \{y^\varepsilon\}$.

2) $K \leq M$. Укажем стратегию f^0 , для которой $W(f^0) \geq M$. Положим

$$f^0(y) = \begin{cases} f^*(y), & y \in E, \\ f^H(y), & y \notin E, \end{cases}$$

где стратегия f^* была определена выше перед леммой 11.1. Получив сообщение о f^0 , второй игрок выберет $y \in E$. Действительно, если $y \notin E$, то $G(f^H(y), y) = \min_{x \in X} G(x, y) < G_2$. Далее, при $y \in E$ $G(f^0(y), y) = G(f^*(y), y) \geq \min_{x \in X} G(x, y) = G_2$. Функция $G(f^*(y), y)$ полунепрерывна сверху на компакте E , поэтому $Y^*(f^0) = \text{Argmax}_{y \in E} G(f^*(y), y) \subseteq E$. Отсюда

$$\begin{aligned} W(f^0) &= \min_{y \in Y^*(f^0)} F(f^*(y), y) \geq \\ &\geq \min_{y \in E} F(f^*(y), y) = \min_{y \in E} \max_{x \in X} F(x, y) = M. \end{aligned}$$

Вторая часть. Докажем, что для произвольной стратегии $f \in \{f\}$ $W(f) \leq \max[K, M]$. Имеем

$$\sup_{y \in Y} G(f(y), y) \geq \max_{y \in Y} \min_{x \in X} G(x, y) = G_2.$$

Рассмотрим два случая.

1) $\sup_{y \in Y} G(f(y), y) > G_2$. В этом случае найдется такая стратегия второго игрока $y^0 \in Y^*(f)$, что $G(f(y^0), y^0) > G_2$, т.е. $(f(y^0), y^0) \in D$. Действительно, если $\sup_{y \in Y}$ достигается, то $Y(f) \neq \emptyset$ и y^0 возьмем реализующим $\sup_{y \in Y}$. Если $\sup_{y \in Y}$ не достигается, то $Y^*(f) = Y$ и стратегия y^0 найдется по

определению $\sup_{y \in Y}$. Отсюда

$$W(f) = \inf_{y \in Y^*(f)} F(f(y), y) \leq F(f(y^0), y^0) \leq K \leq \max[K, M].$$

2) $\sup_{y \in Y} G(f(y), y) = G_2$. Покажем, что $E \subset Y^*(f)$. Действительно, пусть $y \in E$. Тогда

$$G_2 = \min_{x \in X} G(x, y) \leq G(f(y), y) \leq \sup_{y \in Y} G(f(y), y) = G_2.$$

В этой цепочке неравенства выполнены как равенства. Отсюда $y \in Y^*(f)$ и $E \subseteq Y^*(f)$. Итак,

$$\begin{aligned} W(f) &= \inf_{y \in Y^*(f)} F(f(y), y) \leq \\ &\leq \inf_{y \in E} F(f(y), y) \leq \min_{y \in E} \max_{x \in X} F(x, y) = M \leq \max[K, M]. \blacksquare \end{aligned}$$

Сформулируем аналогичный результат для игры Γ_3 . Напомним, что в игре Γ_3 второй игрок выбирает y , когда выбор стратегии x первого ему известен. Второй игрок использует стратегию $g : X \rightarrow Y$. Определим следующие величины и множество:

$G_3 = \min_{x \in X} \max_{y \in Y} G(x, y) = \max_{y \in Y} G(x^H, y)$ — наилучший гарантированный результат второго игрока, когда первый применяет стратегию наказания x^H ;

$$D' = \{(x, y) \in X \times Y \mid G(x, y) > G_3\};$$

$$K' = \begin{cases} \sup_{(x, y) \in D'} F(x, y), & D' \neq \emptyset, \\ -\infty, & D' = \emptyset. \end{cases}$$

Тогда можно доказать, что $F_3 = \max[K', F_1]$ (см. упражнения 11.1-2). Если $F_1 \geq K'$, то первый игрок применяет ε -оптимальную стратегию игры Γ_1 . Пусть $F_1 < K'$. В этом случае найдется такая пара $(x^\varepsilon, y^\varepsilon) \in D'$, что $F(x^\varepsilon, y^\varepsilon) \geq K' - \varepsilon$.

Упражнение 11.1. Докажите, что для стратегии

$$f_1^\varepsilon(g) = \begin{cases} x^\varepsilon, & g(x^\varepsilon) = y^\varepsilon, \\ x^H, & g(x^\varepsilon) \neq y^\varepsilon, \end{cases}$$

оценка эффективности $W(f_1^\varepsilon) \geq K' - \varepsilon$.

Упражнение 11.2. Докажите, что для любой стратегии f_1 первого игрока в игре Γ_3 $W(f_1) \leq \max[K', F_1]$.

Упражнение 11.3. Докажите, что в игре Γ_1 в нормальной форме всегда существует ситуация равновесия.

Упражнение 11.4. Докажите, что $F_1 \leq F_3 \leq F_2$.

Пример 11.1. Решим игры $\Gamma_1, \Gamma_2, \Gamma_3$ для игры Γ с матрицами

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 6 & 8 \\ 4 & 3 & 2 \\ 7 & -5 & -1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 7 & 4 & 3 \\ 7 & 7 & 3 \\ 4 & 6 & 6 \end{pmatrix}.$$

Игра Γ_1 . $F_1 = \max_{1 \leq i \leq 3} \min_{j \in Y(i)} a_{ij} = \max_{1 \leq i \leq 3} W(i)$, $Y(i) = \text{Arg} \max_{1 \leq j \leq 3} b_{ij}$, $W(1) = W(2) = 3$, $W(3) = -5 \Rightarrow F_1 = 3$ и $i^0 = 1, 2$ — оптимальные стратегии.

Игра Γ_2 . $G_2 = \max_{1 \leq j \leq 3} \min_{1 \leq i \leq 3} b_{ij} = 4$, $E = \{1, 2\}$, $D = \{(i, j) \mid b_{ij} > 4\}$,
 $K = \max_{(i, j) \in D} a_{ij} = 4$, $M = \min_{1 \leq j \leq 2} \max_{1 \leq i \leq 3} a_{ij} = 6 \Rightarrow F_2 = M = 6$

и $f^0(j) = \begin{cases} 3, & j = 1, \\ 1, & j = 2, 3, \end{cases}$ — оптимальная стратегия.

Игра Γ_3 . $G_3 = \min_{1 \leq i \leq 3} \max_{1 \leq j \leq 3} b_{ij} = 6$, $D' = \{(i, j) \mid b_{ij} > 6\}$,

$K' = \max_{(i, j) \in D'} a_{ij} = 4 > F_1 = 3 \Rightarrow F_3 = K' = 4$

и $f_1^0(g) = \begin{cases} 2, & g(2) = 1, \\ 3, & g(2) \neq 1, \end{cases}$ — оптимальная стратегия.

Пример 11.2. Решим игры $\Gamma_1, \Gamma_2, \Gamma_3$ для игры Γ :

$$X = Y = [0, 1], \quad F(x, y) = 3x/4 + y/2, \quad G(x, y) = (x - y)^2.$$

Игра Γ_1 . $F_1 = \sup_{0 \leq x \leq 1} \min_{y \in Y(x)} (3x/4 + y/2)$,

$$Y(x) = \text{Arg} \max_{0 \leq y \leq 1} (x - y)^2 = \begin{cases} \{1\}, & 0 \leq x < 1/2, \\ \{0, 1\}, & x = 1/2, \\ \{0\}, & 1/2 < x \leq 1. \end{cases}$$

График функции $W(x) = \min_{y \in Y(x)} (3x/4 + y/2)$ см. на рис. 11.1.




Рис. 11.1

Здесь $F_1 = 7/8$, $x^\varepsilon = 1/2 - 4\varepsilon/3$ — ε -оптимальная стратегия. Отметим, что внешняя верхняя грань в выражении для F_1 не достигается.

Игра Γ_2 . $G_2 = \max_{0 \leq y \leq 1} \min_{0 \leq x \leq 1} (x - y)^2 = 0$, $D = \{(x, y) \mid (x - y)^2 > 0\}$,

$$K = 5/4 = F_2, (x^\varepsilon, y^\varepsilon) = (1 - 4\varepsilon/3, 1), f^\varepsilon(y) = \begin{cases} x^\varepsilon, & y = y^\varepsilon, \\ y, & y \neq y^\varepsilon, \end{cases}$$

— ε -оптимальная стратегия.

Игра Γ_3 . $G_3 = \min_{0 \leq x \leq 1} \max_{0 \leq y \leq 1} (x - y)^2 = 1/4$, $x^H = 1/2$,

$$D' = \{(x, y) \mid |x - y| > 1/2\}, K' = \sup_{(x, y) \in D'} (3x/4 + y/2) = 1 >$$

$$7/8 = F_1 \Rightarrow F_3 = K', (x^\varepsilon, y^\varepsilon) = (1, 1/2 - 2\varepsilon) \in K',$$

$$f_1^\varepsilon(g) = \begin{cases} 1, & g(1) = 1/2 - 2\varepsilon, \\ 1/2, & g(1) \neq 1/2 - 2\varepsilon, \end{cases} \text{ — } \varepsilon\text{-оптимальная стратегия.}$$

Пример 11.3. Игра перестрахования. Перестраховщик (игрок 1) и страховщик (игрок 2) заключают договор перестрахования. Пусть $\mathbf{Z}$ — суммарное возмещение страховщика клиентам, представляющее собой случайную величину с экспоненциальной плотностью распределения $e^{-z/m}/m$, $z \geq 0$. При заключении договора страховщик выбирает *предел убыточности* $y \in Y = \{y \in E^1 \mid y \geq 0\}$: если $\mathbf{Z} > y$, то сумму $\mathbf{Z} - y$ возмещает перестраховщик. Отметим, что при $y = 0$ страховщик полностью передает оплату исков перестраховщику. Величина

$$h(y) \stackrel{\text{def}}{=} E \max[\mathbf{Z} - y, 0] = \int_y^\infty (z - y) \frac{1}{m} e^{-z/m} dz = m e^{-y/m}$$

– средняя величина выплат перестраховщика. Стоимость договора перестрахования равна $d(x, y) \stackrel{\text{def}}{=} (1+x)h(y)$, где $x \geq 0$ – коэффициент надбавки за риск, устанавливаемый перестраховщиком. Будем считать, что оплата договора осуществляется страховщиком из фонда страховых платежей величины $A > m$. Договор может быть заключен лишь при выполнении неравенства $d(x, y) + y \leq A$. Положим $\hat{Y}(x) = \{y \in Y \mid d(x, y) + y \leq A\}$, $X = \{x \in E^1 \mid x \geq 0, \hat{Y}(x) \neq \emptyset\}$. Если $y \in \hat{Y}(x)$, то договор заключается, выигрыш перестраховщика равен его ожидаемой прибыли $F(x, y) = xh(y)$, а выигрыш страховщика – гарантированной величине остатка фонда страховых платежей $G(x, y) = A - d(x, y) - y$, соответствующей случаю $\mathbf{Z} \geq y$.

Решим игру Γ_1 . Напомним, что сначала первый игрок сообщает второму стратегию $x \in X$. Затем второй игрок выбирает стратегию $y \in Y(x) = \text{Arg max}_{y \in \hat{Y}(x)} G(x, y)$. Пусть $x \in X$. Максимум

$$\max_{y \in \hat{Y}(x)} G(x, y) = \max_{y \in \hat{Y}(x)} [A - (1+x)me^{-y/m} - y] = A - m - m \ln(1+x)$$

достигается в единственной точке $y(x) = m \ln(1+x)$. Отсюда вытекает, что $\hat{Y}(x) \neq \emptyset$, если $A - m - m \ln(1+x) \geq 0$. Следовательно, $X = [0, x^0]$, где $x^0 \stackrel{\text{def}}{=} e^{(A-m)/m} - 1$. Отсюда

$$F_1 = \max_{x \in X} F(x, y(x)) = \max_{0 \leq x \leq x^0} \frac{xm}{1+x} = \frac{x^0 m}{1+x^0}$$

и x^0 – оптимальная стратегия первого игрока.

Упражнение 11.5. Рассмотрите игру двух фирм из примера 9.9 при $\alpha = 1$ и решите игру Γ_1 . Сравните наилучший гарантированный результат первого игрока F_1 с выигрышем, который он получает в ситуации равновесия.

Равновесие по Штакельбергу

Определим теперь *равновесие по Штакельбергу* игры Γ_1 . Положим $Y^*(x) = \text{Arg max}_{y \in Y(x)} F(x, y)$ – множество наилучших ответов второго игрока, благожелательных по отношению к первому.

Определение. Ситуация (x^0, y^0) называется *равновесием по Штакельбергу*, если

$$x^0 \in \text{Arg max}_{x \in X} \max_{y \in Y(x)} F(x, y), \quad y^0 \in Y^*(x^0).$$

Здесь предполагается, что второй игрок, получив информацию о x , использует свой наилучший ответ, благожелательный по отношению к первому игроку.

Покажем, что в сделанных предположениях равновесие по Штакельбергу существует. Для этого определим стратегию второго игрока $g^* : g^*(x) \in Y^*(x) \ \forall x \in Y$. По лемме 11.1 функция $F(x, g^*(x))$ полунепрерывна сверху на X . Следовательно, она достигает на компакте X наибольшее значение в некоторой точке x^0 . Тогда при $y^0 = g^*(x^0)$ ситуация (x^0, y^0) будет равновесием по Штакельбергу. ■

Упражнение 11.6. В условиях примеров 11.1 и 11.2 найдите равновесия по Штакельбергу.

Отметим, что использование равновесия по Штакельбергу требует от игроков сотрудничества, которое, как показывает следующий пример, не всегда возможно. В игре с матрицами

$$A = \begin{pmatrix} 5 & 7 \\ 4 & 8 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

ситуация (2,2) является единственным равновесием по Штакельбергу. Однако договориться о ней игрокам будет очень сложно, поскольку в ситуации (1,2) (возникающей при решении игры Γ_1) выигрыш второго игрока существенно больше, чем в (2,2), и он едва ли согласится на ситуацию (2,2).

Комментарий и библиография к главе II

§ 9. Понятие ситуации равновесия в частном случае, еще в 19-м веке, использовалось О. Курно при анализе модели дуополии [59]. Определение ситуации равновесия для игры многих лиц принадлежит Дж. Нэшу [76]. В 1999 году Джон Нэш получил Нобелевскую премию по экономике. Критический разбор понятия ситуации равновесия (в частности, анализ игр "семейный спор" и "дилемма заключенного") сделан Р.Д. Льюсом и Х. Райфой [61]. Пример 9.3 является модификацией примера "перекресток" из [71].

Теорема 9.1 о неподвижной точке принадлежит Л. Брауэру [18]. Комбинаторное доказательство этой теоремы, использующее лемму Э. Шпернера [107], получено Б. Кнастером, К. Куратовским и С. Мазуркевичем [53] (доказательство теоремы см. в Приложении и в [79]).

Теорема существования ситуации равновесия в игре многих лиц с вогнутыми функциями выигрыша (см. также следующую главу) доказана Х. Никайдо и К. Исода [75]. Пример 9.6 является частным случаем модели О. Курно [59]. Байесовские игры введены Дж. Харшаньи [92]. Пример 9.10 взят из [91].

§ 10. Термин "биматричная игра" был предложен Н.Н. Воробьевым (см. [34], где содержится систематическое изложение теории бескоалиционных игр). Теорема существования ситуации равновесия в биматричных играх доказана Дж. Нэшем [76]¹. Там же приведены свойства ситуаций равновесия в смешанных стратегиях. Условие общности положения для биматричных игр использовали К. Лемке и Дж. Хоусон [60] при разработке алгоритма поиска *всех* ситуаций равновесия. Теорема 10.3 имеется в книге Э. Мулена [71]. Изложенный алгоритм поиска ситуаций равновесия биматричной игры является весьма упрощенным вариантом алгоритма К. Лемке и Дж. Хоусона [60, 79].

Концепция ситуации равновесия, основанная на исключении доминируемых стратегий, предложена Э. Муленом [71]. Доказательство отсутствия сходимости итерационного процесса к ситуации равновесия игры из примера 10.1 принадлежит Л.С. Шепли [103]

§ 11. Основы теории иерархических игр с использованием принципа гарантированного результата для игрока-лидера (игрока 1) заложены Ю.Б. Гермейером [37, 38]. В частности, Ю.Б. Гермейеру принадлежит центральный результат этой теории — теорема 11.1. Аналогичный результат для игр Γ_3 (упражнения 11.1 и 11.2) получен Н.С. Кукушкиным [57]. Экономическая интерпретация иерархических игр предложена И.А. Вателем и Ф.И. Ерешко [28]. Определение равновесия по Штакельбергу сформулировано в [95]. Обзор работ по иерархическим играм см. в [52].

¹Даже для более общих игр с конечными множествами стратегий игроков (см. главу III)

ГЛАВА III. ИГРЫ МНОГИХ ЛИЦ

§ 12. Равновесие по Нэшу. Решение игр в нормальной форме

Пусть имеется множество A участников игры или игроков. Игрок a имеет в своем распоряжении стратегии s^a из множества стратегий S^a . Каждый из игроков выбирает стратегию, не зная выборов партнеров. В результате в игре возникает набор стратегий

$$s = (s^a, a \in A) \in S = \bigotimes_{a \in A} S^a,$$

называемый *ситуацией*. У каждого игрока a имеется функция выигрыша $u^a(s)$, определенная на множестве ситуаций S , которую игрок стремится, по возможности, максимизировать. Таким образом, игра многих лиц в нормальной форме задается набором

$$\Gamma = \langle A, S^a, u^a(s), a \in A \rangle.$$

Важнейшим принципом принятия решений в конфликтных ситуациях является понятие равновесия по Нэшу.

Определение. Ситуация $\bar{s} = (\bar{s}^a, a \in A)$ называется ситуацией равновесия (равновесием по Нэшу) игры Γ , если

$$\max_{s^a \in S^a} u^a(\bar{s} || s^a) = u^a(\bar{s}) \quad \forall a \in A.$$

Стратегии $\bar{s}^a$, составляющие ситуацию равновесия, будем называть *равновесными*.

Выражение " $\bar{s} || s^a$ " читается " $\bar{s}$ при условии s^a ". Оно обозначает ситуацию, в которой все компоненты, кроме стратегии игрока a , совпадают с $\bar{s}$, а стратегия игрока a есть s^a . Определение равновесия показывает, что стратегия $\bar{s}^a$, входящая в ситуацию $\bar{s}$, является оптимальной для игрока a при фиксированных стратегиях всех остальных игроков. Таким образом, можно сказать, что равновесие по Нэшу — это такая ситуация, от которой ни одному из игроков не выгодно отклоняться индивидуально.

Опишем один класс игр, для которых равновесие всегда существует.

Определение. Функция $h(z)$, определенная на выпуклом множестве Z евклидова пространства, называется *квазивогнутой*, если для любых $z', z'' \in Z$ и любого числа $0 < \lambda < 1$ выполнено неравенство

$$h(\lambda z' + (1 - \lambda)z'') \geq \min[h(z'), h(z'')].$$

Нетрудно видеть, что любая вогнутая функция является квазивогнутой. Примером квазивогнутой функции на прямой может служить произвольная возрастающая (или убывающая) функция.

Определение. Пусть $z^0 \in Z$. Для функции $h(z)$, определенной на Z , множества вида $Z^+(z^0) = \{z \in Z \mid h(z) \geq h(z^0)\}$ называются *множествами Лебега*.

Упражнение 12.1. Для того чтобы функция $h(z)$ была квазивогнутой на выпуклом множестве Z , необходимо и достаточно, чтобы ее множества Лебега $Z^+(z^0)$ были выпуклыми при любых $z^0 \in Z$. Докажите.

Пусть Z_1 и Z_2 — выпуклые компакты евклидовых пространств. Определим *точечно-множественное* отображение $\Phi : Z_1 \rightarrow 2^{Z_2}$, сопоставляющее каждому $z \in Z_1$ компакт $\Phi(z) \subseteq Z_2$.

Определение. Точечно-множественное отображение $\Phi : Z_1 \rightarrow 2^{Z_2}$ называется *выпуклозначным*, если при каждом $z \in Z_1$ множество $\Phi(z)$ выпукло. Оно называется *замкнутым*, если его график $\{(z, y) \mid z \in Z_1, y \in \Phi(z)\}$ — замкнутое множество, т.е. для любых последовательностей $\{z^n \in Z_1\}$ и $\{y^n \in \Phi(z^n)\}$, таких, что $z^n \rightarrow z^0$ и $y^n \rightarrow y^0$, необходимо $y^0 \in \Phi(z^0)$.

В частном случае Φ может быть просто отображением из Z в Z . Тогда свойство замкнутости отображения Φ совпадает со свойством непрерывности. Таким образом, предыдущее определение обобщает понятие непрерывности для точечно-множественных отображений.

Теорема 12.1 (Какутани). Пусть Z — выпуклый компакт конечномерного евклидова пространства, а $\Phi : Z \rightarrow 2^Z$ — замкнутое выпуклозначное точечно-множественное отображение. Тогда существует неподвижная точка z^0 отображения Φ , т.е. $z^0 \in \Phi(z^0)$.

Докажем теорему для $Z \subset E^1$. В данном случае в соответствии с условием теоремы Z — отрезок $[a, b]$. Рассмотрим множество $\hat{Z} = \{z \in Z \mid \max \Phi(z) \geq z\}$. Это множество непусто, так как $a \in \hat{Z}$. Пусть $z^0 = \sup \hat{Z}$ и покажем, что $z^0 \in \Phi(z^0)$. Действительно, $\max \Phi(z^0) \geq z^0$, так как $\Phi(z)$ — замкнутое отображение. Докажем, что $\min \Phi(z^0) \leq z^0$. Если $z^0 = b$, то утверждение очевидно. Пусть $z^0 < b$. Рассмотрим последовательность $\{z^k\}$, сходящуюся к z^0 и для которой $z^k > z^0$, $k = 1, 2, \dots$

По определению z^0 для нее $\max \Phi(z^k) < z^k$, $k = 1, 2, \dots$. Поэтому найдется такая последовательность $\{y^k \in \Phi(z^k)\}$, что $y^k < z^k$, $k = 1, 2, \dots$. Без потери общности можно считать, что последовательность $\{y^k\}$ сходится к $y^0 \leq z^0$. Поскольку $\Phi(z)$ — замкнутое отображение, $y^0 \in \Phi(z^0)$ и $\min \Phi(z^0) \leq z^0$. Отсюда $z^0 \in \Phi(z^0)$. ■

Доказательство теоремы Какутани в общем случае основано на теореме Брауэра и содержится в Приложении (ПЗ).

Теорема 12.2. Пусть в игре Γ множества S^a — выпуклые компакты евклидовых пространств, а функции $u^a(s)$ непрерывны на S и квазивогнуты по s^a (при любых фиксированных $s^b \in S^b$, $b \in A \setminus \{a\}$). Тогда в игре Γ существует ситуация равновесия.

Доказательство. Определим точно-множественное отображение $\Phi : S \rightarrow 2^S$ следующим образом: для любой ситуации $s \in S$ положим

$$\Phi(s) = \bigotimes_{a \in A} \Phi^a(s^b, b \in A \setminus \{a\}),$$

где

$$\Phi^a(s^b, b \in A \setminus \{a\}) \stackrel{\text{def}}{=} \text{Arg max}_{h^a \in S^a} u^a(s || h^a)$$

— множество наилучших ответов игрока a на стратегии s^b , $b \in A \setminus \{a\}$, остальных игроков. Нетрудно проверить, что отображение

$$\Phi^a : \bigotimes_{b \in A \setminus \{a\}} S^b \rightarrow 2^{S^a}$$

замкнуто (см. замечание к теореме 2.2) и выпуклозначно. Поэтому отображение Φ удовлетворяет условиям теоремы 12.1 и имеет неподвижную точку $\bar{s} \in \Phi(\bar{s})$, которая и будет равновесием по Нэшу в игре Γ . ■

Смешанное расширение игры

Пусть в игре Γ множества стратегий игроков конечны: $S^a = \{1, \dots, m^a\}$, $a \in A$. Стратегии s^a , входящие в S^a , называются чистыми стратегиями игрока a . Смешанная стратегия игрока a определяется как вероятностное распределение $\pi^a = (\pi_1^a, \dots, \pi_{m^a}^a)$, где $\pi_{s^a}^a$ — вероятность выбора чистой стратегии $s^a \in S^a$ в качестве реальной стратегии игрока a . Множество смешанных стратегий игрока a — это симплекс

$$\Pi^a = \{\pi^a = (\pi_1^a, \dots, \pi_{m^a}^a) \mid \sum_{s^a=1}^{m^a} \pi_{s^a}^a = 1, \pi_{s^a}^a \geq 0, s^a = 1, \dots, m^a\}.$$

Для заданного набора смешанных стратегий

$$\pi = (\pi^a, a \in A) \in \Pi = \bigotimes_{a \in A} \Pi^a$$

определим $p(s|\pi) \stackrel{\text{def}}{=} \prod_{a \in A} \pi_{s^a}^a$ — вероятность реализации ситуации

$s = (s^a, a \in A)$. Тогда математическое ожидание выигрыша игрока a будет задаваться функцией $u^a(\pi) = \sum_{s \in S} p(s|\pi) u^a(s)$. Таким образом, смешанное расширение игры Γ в нормальной форме имеет вид

$$\bar{\Gamma} = \langle A, \Pi^a, u^a(\pi), a \in A \rangle.$$

Ситуации равновесия игры $\bar{\Gamma}$ будем называть ситуациями равновесия в смешанных стратегиях игры Γ или смешанными равновесиями по Нэшу.

Каждая функция $u^a(\pi)$, очевидно, непрерывна по π и линейна по π^a при любых фиксированных $\pi^b, b \in A \setminus \{a\}$. Поэтому из теоремы 12.2 вытекает следующий результат.

Теорема 12.3. В любой игре Γ с конечными множествами стратегий существует смешанное равновесие по Нэшу.

Для анализа и вычисления смешанного равновесия по Нэшу полезно следующее утверждение.

Утверждение 12.1. Для того чтобы ситуация $\bar{\pi} = (\bar{\pi}^a, a \in A)$ была смешанным равновесием по Нэшу, необходимо и достаточно, чтобы

$$\max_{s^a \in S^a} u^a(\bar{\pi} || s^a) = u^a(\bar{\pi}) \quad \forall a \in A.$$

Более того, $u^a(\bar{\pi} || s^a) = u^a(\bar{\pi})$ для любой такой стратегии s^a , что $\bar{\pi}_{s^a}^a > 0$.

Доказательство этого утверждения полностью аналогично доказательствам леммы 10.1 и теоремы 10.1.

Пример 12.1. Каждое из трех предприятий, использующих воду из природного водоема, располагают двумя стратегиями: строить сооружения для полной очистки отработанной воды (стратегия 1) или же сбрасывать ее через имеющиеся очистные сооружения без биологической очистки (стратегия 2). Предполагается, что особенности водоема и технологических процессов таковы, что в случае, когда не полностью очищенную воду сбрасывает не более одного предприятия, вода в водоеме остается пригодной для использования и предприятия убытка не несут. Если же не полностью очищенную воду сбрасывают не менее двух предприятий, то

каждый пользователь воды несет убытки в размере трех единиц. Найдем все ситуации равновесия в чистых и смешанных стратегиях описанной игры трех лиц.

Исходная игра Γ представлена в табл. 12.1.

Табл. 12.1.

s^1	s^2	s^3	$u^1(s)$	$u^2(s)$	$u^3(s)$
1	1	1	-1	-1	-1
1	1	2	-1	-1	0
1	2	1	-1	0	-1
1	2	2	-4	-3	-3
2	1	1	0	-1	-1
2	1	2	-3	-4	-3
2	2	1	-3	-3	-4
2	2	2	-3	-3	-3

Построим смешанное расширение $\bar{\Gamma}$. Пусть $p^a \in [0, 1]$, $a = 1, 2, 3$, — вероятность, с которой предприятие a выбирает стратегию 1. Возможные ситуации в игре $\bar{\Gamma}$ составляют множество

$$\Pi = \{\pi = (p^1, p^2, p^3) \mid p^a \in [0, 1], a = 1, 2, 3\}.$$

Функция выигрыша первого предприятия в игре $\bar{\Gamma}$

$$\begin{aligned} u^1(\pi) &= p^1[-p^2p^3 - p^2(1 - p^3) - (1 - p^2)p^3 - 4(1 - p^2)(1 - p^3)] + \\ &\quad + (1 - p^1)[-3p^2(1 - p^3) - 3(1 - p^2)p^3 - 3(1 - p^2)(1 - p^3)] = \\ &= (-6p^2p^3 + 3p^2 + 3p^3 - 1)p^1 + 3p^2p^3 - 3 = k^1(p^2, p^3)p^1 + l^1(p^2, p^3). \end{aligned}$$

Аналогично,

$$u^2(\pi) = k^2(p^1, p^3)p^2 + l^2(p^1, p^3), \quad u^3(\pi) = k^3(p^1, p^2)p^3 + l^3(p^1, p^2),$$

где

$$l^1(p^2, p^3) = 3p^2p^3 - 3, \quad l^2(p^1, p^3) = 3p^1p^3 - 3, \quad l^3(p^1, p^2) = 3p^1p^2 - 3,$$

$$k^1(p^2, p^3) = -6p^2p^3 + 3p^2 + 3p^3 - 1, \quad k^2(p^1, p^3) = -6p^1p^3 + 3p^1 + 3p^3 - 1,$$

$$k^3(p^1, p^2) = -6p^1p^2 + 3p^1 + 3p^2 - 1.$$

Пусть $\bar{\pi} = (\bar{p}^a, a = 1, 2, 3)$ – произвольная ситуация равновесия. Положим

$$\bar{k}^1 = k^1(\bar{p}^2, \bar{p}^3), \bar{k}^2 = k^2(\bar{p}^1, \bar{p}^3), \bar{k}^3 = k^3(\bar{p}^1, \bar{p}^2).$$

Заметив, что если $\bar{k}^a > 0$, то $\bar{p}^a = 1$, а если $\bar{k}^a < 0$, то $\bar{p}^a = 0$, рассмотрим все возможные случаи.

Пусть $\bar{k}^a > 0$, $a = 1, 2, 3$; тогда $\bar{p}^a = 1$ и $\bar{k}^a = -1$ – противоречие.

Пусть $\bar{k}^a > 0$, $a = 1, 2$, $\bar{k}^3 < 0$. В этом случае ситуация равновесия $(1, 1, 0)$. Аналогично, $(1, 0, 1)$ и $(0, 1, 1)$ – также ситуации равновесия.

Пусть $\bar{k}^1 > 0$, $\bar{k}^2, \bar{k}^3 < 0$. тогда $\bar{p}^1 = 1$ и $\bar{p}^2 = \bar{p}^3 = 0$, $\bar{k}^1 = -1$ – противоречие.

Аналогично, нет и других ситуаций равновесия, соответствующих случаю одной положительной и двух отрицательных величин $\bar{k}^a$.

Пусть $\bar{k}^a < 0$, $a = 1, 2, 3$; тогда ситуация равновесия $(0, 0, 0)$.

Пусть $\bar{k}^a = 0$, $a = 1, 2, 3$. Решая полученную систему, найдем две ситуации равновесия:

$$((3 - \sqrt{3})/6, (3 - \sqrt{3})/6, (3 - \sqrt{3})/6) \text{ и } ((3 + \sqrt{3})/6, (3 + \sqrt{3})/6, (3 + \sqrt{3})/6).$$

Пусть $\bar{k}^a = 0$, $a = 1, 2$, $\bar{k}^3 > 0$; тогда $\bar{p}^3 = 1$. Решая соответствующую систему, получаем ситуацию равновесия $(2/3, 2/3, 1)$. Если $\bar{k}^a = 0$, $a = 1, 2$, $\bar{k}^3 < 0$, то $\bar{p}^3 = 0$, $\bar{p}^1 = \bar{p}^2 = 1/3$, $\bar{k}^3 = 1/3$ – противоречие. Аналогично, $(1, 2/3, 2/3)$ и $(2/3, 1, 2/3)$ – ситуации равновесия.

Наконец, рассуждая аналогично, убеждаемся, что нет ситуаций равновесия, соответствующих одной из величин $\bar{k}^a$, равной нулю, и двум, отличным от нуля.

Итак, в игре Γ девять ситуаций равновесия в чистых и смешанных стратегиях.

Доминирование в играх многих лиц

Понятия и результаты о доминировании стратегий в играх двух лиц, изложенные в § 10, легко обобщаются на игры многих лиц Γ .

Определение. Будем говорить, что стратегия h^a *строго доминирует* стратегию g^a ($h^a \succ g^a$) на множестве ситуаций $\bar{S} \subseteq S$, если выполнено неравенство $u^a(s||h^a) \geq u^a(s||g^a) \quad \forall s \in \bar{S}$. Будем говорить о *слабом доминировании* ($h^a \succeq g^a$), если $u^a(s||h^a) \geq u^a(s||g^a) \quad \forall s \in \bar{S}$.

Определение. Будем говорить, что множество $\bar{S}$ *строго* (соответственно *слабо*) *доминирует* множество S (обозначается $\bar{S} \succ S$ и $\bar{S} \succeq S$ соответственно), если оно может быть получено из S в результате по-

последовательного исключения строго (соответственно слабо) доминируемых стратегий, т.е. существует последовательность вложенных множеств $S = S_1 \supset S_2 \supset \dots \supset S_k = \bar{S}$, для которой при любом $l = 1, \dots, k - 1$ выполнены следующие условия:

$S_l = \bigotimes_{a \in A} S_l^a$ и для любых $a \in A$, $g^a \in S_l^a \setminus S_{l+1}^a$ найдется такая стратегия $h^a \in S_{l+1}^a$, что $h^a \succ g^a$ ($h^a \succeq g^a$) на S_l .

Процедура последовательного исключения доминируемых (в строгом или слабом смысле) стратегий состоит в следующем. На первом шаге выясняем для каждого игрока, какие стратегии являются доминируемыми на множестве всех ситуаций $S_1 = S$ и выбрасываем их. Получаем суженное множество S_2 . Теперь стратегии, которые не были доминируемыми на множестве S_1 , могут оказаться доминируемыми на множестве S_2 . На следующем шаге мы их выкидываем, получаем множество S_3 и т.д.

Определение. Будем говорить, что игра Γ разрешима по доминированию, если для некоторого слабо доминирующего множества $\bar{S}$ для каждого $a \in A$ функция $u^a(s)$ не зависит от s^a на $\bar{S}$, т.е. для любых $s \in \bar{S}$ и $h^a \in \bar{S}^a$ $u^a(s) = u^a(s||h^a)$.

Определение. Будем говорить, что смешанная стратегия π^a строго доминирует стратегию g^a ($\pi^a \succ g^a$) на множестве ситуаций $\bar{S} \subseteq S$, если выполнено неравенство $u^a(s||\pi^a) > u^a(s||g^a) \quad \forall s \in \bar{S}$. Будем говорить о слабом доминировании ($\pi^a \succeq g^a$), если $u^a(s||\pi^a) \geq u^a(s||g^a) \quad \forall s \in \bar{S}$.

Определение. Будем говорить, что множество $\bar{S}$ строго (соответственно слабо) доминирует множество S в смешанных стратегиях (обозначается $\bar{S} \succ S$ и $\bar{S} \succeq S$ соответственно), если существует последовательность вложенных множеств $S = S_1 \supset S_2 \supset \dots \supset S_k = \bar{S}$, для которой при любом $l = 1, \dots, k - 1$ выполнены следующие условия:

$S_l = \bigotimes_{a \in A} S_l^a$ и для любых $a \in A$, $g^a \in S_l^a \setminus S_{l+1}^a$ найдется такая стратегия $\pi^a \in S_{l+1}^a$, что $\pi^a \succ g^a$ ($\pi^a \succeq g^a$) на S_l и $\pi_{s^a}^a = 0 \quad \forall s^a \notin S_{l+1}^a$.

Следующее утверждение аналогично теореме 10.4.

Теорема 12.4. 1) Пусть множество $\tilde{S} = \bigotimes_{a \in A} \tilde{S}^a$ строго доминирует множество S в смешанных стратегиях. Тогда для любого смешанного равновесия по Нэшу $\bar{\pi} = (\bar{\pi}^a, a \in A)$ выполнено условие: для любых $a \in A$ и $s^a \notin \tilde{S}^a$ необходимо $\bar{\pi}_{s^a}^a = 0$.

2) Пусть множество $\tilde{S} = \bigotimes_{a \in A} \tilde{S}^a$ слабо доминирует множество S в смешанных стратегиях и $\tilde{\pi} = (\tilde{\pi}_{s^a}^a, s^a \in \tilde{S}^a, a \in A)$ – смешанное равновесие по Нэшу в игре $\tilde{\Gamma} = \langle A, \tilde{S}^a, u^a(s), a \in A \rangle$ с сокращенными множествами стратегий. Определим ситуацию в смешанных стратегиях $\bar{\pi}$ исходной игры Γ : для любого $a \in A$

$$\bar{\pi}_{s^a}^a = \begin{cases} \tilde{\pi}_{s^a}^a, & \text{если } s^a \in \tilde{S}^a, \\ 0, & \text{если } s^a \notin \tilde{S}^a. \end{cases}$$

Тогда $\bar{\pi}$ – равновесие по Нэшу в исходной игре Γ .

Модели игровой динамики

Модели этого типа развиты как альтернатива статическим принципам оптимальности (таким, как равновесие по Нэшу, решения по доминированию). Указанные принципы принятия решения требуют для своей реализации полной информированности игроков относительно условий игры (т.е. относительно множеств стратегий и функций выигрыша всех участников). Более того, игроки должны быть рациональны в принятии собственных решений и предполагать такую же рациональность от своих партнеров. Рассматриваемые динамические модели предъявляют значительно меньше требований к информированности и рациональности игроков и больше похожи на реальные методы принятия решений.

Предположим, что конфликтная ситуация описывается игрой $\Gamma = \langle A, S^a, u^a(s), a \in A \rangle$ с конечными множествами стратегий $S^a, a \in A$. Пусть игра повторяется в периоды времени $t = 1, 2, \dots$. Каждый игрок выбирает стратегию $s^a(t+1)$ на период (шаг) $t+1$, исходя из *истории* $h^t = \{s(\tau) = (s^a(\tau), a \in A)\}_{\tau \leq t}$, сложившейся к этому периоду. Бесконечную последовательность ситуаций $\{s(t)\}$ будем называть *траекторией* процесса. Обозначим через H множество всевозможных историй, т.е.

$$H = \bigcup_{t \geq 1} \{h^t\}.$$

Правило поведения игрока в этом процессе задается отображением $\mu^a : H \rightarrow S^a$. Совокупность $\langle \Gamma; \mu^a, a \in A \rangle$ называется *детерминированным игровым процессом*.

Определим понятие *адаптивного поведения*. Смысл его состоит в том, что игрок прогнозирует вероятности реализации стратегий партнеров $s^{A \setminus \{a\}} = (s^b, b \in A \setminus \{a\})$, исходя из предыстории, и максимизирует собственный выигрыш на основании такого прогноза. В качестве примера

рассмотрим модель наилучших ответов.

Процесс начинается с выбора игроками произвольных стратегий $s^a(1)$, $a \in A$. Далее после t шагов на следующем, $(t+1)$ -м шаге

$$s^a(t+1) \in \text{Arg max}_{s^a \in S^a} u^a(s(t) || s^a), \quad a \in A.$$

Таким образом, игрок максимизирует собственный выигрыш, исходя из предположения, что другие игроки не меняют своих стратегий по сравнению с предыдущим шагом.

В более общем случае предположения о поведении партнеров в момент времени $t+1$ можно характеризовать набором параметров $\{\lambda_{t,\tau}^a \geq 0\}_{\tau \leq t}$, таким, что $\sum_{\tau \leq t} \lambda_{t,\tau}^a = 1$. Игрок a считает, что с вероятностью $\lambda_{t,\tau}^a$ в момент $t+1$ повторится набор стратегий других игроков $s^{A \setminus \{a\}}(\tau)$, случившийся в момент τ . Исходя из этого, игрок a максимизирует математическое ожидание своего выигрыша. Следовательно,

$$s^a(t+1) \in \text{Arg max}_{s^a \in S^a} \sum_{\tau \leq t} \lambda_{t,\tau}^a u^a(s(\tau) || s^a), \quad a \in A. \quad (12.1)$$

Определение. Пусть T — минимальное число периодов, для которого $t - \tau > T \Rightarrow \lambda_{t,\tau}^a = 0 \quad \forall a \in A, t, \tau$. Тогда T называется *памятью* игрового процесса (игроки не помнят то, что происходило T шагов назад).

Примером процесса с бесконечной памятью является итерационный процесс Брауна для матричных игр, изложенный в § 5, или аналогичный процесс для биматричных игр из § 10, где $\lambda_{t,\tau}^a = 1/t$ для всех таких τ и t , что $\tau \leq t$. В общем случае правило прогнозирования можно задать отображением $p^a(s^{A \setminus \{a\}} | h^t)$, определяющем для игрока a субъективную вероятность реализации $s^{A \setminus \{a\}}$ в зависимости от истории h^t . При использовании правил прогнозирования p^a , $a \in A$, на $(t+1)$ -м шаге игроки выбирают стратегии по правилу

$$s^a(t+1) \in \text{Arg max}_{s^a \in S^a} \sum_{s^{A \setminus \{a\}}} p^a(s^{A \setminus \{a\}} | h^t) u^a(s^{A \setminus \{a\}}, s^a), \quad a \in A.$$

Адаптивные правила соответствуют ситуации, когда каждый игрок считает поведение партнеров, не зависящим от его собственного выбора. Он либо не учитывает возможного влияния выбора в текущий период

на последующие повторения, либо они его не интересуют (не случайно другим названием модели наилучших ответов является "близорукое приспособление").

Динамика игровых процессов с адаптивными правилами поведения оказывается для многих игр хорошо согласованной с указанными выше статическими принципами оптимальности. Приводимые ниже утверждения подтверждают возможность использования понятий равновесия по Нэшу и доминирующих множеств для описания поведения индивидуумов с ограниченной рациональностью.

Определение. Правило прогнозирования p^a назовем *адаптивным*, если для любой траектории $\{s(t)\}$ и любого набора стратегий $s^{A \setminus \{a\}}$, который встречается в $\{s(t)\}$ лишь конечное число раз, субъективная вероятность $p^a(s^{A \setminus \{a\}} | h^t)$ стремится к нулю при $t \rightarrow \infty$, где $\{h^t\}$ — последовательность историй, отвечающих траектории $\{s(t)\}$.

Упражнение 12.2. Покажите, что в процессе Брауна игроки используют адаптивные правила прогнозирования.

Теорема 12.5. Пусть последовательность множеств ситуаций $S = S_1 \supset S_2 \supset \dots \supset S_k$ получена в результате последовательного исключения стратегий, строго доминируемых смешанными стратегиями, и $g^a \in S_r^a \setminus S_{r+1}^a$ для некоторых $a \in A$, $r \in \{1, \dots, k-1\}$. Тогда справедливы следующие утверждения.

- 1) Для любой траектории $\{s(t)\}$ модели наилучших ответов $s^a(t+1) \neq g^a$ при $t \geq r$.
- 2) Для всякой адаптивной динамики с набором параметров $\{\lambda_{t,r}\}$ и памятью T $s^a(t+1) \neq g^a$ при $t \geq rT$.

Доказательство. 1) Предположим сначала, что стратегия g^a получена в результате последовательного исключения стратегий, строго доминируемых чистыми стратегиями. Проведем доказательство методом математической индукции по r . Пусть $s^a \succ g^a$, т.е. $r = 1$. Тогда стратегия g^a не является наилучшим ответом на любые стратегии других игроков. Следовательно, $s^a(t+1) \neq g^a$ при $t \geq 1$. Пусть утверждение доказано для любых стратегий из множества $S_1 \setminus S_r$. По индуктивному предположению $s(t) \in S_r$ при любых $t \geq r$. Поэтому, начиная с шага r , можно ограничиться редуцированной игрой с множествами стратегий S_r^a , $a \in A$. Возьмем $g^a \in S_r^a \setminus S_{r+1}^a$. В рассматриваемой редуцированной игре стратегия g^a строго доминируема и $s^a(t+1) \neq s^a$ при любых $t \geq r$.

Перейдем к доминированию смешанными стратегиями. Пусть смешанная стратегия π^a строго доминирует стратегию g^a , т.е. $r = 1$. Тогда для любой ситуации $s(t)$ найдется чистая стратегия s^a , для которой $\pi_{s^a}^a > 0$ и $u^a(s(t)||s^a) > u^a(s(t)||g^a)$. Следовательно, $s^a(t+1) \neq g^a$ при любых $t \geq 1$. Доказательство, как и для случая доминирования чистыми стратегиями, завершается индукцией по r .

2) Пусть $s^a \succ g^a$. Тогда стратегия g^a не является наилучшим ответом игрока a при $t \geq 2$, а начиная с шага $T+1$, она не входит в правые части (12.1) и не влияет на поведение остальных игроков. Поэтому при $t \geq T+1$ можно рассматривать редуцированную игру с множествами стратегий $S_2^b \forall b \in A$. Далее проводятся рассуждения по индукции.

Пусть теперь стратегия g^a строго доминируется смешанной стратегией π^a . Тогда для любой ситуации $s(\tau)$ выполнено неравенство $\sum_{s^a} \pi_{s^a}^a u^a(s(\tau)||s^a) > u^a(s(\tau)||g^a)$, а отсюда

$$\sum_{s^a} \pi_{s^a}^a \sum_{\tau \leq t} \lambda_{t,\tau}^a u^a(s(\tau)||s^a) > \sum_{\tau \leq t} \lambda_{t,\tau}^a u^a(s(\tau)||g^a).$$

Следовательно, найдется такая стратегия s^a , для которой $\pi_{s^a}^a > 0$ и $\sum_{\tau \leq t} \lambda_{t,\tau}^a u^a(s(\tau)||s^a) > \sum_{\tau \leq t} \lambda_{t,\tau}^a u^a(s(\tau)||g^a)$. Поэтому $s^a(t+1) \neq g^a$ при $t \geq 1$, а при $t \geq T+1$ стратегия g^a не влияет на выборы других игроков. Поэтому, начиная с шага $T+1$, можно рассматривать редуцированную игру с множествами стратегий $S_2^b \forall b \in A$. Далее проводятся рассуждения по индукции. ■

Утверждение 12.2. Пусть траектория $\{s(t)\}$ соответствует набору адаптивных правил p^a , $a \in A$ и $s(t) \equiv \bar{s}$ при $t \geq \bar{t}$. Тогда $\bar{s}$ — равновесие по Нэшу игры Γ .

Доказательство. Из условия вытекает, что

$$\lim_{t \rightarrow \infty} p^a(s^{A \setminus \{a\}}|h^t) = 0$$

при любых $s^{A \setminus \{a\}} \neq (\bar{s}^b, b \in A \setminus \{a\})$. Следовательно,

$$\lim_{t \rightarrow \infty} p^a(\bar{s}^b, b \in A \setminus \{a\})|h^t) = 1 \quad \forall a \in A. \quad (12.2)$$

Предположим, что $\bar{s}$ не является ситуацией равновесия. Тогда найдется такая стратегия s^a некоторого игрока a , что $u^a(\bar{s}||s^a) > u^a(\bar{s})$. С учетом

(12.2) при достаточно большом t

$$\sum_{s^A \setminus \{a\}} p^a(s^A \setminus \{a\} \mid h^t) u^a(s^A \setminus \{a\}, s^a) > \sum_{s^A \setminus \{a\}} p^a(s^A \setminus \{a\} \mid h^t) u^a(s^A \setminus \{a\}, \bar{s}^a).$$

Отсюда $s^a(t+1) \neq \bar{s}^a$, что противоречит условию. ■

Большой интерес представляют обратные результаты — о сходимости адаптивных процессов к равновесиям по Нэшу (см. теоремы 5.3 и 10.5).

§ 13. Позиционные игры с полной информацией

Многие реальные конфликтные ситуации имеют длительный характер. Их участники действуют неоднократно и с учетом информации о предшествующем развитии конфликта. Для соответствующих моделей общие теоремы существования решения для игр в нормальной форме не позволяют находить или даже конкретизировать оптимальное поведение из-за большого числа возможных стратегий. Для решения динамических игр с конечным числом игроков часто удобно использовать *позиционное* представление игры. Наиболее простым классом *позиционных игр* является класс конечношаговых позиционных игр с полной информацией. В такой игре на каждом шаге игры делает ход лишь один игрок, имеющий полную информацию о текущем состоянии, всех происходящих действиях и общей структуре игры. Это предположение обычно характеризуется как полная информация. Хорошо известными примерами таких игр являются шашки и шахматы. Многошаговые антагонистические игры с полной информацией рассматривались в § 8. В этом параграфе будут получены более общие результаты.

Напомним пример 9.1 взаимодействия продавца (игрока 1) и покупателя (игрока 2). У продавца две стратегии: "честность" и "обман". У покупателя также две стратегии: "поверить" и "проверить". Матрицы выигрышей игроков имеют вид

$$A = \begin{array}{cc} & \begin{array}{cc} \text{пов} & \text{пров} \end{array} \\ \begin{array}{c} \text{честн} \\ \text{обман} \end{array} & \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{array}{cc} & \begin{array}{cc} \text{пов} & \text{пров} \end{array} \\ \begin{array}{c} \text{честн} \\ \text{обман} \end{array} & \begin{pmatrix} 0 & -1/2 \\ -1 & 1/2 \end{pmatrix}. \end{array}$$

Рассмотрим динамическую модификацию игры: пусть покупатель способен заметить, обвешивает его продавец или нет, т.е. он выбирает свой

вариант поведения, зная поведение продавца. Соответствующая схема изображена на рис. 13.1.




Рис. 13.1

Интуитивно понятно, что рациональным поведением покупателя является выбор оптимального ответа, выделенного на рисунке жирными линиями. В свою очередь, продавец может выбрать оптимальную стратегию, зная реакцию покупателя. Ниже дается обобщение этого метода решения для любой игры с полной информацией. Приведем соответствующие формальные определения.

Определение. Конечным деревом, или ориентированным графом без циклов, называется пара (X, σ) , где X — конечное множество вершин, или позиций, а отображение $\sigma : X \rightarrow X$ сопоставляет каждой вершине ее ближайшего предшественника, причем

- существует единственная *начальная* вершина x_0 , такая, что $\sigma(x_0) = x_0$;
- существует целое $l \geq 0$, что $\sigma^l(x) = x_0$ для всех $x \in X$; наименьшее такое l называется *длиной* дерева (X, σ) .

Любая вершина x , для которой $\sigma^{-1}(x) = \emptyset$, называется *финальной* вершиной дерева (X, σ) , а множество всех таких вершин обозначается через T . Для нефинальных вершин x множество $\sigma^{-1}(x)$ состоит из преемников x , т.е. из следующих за x вершин. Ребра дерева (X, σ) называются *альтернативами*.

Определение. Позиционной игрой с полной информацией называется следующая совокупность:

$$G = \left\langle A, (X, \sigma), u^a(x), x \in T, a \in A; X \setminus T = \bigcup_{a \in A} X^a \cup X^0, \right. \\ \left. \forall x \in X^0 \exists p(x'|x), x' \in \sigma^{-1}(x) \right\rangle,$$

где

- A — множество игроков;

- (X, σ) — конечное дерево с начальной вершиной x_0 и множеством T финальных вершин;
- $R = \{X^a, a \in A, X^0\}$ — разбиение множества $X \setminus T$ на попарно непересекающиеся подмножества;
- X^a — множество позиций, в которых делает ход игрок $a \in A$; X^a называется множеством *личных* позиций игрока a .
- X^0 — множество позиций, в которых "делает ход" случай;
- $u^a : T \rightarrow E^1$ — функция выигрыша игрока a ;
- для каждого $x \in X^0$ заданы вероятности

$$p(x'|x) > 0, \quad \sum_{x' \in \sigma^{-1}(x)} p(x'|x) = 1,$$

перехода из позиции x в позиции $x' \in \sigma^{-1}(x)$.

Разбиение R определяет, какой игрок (или случай, если $x \in X^0$) ходит в каждой конкретной нефинальной вершине x . Если $x_0 \in X^a$, $a \in A$, то игра начинается с того, что игрок a должен выбрать следующую за x_0 вершину, скажем, $x_1 \in \sigma^{-1}(x_0)$. Если x_1 — финальная вершина, то игра окончена и выигрыши игроков суть $u^a(x_1)$, $a \in A$. Если x_1 — нефинальная вершина, то игрок b , для которого $x_1 \in X^b$, имеет право хода и выбирает следующую за x_1 вершину, скажем, $x_2 \in \sigma^{-1}(x_1)$ и т.д. Если в какой-то момент мы попадаем в вершину $x \in X^0$ (в которой ходит случай), то с вероятностью $p(x'|x)$ мы переходим к одной из вершин $x' \in \sigma^{-1}(x)$, в которой продолжаем действовать способом, описанным выше.

Если игрок a в вершине $x \in X^a$ выбирает вершину $x' \in \sigma^{-1}(x)$, то также будем говорить, что он выбирает соответствующую альтернативу — ребро дерева, соединяющего вершины x и x' .




Рис. 13.2

На рис. 13.2 отмеченные крестиками вершины являются финальными. В вершине 0 ходит случай, в остальных — игроки 1, 2 и 3.

Чтобы определить исход позиционной игры, для каждой позиции лю-

бого игрока должна быть указана вершина, куда он перейдет. Введем для этого несколько понятий.

Определение. Стратегией игрока $a \in A$ называется отображение μ^a , определяющее для каждой вершины $x \in X^a$ позицию, в которую он перейдет: $\forall x \in X^a \quad \mu^a(x) \in \sigma^{-1}(x)$. Множество всех стратегий игрока a обозначим через $\{\mu^a\}$.

Набор таких стратегий $\mu = (\mu^a, a \in A)$ называется *ситуацией*. Для каждого $x \in X$ для данной ситуации μ можно определить вероятность $p(x|\mu)$ перехода в позицию x . При этом $p(x_0|\mu) = 1$ — игра всегда начинается с позиции x_0 .

В общем случае вероятность попасть в позицию x , непосредственно следующую за позицией игрока $\sigma(x) \in X^a$, $a \in A$, определяется по формуле $p(x|\mu) = p(\sigma(x)|\mu)p(x|\sigma(x), \mu)$, где

$$p(x|\sigma(x), \mu) = \begin{cases} 1, & \text{если } \mu^a(\sigma(x)) = x, \\ 0 & \text{в противном случае.} \end{cases}$$

Если же $\sigma(x) \in X^0$ — позиция случая, то вероятность $p(x|\sigma(x), \mu) = p(x|\sigma(x))$ задана условиями игры. Таким образом, для любой ситуации μ для каждого игрока $a \in A$ определено среднее значение функции выигрыша

$$u^a(\mu) = E(u^a(x)|\mu) = \sum_{x \in T} p(x|\mu)u^a(x).$$

Упражнение 13.1. На рис. 13.3 ребра дерева, соответствующие ситуации $\bar{\mu}$, выделены жирными линиями, а финальные позиции пронумерованы от 1 до 6, т.е. $T = \{1, \dots, 6\}$. Найдите вероятности $p(x|\bar{\mu})$, $x \in T$.




Рис. 13.3

Определение. Игра $\Gamma(G) = \langle A, \{\mu^a\}, u^a(\mu), a \in A \rangle$ называется *нормальной формой* позиционной игры G .

Для любой вершины $z \in X$ можно рассмотреть позиционную поды-

гру, начинающуюся из этой точки:

$$G_z = \langle A, (X_z, \sigma_z), X_z^0, X_z^a, u_z^a(x), a \in A \rangle,$$

где

- $X_z = \{x \mid \text{существует такое целое } l \geq 0, \text{ что } \sigma^l(x) = z\}$;
- σ_z есть сужение отображения σ на X_z и $\sigma_z(z) = z$;
- $X_z^a = X^a \cap X_z$, $a \in A$, $X_z^0 = X^0 \cap X_z$;
- $u_z^a(x) = u^a(x)$, если $x \in X_z \cap T$.

Пусть $\mu = (\mu^a, a \in A)$ — ситуация в игре $\Gamma(G)$. Обозначим через $\mu_z = (\mu_z^a, a \in A)$ — ее сужение на X_z , а через $u^a(\mu_z)$ — значение выигрыша игрока a в ситуации μ_z . Таким образом, для любого $z \in X$ определена игра $\Gamma(G_z) = \langle A, \{\mu_z^a\}, u_z^a(\mu_z), a \in A \rangle$ — нормальная форма для игры G_z .

Упражнение 13.2. На рис. 13.4 изображено дерево игры G . В финальных позициях указаны векторы выигрышей игроков $u(x) = (u^1(x), u^2(x))$ или *исходы* игры.




Рис. 13.4

Запишите нормальную форму данной игры G и подыгры G_z , соответствующей случайному выбору правой альтернативы.

Определение. Ситуация $\bar{\mu} = (\bar{\mu}^a, a \in A)$ называется *совершенным подыгровым равновесием*, игры G , если для каждой вершины $z \in X$ ситуация $\bar{\mu}_z = (\bar{\mu}_z^a, a \in A)$, где $\bar{\mu}_z^a$ — сужение стратегии $\bar{\mu}^a$ на подыгру $\Gamma(G_z)$, является равновесием по Нэшу в игре $\Gamma(G_z)$.

Алгоритм определения совершенного подыгрового равновесия (алгоритм Куна)

Алгоритм Куна состоит из последовательных редукций игры G .

Шаг 1. Рассмотрим множество Z_1 *предфинальных* вершин, для которых все последующие вершины являются финальными: $Z_1 = \{x \mid \sigma^{-1}(x) \subseteq T\}$. Для каждой вершины $x \in Z_1$ действуем следующим образом.

1) Если в данной вершине ходит игрок $a \in A$ ($x \in Z_1 \cap X^0$), то находим его наилучший выбор в этой вершине

$$\bar{\mu}^a(x) \in \text{Arg} \max_{y \in \sigma^{-1}(x)} u^a(y)$$

и доопределяем вектор выигрышей игроков в вершине

$$u(x) = (u^b(x), b \in A) \stackrel{\text{def}}{=} (u^b(\bar{\mu}^a(x)), b \in A).$$

2) Если в данной вершине ходит случай ($x \in Z_1 \cap X^0$), то приписываем этой вершине среднее значение вектора выигрышей среди возможных альтернатив

$$u(x) = \sum_{y \in \sigma^{-1}(x)} p(y|x)u(y).$$

В результате получили редуцированную игру с множеством финальных вершин Z_1 .

Шаг 2. Для этой игры аналогично шагу 1 находим множество нефинальных вершин Z_2 , для которых все последующие вершины в новом дереве являются финальными: $Z_2 = \{x \mid \sigma^{-1}(x) \subset T \cup Z_1\}$. Для каждой вершины x этого множества аналогично пунктам 1) и 2) определяем выборы $\bar{\mu}^a(x)$ при $x \in X^a$ и вектор выигрышей $u(x)$.

Далее аналогично продолжаем этот процесс для множеств

$$Z_3 = \{x \mid \sigma^{-1}(x) \subset T \cup Z_1 \cup Z_2\},$$

$$Z_4 = \{x \mid \sigma^{-1}(x) \subset T \cup Z_1 \cup Z_2 \cup Z_3\}$$

и т.д., пока очередное множество Z_l не будет состоять только из начальной вершины x_0 . При этом полученная ситуация $\bar{\mu} = (\bar{\mu}^a, a \in A)$ будет совершенным подыгровым равновесием исходной игры G . Таким образом, доказано следующее утверждение.

Теорема 13.1. В любой конечной позиционной игре с полной информацией существует совершенное подыгровое равновесие. Соответствующие стратегии и выигрыши игроков задаются алгоритмом Куна.

Упражнение 13.3. Найти совершенное подыгровое равновесие в позиционной игре G , изображенной на рис. 13.4.

Пример 13.1. Модель внутриведомственного экологического контроля. Пусть первый игрок — предприятие, имеющее две стратегии: 1 — применять экологически чистый способ производства и 2 — применять "грязный", но более дешевый способ. Второй игрок — контролирующий орган, принадлежащий тому же ведомству, что и предприятие. Он имеет две стратегии: 1 — штрафовать за применение "грязного" способа производства, 2 — пропускать экологическое нарушение ("закрывать глаза").




Рис. 13.5

Вначале ходит первый игрок, а затем — второй, зная выбор первого. На рис. 13.5 изображено дерево игры. В финальных вершинах дерева указаны условные выигрыши игроков. Например, если оба игрока применяют вторые стратегии, то первый выиграет 2, а второй проиграет 1, поскольку при этом произошло загрязнение окружающей среды.

Легко видеть, что совершенным подыгровым равновесием в данном случае является набор $\bar{\mu} = (2, 2)$, приводящий к исходу $(2, -1)$. Однако, в этой игре существует равновесие по Нэшу, более выгодное для второго игрока : он может использовать "стратегию наказания" (см. § 11) и при выборе первым игроком второй стратегии выбирать стратегию "штрафовать", что приводит к исходу $(-5, -2)$ (несмотря на то, что это ему не выгодно). Тогда первый игрок, чтобы не получить -5 , предпочтет выбрать первую стратегию. В итоге получится ситуация равновесия $\mu = (1, 1)$, которая не является совершенным подыгровым равновесием. Отметим, что ситуацию $(2, 2)$ можно также получить исключением доминируемых стратегий в игре $\Gamma(G)$ с матрицами

$$A = \begin{matrix} & \begin{matrix} \text{штр} & \text{проп} \end{matrix} \\ \begin{matrix} \text{гряз} \\ \text{чист} \end{matrix} & \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -5 & 2 \end{pmatrix} \end{matrix}, \quad B = \begin{matrix} & \begin{matrix} \text{штр} & \text{проп} \end{matrix} \\ \begin{matrix} \text{гряз} \\ \text{чист} \end{matrix} & \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -2 & -1 \end{pmatrix} \end{matrix}.$$

Нетрудно видеть, что стратегия 1 второго игрока слабо доминируется стратегией 2. Если ее вычеркнуть, то получается игра, где стратегия 2 первого игрока строго доминирует стратегию 1. В результате исключения доминируемых стратегий останется ситуация $(2, 2)$, которая обычно и возникает при внутриведомственном контроле. В этом примере игра $\Gamma(G)$ разрешима по доминированию.

Вообще для игр с полной информацией типична ситуация, когда совершенное подыгровое равновесие одно, а прочих равновесий по Нэшу, связанных со стратегиями наказания, много.

Рассмотрим следующее *возмущение игры* G : пусть в каждой позиции с некоторой достаточно малой вероятностью $\varepsilon > 0$ все игроки ошибаются. В каждой позиции игрока a с вероятностью $1 - \varepsilon$ реализуется намеченная им альтернатива, а с вероятностью ε происходит ход случая и равновероятно реализуется любая другая альтернатива. Обозначим через G_ε указанную возмущенную игру. Очевидно, что множества стратегий остаются такими же, как в игре G , и любая вершина исходной игры в возмущенной игре G_ε реализуется с положительной вероятностью при любых стратегиях игроков.

Теорема 13.2. Пусть в исходной игре G существует единственное совершенное подыгровое равновесие. Тогда для любого достаточно малого $\varepsilon > 0$ в игре G_ε существует единственное равновесие по Нэшу, совпадающее с совершенным подыгровым равновесием исходной игры.

Доказательство повторяет схему алгоритма Куна. В любой предфинальной позиции $x \in Z_1 \cap X^a$ существует единственный наилучший выбор $\bar{\mu}^a(x)$ игрока a , отвечающий совершенному подыгровому равновесию. В любой ситуации равновесия $\hat{\mu}$ при достаточно малых $\varepsilon > 0$ $\hat{\mu}^a(x) = \bar{\mu}^a(x)$, поскольку вероятность осуществления позиции x положительна и любой другой выбор приведет к строго меньшему выигрышу. Далее рассматриваются вершины из $Z_2, Z_3, \dots$, проводятся аналогичные рассуждения по индукции и доказывается, что $\hat{\mu} = \bar{\mu}$. ■

Следствие. Пусть G — позиционная игра, для которой существует единственное совершенное подыгровое равновесие $\bar{\mu}$. Тогда игра в нормальной форме $\Gamma(G)$ разрешима по доминированию, а выигрыши игроков $u^a(\bar{\mu})$, $a \in A$, задаются алгоритмом Куна.

В следующем примере (рис. 13.6) совершенное подыгровое равновесие строго хуже для игроков, чем другая ситуация.




Рис. 13.6

§ 14. Позиционные игры общего вида

Основное отличие позиционных игр с неполной информацией от игр с полной информацией состоит в том, что игрок в момент принятия решения не знает точно состояние игры, то есть не различает некоторые вершины между собой. Отметим, что неточная информация о текущем состоянии типична для реальных конфликтов. Общее понятие позиционной игры (с неполной информацией) отличается от данного выше определения игры с полной информацией в следующем отношении. Для каждого игрока a вводится дополнительное разбиение множества его позиций на информационные множества. *Информационное множество* — это совокупность состояний позиционной игры, которые игрок не различает между собой. Необходимым условием для всех позиций одного информационного множества является одинаковое число альтернатив, т.е. последующих позиций, в каждой такой вершине. Кроме того, информационное множество не должно содержать двух позиций, принадлежащих одному пути, соединяющему начальную вершину с некоторой финальной. Занумеруем эти множества для каждого игрока и обозначим информационное множество с номером j игрока $a \in A$ через Z^{aj} .

Как и в игре с полной информацией, в произвольной позиционной игре

$$G = \left\langle A, (X, \sigma), u^a(x), x \in T, a \in A; X \setminus T = \bigcup_{a \in A} X^a \cup X^0, \right. \\ \left. \forall x \in X^0 \exists p(x'|x), x' \in \sigma^{-1}(x) \right\rangle,$$

заданы

- A — множество игроков;
- (X, σ) — конечное дерево (ориентированный граф без циклов), где X — множество позиций (вершин) с *начальной* вершиной x_0 и $\sigma : X \rightarrow X$ — отображение, сопоставляющее каждой вершине дерева (X, σ) ее ближайшего *предшественника*, причем

$$1) \sigma(x_0) = x_0,$$

- 2) найдется целое $l \geq 0$, что $\sigma^l(x) = x_0 \quad \forall x \in X$; наименьшее такое l называется *длиной* дерева (X, σ) ;

- $T = \{x \in X \mid \sigma^{-1}(x) = \emptyset\}$ — множество финальных вершин;
- $R = \{X^a, a \in A, X^0\}$ — разбиение множества $X \setminus T$ на попарно непересекающиеся подмножества;

- X^a — множество личных позиций, в которых делает ход игрок $a \in A$;

- X^0 — множество позиций, в которых "делает ход" случай;
- $u^a : T \rightarrow E^1$ — функция выигрыша игрока a ;
- для каждого $x \in X^0$ заданы вероятности

$$p(x'|x) > 0, \quad \sum_{x' \in \sigma^{-1}(x)} p(x'|x) = 1,$$

перехода из позиции x в позиции $x' \in \sigma^{-1}(x)$.

Кроме того, для каждого $a \in A$ задано разбиение

$$X^a = \bigcup_{j \in J^a} Z^{aj}$$

на информационные множества Z^{aj} , $j \in J^a$, включающие позиции с одинаковым числом альтернатив, равным $k(j)$. Альтернативы каждой позиции $x \in Z^{aj}$ пронумерованы слева направо числами от 1 до $k(j)$. Игрок a делает ход, не различая позиции из Z^{aj} между собой. Чтобы отразить это обстоятельство, обозначим через $Al^{aj} = \{1, \dots, k(j)\}$ множество номеров альтернатив для информационного множества Z^{aj} игрока $a \in A$. Во всех позициях $x \in Z^{aj}$ множество Al^{aj} изоморфно множеству позиций $\sigma^{-1}(x)$. Обозначим через $\xi(x, k)$ вершину, следующую за x и соответствующую альтернативе с номером $k \in Al^{aj}$ при указанном изоморфизме.

Определение. Чистой стратегией игрока $a \in A$ называется отображение μ^a , определяющее для каждого информационного множества Z^{aj} альтернативу $\mu^a(Z^{aj}) \in Al^{aj}$, которую игрок выбирает в любой из вершин этого множества. Набор таких стратегий

$\mu = (\mu^a, a \in A)$ называется ситуацией.

Вероятность попасть в позицию $x \in X$, непосредственно следующую за вершиной $\sigma(x) \in Z^{aj}$ при использовании ситуации μ , определяется по формуле $p(x|\mu) = p(\sigma(x)|\mu)p(x|\sigma(x), \mu)$, где

$$p(x|\sigma(x), \mu) = \begin{cases} 1, & \text{если } x = \xi(\sigma(x), \mu^a(Z^{aj})), \\ 0 & \text{в противном случае.} \end{cases}$$

Если же $\sigma(x) \in X^0$ — позиция случая, то вероятность $p(x|\sigma(x), \mu) = p(x|\sigma(x))$ задана условиями игры. Таким образом, для любой ситуации μ для каждого игрока $a \in A$ определено среднее значение функции выигрыша

$$u^a(\mu) = E(u^a(x)|\mu) = \sum_{x \in T} p(x|\mu) u^a(x).$$

Определение. Смешанной стратегией π^a игрока $a \in A$ называется вероятностное распределение на множестве $\{\mu^a\}$ его чистых стратегий,

ставящее в соответствие каждой стратегии μ^a вероятность $\pi_{\mu^a}^a$ ее выбора.

Ситуация $\pi = (\pi^a, a \in A)$ в смешанных стратегиях определяет вероятностное распределение на множестве T финальных позиций:

$$p(x|\pi) = \sum_{\mu} \left(\prod_{a \in A} \pi_{\mu^a}^a \right) p(x|\mu) \quad \forall x \in T.$$

Ожидаемый выигрыш игрока a в ситуации π определяется как математическое ожидание

$$u^a(\pi) = E(u^a(x)|\mu) = \sum_{x \in T} p(x|\pi) u^a(x).$$

Указанный способ введения смешанных стратегий аналогичен случаю игр в нормальной форме. Однако в данном классе игр он, как правило, неэффективен, поскольку даже для небольших деревьев число возможных чистых стратегий может быть очень велико. Более эффективным является следующий подход, связанный с понятием *стратегии поведения*.

Рассмотрим ситуацию, когда игрок выбирает вероятностное распределение на альтернативах для каждого своего информационного множества и, в случае своего выбора, проводит рандомизацию, пользуясь этим распределением. При этом предполагается, что случайный выбор альтернатив в различных информационных множествах производится независимо.

Определение. Стратегией поведения β^a игрока a называется отображение, которое каждому информационному множеству Z^{aj} , $j \in J^a$, сопоставляет набор

$$(p_k^{aj}, k = 1, \dots, k(j)) : \sum_{k=1}^{k(j)} p_k^{aj} = 1, p_k^{aj} \geq 0, k = 1, \dots, k(j),$$

причем p_k^{aj} — вероятность выбора альтернативы $k \in Al^{aj}$ в любой позиции множества Z^{aj} .

Любая ситуация $\beta = (\beta^a, a \in A)$ в стратегиях поведения определяет вероятностное распределение на множестве позиций следующим образом:

$$\sigma(x) \in Z^{aj}, x = \xi(\sigma(x), k), k \in Al^{aj} \Rightarrow p(x|\beta) = p(\sigma(x)|\beta) p_k^{aj};$$

$$\sigma(x) \in X^0 \Rightarrow p(x|\beta) = p(\sigma(x)|\beta)p(x|\sigma(x)).$$

Ожидаемый выигрыш $u^a(\beta)$ игрока a в ситуации $\beta = (\beta^a, a \in A)$ определяется как математическое ожидание $u^a(\beta) = \sum_{x \in T} p(x|\beta)u^a(x)$.

Таким образом, мы определили два смешанных расширения игры $\Gamma(G)$:

$$\bar{\Gamma}(G) = \langle A, \{\pi^a\}, u^a(\pi), a \in A \rangle \text{ и } \hat{\Gamma}(G) = \langle A, \{\beta^a\}, u^a(\beta), a \in A \rangle.$$

Как они между собой соотносятся? Изучим этот вопрос, используя следующие понятия.

Определение. Позиция $x \in X^a$ игрока a называется *возможной* для смешанной стратегии π^a (чистой стратегии μ^a), если существует такая ситуация π (μ), содержащая π^a (μ^a), что $p(x|\pi) > 0$ ($p(x|\mu) > 0$).

Определение. Информационное множество Z^{aj} игрока a называется *существенным* для смешанной стратегии π^a (чистой стратегии μ^a), если некоторая позиция $x \in Z^{aj}$ возможна для π^a (μ^a).

Обозначим множество позиций, возможных для стратегии μ^a , через $\text{Poss } \mu^a$, а семейство информационных множеств, существенных для μ^a , через $\text{Rel } \mu^a$. Аналогично вводятся множество $\text{Poss } \pi^a$ и семейство $\text{Rel } \pi^a$.

Обозначим через $[x_0, x]$ путь, ведущий из начальной вершины x_0 дерева в вершину x .

Упражнение 14.1. Пусть μ^a — чистая стратегия игрока $a \in A$. Покажите, что $x \in \text{Poss } \mu^a$ тогда и только тогда, когда стратегия μ^a в любой вершине $x' \in [x_0, x] \cap X^a$, $x' \neq x$, выбирает альтернативу, принадлежащую пути $[x_0, x]$. В частности, если $x \in X^a \cap Z^{aj}$ — первая позиция, где игрок a делает ход, то $x \in \text{Poss } \mu^a$ и $Z^{aj} \in \text{Rel } \mu^a$ для любой чистой стратегии μ^a .

Для смешанной стратегии π^a , информационного множества Z^{aj} и альтернативы $k \in Al^{aj}$ положим

$$P(\pi^a, j) = \sum_{\mu^a: Z^{aj} \in \text{Rel } \mu^a} \pi_{\mu^a}^a, \quad P_k(\pi^a, j) = \sum_{\mu^a: Z^{aj} \in \text{Rel } \mu^a, \mu^a(Z^{aj})=k} \pi_{\mu^a}^a.$$

Здесь $P(\pi^a, j)$ — вероятность выбора чистой стратегии μ^a , для которой множество Z^{aj} возможно, а $P_k(\pi^a, j)$ — вероятность выбора аналогичной стратегии μ^a с дополнительным условием $\mu^a(Z^{aj}) = k$. Нетрудно видеть,

что

$$P(\pi^a, j) = \sum_{k=1}^{k(j)} P_k(\pi^a, j).$$

Определение. Стратегией поведения β^a , соответствующей смешанной стратегии π^a игрока a , называется стратегия поведения, определяемая следующим образом:

$$p_k^{aj} = \begin{cases} P_k(\pi^a, j)/P(\pi^a, j), & \text{если } Z^{aj} \in \text{Rel } \pi^a, \\ \sum_{\mu^a: \mu^a(Z^{aj})=k} \pi_{\mu^a}^a, & \text{если } Z^{aj} \notin \text{Rel } \pi^a. \end{cases} \quad (14.1)$$

Из последних формул вытекает, что каждая смешанная стратегия однозначно определяет соответствующую стратегию поведения. Обратно, каждой стратегии поведения соответствует много смешанных стратегий. Но одну из них всегда можно задать следующим образом.

Лемма 14.1. Если дана стратегия поведения β^a игрока a и смешанная стратегия π^a определена по формуле

$$\pi_{\mu^a}^a = \prod_{j \in J^a} p_{i_j}^{aj},$$

где $\mu^a(Z^{aj}) = i_j \in Al^{aj} \quad \forall j \in J^a$, то β^a есть стратегия поведения, соответствующая π^a .

Доказательство. Любая чистая стратегия μ^a игрока a определяется набором значений

$$i^a = (i_j \mid \mu^a(Z^{aj}) = i_j \in Al^{aj}, j \in J^a).$$

Поэтому

$$\sum_{\mu^a} \pi_{\mu^a}^a = \sum_{i^a} \prod_{j \in J^a} p_{i_j}^{aj} = \prod_{j \in J^a} \sum_{i_j=1}^{k(j)} p_{i_j}^{aj} = 1.$$

Пусть $Z^{aj} \in \text{Rel } \pi^a$. Тогда для $k \in Al^{aj}$

$$P_k(\pi^a, j) = \sum_{\mu^a: Z^{aj} \in \text{Rel } \mu^a, \mu^a(Z^{aj})=k} \pi_{\mu^a}^a =$$

$$= \left(\sum_{\mu^a: Z^{aj} \in \text{Rel}_{\mu^a, \mu^a(Z^{aj})=k}} \prod_{l \in J^a \setminus \{j\}} p_{\mu^a(Z^{al})}^{al} \right) p_k^{aj} = d_k p_k^{aj}.$$

Величина d_k от $k \in Al^{aj}$ не зависит, поскольку она представляет собой сумму одинакового числа слагаемых, не зависящих от k . Отсюда

$$P(\pi^a, j) = \sum_{k=1}^{k(j)} P_k(\pi^a, j) = \sum_{k=1}^{k(j)} d_k p_k^{aj} = d_k \Rightarrow p_k^{aj} = P_k(\pi^a, j) / P(\pi^a, j).$$

Пусть $Z^{aj} \notin \text{Rel } \pi^a$. Тогда

$$\begin{aligned} \sum_{\mu^a: \mu^a(Z^{aj})=k} \pi_{\mu^a}^a &= \left(\sum_{\mu^a: \mu^a(Z^{aj})=k} \prod_{l \in J^a \setminus \{j\}} p_{\mu^a(Z^{al})}^{al} \right) p_k^{aj} = \\ &= \prod_{l \in J^a \setminus \{j\}} \sum_{\mu^a: \mu^a(Z^{aj})=k} p_{\mu^a(Z^{al})}^{al} p_k^{aj} = p_k^{aj}. \blacksquare \end{aligned}$$

Приведенная лемма утверждает, что мы можем получить каждую стратегию поведения из некоторой смешанной стратегии.

Пример 14.1. Игра с партнером. В этой антагонистической игре игрок 1 состоит из двух агентов, называемых Играющий и Партнер. Две карты, "старшая" и "младшая", сдаются Играющему и игроку 2. Оба возможных расклада карт считаются равновероятными. Игрок со старшей картой получает доллар от игрока с младшей картой и имеет альтернативы либо закончить, либо продолжить партию. Если партия продолжается, Партнер, не зная расклада (и полученной суммы), может посоветовать Играющему поменяться картой с игроком 2 или сохранить свою карту. Снова имеющий старшую карту получает доллар от агента, имеющего младшую (см. рис. 14.1, где в каждой финальной позиции записан выигрыш игрока 1).




Рис. 14.1

Здесь $X^1 = Z^{11} \cup Z^{12}$, $X^2 = Z^{21}$. Поэтому $\mu^1 = (\mu^1(Z^{11}), \mu^1(Z^{12}))$ и $\mu^2 = (\mu^2(Z^{21}))$. Матрица ожидаемых выигрышей $u^1(\mu^1, \mu^2)$ первого игрока есть

$$\begin{array}{cc}
 & \begin{array}{cc} (1) & (2) \\ \text{закончить} & \text{продолжить} \end{array} \\
 \begin{array}{cc} \text{(закончить, оставить)} & (1, 1) \\ \text{(закончить, меняться)} & (1, 2) \\ \text{(продолжить, оставить)} & (2, 1) \\ \text{(продолжить, меняться)} & (2, 2) \end{array} & \begin{pmatrix} 0 & -1/2 \\ 0 & 1/2 \\ 1/2 & 0 \\ -1/2 & 0 \end{pmatrix}
 \end{array}$$

$$\begin{aligned}
 u^1((1, 1), 1) &= 1/2 \cdot 1 + 1/2 \cdot (-1) = 0; \\
 u^1((1, 1), 2) &= 1/2 \cdot 1 + 1/2 \cdot (-2) = -1/2; \\
 u^1((1, 2), 1) &= 1/2 \cdot 1 + 1/2 \cdot (-1) = 0; \\
 u^1((1, 2), 2) &= 1/2 \cdot 1 + 1/2 \cdot 0 = 1/2; \\
 u^1((2, 1), 1) &= 1/2 \cdot 2 + 1/2 \cdot (-1) = 1/2; \\
 u^1((2, 1), 2) &= 1/2 \cdot 2 + 1/2 \cdot (-2) = 0; \\
 u^1((2, 2), 1) &= 1/2 \cdot 0 + 1/2 \cdot (-1) = -1/2; \\
 u^1((2, 2), 2) &= 1/2 \cdot 0 + 1/2 \cdot 0 = 0.
 \end{aligned}$$

Решение матричной игры $(\bar{\pi}^1, \bar{\pi}^2, v) = ((0, 1/2, 1/2, 0), (1/2, 1/2), 1/4)$ обеспечивает игроку 1 ожидаемый выигрыш $1/4$, а игроку 2 — ожидаемую потерю, не превышающую $1/4$. С другой стороны, если взять стратегию поведения игрока 1 $s = p_1^{11}$, $1 - s = p_2^{11}$ и $r = p_1^{12}$, $1 - r = p_2^{12}$, то получим, что ожидаемый выигрыш игрока 1 равен

$$\begin{cases} s/2 + 2((1-s)r/2) + 0 - 1/2 = (s-1)(1/2 - r), & \text{если } \mu^2 = (1), \\ s/2 + 2((1-s)r/2) + 0 + (-2)r/2 + 0 = s(1/2 - r), & \text{если } \mu^2 = (2). \end{cases}$$

Для любых s и r игроку 1 гарантирован только минимум из этих двух значений. Следовательно, максимальная сумма, которую игрок 1 может себе обеспечить, равна

$$\max_{0 \leq s, r \leq 1} \min[(s-1)(1/2 - r), s(1/2 - r)] = 0$$

и достигается при $r = 1/2$. Таким образом, стратегии поведения могут дать худший результат, чем смешанные стратегии. Заметим, что смешанная стратегия $\pi^1 = (\pi_{(1,1)}^1, \pi_{(1,2)}^1, \pi_{(2,1)}^1, \pi_{(2,2)}^1)$ имеет соответствующую стратегию поведения $\beta^1 = (s, r) = (\pi_{(1,1)}^1 + \pi_{(1,2)}^1, \pi_{(1,1)}^1 + \pi_{(2,1)}^1)$. Следовательно, если мы рассмотрим оптимальную смешанную стратегию $(0, 1/2, 1/2, 0)$ игрока 1, соответствующей стратегией поведения будет $s = r = 1/2$, и, в то время как оптимальная смешанная стратегия обеспечивает первому игроку выигрыш $1/4$, даже соответствующая стратегия поведения дает ему только 0. Это расхождение объясняется, конечно, независимостью, содержащейся в природе стратегии поведения. Чтобы получить положительные результаты при использовании стратегий поведения, надо наложить ограничение на информационное разбиение.

Определение. Игра G называется *игрой с полной памятью* для игрока a , если из $Z^{aj} \in \text{Rel } \mu^a$ и $x \in Z^{aj}$ следует $x \in \text{Poss } \mu^a$ для всех Z^{aj} , x и μ^a .

Из определения вытекает, что в игре с полной памятью для игрока a любая позиция из существенного информационного множества является возможной. Термин "полная память" означает, что игрок может точно восстановить, какие альтернативы он выбирал во всех своих предыдущих ходах (см. упражнение 14.1).

В примере 14.1 игра G не является игрой с полной памятью для игрока 1. Действительно, информационное множество Z^{12} существенно для стратегии $\mu^1 = (1, 2)$, поскольку, если игрок 2 использует стратегию $\mu^2 = (2)$, то позиция $y \in Z^{12}$ реализуется с вероятностью $1/2$. Однако другая позиция $x \in Z^{12}$ не является возможной для стратегии μ^1 , так как Играющий, получив старшую карту, заканчивает игру.

Игра с полной памятью для всех игроков превращается в игру с полной информацией, если все ее информационные множества содержат по одной вершине.

Пусть $w \in T$ — финальная позиция, а игроку a принадлежит некоторая позиция пути $[x_0, w]$. Предположим, что его последняя позиция $x \in Z^{aj} \cap [x_0, w]$ имеет альтернативу с номером $t \in Al^{aj}$, также принадлежащую пути $[x_0, w]$. Положим

$$S^a(w) = \{\mu^a \mid Z^{aj} \in \text{Rel } \mu^a, \mu^a(Z^{aj}) = t\}.$$

Наконец, пусть величина $c(w)$ равна или произведению вероятностей альтернатив случая, принадлежащих пути $[x_0, w]$, или 1, если таковых нет. На рис. 14.1 для финальной вершины w $c(w) = 1/2$, $S^1(w) = \{(1, 1), (2, 1)\}$.

Лемма 14.2. Пусть G — игра с полной памятью для всех игроков. Тогда для любой ситуации $\mu = (\mu^a, a \in A)$ и для всех $w \in T$

$$p(w|\mu) = \begin{cases} c(w), & \text{если } \mu^a \in S^a(w) \quad \forall a \in A, \\ 0 & \text{в противном случае.} \end{cases}$$

Доказательство. Очевидно, достаточно показать, что если $\mu^a \in S^a(w)$, $a \in A$, то каждая стратегия μ^a выбирает альтернативы игрока a , принадлежащие пути $[x_0, w]$ (если таковые существуют). Но если $\mu^a \in S^a(w)$, то $Z^{aj} \in \text{Rel } \mu^a$ и, так как G — игра с полной памятью, то $x \in \text{Poss } \mu^a$. Поэтому μ^a выбирает все альтернативы игрока a , принадлежащие пути $[x_0, w]$ (см. упражнение 14.1). ■

Следствие. Пусть G — игра с полной памятью для всех игроков. Тогда для любой ситуации в смешанных стратегиях $\pi = (\pi^a, a \in A)$ позиция $w \in T$ возникает с вероятностью

$$p(w|\pi) = \sum_{\mu} \prod_{a \in A} \pi_{\mu^a}^a p(w|\mu) = \sum_{\mu: \mu^a \in S^a(w), a \in A} \prod_{a \in A} \pi_{\mu^a}^a c(w). \quad (14.2)$$

Лемма 14.3. Пусть G — игра с полной памятью для игрока a . Позиции $z \in Z^{al}$, $\xi(z, k)$ и $x \in Z^{al}$ принадлежат пути $[x_0, w]$, $w \in T$, причем x следует за z .¹ Тогда множества $S_1 = \{\mu^a \mid Z^{al} \in \text{Rel } \mu^a, \mu^a(Z^{al}) = k\}$ и $S_2 = \{\mu^a \mid Z^{aj} \in \text{Rel } \mu^a\}$ совпадают.

¹В частности, x может совпасть с $\xi(z, k)$.

Доказательство. Пусть $\mu^a \in S_1$. Тогда $Z^{al} \in \text{Rel } \mu^a$, и, так как G — игра с полной памятью для игрока a , то $z \in \text{Poss } \mu^a$. Следовательно, стратегия μ^a выбирает все альтернативы игрока a на пути $[0, z]$. Но $\mu^a(Z^{al}) = k$, и, значит, μ^a выбирает все альтернативы игрока a на пути $[0, x]$. Следовательно, $x \in \text{Poss } \mu^a$, $Z^{aj} \in \text{Rel } \mu^a$ и $\mu^a \in S_2$.

Пусть $\mu^a \in S_2$. Тогда $Z^{aj} \in \text{Rel } \mu^a$, и, так как G — игра с полной памятью для игрока a , то $x \in \text{Poss } \mu^a$. Следовательно (см. упражнение 14.1), $z \in \text{Poss } \mu^a$ и $\mu^a(Z^{al}) = k$, т.е. $\mu^a \in S_1$. ■

Следующее утверждение показывает, что в играх с полной памятью можно ограничиться поиском равновесий по Нэшу в стратегиях поведения.

Теорема 14.1. Пусть β — ситуация в стратегиях поведения, соответствующая (по формулам (14.1)) произвольной ситуации π в смешанных стратегиях в игре G , в которой все позиции имеют по крайней мере две альтернативы. Тогда для того чтобы $u^a(\beta) = u^a(\pi)$, $a \in A$, для всех π и для любых значений функций выигрыша $u^a(w)$, $a \in A$, $w \in T$, необходимо и достаточно, чтобы G была игрой с полной памятью для всех игроков.

Доказательство. Необходимость. Пусть G не является игрой с полной памятью для некоторого игрока a . Тогда должна существовать чистая стратегия μ^a и такие две позиции x и y в некотором информационном множестве Z^{aj} , что $x \notin \text{Poss } \mu^a$ и $y \in \text{Poss } \mu^a$. Выберем стратегию $\hat{\mu}^a$, для которой $x \in \text{Poss } \hat{\mu}^a$ и $\hat{\mu}^a(Z^{aj}) = t \neq \mu^a(Z^{aj})$. При этом существует такая позиция $z \in [x_0, x] \cap Z^{al}$, в которой k -ая альтернатива, принадлежащая $[x_0, x]$, стратегией $\hat{\mu}^a$ выбирается, а стратегией μ^a — нет. Пусть $\hat{\mu}$ — такая ситуация, содержащая $\hat{\mu}^a$, что $p(x|\hat{\mu}) > 0$, а $w \in T$ — финальная позиция, следующая за x , для которой $p(w|\hat{\mu}) > 0$. В игре G примера 14.1 (см. рис. 14.1) $a = 1$, $k = 2$, $t = 1$, $l = 1, j = 2$, $\mu^1 = (1, 2)$, $\hat{\mu}^1 = (2, 1)$, $\hat{\mu}^2 = (1)$.

Положим $\pi^a = (1/2)\mu^a + (1/2)\hat{\mu}^a$. Для соответствующей стратегии поведения β^a выполнено $p_k^{al} = p_t^{aj} = 1/2$. Пусть ситуация β в стратегиях поведения соответствует ситуации $\pi = \hat{\mu} || \pi^a$. Тогда $p(w|\beta) \leq (1/4)c(w) < (1/2)c(w) = p(w|\pi)$. Определим для игрока a функцию выигрыша следующим образом:

$$u^a(w') = \begin{cases} 1, & w' = w, \\ 0, & w' \in T, w' \neq w. \end{cases}$$

Тогда из последнего неравенства следует, что $u^a(\beta) < u^a(\pi)$ (противоречие).

Достаточность. Предположим, что G — игра с полной памятью для всех игроков. Тогда достаточно показать, что $p(w|\beta) = p(w|\pi)$ для всех $w \in T$. Возьмем некоторую финальную позицию w .

Пусть $x_1 \in Z^{aj_1}, \dots, x_{r(a)} \in Z^{aj_{r(a)}}$ — позиции игрока a , расположенные в порядке следования вдоль пути $[x_0, w]$, а $k_1 \in Al^{aj_1}, \dots, k_{r(a)} \in Al^{aj_{r(a)}}$ — номера соответствующих альтернатив, принадлежащих пути $[x_0, w]$. Заметим, что $Z^{aj_1} \in \text{Rel } \mu^a$ для всех μ^a (см. упражнение 14.1). Поэтому

$$P(\pi^a, j_1) = \sum_{\mu^a: Z^{aj_1} \in \text{Rel } \mu^a} \pi_{\mu^a}^a = 1.$$

Без потери общности можно считать, что все информационные множества $Z^{aj_2}, \dots, Z^{aj_{r(a)}}$ существенны для стратегии π^a . Действительно, в противном случае $p(w|\beta) = p(w|\pi) = 0$.

В данных обозначениях

$$S^a(w) = \{\mu^a \mid Z^{aj_{r(a)}} \in \text{Rel } \mu^a, \mu^a(Z^{aj_{r(a)}}) = k_{r(a)}\}.$$

Из леммы 14.3 следует, что

$$P_{k_{r-1}}(\pi^a, j_{r-1}) = P(\pi^a, j_r), \quad r = 2, \dots, r(a).$$

Отсюда вытекает, что для соответствующей π^a стратегии поведения $\beta^a = (p_k^{aj}, k \in Al^{aj}, j \in J^a)$ по формулам (14.1)

$$\prod_{r=1}^{r(a)} p_{k_r}^{aj_r} = \prod_{r=1}^{r(a)} \frac{P_{k_r}(\pi^a, j_r)}{P(\pi^a, j_r)} = P_{k_{r(a)}}(\pi^a, j_{r(a)}) = \sum_{\mu^a \in S^a(w)} \pi_{\mu^a}^a. \quad (14.3)$$

Используя следствие леммы 14.2, получаем

$$p(w|\beta) = c(w) \prod_{a \in A} \prod_{r=1}^{r(a)} p_{k_r}^{aj_r} \stackrel{(14.3)}{=} \\ \stackrel{(14.3)}{=} c(w) \prod_{a \in A} \sum_{\mu^a \in S^a(w)} \pi_{\mu^a}^a = c(w) \sum_{\mu^a \in S^a(w), a \in A} \prod_{a \in A} \pi_{\mu^a}^a \stackrel{(14.2)}{=} p(w|\pi). \quad \blacksquare$$

Упражнение 14.2. Изменим правила игры из примера 14.1. Первым делает ход игрок 2. Он выбирает вариант расклада двух карт (старшей и младшей) Игроющему и себе. Играющий, не зная расклада, может оставить карты в прежнем положении, либо поменять их местами. Затем, Партнер, наблюдавший за действиями Играющего, также может выбрать одну из двух альтернатив: не трогать карты, либо поменять их местами. Игрок, имеющий в итоге старшую карту, получает от другого игрока доллар и дополнительную сумму, определяемую по следующему правилу. Если игрок 1 имеет старшую карту в результате одного (или двух) ее перемещений, то он получает от игрока 2 дополнительно два (или три) доллара. В аналогичной ситуации игрок 2 получает от игрока 1 дополнительно один доллар (или два доллара). Если после раздачи, карты не перемещались, то дополнительные выплаты не производятся. Установить, что описанная антагонистическая игра G является игрой с полной памятью для обоих игроков. Найти оптимальные стратегии поведения и значение игры.

§ 15. Кооперативные игры

Кооперативные игры относятся к *нестратегическим* играм, в которых игроки делят некоторое количество (денежного дохода, ресурса и т.п.), используя какой-либо принцип оптимальности.

Пример 15.1. Игра "джаз-оркестр". Владелец ночного клуба в Париже обещает \$1000 певцу, пианисту и ударнику (игроки 1, 2 и 3) за совместную игру в его клубе. Выступление дуэта певца и пианиста он расценивает в \$800, ударника и пианиста — в \$650 и одного пианиста — в \$300. Дуэт певец—ударник зарабатывает \$500 за вечер в одной станции метро, певец зарабатывает \$200 за вечер в открытом кафе. Ударник один ничего не может заработать. Какое распределение дохода в \$1000 следует считать разумным, учитывая описанные возможности игроков?

Пусть A — множество номеров игроков. Подмножества $K \subseteq A$ в кооперативной теории называются *коалициями*. Функция v , сопоставляющая каждой коалиции K ее доход $v(K)$, называется *характеристической*. Характеристическая функция v называется *супераддитивной*, если $v(K \cup T) \geq v(K) + v(T)$ для любых непересекающихся коалиций K и T . Условие супераддитивности означает, что при $K \cap T = \emptyset$ доход коалиции $K \cup T$ не меньше суммы доходов коалиций K и T . В дальнейшем вместо

$v(\{i, j, \dots, l\})$ будем писать $v(ij\dots l)$.

В примере 15.1 $A = \{1, 2, 3\}$, а характеристическая функция v принимает следующие значения: $v(1) = 200$, $v(2) = 300$, $v(3) = 0$, $v(12) = 800$, $v(23) = 650$, $v(13) = 500$, $v(123) = 1000$. Нетрудно видеть, что v супераддитивна. Если бы условие супераддитивности здесь нарушалось (скажем, при $v(1) = 400$), то собрать весь состав музыкантов за \$1000 было бы трудно, если только к совместной игре их не привлекают другие стимулы.

Определение. Кооперативной игрой (или игрой в форме характеристической функции) называется пара $\mathcal{K} = \langle A, v \rangle$.

Установим связь между играми в нормальной форме и кооперативными играми. Предположим, что в игре $\Gamma = \langle A, S^a, u^a(s), a \in A \rangle$ множества стратегий игроков конечны, а выигрыши — денежные. Игроки могут осуществлять *побочные платежи*, т.е. перераспределять между собой полученные выигрыши. Определим характеристическую функцию. Для коалиции A естественно положить $v(A) = \max_{s \in S} \sum_{a \in A} u^a(s)$. Для любой коалиции $K \neq A$ и ситуации s обозначим

$$s^K = (s^a, a \in K) \in S^K \stackrel{\text{def}}{=} \bigotimes_{a \in K} S^a.$$

Теперь ситуацию s можно записать в виде $s = (s^K, s^{A \setminus K})$. Пусть игра Γ имеет *постоянную сумму*, т.е.

$$\sum_{a \in A} u^a(s) \equiv \text{const.}$$

Для таких игр $v(K)$ можно определить как значение антагонистической игры коалиции K против ее дополнения $A \setminus K$

$$\Gamma^K = \langle S^K, S^{A \setminus K}, u^K(s^K, s^{A \setminus K}) \stackrel{\text{def}}{=} \sum_{a \in K} u^a(s^K, s^{A \setminus K}) \rangle.$$

Упражнение 15.1. Докажите, что для игры Γ с постоянной суммой характеристическая функция v супераддитивна и

$$v(K) + v(A \setminus K) = v(A) \quad \forall K \subset A. \quad (15.1)$$

Определение. Говорят, что кооперативная игра $\mathcal{K} = \langle A, v \rangle$ имеет постоянную сумму, если для нее выполнено условие (15.1).

Пример 15.2. Рассмотрим две пары матриц

$$A^1 = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 1 \end{pmatrix}, B^1 = \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 7 & -2 \end{pmatrix};$$

$$A^2 = \begin{pmatrix} 7 & -1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}, B^2 = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}.$$

Первый игрок выбирает номер строки i , второй — номер столбца j , а третий игрок выбирает номер пары $r \in \{1, 2\}$. Выигрыш первого игрока равен a_{ij}^r , второго — b_{ij}^r , а третьего — $c_{ij}^r = 10 - a_{ij}^r - b_{ij}^r$. Игра Γ имеет постоянную сумму $v(123) = 10$. Найдем $v(1)$. Первый игрок играет против коалиции $\{2, 3\}$ в игру с матрицей

$$\begin{array}{cccc} & (1, 1) & (1, 2) & (2, 1) & (2, 2) \\ \begin{array}{c} 1 \\ 2 \end{array} & \begin{pmatrix} 2 & 7 & 3 & -1 \\ 4 & 2 & 1 & 3 \end{pmatrix} \end{array}$$

Вычеркивая первый и второй столбцы и решая игру 2×2 , находим значение игры $v(1) = 5/3$. Из условия постоянства суммы $v(23) = 10 - v(1) = 25/3$.

Упражнение 15.2. В условиях примера 15.2 найдите значения характеристической функции $v(2), v(13), v(3)$ и $v(12)$.

Определение. Дележом называется вектор $y = (y^a, a \in A)$, удовлетворяющий условиям

$$\sum_{a \in A} y^a = v(A), \quad y^a \geq v(a) \quad \forall a \in A.$$

Дележ y задает распределение выигрыша $v(A)$, удовлетворяющее условию *индивидуальной разумности* $y^a \geq v(a) \quad \forall a \in A$. Пусть Y — множество всех дележей.

Из свойства супераддитивности характеристической функции v вытекает неравенство $\sum_{a \in A} v(a) \leq v(A)$.

Определение. Кооперативная игра $\mathcal{K} = \langle A, v \rangle$ называется *несущественной*, если $\sum_{a \in A} v(a) = v(A)$.

В несущественной игре дележ $y = (v(a), a \in A)$ — единственный. В дальнейшем будем рассматривать только существенные игры.

Определение. Две кооперативные игры $\mathcal{K} = \langle A, v \rangle$ и $\mathcal{K}' = \langle A, v' \rangle$ называются *эквивалентными*, если найдутся такие числа $c > 0$ и d^a , $a \in A$, что $v'(K) = cv(K) + \sum_{a \in K} d^a \quad \forall K \subseteq A$.

Переход от игры $\mathcal{K}$ к эквивалентной игре $\mathcal{K}'$ можно связать с изменением в c раз денежной единицы. Положительная величина d^a интерпретируется как дополнительная выплата игроку a . Если же величина d^a отрицательна, то $-d^a$ можно рассматривать как плату игрока a за участие в игре. Дележ y игры $\mathcal{K}$ переходит в дележ z игры $\mathcal{K}'$ с компонентами $z^a = cy^a + d^a \quad \forall a \in A$.

Определение. Говорят, что кооперативная игра $\mathcal{K}'$ имеет $(0 - 1)$ -редуцированную форму, если $v'(A) = 1$, $v'(a) = 0 \quad \forall a \in A$.

Для кооперативной игры $\mathcal{K}$ эквивалентная игра $\mathcal{K}'$ имеет $(0 - 1)$ -редуцированную форму, если

$$c = (v(A) - \sum_{a \in A} v(a))^{-1} \text{ и } d^a = -cv(a), \quad \forall a \in A.$$

Упражнение 15.3. Для игры "джаз-оркестр" найти эквивалентную игру в $(0 - 1)$ -редуцированной форме.

В кооперативной теории нет единого понятия "разумного" дележа. Более того, различные соображения "оптимальности" приводят к разным множествам "разумных" дележей. Рассмотрим два подхода, основанные на понятиях ядра и вектора Шепли.

Определение. Множество дележей

$$C = \{y \in Y \mid \sum_{a \in K} y^a \geq v(K) \quad \forall K \neq A\}$$

называется ядром (или c -ядром от английского "core").

Дележ y , принадлежащий ядру, удовлетворяет условию "групповой разумности": выигрыш $v(K)$ любой коалиции K не превосходит ее доли $\sum_{a \in K} y^a$ по дележу y .

Займемся выводом условия существования ядра, т.е. когда $C \neq \emptyset$. Положим

$$C' = \{y \in E^{|A|} \mid \sum_{a \in K} y^a \geq v(K) \quad \forall K \neq A\}.$$

Упражнение 15.4. Докажите, что ядро C существует тогда и только

тогда, когда

$$\min_{y \in C'} \sum_{a \in A} y^a \leq v(A). \quad (15.2)$$

В условии (15.2) $\min_{y \in C'} \sum_{a \in A} y^a$ запишем с помощью двойственной задачи линейного программирования

$$\min_{y \in C'} \sum_{a \in A} y^a = \max_{\lambda \in \Lambda} \sum_{K \neq A} \lambda^K v(K),$$

где

$$\Lambda = \{ \lambda = (\lambda^K, K \neq A) \mid \sum_{K: a \in K} \lambda^K = 1 \ \forall a \in A, \lambda^K \geq 0 \ \forall K \neq A \}.$$

Последний максимум можно брать только по множеству Λ^0 крайних точек (вершин) многогранника Λ (см. упражнение 5.5). Окончательно необходимое и достаточное условие существования ядра записывается в виде

$$\sum_{K \neq A} \lambda^K v(K) \leq v(A) \ \forall \lambda \in \Lambda^0. \quad (15.3)$$

Векторы из множества Λ называются *сбалансированными покрытиями* множества A , а векторы из множества Λ^0 — *приведенными* (или *минимальными*) *сбалансированными покрытиями*. Для коалиции $K \subset A$ определим вектор

$$\chi(K) \in E^{|A|} : \chi^a(K) = \begin{cases} 1, & a \in K, \\ 0, & a \notin K. \end{cases}$$

Эти векторы являются столбцами матрицы системы уравнений, задающей множество Λ .

Для того чтобы сбалансированное покрытие λ было приведенным, необходимо и достаточно, чтобы система векторов $\{\chi(K) \mid \lambda^K > 0\}$ была линейно независимой. Этот факт доказывается аналогично упражнению 5.5.

Определение. Семейство $\mathcal{B}$ коалиций называется *сбалансированным*, если найдется такое приведенное сбалансированное покрытие λ , что $\mathcal{B} = \{K \mid \lambda^K > 0\}$.

Примером сбалансированного семейства коалиций является разбиение $\mathcal{B}$ множества A на попарно непересекающиеся подмножества. Для соответствующего приведенного сбалансированного покрытия λ компоненты $\lambda^K = 1$, $K \in \mathcal{B}$. Отметим, что для такого покрытия неравенство из (15.3) выполняется "автоматически", в силу супераддитивности характеристической функции. Поэтому приведенные сбалансированные покрытия, отвечающие разбиениям множества A , в дальнейшем не рассматриваются. Справедлив и более общий результат.

Упражнение 15.5. Пусть для приведенного сбалансированного покрытия λ найдутся такие коалиции T и L , что $T \cap L = \emptyset$, $\lambda^T \geq \lambda^L > 0$. Покажите, что покрытие μ с компонентами

$$\mu^K = \begin{cases} \lambda^T - \lambda^L, & K = T, \\ 0, & K = L, \\ \lambda^L, & K = T \cup L, \\ \lambda^K, & K \neq T, L, T \cup L, \end{cases}$$

является приведенным сбалансированным и

$$\sum_{K \neq A} \lambda^K v(K) \leq \sum_{K \neq A} \mu^K v(K). \quad (15.4)$$

Из (15.4) вытекает, что неравенства (15.3) достаточно проверять только для *существенных* приведенных сбалансированных покрытий λ , для которых не существуют непересекающихся коалиций T и L с положительными λ^T и λ^L .

Найдем необходимое и достаточное условие существования ядра в кооперативной игре трех лиц. Компоненты вектора $\lambda \in \Lambda^0$ упорядочим следующим образом: $\lambda = (\lambda^1, \lambda^2, \lambda^3, \lambda^{23}, \lambda^{13}, \lambda^{12})$. Перечислим все приведенные сбалансированные покрытия множества A :

$$\lambda(1) = (1, 1, 1, 0, 0, 0), \quad \lambda(2) = (1, 0, 0, 1, 0, 0), \quad \lambda(3) = (0, 1, 0, 0, 1, 0),$$

$$\lambda(4) = (0, 0, 1, 0, 0, 1), \quad \lambda(5) = (0, 0, 0, 1/2, 1/2, 1/2).$$

С учетом результата упражнения 15.5 существенным покрытием является только $\lambda(5)$ и условие существования ядра записывается в виде $v(23) + v(13) + v(12) \leq 2v(123)$.

Упражнение 15.6. Для кооперативной игры "джаз-оркестр" проверьте, что ядро C существует. Изобразите проекцию ядра на плоскость (y^1, y^2) и найдите его вершины.

В таблице 15.1 перечислены все существенные приведенные сбалансированные покрытия множества A игры четырех лиц.

Табл. 15.1

$\mathcal{B}$	$\lambda^K, K \in \mathcal{B}$
$A \setminus \{a\}, a = 1, 2, 3, 4$	$1/3, 1/3, 1/3, 1/3$
$\{1, 2, 3\}, \{1, 2, 4\}, \{3, 4\}$	$1/2, 1/2, 1/2$
$\{1, 2, 3\}, \{1, 4\}, \{2, 4\}, \{3, 4\}$	$2/3, 1/3, 1/3, 1/3$
$\{1, 2, 3\}, \{1, 4\}, \{2, 4\}, \{3\}$	$1/2, 1/2, 1/2, 1/2$

Остальные существенные покрытия отличаются от указанных перестановками номеров игроков.

Рассмотрим частный случай кооперативной игры, когда условие существования ядра может быть записано в простой форме.

Определение. Кооперативная игра $\mathcal{K} = \langle A, v \rangle$ называется *симметричной*, если характеристическая функция v зависит только от числа игроков в коалиции: $v(K) = v_{|K|} \ \forall K \subset A$.

Упражнение 15.7. Покажите, что для симметричной кооперативной игры $\mathcal{K}$ ядро C тогда и только тогда существует, когда выполнены неравенства

$$v_{|K|} \leq \frac{|K|}{|A|} v_{|A|} \ \forall K \subset A. \quad (15.5)$$

Недостатком ядра является тот факт, что оно может не существовать. Докажем, что $C = \emptyset$, если кооперативная игра $\mathcal{K} = \langle A, v \rangle$ имеет постоянную сумму. Действительно, если $y \in C$, то

$$\sum_{b \neq a} y^b \geq v(A \setminus \{a\}) = v(A) - v(a), \quad y^a \geq v(a).$$

Последние два неравенства могут выполняться только как равенства. Отсюда $y^a = v(a) \ \forall a \in A$ и $\sum_{a \in A} y^a < v(A)$ (противоречие).

Указанным недостатком не обладает вектор Шепли. Определим его, используя вероятностную интерпретацию. Положим $v(\emptyset) = 0$.

Определение. Для игрока $a \in K$ величина $v(K) - v(K \setminus \{a\})$ называется *вкладом* игрока в коалицию K .

Пусть коалиция A образуется в результате следующего случайного процесса. Сначала с вероятностью $1/|A|$ выбирается игрок a_1 , затем из оставшихся $|A| - 1$ игроков с вероятностью $1/(|A| - 1)$ выбирается игрок a_2 и присоединяется к игроку a_1 и т.д. В результате с вероятностью $1/|A|!$ будет выбрана перестановка игроков $a_1, \dots, a_{|A|}$. Можно подсчитать вклад игрока a_l в коалицию $\{a_1, \dots, a_l\}$. Таким образом, для каждого игрока a его вклад (в какую-то коалицию K) будет случайной величиной, принимающей значение $v(K) - v(K \setminus \{a\})$ (где $a \in K$) с вероятностью $(|K| - 1)! (|A| - |K|)! / |A|!$.

Определим теперь специальный дележ φ – вектор Шепли. Его компонента φ^a равна математическому ожиданию вклада игрока a , т.е.

$$\varphi^a = \sum_{K: a \in K} \frac{(|K| - 1)! (|A| - |K|)!}{|A|!} (v(K) - v(K \setminus \{a\})).$$

Проверим, что

$$\sum_{K: a \in K} \frac{(|K| - 1)! (|A| - |K|)!}{|A|!} = 1. \quad (15.6)$$

Действительно,

$$\sum_{K: a \in K} \frac{(|K| - 1)! (|A| - |K|)!}{|A|!} = \sum_{l=1}^{|A|} \sum_{K: a \in K, |K|=l} \frac{(l - 1)! (|A| - l)!}{|A|!}.$$

Число коалиций, содержащих l игроков и среди них игрока a , равно

$$C_{|A|-1}^{l-1} = \frac{(|A| - 1)!}{(l - 1)! (|A| - l)!}.$$

Поэтому в последней двойной сумме при любом l внутренняя сумма равна $1/|A|$. Отсюда и следует (15.6).

Упражнение 15.8. Покажите, что вектор Шепли $\varphi = (\varphi^a, a \in A)$ является дележом кооперативной игры.

Упражнение 15.9. Выпишите явные формулы для подсчета вектора Шепли в игре трех лиц. Найти вектор Шепли для кооперативной игры "джаз-оркестр" и показать его принадлежность ядру. Проверить, что если $v(123)$ уменьшить на \$3, то вектор Шепли ядру не принадлежит.

Упражнение 15.10. Показать, что для симметричной кооперативной игры вектор Шепли $\varphi = (v_{|A|}/|A|, \dots, v_{|A|}/|A|)$.

Комментарий и библиография к главе III

§ 12. Определение ситуации равновесия для игры многих лиц принадлежит Дж. Нэшу [76]. Теорема 12.1 доказана С. Какутани [47] и использована для доказательства теоремы 2.3 о вогнуто-выпуклой функции. Теорема существования ситуации равновесия в играх с конечными множествами стратегий доказана Дж. Нэшем [76]. Там же приведены свойства ситуаций равновесия в смешанных стратегиях. Пример 12.1 принадлежит Н.Н. Воробьеву [34]. Определение игры, разрешимой по доминированию, введено Э. Муленом [71].

§ 13. Основные понятия теории позиционных игр определены Дж. фон Нейманом и О. Моргенштерном в [72]. Полная формализация этих игр проведена Г.У. Куном [58]. Определение совершенного подыгрового равновесия принадлежит Р. Селтену [98]. Теорема 13.1 о существовании ситуации равновесия в позиционной игре с полной информацией доказана Г.У. Куном [58]. Концепция возмущенной игры, в которой игроки могут ошибаться при выборе своих стратегий, введена Р. Селтенем [99].

§ 14. Пример 14.1 и теорема 14.1 об эквивалентности смешанных стратегий соответствующим стратегиям поведения в играх с полной памятью принадлежит Г.У. Куну [58]. Другие результаты по теории позиционных игр см. в сборнике [82]. С моделями многошаговых неантагонистических игр можно ознакомиться в [22, 23, 71, 91].

§ 15. Основы кооперативной теории заложены Дж. фон Нейманом и О. Моргенштерном в [72]. Пример кооперативной игры "джаз-оркестр" принадлежит Г.П. Янгу (см. [71]). Понятие ядра определено Д. Джиллисом в [44]. Необходимое и достаточное условие существования ядра с использованием новых комбинаторных объектов — приведенных сбалансированных покрытий — получено О.Н. Бондаревой в 1962 году в [13], где, в частности, описаны приведенные сбалансированные покрытия для игр трех и четырех лиц. О.Р. Меньшикова в кандидатской диссертации (факультет ВМиК МГУ, 1978 год) перечислила все приведенные сбалансированные покрытия для игр пяти и шести лиц. Результат упражнения 15.5 взят из [109]. Теорию двойственности линейного программирования см. в [5]. Р. Ауман [7] определил понятие ядра для игры в нормальной форме. Ряд результатов в этом направлении получен А.А. Васиным (см.

[22], где имеется также обзор работ по теории ядра). В.В. Морозов и М.Х. Аъзамхужаев ввели *дискретные* кооперативные игры, в которых значения характеристической функции и компоненты дележей — целые числа. Для таких игр поиск дележа из ядра сводится к задаче целочисленного линейного программирования. В [68] предложен эффективный алгоритм ее решения для игр шести лиц.

Вектор Шепли был определен в [102], где имеется аксиоматическое его обоснование (см. также [31]). С другими концепциями оптимальности в кооперативной теории (решением фон Неймана-Моргенштерна, n -ядром Шмайdlера и др.) можно ознакомиться в [55, 31, 78]. Фундаментальный обзор результатов по теории игр см. в [93].

ГЛАВА IV. ВВЕДЕНИЕ В МАТЕМАТИЧЕСКУЮ ЭКОНОМИКУ

В этой главе рассматриваются простейшие математические модели производства, распределения и потребления.

§ 16. Модели нерегулируемых рынков

Важную роль в экономической теории играет понятие рынка. Рынок — это механизм обмена товарами, включающий два типа агентов: производители (продавцы) и потребители (покупатели). Каждый агент самостоятельно принимает решение об участии в обмене, исходя из своих интересов и предлагаемых условий. Обычно каждый продавец назначает условия обмена в виде цены на свой товар, а покупатели выбирают, сколько и какого товара купить. Но существуют и другие варианты рынков.

В этой главе рассматриваются три основных модели рынка одного товара:

1) рынок в условиях совершенной конкуренции, или конкурентный рынок, на котором много мелких агентов-производителей и потребителей;

2) монополизированный рынок, на котором один производитель-монополист взаимодействует с большим числом мелких потребителей;

3) олигополия, то есть рынок, на котором несколько фирм конкурируют, взаимодействуя с множеством мелких потребителей.

У читателя с математическим складом ума здесь возникают вопросы: что означает "мелкий" агент, "большое число мелких потребителей" и т.п.? Следует отметить, что достаточно полных и точных ответов на подобные вопросы не получено до настоящего времени. Некоторые подходы и оценки изложены в параграфе, посвященном олигополии. Указанные характеристики служат некоторым обоснованием сформулированных далее предположений о поведении агентов.

Конкурентный рынок одного товара

Рассмотрим рынок однородного (т.е. не различающегося по качеству) товара, такого как нефть или мука. Предположение, лежащее в основе модели конкурентного рынка, состоит в следующем: на рынке складывается единая цена p на товар и ни один производитель или потребитель

не может повлиять на нее индивидуальными действиями, т.е. каждый агент приспосабливается к рыночной цене p .

Начнем с описания поведения производителей товара. Предполагается, что каждый из них стремится максимизировать прибыль от производства товара. Обозначим через A множество предприятий, поставляющих товар на рынок. В простейшем случае конкретное предприятие $a \in A$ характеризуется максимальным объемом выпуска, или производственной мощностью, V^a и *удельной себестоимостью* продукта (в расчете на единицу) c^a . При этом стратегией предприятия является объем выпуска V . Формально поведение продавца a характеризуется *функцией предложения* $S^a(p)$, которая указывает оптимальный объем производства в зависимости от цены. Рассмотрим, как определяется $S^a(p)$ в данном случае:

$$S^a(p) = \operatorname{Arg} \max_{0 \leq V \leq V^a} [V(p - c^a)] = \begin{cases} 0, & \text{если } p < c^a, \\ [0, V^a], & \text{если } p = c^a, \\ V^a, & \text{если } p > c^a, \end{cases}$$

где $V(p - c^a)$ — *функция прибыли*.

Отметим, что функция предложения является точечно-множественным отображением, т.е. одному значению аргумента может соответствовать целое множество значений функции. Общая характеристика рынка со стороны производителей — это суммарная функция предложения $S(p) = \sum_{a \in A} S^a(p)$. Эта функция указывает общее количество товара, поставляемое на рынок в зависимости от цены. Упорядочим предприятия по возрастанию удельных себестоимостей, т.е. пусть $c^1 \leq c^2 \leq \dots$. Тогда график функции предложения для случая трех производителей выглядит следующим образом:




Рис. 16.1

В качестве примера более общей модели производства рассмотрим

предприятие, на котором имеются три вида производственных мощностей (станков) для выпуска товара. Каждый вид характеризуется величинами удельной себестоимости c^i и максимального объема выпуска V^i , где $i = 1, 2, 3$ и $c^1 < c^2 < c^3$. При выполнении заказа на выпуск V единиц товара предприятие стремится минимизировать издержки производства. Выясним, как зависит полная себестоимость $C(V)$ от объема выпуска при оптимальной загрузке мощностей. Очевидно, что предприятие в первую очередь использует мощности с минимальной удельной себестоимостью выпуска. Если их не хватит, то будут задействованы мощности второго, а затем третьего типа. Таким образом, график $C(V)$ имеет следующий вид:




Рис. 16.2

В общем случае предприятие a характеризуется функцией $C^a(V)$ себестоимости выпуска в объеме V на данном предприятии. Далее предполагается, что эта функция задает общие издержки. Прежде, чем сформулировать свойства функции издержек, напомним определение выпуклой (вогнутой) функции (см. § 2).

Определение. Функция $C(V)$ называется *выпуклой* (*вогнутой*), если для любых двух точек V_1 и V_2 и любого числа $0 < t < 1$ справедливо неравенство $C(tV_1 + (1-t)V_2) \leq (\geq) tC(V_1) + (1-t)C(V_2)$.

Отметим некоторые свойства выпуклых функций, известные из курса математического анализа.

Выпуклая функция $C(V)$, определенная на полуоси $V \geq 0$, непрерывна в любой точке $V > 0$.

Выпуклая и неубывающая функция $C(V)$ непрерывна и в точке $V = 0$.

Для выпуклой функции $C(V)$ в любой точке V существуют левосторонняя $\dot{C}_-(V)$ и правосторонняя $\dot{C}_+(V)$ производные. Причем, если

$V < V'$, то $\dot{C}_+(V) \leq \dot{C}_-(V')$.

Для дифференцируемой функции $C(V)$ необходимым и достаточным условием выпуклости является неубывание по V производной $\dot{C}(V)$.

Для дважды дифференцируемой функции аналогичным условием является неотрицательность второй производной $\ddot{C}(V)$.

Будем предполагать, что функция издержек $C(V)$ обладает следующими свойствами:

- C1 монотонно возрастает по V ;
- C2 $C(0) = 0$;
- C3 является выпуклой функцией;
- C4 $\dot{C}_-(V) \rightarrow \infty$ при $V \rightarrow \infty$.

Обсудим свойства C1-C4 с практической точки зрения.

Первое свойство очевидно: чем больше объем выпуска, тем больше общие издержки.

Второе условие кажется ограничительным, так как у предприятия могут быть постоянные издержки. Однако эти издержки не играют роли при расчете функции предложения (см. ниже), а инвестиционные процессы мы не рассматриваем.

Третье и четвертое свойства означают, что удельные издержки $\dot{C}_+(V)$ растут и стремятся к бесконечности с увеличением объема выпуска. В то же время из производственной практики известно, что при переходе от опытного производства к массовому выпуску возникает эффект масштаба, т.е. удельные издержки убывают с ростом объема выпуска. Однако, данный эффект возникает тогда, когда предприятие меняет структуру основных фондов. Рассматриваемая здесь модель отражает работу предприятия в стационарных условиях.

Дадим формальное обоснование свойства C3. Отметим, что рассматриваемые величины (максимальный объем выпуска, реальный объем, издержки) относятся к некоторому фиксированному периоду времени. Рассмотрим две технологии, характеризующиеся объемами выпуска V_1 и V_2 . Будем чередовать эти технологии (пусть доля времени t используется одна технология, а доля времени $(1 - t)$ — другая). Таким образом, мы выпустим объем $tV_1 + (1 - t)V_2$ с издержками $tC(V_1) + (1 - t)C(V_2)$. Следовательно, $C(tV_1 + (1 - t)V_2) \leq tC(V_1) + (1 - t)C(V_2)$.

Упражнение 16.1. Какие реальные факторы не учтены в этом рассуждении?

Для функции себестоимости $C^a(V)$, удовлетворяющей условиям C1–C4, функция предложения предприятия определяется как

$$S^a(p) = \text{Arg max}_{V \geq 0} (pV - C^a(V)),$$

где $pV - C^a(V)$ – функция прибыли. Заметим, что здесь нет ограничения сверху на объем V выпускаемого товара.

Утверждение 16.1. Если функция $C^a(V)$ удовлетворяет свойствам C1 – C4, то функция $S^a(p)$ удовлетворяет следующим свойствам:

S1 $S^a(0) = 0$;

S2 для каждого p множество $S^a(p)$ выпукло и ограничено, а график отображения $S^a(p)$ $Gr(S^a(p)) = \{(p, V) \mid p \geq 0, V \in S^a(p)\}$ замкнут;

S3 $S^a(p)$ не убывает по p , т.е. для любых $p < p'$ и для любых $V \in S^a(p)$, $V' \in S^a(p')$ выполнено неравенство $V \leq V'$.

Доказательство. S1. Очевидно, поскольку при нулевой цене производство товара не выгодно.

S2. Функция pV – линейная по V , а $C^a(V)$ – выпуклая, следовательно, функция $pV - C^a(V)$ является вогнутой. Множество точек максимума у вогнутой функции выпукло. $S^a(p)$ есть множество точек максимума непрерывной функции $pV - C^a(V)$. Следовательно, множество $S^a(p)$ замкнуто. По свойству C4 функция издержек $C(V)$ растет быстрее любой линейной функции. Поэтому при любом $p > 0$ найдется такая величина $V(p)$, что $pV - C^a(V) < 0 \quad \forall V \geq V(p)$. Отсюда вытекает ограниченность множества $S^a(p)$.

S3. Возьмем $p < p'$ и зафиксируем произвольные $V \in S^a(p)$, $V' \in S^a(p')$. Если $V' = 0$, то необходимо $\dot{C}_+(0) \geq p' > p$. Следовательно, $S^a(p) = \{0\}$ и утверждение доказано. Пусть $V > 0$, $V' > 0$. Тогда из условия максимума функции прибыли вытекают неравенства

$$\dot{C}_-(V) \leq p \leq \dot{C}_+(V), \quad \dot{C}_-(V') \leq p' \leq \dot{C}_+(V').$$

Отсюда с учетом $p < p'$ находим $\dot{C}_-(V) < \dot{C}_+(V')$. Из выпуклости функции $C^a(V)$ следует неравенство $V \leq V'$. ■

Графический метод построения функции предложения

1) Пусть $C^a(V)$ – гладкая функция. Если максимум прибыли достигается во внутренней точке $V^* > 0$, то $p = \dot{C}^a(V^*) \Rightarrow V^* = (\dot{C}^a)^{-1}(p) = S^a(p)$. Если максимум достигается в нуле, то $p \leq \dot{C}^a(0)$. При $p = \dot{C}^a(0)$ $S^a(p) = [0, S^{a+}]$, где $S^{a+} = \sup\{V \mid \dot{C}^a(V) = \dot{C}^a(0)\}$.

Строим график обратной функции $(\dot{C}^a)^{-1}(p)$. Для этого отобразим график функции $\dot{C}^a(V)$ симметрично относительно биссектрисы. На оси p соединим ноль с точкой $\dot{C}^a(0)$ и получим график функции $S^a(p)$.

2) С негладкой функцией поступаем аналогично: скачкам функции $\dot{C}^a(V)$ будут соответствовать горизонтальные отрезки на графике функции $S^a(p)$.

Пример 16.1. Функция издержек задана следующим образом:




Рис. 16.3

Требуется построить функцию предложения $S^a(p)$.

1) Строим функцию $\dot{C}^a(V)$:




Рис. 16.4

2) Строим функцию $S^a(p)$ как обратную к $\dot{C}^a(V)$:




Рис. 16.5

Упражнение 16.2. Найдите функцию предложения $S^a(p)$ по заданной функции издержек $C^a(V) = \max[V, V^2]$.

Функция спроса

Мы описали поведение производителей. Обратимся теперь к другой стороне рынка и рассмотрим поведение второй группы агентов, действующих на рынке, — потребителей.

Пусть B — множество потребителей товара; $b \in B$ — конкретный потребитель, который характеризуется *функцией спроса* $D^b(p)$, указывающей, какой объем товара готов купить потребитель b по цене p . Общей характеристикой поведения всего множества присутствующих на рынке потребителей является *суммарная функция спроса*, которая определяется следующим образом: $D(p) = \sum_{b \in B} D^b(p)$. Для начала рассмотрим несколько примеров функции спроса отдельного потребителя.

Пример 16.2. Пусть K^b — денежный капитал потребителя b . Потребитель тратит весь капитал на покупку товара, тогда $D^b(p) = K^b/p$.

Пример 16.3. Как и в предыдущем примере, потребитель b характеризуется размером имеющегося у него денежного капитала K^b . Отличие состоит в том, что потребитель может потратить свой капитал не только на этом рынке товара, но у него есть возможность покупать тот же товар в другом месте по фиксированной цене r^b , которая называется *резервной ценой* для данного потребителя. Смысл этой величины состоит в том, что потребителю невыгодно покупать товар на рассматриваемом рынке, если цена превышает r^b , т.е. при $p > r^b$ покупка не производится.

Функция спроса для такой модели имеет вид

$$D^b(p) = \begin{cases} K^b/p, & p < r^b, \\ [0, K^b/p], & p = r^b, \\ 0, & p > r^b. \end{cases}$$

Дадим альтернативную интерпретацию понятия резервной цены: у данного товара существует заменитель, цена на который фиксирована и равна r^b . Поэтому в случае, когда цена продукта превышает r^b , потребитель b покупает заменитель.

До сих пор мы предполагали, что весь денежный капитал потребителя расходуется на приобретение товара. Однако на практике количество денег, которое расходуется на данный товар, может меняться в зависимости от цены. Объем потребления предметов первой необходимости (основных продуктов питания, необходимой одежды и т.п.) обычно слабо зависит от цены. Например, даже при значительном росте цены на хлеб, люди будут потреблять то же самое количество хлеба. С другой стороны, есть товары типа предметов роскоши (драгоценности, предметы искусства и т.д.), спрос на которые сильно зависит от колебаний цены. Это происходит отчасти потому, что при росте цен на одни предметы роскоши люди, как правило, предпочитают покупать другие предметы, которые подорожали в меньшей степени. Свойство функции спроса изменяться в зависимости от цены называется *эластичностью спроса*. Формальное определение будет дано позже. С содержательной точки зрения эластичность характеризует степень зависимости объема спроса от цены на товар.

Пример 16.4. Рассмотрим пример неэластичной функции спроса:

$$D^b(p) = \begin{cases} \bar{V}^b, & p < r^b, \\ [0, \bar{V}^b], & p = r^b, \\ 0, & p > r^b. \end{cases}$$

Во всех приведенных выше примерах функция спроса $D^b(p)$ — это точно-множественное отображение, удовлетворяющее следующим свойствам:

$D1$ выпуклозначность (значением функции спроса $D^b(p)$ для любого p является либо точка, либо отрезок);

$D2$ замкнутость (график отображения $D^b(p)$ $Gr(D^b(p)) = \{(p, V) \mid 0 \leq p < \infty, V \in D^b(p)\}$ является замкнутым);

$D3$ монотонное невозрастание (при любых $p < p'$ и любых $V \in D^b(p)$, $V' \in D^b(p')$ выполнено неравенство $V \geq V'$);

$D4$ $D^b(p) \rightarrow 0$ при $p \rightarrow \infty$ (при неограниченном возрастании цены спрос стремится к нулю).

Обсудим подробнее свойство монотонного невозрастания (свойство $D3$). Это свойство говорит о том, что при росте цены на товар спрос на него не увеличивается (а иногда и убывает, если учесть дополнительно свойство $D4$). Возникает вопрос: для всех ли товаров выполнено это свойство? В экономике известно несколько экзотических примеров товаров, спрос на которые не удовлетворяет, по крайней мере в определенные промежутки времени, свойству монотонного невозрастания.

Пример 16.5. Известно, что в Ирландии в голодные годы, когда цена на картошку сильно повышалась, объем ее потребления тоже возрастал. С чем это было связано? В обычные годы в рацион основной массы населения входили картошка и мясо. Когда цена на картошку значительно повышалась, денег на мясо уже не хватало, и люди переходили на питание одной картошкой. Поэтому картошки требовалось больше, чем обычно.

Пример 16.6. Традиционная японская водка — саке. Есть несколько сортов саке, причем как хорошего качества, так и плохого. Известен следующий факт: когда цена на низкокачественный саке растет, то объем его потребления в этот момент тоже увеличивается. Дело в том, что определенная группа лиц, страдающая алкогольной зависимостью, нуждается в определенной дозе чистого алкоголя. Они, конечно, предпочли бы пить хороший саке, но когда цена на саке сильно растет, им для получения своей суточной нормы алкоголя приходится отказываться от хорошего саке в пользу плохого. Однако приведенные примеры достаточно редки и нетипичны, а для большинства товаров свойство монотонного невозрастания функции спроса выполняется.

Принцип конкурентного равновесия

Итак, мы описали поведение двух групп агентов на рынке (производителей товара и потребителей) в зависимости от цены на товар. Для получения полного представления о модели конкурентного рынка одного товара осталось выяснить, как определяется цена p на рынке.

На конкурентном рынке цена товара определяется из принципа конкурентного равновесия.

Принцип конкурентного равновесия Вальраса. В условиях совершенной конкуренции на рынке устанавливается цена $\tilde{p}$, которая балансирует спрос и предложение на товар и называется *ценой конкурентного равновесия* (или вальрасовской ценой). Формально эта цена определяется из условия $D(\tilde{p}) \cap S(\tilde{p}) \neq \emptyset$, где $S(p)$ — функция суммарного предложения, а $D(p)$ — функция суммарного спроса.

Таким образом, цена конкурентного равновесия обладает тем свойством, что существует объем товара, который может быть предложен по этой цене и может быть потреблен по этой цене. Если функции спроса и предложения — однозначные функции, то принцип конкурентного равновесия можно сформулировать проще: по равновесной цене спрос равен предложению.

Полная формулировка принципа начинается словами: "в условиях совершенной конкуренции...". Что понимается под *условиями совершенной конкуренции*? Содержательно Вальрас охарактеризовал их как наличие большого числа близких по своим характеристикам производителей и потребителей, каждый из которых не может влиять на рыночную цену (т.е. все они малы по сравнению с общими объемами рынка). Кроме того, все производители и потребители располагают полной информацией о рынке и могут свободно выбирать себе партнеров для заключения сделки. Ясно, что такое описание не является конструктивным. Возьмем конкретный рынок, на котором действуют 20 производителей продукции и 500 потребителей, характеризующихся определенными параметрами. Используя определение Вальраса, нельзя сказать, находится ли этот рынок в состоянии совершенной конкуренции, так как это определение чисто качественное и не дает количественных критериев.

Свойства равновесной цены

Будем использовать запись $D(p) - S(p) > 0$, если $V > V'$ при всех $V \in D(p)$, $V' \in S(p)$. Аналогично, будем писать $D(p) - S(p) < 0$, если $V < V'$ при всех $V \in D(p)$, $V' \in S(p)$.

Утверждение 16.2. Пусть функция предложения $S^a(p)$ каждого производителя $a \in A$ удовлетворяет условиям S1-S3, а функция спроса $D^b(p)$ каждого потребителя $b \in B$ — условиям D1-D4. Тогда равновесная цена всегда существует.

Доказательство. Заметим, что функция предложения $S(p) = \sum_{a \in A} S^a(p)$ удовлетворяет условиям $S1-S3$, а функция спроса $D(p) = \sum_{b \in B} D^b(p)$ — условиям $D1-D4$.

Поскольку $S(0) = 0$, то из монотонности функции $S(p)$ и замкнутости ее графика вытекает, что $S(p) = 0$ в некоторой малой окрестности точки 0. С другой стороны, функцию спроса $D(p)$ в этой окрестности можно считать положительной. Поэтому разность $D(p) - S(p) > 0$ при малых p .

Для достаточно больших p функция $S(p)$ положительна (достаточно взять $p > \dot{C}^a(0)$ для некоторого производителя $a \in A$) и не убывает, а $D(p) \rightarrow 0$ при $p \rightarrow \infty$. Значит, $D(p) - S(p) < 0$ при больших p .

Воспользуемся аналогом теоремы о промежуточном значении непрерывной функции, известной из математического анализа: если непрерывная функция принимает противоположные по знаку значения на концах некоторого отрезка, то внутри этого отрезка существует точка, в которой функция обращается в ноль.

Как уже говорилось, свойство замкнутости аналогично свойству непрерывности. Так как $D(p)$ и $S(p)$ — замкнутые функции, следовательно, их разность $D(p) - S(p)$ тоже замкнутая функция. Поэтому существует точка $\tilde{p}$, в которой эта разность принимает нулевое значение, в том смысле, что $0 \in D(\tilde{p}) - S(\tilde{p})$. ■

Утверждение 16.3. Пусть $\tilde{p}^1, \tilde{p}^2$ — две цены конкурентного равновесия. Тогда любая цена $\tilde{p} \in [\tilde{p}^1, \tilde{p}^2]$ тоже является равновесной, т.е. $S(\tilde{p}) \cap D(\tilde{p}) \neq \emptyset$.

Доказательство. Функция $D(p) - S(p)$ монотонно не возрастает. Так как эта функция принимает значение 0 в точках $\tilde{p}^1$ и $\tilde{p}^2$, то и во всех промежуточных точках она принимает то же значение. Следовательно, $D(\tilde{p}) \cap S(\tilde{p}) \neq \emptyset$ для любого $\tilde{p} \in [\tilde{p}^1, \tilde{p}^2]$. ■

Покажем, что на самом деле возможны ситуации, когда равновесная цена определяется не единственным образом. В таких случаях из утверждения 16.3 будет следовать, что существует целый отрезок равновесных цен.

Пример 16.7. Пусть на рынке есть всего три потребителя с неэластичными функциями спроса. Резервные цены для этих потребителей равны r^1, r^2 и r^3 соответственно. В этом случае суммарная функция спро-

са будет иметь ступенчатый вид. Пусть, кроме того, на рынке есть два предприятия-производителя с фиксированными удельными себестоимостями c^1, c^2 и максимальными объемами производства V^1, V^2 соответственно. Следовательно, суммарное предложение также является ступенчатой функцией. Тогда возможна следующая ситуация, изображенная на рис. 16.6, где получился целый отрезок равновесных цен $\tilde{p}$.




Рис. 16.6




Рис. 16.7

Заметим, что возможна и другая ситуация, когда равновесная цена $\tilde{p}$ единственна, но не единственным образом определяется равновесный объем $\tilde{V}$ (см. рис. 16.7).

Из приведенных выше утверждений можно сделать вывод, что множество равновесных цен — это либо точка (единственная цена $\tilde{p}$), либо существует отрезок равновесных цен $[\tilde{p}^1, \tilde{p}^2]$.

Заметим, что случаи, проиллюстрированные на рисунках 16.6-7, нетипичны и носят вырожденный характер, так как при малом возмущении параметров модели графики смещаются и пересечение по целому отрезку превращается в пересечение в точке. При этом возможна одна из изображенных на следующем рис. 16.8 ситуаций:




Рис. 16.8

В типичных случаях (или, иными словами, в условиях общего поло-

жения) равновесная цена и равновесный объем определяются единственным образом, что и предполагается в дальнейшем.

§ 17. Монополизированный рынок

Рассмотрим ситуацию, когда на рынке присутствует лишь одна фирма-производитель. Как и раньше, производитель характеризуется себестоимостью товара, т.е. функцией издержек $C(V)$, которая показывает, сколько денег необходимо затратить, чтобы произвести товар в объеме V .

Потребители на этом рынке полагаются мелкими. Их поведение характеризуется суммарной функцией спроса $D(p)$, показывающей, какой объем товара будет куплен при заданной цене p . Фирма-монополист устанавливает цену на товар p и объем его производства V . Таким образом, *стратегией монополии* является пара (p, V) .

Поиск оптимальной стратегии монополии

Обсудим задачу поиска оптимальной стратегии монополии. Она состоит в выборе цены на товар p^* и объема производства V^* , максимизирующих прибыль монополии. Задача решается при следующих ограничениях: цена неотрицательна, а объем выпуска неотрицателен и не превосходит спроса (производителю нет смысла производить больше товара, чем потребители готовы купить). Формально эта задача сводится к нахождению оптимальной стратегии

$$(p^*, V^*) \in \operatorname{Arg} \max_{(p, V): p \geq 0, 0 \leq V \leq D(p)} (pV - C(V)). \quad (17.1)$$

Будем записывать функцию спроса в виде $D(p) = [D^-(p), D^+(p)]$, где $D^-(p), D^+(p)$ — нижняя и верхняя границы для $D(p)$. Аналогичная запись будет использоваться и для функции предложения: $S(p) = [S^-(p), S^+(p)]$.

Решение оптимизационной задачи (17.1) проведем в два этапа.

Этап 1. *Оптимизация по объему при фиксированной цене*

Фиксируем любую цену p и определим оптимальное значение $V^*(p)$.

Заметим, что для монополизированного рынка можно так же, как и для конкурентного рынка, ввести формально функцию предложения $S(p) = \operatorname{Arg} \max_{V \geq 0} (pV - C(V))$ и найти равновесную цену $\tilde{p}$, такую, что $S(\tilde{p}) \cap D(\tilde{p}) \neq \emptyset$.

Утверждение 17.1. Если $\tilde{p}$ – равновесная цена, то

$$V^*(p) \in \begin{cases} S(p), & p < \tilde{p}, \\ S(p) \cap [0, D^+(p)], & p = \tilde{p}, \\ D^+(p), & p > \tilde{p}. \end{cases}$$

Доказательство. Пусть $p < \tilde{p}$. Заметим, что если отбросить в задаче (17.1) ограничение на объем, то ее решение при фиксированном p совпадает со значением функции предложения $S(p)$ в точке p . Следовательно, так как $S(p)$ является решением задачи оптимизации на более широком множестве, то значение оптимизируемого функционала в $S(p)$ не меньше, чем в точке $V^*(p)$. Однако при $p < \tilde{p}$ функция предложения $S(p)$ удовлетворяет ограничению на объем, т.е. $S^+(p) < D^-(p)$. Это условие выполняется, так как функция $S(p)$ монотонно не убывает, а $D(p)$ монотонно не возрастает и, следовательно, для любого $p < \tilde{p}$ разность $D(p) - S(p) > 0$ (см. рис. 17.1). Следовательно, в этом случае $V^*(p) \in S(p)$.




Рис. 17.1




Рис. 17.2

Пусть $p = \tilde{p}$. В этом случае надо взять оптимальный объем производства, но такой, который потребитель в состоянии купить. Следовательно, в этом случае $V^*(\tilde{p}) \in S(\tilde{p}) \cap [0, D^+(\tilde{p})]$.

Наконец, пусть $p > \tilde{p}$. Оптимизируемая в задаче (17.1) функция представляет собой разность линейной и выпуклой функций и, следовательно, сама является вогнутой функцией. Причем, как было замечено в предыдущем пункте доказательства, максимум ее достигается в $S(p)$. Значит, рассматриваемая функция возрастает на отрезке $[0, S^-(p)]$. При $p > \tilde{p}$ в силу ограничения на объем предложения максимально допустимым объемом производства будет $D^+(p)$, так как в этом случае $D^+(p) < S^-(p)$ (см. рис. 17.1 и рис. 17.2). Следовательно, в этом случае $V^*(p) = D^+(p)$. ■

Этап 2. Оптимизация по цене

Итак, мы определили оптимальный объем для каждой фиксированной цены. Теперь найдем оптимальную монопольную цену.

Утверждение 17.2. 1) Монополия всегда назначает цену p^* не ниже равновесной, т.е. $p^* \geq \tilde{p}$.

2) Если функция спроса $D(p)$ — однозначная и гладкая в окрестности точки $\tilde{p}$, то монополия назначает цену p^* выше равновесной, т.е. $p^* > \tilde{p}$.

Доказательство. 1) Сначала покажем, что цена монополии не ниже, чем $\tilde{p}$. Берем любую цену $p < \tilde{p}$. В силу предыдущего утверждения 17.1 оптимальное значение объема $V^*(p) \in S(p)$. Рассмотрим альтернативную стратегию $(\tilde{p}, V^*(p))$. Нам известно, что $D(\tilde{p}) \cap S(\tilde{p}) \neq \emptyset$. Тогда из монотонности функций спроса и предложения следует, что $D(\tilde{p}) \geq S(p) \forall p < \tilde{p}$. Следовательно, стратегия $(\tilde{p}, V^*(p))$ допустима, т.е. тот же объем товара $V^*(p)$ может быть реализован по большей цене $\tilde{p}$. Заметим, что издержки при этом не изменятся, так как объем выпуска остался тем же. Значит общая выручка производителя от продажи по цене $\tilde{p}$ будет выше, чем от продажи по цене $p < \tilde{p}$. Итак, монополист всегда назначает цену p^* не ниже $\tilde{p}$.

2) Покажем, что для однозначной и гладкой в окрестности точки $\tilde{p}$ функции спроса $D(p)$ монополист назначит цену выше $\tilde{p}$. Из утверждения 17.1 следует, что $V^*(p) = D(p)$ при $p > \tilde{p}$, а при $p = \tilde{p}$ максимально возможный объем $V^*(p) \in S(\tilde{p}) \cap [0, D(\tilde{p})]$ равен $D(\tilde{p})$. Следовательно, задача оптимизации прибыли монополиста при $p \geq \tilde{p}$ принимает вид $\max_{p \geq \tilde{p}} (pD(p) - C(D(p)))$.

Вычислим производную функции прибыли $W(p) = pD(p) - C(D(p))$

$$\dot{W}(p) = D(p) + \dot{D}(p)(p - \dot{C}(D(p))). \quad (17.2)$$

При $p = \tilde{p}$ ее значение равно $\dot{W}(\tilde{p}) = D(\tilde{p}) + \dot{D}(\tilde{p})(\tilde{p} - \dot{C}(D(\tilde{p})))$. Поскольку $D(\tilde{p}) \in S(\tilde{p})$, а $S(\tilde{p})$ является решением задачи оптимизации, то $\tilde{p} = \dot{C}(D(\tilde{p}))$ и второе слагаемое выражения (17.2) равно нулю. Откуда следует, что $\dot{W}(\tilde{p}) = D(\tilde{p}) > 0$. Мы показали, что функция прибыли $W(p)$ возрастает в точке $\tilde{p}$. Значит, монополист назначит цену выше цены конкурентного равновесия. ■

Упражнение 17.1. Пусть функция издержек фирмы-монополиста $C(V)$ равна функции $C^a(V)$ из примера 16.1, а функция спроса $D(p) = 3/p^2$. Найдите оптимальную монопольную цену p^* .

Замечание. Насколько монополист завысит цену по сравнению с ценой конкурентного равновесия, будет зависеть от конкретного вида функции спроса, точнее, от скорости ее убывания после равновесной цены. Если происходит резкое убывание, то монопольная цена будет мало отличаться от конкурентной, если же убывание функции спроса происходит медленно, то разница между ценой, назначенной монополистом, и равновесной будет значительной.

Определение. Функция спроса $D(p)$ называется *медленно убывающей* на отрезке $[p_1, p_2]$, если $p_2 D(p_2) \geq p D(p) \quad \forall p \in [p_1, p_2]$, т.е. *спрос в денежном выражении* $pD(p)$ достигает максимума в точке p_2 .

Пример 17.1. Пусть $D(p) = K/p$. Тогда спрос в денежном выражении равен постоянной величине K . Следовательно, такая функция является медленно убывающей. К этому классу относятся также функции вида $D(p) = K/p^\alpha$, $0 < \alpha < 1$.

Определение. Для гладкой функции спроса $D(p)$ *эластичностью* называется величина

$$e(D(p)) = \frac{|\dot{D}(p)|}{D(p)} p = \frac{|dD(p)/D(p)|}{dp/p}.$$

Она показывает, на сколько процентов изменится объем спроса при изменении цены на один процент.

Отметим, что если эластичность $e(D(p)) \equiv 1$, то $D(p) = K/p$. *Высокоэластичный спрос* (на предметы роскоши) характеризуется значениями $e(D(p)) > 1$, *низко эластичный спрос* (на предметы первой необходимости) — значениями $e(D(p)) < 1$. В экономической литературе, когда говорят об эластичном спросе, обычно подразумевают высокоэластичный спрос.

Утверждение 17.3. Если эластичность функции спроса $e(D(p)) \leq 1$ на отрезке $[p_1, p_2]$, то $D(p)$ медленно убывает на данном отрезке.

Упражнение 17.2. Докажите утверждение 17.3. Что можно сказать про поведение монополии в случае, когда спрос медленно убывает?

Утверждение 17.4. Пусть для некоторого значения $\bar{p} > \tilde{p}$ функция спроса $D(p)$ медленно убывает на отрезке $[\tilde{p}, \bar{p}]$. Тогда для оптимальной монопольной цены выполнено неравенство $p^* \geq \bar{p}$.

Поясним смысл утверждения: пока эластичность мала, монополии выгодно увеличивать цену.

Доказательство. Предположим от противного, что $p^* < \bar{p}$. Будем продавать товар по цене $\bar{p}$, сохраняя объем выручки $\bar{V} = D(p^*)p^*/\bar{p}$. Тогда $\bar{V} < D(p^*)$, издержки снизятся, а прибыль соответственно вырастет. Остается проверить, что можно продать объем $\bar{V}$ по цене $\bar{p}$. Действительно, из условия медленного убывания $D(\bar{p}) \geq D(p^*)p^*/\bar{p}$, откуда $\bar{V} \leq D(\bar{p})$, т.е. такой объем продать можно. Следовательно, предположение неверно. ■

Мы показали, что монопольный рынок плох для потребителя. В следующем параграфе обсуждается, какой ущерб монополия наносит экономике в целом.

§ 18. Модель двухотраслевой экономики

Теорема об оптимальности конкурентного равновесия

Центральная роль понятия конкурентного равновесия в современной экономической теории определяется следующими свойствами. Во-первых, согласно гипотезе Вальраса, экономика в условиях совершенной конкуренции естественным путем приходит в состояние конкурентного равновесия. Во-вторых, это состояние является оптимальным в определенном смысле. В совокупности эти два свойства можно интерпретировать в том смысле, что рынок в условиях совершенной конкуренции является идеальным экономическим механизмом. Отсюда понятно то внимание, которое уделяет этой концепции традиционная экономическая теория.

Однако к такой интерпретации надо относиться с осторожностью. Отметим две важные проблемы. Первая — это отсутствие теоретически обоснованного конструктивного определения условий совершенной конкуренции, о чем уже шла речь выше, вторая — неэффективность рынка при производстве особой группы товаров и услуг, называемых общественными благами. Последней проблемы мы коснемся в параграфе, посвященном налоговому регулированию, где обсуждаются причины существования государственного, или бюджетного, сектора экономики и приводятся модели, обосновывающие целесообразность государственного регулирования.

Несмотря на отмеченные сложности, теоремы об оптимальности конкурентного равновесия имеют большое значение. В этом параграфе мы докажем "теорему благосостояния" для двухотраслевой экспортно-

ориентированной экономики.

Рассмотрим экономику, состоящую из двух отраслей. Первая отрасль с множеством предприятий A добывает ресурс (например, нефть). Каждое предприятие характеризуется максимальным объемом выпуска V^a и удельными себестоимостями добытого ресурса c^a . В этом случае функция предложения имеет вид

$$S^a(p) = \operatorname{Arg} \max_{0 \leq V \leq V^a} [(p - c^a)V] = \begin{cases} 0, & \text{если } p < c^a, \\ [0, V^a], & \text{если } p = c^a, \\ V^a, & \text{если } p > c^a. \end{cases}$$

Вторая отрасль занимается переработкой добытого ресурса. Каждое предприятие b второй отрасли характеризуется максимальным объемом переработки W^b , удельными затратами сырья на единицу готовой продукции d^b и прочими издержками на единицу конечного продукта $\tilde{c}^b$. Предполагается, что конечный продукт продается на внешнем рынке и его цена q на этом рынке фиксирована.

Рассмотрим сначала ситуацию, когда обе отрасли являются конкурентными, т.е. там много небольших предприятий, и цена на сырье на внутреннем рынке складывается из условия равенства спроса и предложения. Определим спрос на сырье по цене p со стороны предприятия b . Обозначим через

$$Pr^b(p, W) = (q - \tilde{c}^b)W/d^b - pW$$

прибыль предприятия b в зависимости от цены p и объема W переработанного сырья. Пусть предприятие стремится максимизировать свою прибыль. Тогда спрос на сырье определяется из условия максимизации этой прибыли:

$$D^b(p) = \operatorname{Arg} \max_{W \in [0, W^b]} Pr^b(p, W).$$

Заметим, что функция прибыли $Pr^b(p, W)$ линейна по W и все зависит от значения коэффициента при W . Обозначим через $r^b = (q - \tilde{c}^b)/d^b$ *резервную цену* предприятия b . Если цена на сырье больше, чем r^b , то предприятию не выгодно его перерабатывать. Окончательно получаем выражение для функции спроса

$$D^b(p) = \begin{cases} 0, & \text{если } p < r^b, \\ [0, W^b], & \text{если } p = r^b, \\ W^b, & \text{если } p > r^b. \end{cases}$$

Предположим, что предприятия добывающей отрасли упорядочены по возрастанию удельных себестоимостей, т.е. $c^1 \leq c^2 \leq c^3 \leq \dots$, а предприятия перерабатывающей отрасли упорядочены по убыванию резервных цен, т.е. $r^1 \geq r^2 \geq \dots$. Построим графики функций спроса и предложения и определим равновесную цену. Возможны два типа пересечения графиков, устойчивые к малым возмущениям параметров модели:




Рис. 18.1

Здесь $\tilde{p}$ – равновесная цена. Рассмотрим ситуацию, когда рынок является конкурентным. Тогда в производстве будут участвовать те предприятия добывающей отрасли, у которых $c^a \leq \tilde{p}$. При этом, если $c^a < \tilde{p}$, то будут полностью загружены производственные мощности данного предприятия. В случае равенства $c^a = \tilde{p}$ мощности добывающего предприятия a могут быть загружены частично, чтобы сбалансировать равновесное предложение (случай б)). Из предприятий перерабатывающей отрасли будут заняты те, у которых $r^b \geq \tilde{p}$, и если $r^b > \tilde{p}$, то мощности предприятия будут загружены полностью. В случае равенства $r^b = \tilde{p}$ мощности перерабатывающего предприятия b могут быть загружены частично, что сбалансировать предложение (в случае а)).

Возможны также ситуации, когда цена или объем определяется неоднозначно (см. примеры 16.7 и 16.8). Однако, такие ситуации являются структурно неустойчивыми, поскольку сколь угодно малыми возмущениями параметров модели можно перейти к одному из двух ранее рассмотренных случаев. Далее предположим, что равновесные цена и объем определяются однозначно.

Выясним, какой будет прибыль предприятий обеих отраслей в ситуации конкурентного равновесия. Общая прибыль добывающей отрасли $\sum_{a: c^a < \tilde{p}} (\tilde{p} - c^a) V^a$ соответствует площади фигуры, ограниченной осью цен, вертикальной линией $p = \tilde{p}$, соответствующей равновесной цене, и гра-

фиком функции предложения $S(p)$ (см. рис. 18.2).




Рис. 18.2




Рис. 18.3

Прибыль перерабатывающей отрасли $\sum_{b: \tilde{p} < r^b} (r^b - \tilde{p})W^b$ — это площадь фигуры образованной осью цен, вертикальной линией $p = \tilde{p}$, соответствующей равновесной цене, и графиком функции спроса $D(p)$ (см. рис. 18.3).

Общая площадь заштрихованных на рис. 18.2 и 18.3 фигур — это прибыль всей экономики в состоянии конкурентного равновесия (см. рис. 18.4).




Рис. 18.4




Рис. 18.5

Обсудим, каким будет состояние этой экономики, если установится монополия в одной из отраслей, а другая отрасль останется конкурентной. Для определенности будем считать, что монополизирована добывающая отрасль. Тогда монополия в добывающей отрасли установит и объем, и цену на сырье, стремясь максимизировать свою прибыль.

Допустим, что функция спроса $D(p)$ является медленно убывающей на отрезке $[\tilde{p}, r^2]$. Согласно утверждению 17.4, оптимальная цена для монополии $p^* \geq r^2$. Пусть для определенности $p^* = r^2$. Тогда объем добычи составит $D(r^2)$ и прибыль монополии будет равна площади фигуры,

ограниченной горизонтальной линией $V = D(r^2)$, графиком функции предложения $S(p)$, осью цен и вертикальной линией $p = r^2$ (см. рис. 18.5).

Обсудим результаты господства монополии на рынке. Возникают два основных негативных эффекта: во-первых, для экономики в целом теряется часть прибыли, и во-вторых, установилась диспропорция, поскольку монополия захватила себе львиную долю прибыли в ущерб второй отрасли.

Допустим теперь, что обе отрасли монополизированы. Тогда цена, которая установится на рынке, будет определяться путем переговоров между этими монополиями. Скорее всего, ни одна монополия не согласится, чтобы другая монополия установила монопольную цену, и в результате переговоров установится промежуточная цена между их монопольными ценами. Вполне может быть, что они сговорятся о цене, близкой к конкурентному равновесию, что выгоднее для экономики в целом, чем предыдущий вариант. Реальная технологическая цепочка содержит не две отрасли, а несколько. Рассмотрим основные звенья:

- 1) добыча сырья;
- 2) транспортировка;
- 3) переработка;
- 4) оптовая торговля;
- 5) розничная торговля.

Для отклонения от конкурентного равновесия достаточно, чтобы хотя бы в одном из звеньев возникла монополия. В российской экономике возникновение таких монопольных структур часто связано с преступными группами. Ими, например, долгое время контролировался сбыт легковых автомобилей. Автомобили скупались на предприятиях по ценам, близким к себестоимости, и потом продавались в розничной сети по монопольным ценам.

Практический вывод из рассмотренных моделей состоит в том, что надо аккуратно относиться к демополизации отраслей. Иногда более выгодно иметь монополии в нескольких отраслях, чем в одной. При этом по крайней мере общая прибыль для экономики будет выше, чем в случае одного монополиста. Присвоение им основной части прибыли на практике может привести к разрушению всей технологической цепочки.

Рассмотрим экономику с аналогичной технологической структурой, но в условиях *централизованного планирования*. Покажем, что для централизованно управляемой экономики оптимальный план соответствует

состоянию конкурентного равновесия.

Рассматриваем ту же модель с двумя отраслями. Плановый орган устанавливает задание для каждого предприятия. Плановое задание для предприятия a добывающей отрасли обозначим как $\bar{V}^a$, а для предприятия b перерабатывающей отрасли как $\bar{W}^b$. Должен соблюдаться баланс, т.е. сумма добытого сырья должна равняться сумме переработанного сырья, а также должны соблюдаться ограничения на мощности:

$$\sum_{b \in B} \bar{W}^b = \sum_{a \in A} \bar{V}^a, \quad \bar{V}^a \leq V^a, \quad a \in A, \quad \bar{W}^b \leq W^b, \quad b \in B. \quad (18.1)$$

Набор $(\bar{V}^a, a \in A, \bar{W}^b, b \in B)$, удовлетворяющий системе (18.1), называется *допустимым планом*.

Задача централизованного планирования — найти *оптимальный план*, т.е. допустимый план, максимизирующий доход страны от производства и экспорта продукта. Доход, соответствующий допустимому плану $(\bar{V}^a, a \in A, \bar{W}^b, b \in B)$, равен

$$q \left(\sum_{b \in B} \frac{\bar{W}^b}{d^b} \right) - \sum_{a \in A} c^a \bar{V}^a - \sum_{b \in B} \tilde{c}^b \frac{\bar{W}^b}{d^b} = \sum_{b \in B} r^b \bar{W}^b - \sum_{a \in A} c^a \bar{V}^a.$$

Поскольку экономика — централизованная, то внутренних цен может и не быть.

Утверждение 18.1. Оптимальный план соответствует состоянию конкурентного равновесия, т.е. для каждого предприятия надо установить задание, которое соответствует объему выпуска этого предприятия в условиях конкурентного равновесия.

Доказательство. Зафиксируем цену $p \in [c^1, r^1]$ и для допустимого плана $(\bar{V}^a, a \in A, \bar{W}^b, b \in B)$ запишем доход в виде

$$\sum_{a \in A} (p - c^a) \bar{V}^a + \sum_{b \in B} (r^b - p) \bar{W}^b. \quad (18.1)$$

Без потери общности будем считать, что

$$\sum_{l: p \geq c^l} V^l \geq W(p) \stackrel{\text{def}}{=} \sum_{l: p \leq r^l} W^l.$$

Определим целое k из условия

$$\sum_{l=1}^k V^l < W(p) \leq \sum_{l=1}^{k+1} V^l.$$

Если $k = 0$, то условно полагаем $\sum_{l=1}^0 V^l = 0$ и первое (строгое) неравенство здесь отсутствует. Тогда план, максимизирующий доход (18.1) при фиксированном p , определяется по формулам

$$\bar{V}^a = \begin{cases} 0, & p < c^a, \\ V^a, & p \geq c^a, \ a \leq k, \\ W(p) - \sum_{l=1}^k V^l, & p \geq c^a, \ a = k+1, \\ 0, & p \geq c^a, \ a > k+1, \end{cases} \quad \bar{W}^b = \begin{cases} 0, & r^b < p, \\ W^b, & r^b \geq p. \end{cases}$$

Соответствующая величина дохода равна площади фигуры, ограниченной осью цен, горизонтальной линией $V = W(p)$ и графиками функций спроса и предложения (см. рис. 18.5, где $p = r^2$, $W(p) = W^1 + W^2$, $k = 2$). Площадь этой фигуры максимальная при $p = \tilde{p}$. ■

Обсудим этот результат. Утверждение говорит о том, что в централизованно управляемой экономике максимальная общая прибыль такая же, как и в состоянии конкурентного равновесия. Возникает вопрос: зачем все эти переходы от капитализма к социализму и обратно, если и там и там наилучший результат одинаковый? Дело в том, что в условиях централизованного управления оптимальный план не удастся реализовать на практике. Плановый орган должен иметь правдивую информацию об издержках и объемах производства. Но предприятие не заинтересовано в предоставлении правдивой информации. При плановой экономике снижается также качество продукции, а значит растут издержки производства в последующих звеньях технологической цепи.

Что касается рыночной экономики, то она может обеспечить оптимальный результат, если складывается конкурентное равновесие. Как мы показали, действия монополии, максимизирующей прибыль, приводят к значительным отклонениям от этого оптимального результата. Реальные рынки обычно не являются монопольными, в них участвуют несколько агентов с каждой стороны. Важная теоретическая проблема — оценка

возможного отклонения от состояния конкурентного равновесия для таких рынков. Для ее исследования разработаны модели несовершенной конкуренции, или олигополии, рассматриваемые в следующем параграфе.

§ 19. Модели олигополии

Введенное выше понятие конкурентного равновесия характеризуется следующими свойствами.

1. Товар на рынке продается по единой цене.
2. Каждый производитель и потребитель определяет объем предложения (соответственно, спроса), максимизируя свою прибыль (полезность) при данной цене.
3. Цена устанавливается таким образом, что балансирует спрос и предложение.

Рассмотрим теперь модель рынка, на котором действует несколько производителей товара, каждый из которых обладает определенными возможностями влиять на рыночную цену и учитывает эти возможности при выборе своей стратегии. Потребителей по-прежнему считаем мелкими: отдельный потребитель не оказывает влияния на параметры рынка. Рынок с такой структурой называется *олигополией*. Цель исследования этой модели — ответить на следующие вопросы: При каких условиях на структуру отрасли-производителя товара рынок придет в состояние конкурентного равновесия? Как зависит отклонение от конкурентного равновесия (по цене и объемам выпуска) от структуры отрасли? Насколько эффективно антимонопольное законодательство и какие меры регулирования можно предложить для повышения эффективности рынка?

Модель олигополии по Курно

Рассматривается отрасль экономики, выпускающая однородный товар. В отрасль входит m предприятий-производителей, каждое из которых характеризуется постоянными удельными себестоимостями c^a и максимальным объемом производства V^a , $a \in A = \{1, \dots, m\}$. Задана однозначная функция спроса на товар $D(p)$, причем $D(p)$ убывает по p и $D(p) \rightarrow 0$ при $p \rightarrow \infty$. Характерным примером функции спроса является функция вида

$$D(p) = K/p^\alpha, \quad \alpha > 0. \quad (19.1)$$

Стратегией предприятия $a \in A$ является объем выпуска $v^a \in [0, V^a]$. Це-

на на рынке устанавливается таким образом, чтобы фактическое предложение товара $\sum_{a \in A} v^a$ соответствовало спросу на него. Обозначим через $v = (v^a, a \in A)$ вектор выпуска товара. Тогда цена на рынке будет равна

$$p(v) = D^{-1} \left(\sum_{a \in A} v^a \right). \quad (19.2)$$

Прибыль производителя a зависит от вектора выпусков v и определяется как

$$u^a(v) = v^a(p(v) - c^a). \quad (19.3)$$

При выборе объема выпуска каждое предприятие стремится максимизировать свою прибыль. Получается, что с одной стороны, если разность цены и удельной себестоимости положительна, т.е. $p(v) - c^a > 0$, то прибыль возрастает с увеличением объема за счет первого сомножителя v^a . Но с другой стороны, цена убывает с увеличением объема выпуска в силу (19.2). Действительно, функция спроса $D(p)$ предполагается убывающей и обратная к ней функция $D^{-1}(V)$ также убывает. Следовательно, прибыль может убывать с увеличением объема выпуска за счет второго сомножителя в (19.3).

Отметим, что в точке $v = \mathbf{0}$ функции $u^a(v)$ имеют особенность. Естественно определить $u^a(\mathbf{0}) = 0$.

Мы описали взаимодействие производителей в виде игры в нормальной форме:

$$\Gamma = \left\langle A, [0, V^a], u^a(v), v \in \bigotimes_{a \in A} [0, V^a], a \in A \right\rangle,$$

где A — множество игроков (производителей товара), $[0, V^a]$ — множество допустимых стратегий игрока a (множество допустимых объемов выпуска), $u^a(v)$ — выигрыш (прибыль) игрока a .

Отметим, что если $\lim_{V \rightarrow 0+} D^{-1}(V)V > 0$, то функция $u^a(\mathbf{0} || v^a) = v^a(D^{-1}(v^a) - c^a)$ разрывна в точке $v^a = 0$. В этом случае равновесие по Нэшу в игре Γ может не существовать (см. ниже упражнение 19.1).

Поиск равновесий по Нэшу для модели Курно

Найдем равновесия по Нэшу для этой игры, т.е. такой набор стратегий

$\bar{v} = (\bar{v}^a, a \in A)$, что каждое предприятие выпускает объем товара

$$\bar{v}^a \in \text{Arg} \max_{v^a \in [0, V^a]} v^a \left(D^{-1} \left(\sum_{b \in A \setminus \{a\}} \bar{v}^b + v^a \right) - c^a \right). \quad (19.4)$$

Обозначим через $u'_{v^a}(v)$ частную производную функции $u^a(v)$ по переменной v^a в точке v .

Лемма 19.1. Если $\bar{v}$ — равновесие по Нэшу, то $\bar{v} \neq \mathbf{0}$ и выполнены следующие необходимые условия:

- 1) $\bar{v}^a = 0 \Rightarrow u'_{v^a}(\bar{v}) \leq 0$;
- 2) $\bar{v}^a \in (0, V^a) \Rightarrow u'_{v^a}(\bar{v}) = 0$;
- 3) $\bar{v}^a = V^a \Rightarrow u'_{v^a}(\bar{v}) \geq 0$.

Доказательство. Покажем, что ситуация равновесия $\bar{v}$ не может быть нулевой. Действительно, предположим, что $\bar{v} = \mathbf{0}$ — ситуация равновесия. В силу свойства D4 функции спроса, $D^{-1}(V) \rightarrow \infty$ при $V \rightarrow 0 +$. Поэтому при достаточно малом $v^a > 0$

$$u^a(\mathbf{0} || v^a) = v^a(D^{-1}(v^a) - c^a) > 0 = u^a(\mathbf{0}),$$

что противоречит определению ситуации равновесия.

Условия 1)-3) являются необходимыми условиями для точки максимума $\bar{v}^a$ дифференцируемой функции $u^a(\bar{v} || v^a)$ одной переменной v^a на отрезке $[0, V^a]$ (см. задачу (19.4)). ■

Вычислим производную функции прибыли по объему выпуска v^a как производную произведения:

$$u'_{v^a}(v) = D^{-1} \left(\sum_{b \in A} v^b \right) - c^a + v^a / \dot{D}(p(v)). \quad (19.5)$$

Утверждение 19.1. Пусть $c^1 \leq c^2 \leq \dots \leq c^m$, т.е. предприятия упорядочены по возрастанию удельных себестоимостей, а функция спроса $D(p)$ — дифференцируемая и убывающая. Тогда найдется такое предприятие k , что в равновесии по Нэшу $\bar{v}^a > 0$, $a = 1, 2, \dots, k$, $\bar{v}^a = 0$, $a = k + 1, \dots, m$, причем $c^{k+1} > c^k$.

Доказательство.

1) Пусть $\bar{v}$ — равновесие по Нэшу. По лемме 19.1 $\bar{v} \neq \mathbf{0}$. Возьмем такое k , что $\bar{v}^k > 0$. Покажем, что тогда

$D^{-1}\left(\sum_{b \in A} \bar{v}^b\right) - c^k > 0$. Согласно лемме 19.1 из $\bar{v}^k > 0$ следует $u'_{v^k}(\bar{v}) \geq 0$. Из формулы (19.5) получаем

$$D^{-1}\left(\sum_{b \in A} \bar{v}^b\right) - c^k \geq -\bar{v}^k / \dot{D}(p(\bar{v})) > 0,$$

поскольку $\dot{D}(p(\bar{v})) < 0$.

2) Покажем, что $\bar{v}^a > 0$ при $a = 1, \dots, k-1$. Допустим от противного, что $\bar{v}^a = 0$ для некоторого $a \in \{1, \dots, k-1\}$. Тогда

$$\begin{aligned} u'_{v^a}(\bar{v}) &= D^{-1}\left(\sum_{b \in A} \bar{v}^b\right) - c^a + \bar{v}^a / \dot{D}(p(\bar{v})) = D^{-1}\left(\sum_{b \in A} \bar{v}^b\right) - c^a \geq \\ &\geq D^{-1}\left(\sum_{b \in A} \bar{v}^b\right) - c^k > 0, \end{aligned}$$

так как $c^a \leq c^k$ при $a < k$. По лемме 19.1 из $u'_{v^a}(\bar{v}) > 0$ следует $\bar{v}^a > 0$. Получили противоречие с предположением, что $\bar{v}^a = 0$. Следовательно, $\bar{v}^a > 0$ при $a = 1, \dots, k-1$.

3) Таким образом, найдется такое максимальное k , что $\bar{v}^a > 0$, $a = 1, 2, \dots, k$, $\bar{v}^a = 0$, $a = k+1, \dots, m$. Наконец, покажем, что $c^{k+1} > c^k$. Если $c^{k+1} = c^k$, то

$$u'_{v^{k+1}}(\bar{v}) = D^{-1}\left(\sum_{b \in A} \bar{v}^b\right) - c^{k+1} + \bar{v}^{k+1} / \dot{D}(p(\bar{v})) = D^{-1}\left(\sum_{b \in A} \bar{v}^b\right) - c^k > 0.$$

По лемме 19.1 из $u'_{v^{k+1}}(\bar{v}) > 0$ следует $\bar{v}^{k+1} > 0$ (противоречие). ■

Полученный результат имеет простой экономический смысл: если некоторому предприятию выгодно производить товар по данной цене, то предприятию с меньшей удельной себестоимостью тем более выгодно производить этот товар.

Случай с равными удельными себестоимостями

Рассмотрим случай, когда удельные себестоимости c^a всех предприятий одинаковы и равны s . Из утверждения 19.1 следует, что тогда в равновесии по Нэшу $\bar{v}^a > 0$ при всех $a \in A$, т.е. каждый производитель выпускает положительное количество товара.

Рассмотрим сначала *модель без ограничений на объемы выпуска*. Будем искать решение задачи (19.4), считая $V^a = \infty$ (производственные

мощности предприятий не ограничены). Тогда в точке максимума задачи (19.4) все производные $u'_{v^a}(\bar{v}) = 0$ и для поиска равновесия по Нэшу получаем следующую систему уравнений относительно неизвестных $\bar{v}^a$, $a = 1, \dots, m$:

$$u'_{v^a}(\bar{v}) = D^{-1}\left(\sum_{b \in A} \bar{v}^b\right) - c + \bar{v}^a / \dot{D}(p(\bar{v})) = 0, \quad a \in A. \quad (19.6)$$

Суммируем уравнения (19.6) по всем $a \in A$. Получаем

$$mD^{-1}\left(\sum_{a \in A} \bar{v}^a\right) - mc + \sum_{a \in A} \bar{v}^a / \dot{D}\left(D^{-1}\left(\sum_{a \in A} \bar{v}^a\right)\right) = 0. \quad (19.7)$$

Выражение (19.7) представляет собой уравнение относительно одной неизвестной величины $\sum_{a \in A} \bar{v}^a$. Разрешив данное уравнение и подставив найденную величину в уравнения (19.6), найдем значения $\bar{v}^a$, $a \in A$, которые, очевидно, одинаковы для всех a .

Продemonстрируем действие этого алгоритма на конкретной функции спроса. Пусть $D(p) = K/p$. Тогда $p(v) = D^{-1}(\sum_{a \in A} v^a) = K / \sum_{a \in A} v^a$. Система (19.6) в этом случае принимает вид

$$K / \sum_{a \in A} \bar{v}^a - c - \bar{v}^a K / \left(\sum_{a \in A} \bar{v}^a\right)^2 = 0, \quad a \in A, \quad (19.6')$$

а уравнение (19.7) преобразуется к виду:

$$mK / \sum_{a \in A} \bar{v}^a - mc - K / \sum_{a \in A} \bar{v}^a = 0. \quad (19.7')$$

Из (19.7') получаем, что $\sum_{a \in A} \bar{v}^a = (m-1)K/(mc)$. Подставляя это выражение в (19.6'), находим равновесие по Нэшу для модели Курно

$$\bar{v}^a = v^* \stackrel{\text{def}}{=} \frac{K(m-1)}{cm^2} \quad \forall a \in A. \quad (19.8)$$

Для модели с ограничениями на объемы выпуска отметим два случая.

а) $v^* \leq \min_{b \in A} V^b$. Тогда решение задачи с ограничениями на объемы выпуска совпадает с решением той же задачи без учета ограничений,

так как v^* — решение задачи оптимизации по более широкому множеству и в то же время является допустимым объемом выпуска для задачи с ограничениями. Следовательно, в этом случае $\bar{v}^a$ задается формулой (19.8).

б) $v^* > \min_{b \in A} V^b$. Упорядочим производителей по убыванию максимальных объемов выпуска: $V^1 \geq V^2 \geq \dots \geq V^m$. Тогда найдется такой производитель k , что

$$\bar{v}^a = \begin{cases} v^*, & a \leq k, \\ V^a, & a > k. \end{cases} \quad (19.9)$$

Алгоритм поиска равновесия по Нэшу вида (19.9)

Фиксируем некоторое k . Тогда, переписав (19.6) для этого случая, получаем уравнение для нахождения $v^*(k)$:

$$K / \left(\sum_{a=k+1}^m V^a + kv^* \right) - c - v^* K / \left(\sum_{a=k+1}^m V^a + kv^* \right)^2 = 0, \quad (19.6'')$$

где выражение $\sum_{a=m+1}^m V^a$ полагается равным нулю.

Начинаем поиск равновесия по Нэшу с $k = m$. Находим $v^*(m)$ и проверяем условие $v^*(m) \leq V^m$. Если оно выполняется, то найденная ситуация $\bar{v}$ является равновесием по Нэшу. Иначе берем $k = m - 1$ и т.д. В результате за конечное число шагов найдем равновесие по Нэшу для этого случая.

Сравнение равновесий по Нэшу и по Вальрасу для модели Курно

Пусть $D(p) = K/p$, $V^a \equiv V$, $c^a \equiv c$. В этом случае равновесие по Нэшу $\bar{v}$ и цена p^* определяется по формулам

$$\bar{v}^a = \begin{cases} v^* = K(m-1)/(cm^2), & \text{если } v^* \leq V, \\ V, & \text{если } v^* > V, \end{cases} \quad \forall a \in A,$$

$$p^* = \begin{cases} K/(mv^*) = cm/(m-1), & \text{если } v^* \leq V, \\ K/(mV), & \text{если } v^* > V. \end{cases}$$

Чтобы найти равновесие по Вальрасу, надо найти пересечение функций спроса и предложения, причем

$$S(p) = \begin{cases} 0, & p < c, \\ [0, mV], & p = c, \\ mV, & p > c. \end{cases}$$

Если $K/c \leq mV$, то $\tilde{p} = c$ (см. рис. 19.1), иначе $\tilde{p} = K/(mV)$ (см. рис. 19.2).




Рис. 19.1




Рис. 19.2

В итоге получаем следующий результат.

Утверждение 19.2. Для данной модели возможны следующие соотношения равновесий по Нэшу и по Вальрасу.

1) Если $V \geq K/(cm)$, то

$$p^* = cm/(m-1), \quad v^* = K(m-1)/(cm^2), \quad \tilde{p} = c, \quad \tilde{v}^a = K/(cm),$$

т.е. равновесная цена для олигополии p^* превышает цену конкурентного равновесия $\tilde{p}$ в $m/(m-1)$ раз (рис. 19.1).

2) Если $K/(cm) > V > K(m-1)/(cm^2)$, то

$$p^* = cm/(m-1), \quad v^* = K(m-1)/(cm^2), \quad \tilde{p} = K/mV, \quad \tilde{v}^a = V, \text{ т.е. цены отличаются в меньшей степени.}$$

3) При $V \leq K(m-1)/(cm^2)$ цены и объемы совпадают: $p^* = \tilde{p} = K/(mV)$, $v^* = \tilde{v}^a = V$. (см. рис. 19.2).

Таким образом, если ограничение объема выпуска не существенно ($V \geq K/(cm)$), то для малых m получаем следующие соотношения цен:

$$m = 2 \Rightarrow \tilde{p} = p^*/2; \quad m = 3 \Rightarrow \tilde{p} = 2p^*/3; \quad m = 4 \Rightarrow \tilde{p} = 3p^*/4.$$

Так как $p = K / \sum_{a \in A} v^a$, то соотношение объемов обратно пропорционально

соотношению соответствующих цен, т.е. $v^*/\tilde{v} = 1 - 1/m$, в частности,

$$m = 2 \Rightarrow \tilde{v} = 2v^*; \quad m = 3 \Rightarrow \tilde{v} = 3v^*/2; \quad m = 4 \Rightarrow \tilde{v} = 4v^*/3.$$

Модель Курно позволяет обосновать меры по антимонопольному регулированию. Из анализа этой модели вытекает, что если на рынке действует хотя бы четыре компании, то отклонение по объему от состояния конкурентного равновесия по Вальрасу составляет не более 25%, а отклонение по цене не более 33%. При этом объем выпуска на каждом из четырех предприятий, присутствующих на рынке, должен составлять $v^* = 3K/(16c)$ (т.е. $3/16$ от равновесного по Вальрасу общего объема производства). Согласно антимонопольному законодательству США, к предприятию могут применяться антимонопольные меры, если оно контролирует более 30% рынка. Исходя из модели Курно, таким образом обеспечивается определенная степень близости к конкурентному равновесию.

Упражнение 19.1. Покажите, что равновесие по Нэшу для модели Курно не существует, если $D(p) = K/p^\alpha$, $0 < \alpha \leq 1/m$, $c^a \equiv c$.

Упражнение 19.2. Найдите равновесия по Нэшу для модели Курно и сравните их с конкурентным равновесием в следующих условиях:

1. $D(p) = K/p^\alpha$, $\alpha > 1/m$, $c^a \equiv c$, $V^a \equiv V$.
2. $D(p) = K/p$, $c^a \equiv c$, $V^1 \geq V^2 \geq \dots \geq V^m$.
3. $D(p) = K/p$, $c^1 \leq c^2 \leq \dots \leq c^m$, $V^a \equiv V \geq K/c^1$.

Достоинства модели Курно:

- а) проста для исследования;
- б) согласуется с моделью конкурентного равновесия;
- в) условия совершенной конкуренции и оценки отклонения от них легко формализуются.

Недостатки модели Курно:

а) неясно, какое отношение модель имеет к реальным рынкам, поскольку на практике нет таких механизмов ценообразования: производитель назначает и цену, и объем выпуска. Исследование соответствующей модели показывает, что найденное для модели Курно равновесие по Нэшу неустойчиво к изменению цен (см. следующий параграф);

б) видимо, модель не соответствует и экономической статистике. Например, по России доля торговой наценки в цене на мелкооптовых рынках превышает 50%, хотя количество продавцов каждого товара велико.

Модель ценовой конкуренции Бертрана-Эджворта

Рассмотрим другой вариант модели олигополии. Рынок предполагается прежним: A — множество производителей товара, c^a и V^a — посто-

янные удельная себестоимость и максимальный объем выпуска производителя a , $D(p)$ — функция спроса. Потребители — мелкие, они образуют континуум, каждый из них может купить одну единицу товара. Потребитель характеризуется резервной ценой $r \geq 0$. Он покупает, если ему достается товар по цене $p \leq r$ и не покупает в противном случае.

Ответы на поставленные вопросы относительно условий реализации конкурентного равновесия и оценки отклонения от него зависят от механизма взаимодействия между производителями и потребителями. В качестве примера такого механизма рассмотрим *односторонний аукцион первой цены*. Производители-продавцы одновременно и независимо назначают цены $s^a \geq c^a$ на свой товар. Потребители-покупатели выстраиваются в очередь и покупают предложенный товар в порядке возрастания цены с учетом их резервных цен. При этом важен порядок прихода покупателей на рынок.

Пример 19.1. На рынке взаимодействуют два продавца и две группы покупателей со следующими параметрами: $s^1 = 5$, $V^1 = 100$; $r^1 = 6$, $D^1 = 110$; $s^2 = 7$, $V^2 = 50$; $r^2 = 8$, $D^2 = 40$, где s^a — цена, назначенная продавцом a , V^a — предложенный по этой цене объем товара, r^i — резервная цена для группы покупателей i , D^i — объем их спроса (который неэластичен при $p < r^i$).

Если на рынок первыми приходят "бедные" покупатели (т.е. с низкой резервной ценой), то они покупают 100 единиц по цене 5, а потом "богатые" купят 40 единиц по цене 7. Если же на рынок первыми приходят "богатые", то они покупают 40 единиц по цене 5, а потом "бедные" покупают 60 единиц по цене 5. Очевидно, что прибыль второго продавца при этом существенно меняется.

Далее будем предполагать, что потребители с различными резервными ценами r распределены в соответствии с плотностью $\rho(r)$ — неотрицательной функцией, интегрируемой на полупрямой $[0, \infty)$. Это значит, что при заданной цене $p \leq r$ и малом dr потребители с резервными ценами из отрезка $[r, r + dr]$ купят товар в количестве $\rho(r)dr$. Пусть имеется такое число $M > 0$, что плотность $\rho(r)$ положительна на интервале $(0, M)$, а потребители с резервными ценами $r \geq M$ имеют дополнительную возможность приобрести товар на другом рынке по фиксированной цене M .

Тогда функция спроса имеет вид

$$D(p) = \begin{cases} \int_p^{\infty} \rho(r) dr, & p < M, \\ [0, \int_M^{\infty} \rho(r) dr], & p = M, \\ 0, & p > M. \end{cases}$$

Отметим, что $D(p)$ можно интерпретировать как общее число потребителей, желающих приобрести товар по цене p . Ясно, что функция $D(p)$ — убывающая и дифференцируемая на интервале $(0, M)$. Далее будем считать, что $\sum_{a:c^a < M} V^a > D^+(M)$.

В сделанных предположениях равновесная цена $\tilde{p}$ однозначно определяется из условия $D(\tilde{p}) \in [S^-(\tilde{p}), S^+(\tilde{p})]$, причем $D(\tilde{p}) > 0$.

Набор цен $s = (s^a, a \in A)$, установленных производителями, определяет вектор фактического предложения товара:

$\tilde{V}(s) = (\tilde{V}_p(s), p \in P(s))$, где $\tilde{V}_p(s) = \sum_{a:s^a=p} V^a$ — количество товара, предложенное по цене p , а $P(s)$ — множество назначенных цен.

В общем случае процесс продажи характеризуется функцией остаточного спроса. Функция остаточного спроса $D(p, \tilde{V})$ показывает, каков остаточный спрос по цене p после продажи всех объемов $\tilde{V}_{p'}$ по ценам $p' < p$, $p' \in P(s)$. Рассмотрим три конкретных вида функций остаточного спроса, связанных с *правилами рационирования*, т.е. с порядком потребителей в очереди:

1. Приоритет потребителей с большей резервной ценой:

$$D^1(p, \tilde{V}) = \max \left[0, D(p) - \sum_{p' < p} \tilde{V}_{p'} \right]. \quad (19.10)$$

2. Потребители равномерно распределены в очереди и остаточный спрос формируется по пропорциональному правилу:

$$D^2(p, \tilde{V}) = D(p) \max \left[0, 1 - \sum_{p' < p} \tilde{V}_{p'} / D(p') \right]. \quad (19.11)$$

3. Приоритет потребителей с низкой резервной ценой:

$$D^3(p, \tilde{V}) = \max \left[0, \min_{\bar{p} \leq p} \left[D(\bar{p}) - \sum_{\bar{p} \leq p' < p} \tilde{V}_{p'} \right] \right]. \quad (19.12)$$

Упражнение 19.3. Докажите формулы (19.10-12).

При любом порядке потребителей в очереди справедливо соотношение $D^1(p, \tilde{V}) \leq D(p, \tilde{V}) \leq D^3(p, \tilde{V})$, означающее, что остаточный спрос убывает быстрее всего в случае 1 и медленнее всего — в случае 3.

Далее рассмотрим произвольный порядок потребителей в очереди, считая, что остаточный спрос характеризуется функцией $D(p, \tilde{V})$, удовлетворяющей следующим неравенствам:

$$D(p) - \sum_{p' < p} \tilde{V}_{p'} \leq D(p, \tilde{V}) \leq \max[0, D(\bar{p}, \tilde{V}) - \sum_{\bar{p} \leq p' < p} \tilde{V}_{p'}] \quad \forall \bar{p} < p. \quad (19.13)$$

Помимо этого, потребуем, чтобы функция $D(p, \tilde{V}(s))$ была непрерывна по любой переменной s^a в интервале $0 < s^a < p$ при фиксированных остальных переменных.

По функции остаточного спроса $D(p, \tilde{V})$ для любых стратегий s^a производителей однозначно определяется *максимальная продажная цена* $p(s) = \max\{p \in P(s) \mid D(p, \tilde{V}(s)) > 0\}$, при которой остаточный спрос еще положителен.

Определим правило распределения величины $D(p, \tilde{V}(s))$ для производителей a , выбравших $s^a = p(s)$. Разобьем их на две группы:

$$A_1 = \{a \in A \mid c^a < s^a = p(s)\}, \quad A_2 = \{a \in A \mid c^a = s^a = p(s)\}.$$

Если $D(p(s), \tilde{V}(s)) < \sum_{a \in A_1} V^a$, то весь остаточный спрос распределяется между производителями $a \in A_1$ пропорционально их максимальным объемам предложения V^a . При этом производитель a выпускает свой товар в количестве $\hat{v}^s = V^a D(p(s), \tilde{V}(s)) / \sum_{a \in A_1} V^a$. В случае $D(p(s), \tilde{V}(s)) \geq \sum_{a \in A_1} V^a$ производители $a \in A_1$ выпускают свой товар в количестве V^a .

Величина остатка спроса $\tilde{D}(p(s), \tilde{V}(s)) \stackrel{\text{def}}{=} \max \left[0, D(p(s), \tilde{V}(s)) - \sum_{a \in A_1} V^a \right]$ распределяется между производителями $a \in A_2$ по аналогичному правилу.

Итак, при распределении остаточного спроса приоритетом пользуются фирмы, для которых себестоимости ниже продажной цены. Последнее условие вводится для технического удобства, поскольку определяемые ниже функции выигрыша разрывны, и данная модель описывает распределение покупателей при разности цен, близкой к нулю. В качестве

выигрыша производителя a рассмотрим его прибыль

$$u^a(s) = \begin{cases} (s^a - c^a)V^a, & s^a < p(s), \\ (s^a - c^a)V^a \min[1, D(p(s), \tilde{V}(s)) / \sum_{b \in A_1} V^b], & a \in A_1, \\ (s^a - c^a)V^a \min[1, \tilde{D}(p(s), \tilde{V}(s)) / \sum_{b \in A_2} V^b], & a \in A_2, \\ 0, & s^a > p(s). \end{cases}$$

Таким образом, описана модель ценовой конкуренции производителей как игра в нормальной форме $\Gamma = \langle A, \{s^a \mid s^a \geq c^a\}, u^a(s), a \in A \rangle$, где игроки $a \in A$ — фирмы, множества стратегий $\{s^a \mid s^a \geq c^a\}$ — множества цен, которые они могут назначить, функции выигрыша $u^a(s)$ определяют прибыли фирм.

Известные модели поведения в игре Γ — это равновесие по Нэшу, решение по доминированию, модели игровой динамики (динамика наилучших ответов, адаптивные динамики).

Рассмотрим сначала необходимые условия для равновесия по Нэшу описанной игры.

Утверждение 19.3. Пусть $\bar{s}$ — равновесие по Нэшу, $\tilde{p}$ — цена конкурентного равновесия. Тогда справедливо одно из следующих двух условий:

1) $p(\bar{s}) = \tilde{p}$ и для каждого производителя a , имеющего $c^a < \tilde{p}$, выполнено $\bar{s}^a = \tilde{p}$.

2) $p(\bar{s}) > \tilde{p}$ и найдется единственный производитель a , для которого $c^a < p(\bar{s}) = \bar{s}^a$, при этом $c^a \leq \tilde{p}$ (см. рис. 19.3).




Рис. 19.3




Рис. 19.4

Доказательство. Заметим, что $\sum_{a: c^a < \tilde{p}} V^a \leq S^-(\tilde{p}) \leq D(\tilde{p})$. Отсюда и из первого неравенства (19.13) вытекает, что каждый производитель a ,

для которого $c^a < \tilde{p}$, сможет продать весь свой товар по цене $\tilde{p}$. Поэтому для ситуации равновесия $\bar{s} \min_{a \in A} \bar{s}^a \geq \tilde{p} \Rightarrow p(\bar{s}) \geq \tilde{p}$.

Пусть $p(\bar{s}) = \tilde{p}$. Если $c^a < \tilde{p} < \bar{s}^a$, то производитель a ничего не продаст. Ему выгодно отклониться и выбрать цену $s^a = \tilde{p}$, получив положительную прибыль (противоречие). Итак, $c^a < \tilde{p} \Rightarrow \bar{s}^a = \tilde{p}$.

Пусть $p(\bar{s}) > \tilde{p}$. Предположим, что для некоторого производителя a выполнено $c^a \leq \bar{s}^a < p(\bar{s})$. По определению $p(\bar{s})$ он продаст весь свой товар в объеме V^a . Если он увеличит цену до $s^a = \bar{s}^a + \varepsilon$, то при малом $\varepsilon > 0$ в силу свойства непрерывности остаточный спрос $D(p(\bar{s}||s^a), \tilde{V}(\bar{s}||s^a))$ останется положительным. Следовательно, производитель a продаст товар в объеме V^a и увеличит прибыль (противоречие). Итак, $c^a < p(\bar{s}) \Rightarrow \bar{s}^a = p(\bar{s})$. Далее, $\sum_{a: c^a < p(\bar{s})} V^a \geq D(\tilde{p}) > D(p(\bar{s}))$. Поэтому, если производителей a , для которых $c^a < p(\bar{s})$, по меньшей мере двое, то они не смогут реализовать полностью свои объемы по цене $p(\bar{s})$. Одному из них выгодно отклониться и назначить цену $p(\bar{s}) - \varepsilon$. В результате он увеличит свою прибыль, что противоречит определению ситуации равновесия. ■

Следствие. Если найдутся два производителя a , для которых $c^a < \tilde{p}$, и существует равновесие по Нэшу $\bar{s}$, то $p(\bar{s}) = \tilde{p}$ (см. рис. 19.4).

Упражнение 19.4. В условиях предыдущего следствия дополнительно предположим, что $S^+(\tilde{p}) > D(\tilde{p})$ (см. рис. 19.5). Докажите, что для производителя a , имеющего удельную себестоимость $c^a = \tilde{p}$, выполнено неравенство $V^a \leq S^+(\tilde{p}) - D(\tilde{p})$.




Рис. 19.5




Рис. 19.6

Теперь сформулируем достаточные условия существования равновесия по Нэшу.

Утверждение 19.4. Предположим, что

$$\sum_{a:c^a \leq \tilde{p}} V^a - \max_{a:c^a \leq \tilde{p}} V^a \geq D(\tilde{p}). \quad (19.14)$$

Тогда любая ситуация $\bar{s}$, удовлетворяющая условию: $\bar{s}^a = \tilde{p}$, если $c^a \leq \tilde{p}$, является равновесием по Нэшу.

Доказательство. По условию $p(\bar{s}) = \tilde{p}$. Производители a , для которых $\bar{s}^a \geq c^a > \tilde{p}$, ничего не продадут. Отклоняться им от своих стратегий $\bar{s}^a$ не имеет смысла, поскольку их прибыль останется нулевой. Рассмотрим теперь производителей a , для которых $c^a \leq \tilde{p}$. Если один из них увеличит цену до $s^a = \tilde{p} + \varepsilon$, то ничего не продаст, так как по условию (19.14) другие представители этой группы полностью покроют спрос по цене $\tilde{p}$ и остаточный спрос по цене $\tilde{p} + \varepsilon$ будет нулевым. Поэтому увеличивать цену производителю a невыгодно. Уменьшать ее (если $c^a < \tilde{p}$) также не имеет смысла. Действительно, поскольку

$$\sum_{a:c^a < \tilde{p}} V^a \leq S^-(\tilde{p}) \leq D(\tilde{p}),$$

производитель a сможет продать весь свой объем по цене $\tilde{p}$. Итак, $\bar{s}$ — равновесие по Нэшу. ■

Введем обозначение: $\bar{c} = \max_{a:c^a < \tilde{p}} c^a$.

Утверждение 19.5. Предположим, что $S^+(\tilde{p}) = S^-(\tilde{p}) = D(\tilde{p})$ и существуют хотя бы два производителя a_1 и a_2 , для которых $\max[c^{a_1}, c^{a_2}] < \tilde{p}$ (см. рис. 19.4).

1) Пусть $D(p)(p - \bar{c}) \leq D(\tilde{p})(\tilde{p} - \bar{c})$ при $p \in [\tilde{p}, M]$ и

$$D(p, \tilde{V}) \leq D(p)(1 - \sum_{p' < p} \tilde{V}_{p'}/D(p')). \quad (19.15)$$

Тогда любая ситуация $\bar{s}$, удовлетворяющая условию: $\bar{s}^a = \tilde{p}$, если $c^a \leq \tilde{p}$, является равновесием по Нэшу.

2) Пусть в некоторой правой окрестности точки $\tilde{p}$ выполнены неравенства $D(p)(p - \bar{c}) \geq D(\tilde{p})(\tilde{p} - \bar{c})$ и

$$D(p, \tilde{V}) \geq D(p)(1 - \sum_{p' < p} \tilde{V}_{p'}/D(p')), \quad (19.16)$$

при этом хотя бы одно из них строгое. Тогда в модели ценовой конкуренции не существует равновесия по Нэшу.

Доказательство. Из равенства $S^+(\tilde{p}) = S^-(\tilde{p})$ вытекает, что не существует производителей a , для которых $c^a = \tilde{p}$. Далее, равенства $S(\tilde{p}) = \sum_{a:c^a < \tilde{p}} V^a = D(\tilde{p})$ означают, что спрос по цене $\tilde{p}$ будет удовлетворен полностью. Поэтому производитель a , для которого $\bar{s}^a \geq c^a > \tilde{p}$, ничего не продаст. Следовательно, $p(\bar{s}) = \tilde{p}$.

1) Из условия следует, что $D(p)(p - c^a) \leq D(\tilde{p})(\tilde{p} - c^a)$ при $p \in [\tilde{p}, M]$ для всех производителей a , имеющих удельную себестоимость $c^a < \tilde{p}$. Действительно, при $p > \tilde{p}$ из неравенства $D(p)(p - \bar{c}) \leq D(\tilde{p})(\tilde{p} - \bar{c})$ получаем

$$D(p)p - D(\tilde{p})\tilde{p} \leq \bar{c}(D(p) - D(\tilde{p})) \leq c^a(D(p) - D(\tilde{p})).$$

Отсюда $D(p)(p - c^a) \leq D(\tilde{p})(\tilde{p} - c^a)$.

Рассмотрим производителя a , такого, что $c^a < \tilde{p}$. Ему невыгодно снижать цену $\bar{s}^a = \tilde{p}$, поскольку он продаст весь свой объем V^a и по цене $\tilde{p}$. Ему невыгодно выбирать и более высокую цену $s^a > \tilde{p}$, так как

$$\begin{aligned} u^a(\bar{s}||s^a) &= (s^a - c^a)D(s^a, \tilde{V}(\bar{s}||s^a)) \leq (s^a - c^a)D(s^a)(1 - \tilde{V}_{\tilde{p}}(\bar{s}||s^a)/D(\tilde{p})) = \\ &= (s^a - c^a)D(s^a)\left(1 - \sum_{b \in A \setminus \{a\}} V^b / \sum_{b \in A} V^b\right) = \\ &= (s^a - c^a)D(s^a)V^a / \sum_{b \in A} V^b \leq (\tilde{p} - c^a)D(\tilde{p})V^a / \sum_{b \in A} V^b = u^a(\bar{s}). \end{aligned}$$

2) Предположим, что существует равновесие по Нэшу $\bar{s}$. Рассмотрим производителя, имеющего удельную себестоимость $c^a = \bar{c} < \tilde{p}$. При назначении новой цены $s^a = \tilde{p} + \varepsilon$ его прибыль будет равна

$$\begin{aligned} u^a(\bar{s}||s^a) &= (s^a - \bar{c})D(s^a, \tilde{V}(\bar{s}||s^a)) \geq (s^a - \bar{c})D(s^a)(1 - \tilde{V}_{\tilde{p}}(\bar{s}||s^a)/D(\tilde{p})) = \\ &= (s^a - \bar{c})D(s^a)V^a / \sum_{b \in A} V^b \geq (\tilde{p} - \bar{c})D(\tilde{p})V^a / \sum_{b \in A} V^b = u^a(\bar{s}), \end{aligned}$$

при этом одно из последних двух неравенств выполнено как строгое. Следовательно, получено противоречие с тем, что ситуация $\bar{s}$ является равновесием по Нэшу. ■

Цену p^* и набор объемов $\bar{v}^a$, $a \in A$, отвечающих равновесию по Нэшу в модели Курно, назовем *исходом по Курно*. Из доказательства утверждения 19.5 вытекает, что в его условиях исход по Курно не является равновесием по Нэшу в модели ценовой конкуренции, если можно одновременно менять цену и объем предлагаемого товара. Действительно, если $D(p) = K/p$, $c^a \equiv c$, $V^a \equiv V \leq K(m-1)/(cm^2)$, то согласно утверждению 19.2, в модели Курно существует равновесие по Нэшу $\bar{v} = (V, \dots, V)$ с ценой $p^* = \tilde{p}$. Но по второй части утверждения 19.5 в модели ценовой конкуренции $\bar{s} = (p^*, \dots, p^*)$ не является ситуацией равновесия.

Рассмотрим также модели с последовательным выбором цен и объемов. Пусть на первом этапе производители одновременно назначают цены $s^a \geq c^a$, а на втором определяют объемы выпуска $v^a \in [0, V^a]$, зная цены s^a , $a \in A$. Покажем, что на втором этапе оптимальный выбор (решение по доминированию) соответствует объемам продаж в рассмотренной модели ценовой конкуренции. Действительно, заметим, что в этой модели функция выигрыша производителя a u^a не убывает по параметру V^a при фиксированных остальных переменных. Поэтому стратегия игрока a (s^a, V^a) слабо доминирует любую его стратегию (s^a, v^a) , где $v^a < V^a$. Таким образом, данный случай двухэтапной игры эквивалентен модели ценовой конкуренции.

Предположим теперь, что цены и объемы выбираются в обратном порядке: на первом этапе производители устанавливают фиксированные объемы $v^a \in [0, V^a]$, а на втором — цены $s^a \geq c^a$, зная объемы v^a , $a \in A$. Прибыль, получаемая производителем a равна $\hat{v}^a s^a - c^a v^a$, где $\hat{v}^a$ — объем реализованной продукции, определяемый (остаточным) спросом по цене s^a . Заметим, что на втором этапе оптимизация этой прибыли не зависит от издержек $c^a v^a$ (объемы v^a были выбраны на первом этапе и не меняются). Поэтому на втором этапе игроки фактически действуют в рамках модели ценовой конкуренции с нулевыми удельными себестоимостями.

Тогда справедливо следующее утверждение.

Утверждение 19.6. 1) Пусть при достаточно малых p выполнено неравенство $D(p) > \sum_{a \in A} V^a$. Если $e(D(p)) \geq 1$ при $p \in [\tilde{p}, M]$ и для функции остаточного спроса выполнено условие (19.15), то совершенные подыгровые равновесия в рассматриваемой двухэтапной игре однозначно соответствуют равновесиям в модели Курно.

2) Пусть для функций спроса и остаточного спроса при $p \in [\tilde{p}, M]$ выполнены неравенства $D(p)p \geq D(\tilde{p})\tilde{p}$ и (19.16), причем хотя бы одно из

них строгое. Тогда совершенного подыгрового равновесия в двухэтапной игре не существует.

Доказательство. Пусть выбраны v^a , $a \in A$. Функция предложения определяется этими объемами. Поэтому цена конкурентного равновесия $\tilde{p}(v)$ зависит от вектора v . Как отмечалось выше, на втором этапе удельные себестоимости можно считать нулевыми. Поэтому равновесная цена $\tilde{p}(v)$ однозначно определяется из условия $D(p) = \sum_{a \in A} v^a$ (см. рис. 19.6).

1) Условие $e(D(p)) \geq 1$ гарантирует выполнение неравенства $D(p)p \leq D(\tilde{p})\tilde{p}$ при $p \in [\tilde{p}, M]$. Поэтому все условия первой части утверждения 19.5 выполнены. Из него вытекает, что в рассматриваемой подыгре существует единственное равновесие по Нэшу, соответствующее ситуации $\bar{s}$, для которой $\bar{s}^a = \tilde{p}(v^a, a \in A) \quad \forall a \in A$. Таким образом, первый этап эквивалентен модели Курно.

2) Согласно второй части утверждения 19.5, равновесия по Нэшу на втором этапе не существует ни при каком выборе $v^a \in [0, V^a]$. ■

Таким образом, двухэтапная модель сводится к модели Курно. Для каких товаров выполнены условия последнего утверждения? Для тех, спрос на которые эластичен и производство которых нельзя осуществлять по мере поступления заказов, а также нельзя без значительных издержек долго держать их на складе. В качестве примера отметим импортные фрукты. Для большинства же товаров указанные условия не выполнены.

§ 20. Налоговое регулирование

Создание эффективно функционирующей системы налогообложения является одной из наиболее актуальных задач для стран, в которых развивается рыночная экономика. Бюджетный сектор экономики, существующий в основном за счет налоговых сборов, выполняет ряд важных функций. Прежде всего, он обеспечивает производство товаров и услуг, которые не может эффективно производить рынок. Некоторые из этих услуг необходимы для функционирования рыночной экономики. В частности, к ним относятся защита прав собственности и обеспечение выполнения заключенных сделок. Если эти условия не обеспечены, то эффективность экономического рынка резко снижается: большие ресурсы расходуются на захват чужой собственности и/или защиту от грабежа и обмана.

Бюджетный сектор производит также другие товары и услуги, отно-

сящиеся к так называемым общественным благам. Их специфика состоит в том, что невозможно или очень дорого распределять их с помощью рыночного механизма, т.е. продавая индивидуальным потребителям. Известными примерами общественных благ являются маяки, радио- и теле-трансляторы, дорожная инфраструктура. К другому типу общественных благ относятся услуги, которые целесообразно предоставить определенной части населения независимо от покупательной способности отдельных потребителей. Во многих странах в эту категорию входят определенный уровень образования, здравоохранение и информационного обеспечения населения. Целесообразный уровень обеспечения такими услугами определяется государственными органами, исходя как из экономических, так и внеэкономических соображений. Например, определенный уровень культуры и знаний населения может рассматриваться как самостоятельная ценность вне зависимости от потребностей экономического рынка.

Основной источник доходов государства — налоги. В качестве примера рассмотрим структуру бюджета США за 1987г. Национальный доход США составил 4 трлн. 527 млрд. долларов. Доходы федерального бюджета: 854 млрд. долларов. Источники дохода: 46% — подоходный налог с физических лиц, 35% — начисление с зарплаты, 10% — налог на прибыль с корпораций, 4% — акцизы, 5% — таможенные сборы. Расходы: 1 трлн. 4 млрд. долларов. Статьи расходов: 40% — социальная помощь, 28% — национальная оборона, 14% — погашение государственного долга, 7% — государственное образование и медицинские учреждения, 7% — развитие транспортной сети, 4% — субсидии фермерам.

Рассмотрим основные виды налогов и их влияние на поведение производителей на конкурентном рынке.

Налог с продаж

Налог с продаж взимается с товаров, которые продаются конечному потребителю. Налог с продаж характеризуется ставкой $t_s \in [0, 1]$, показывающей, какая часть стоимости товара должна поступать в государственный бюджет. Посмотрим как налог с продаж влияет на функции прибыли и предложения.

Без налога с продаж

$$Pr^a(p, V) = pV - C(V) - \text{функция прибыли,}$$

$$S^a(p) = \text{Arg} \max_{V \geq 0} Pr^a(p, V) - \text{функция предложения.}$$

С налогом с продаж функции прибыли и предложения равны

$$Pr^a(p, V, t_s) = (1 - t_s)pV - C(V),$$

$$S^a(p, t_s) = \operatorname{Arg} \max_{V \geq 0} Pr^a(p, V, t_s) = S^a(p(1 - t_s)).$$

Отсюда следует, что график функции предложения растягивается в по оси p в $1/(1 - t_s)$ раз (см. рис. 20.1).




Рис. 20.1

Поскольку функция $S^a(p)$ монотонно не убывает по p , то $S^a(p, t_s) \leq S^a(p)$. То же самое справедливо для совокупной функции предложения отрасли $S(p) = \sum_{a \in A} S^a(p)$, т.е. $S(p, t_s) \leq S(p)$. Если собранные налоги не влияют на функцию спроса, т.е. эти деньги идут на другие нужды, то равновесная цена не убывает по t_s .

Акцизный налог

Акцизный налог берется не с объема выручки, а с каждой единицы товара (сигареты, спиртное и т.п.). Ставка акцизного налога t_e показывает, сколько надо заплатить в бюджет с каждой единицы проданной продукции. Рассмотрим влияние этого налога на функции прибыли и предложения

$$Pr^a(p, V, t_e) = (p - t_e)V - C(V),$$

$$S^a(p, t_e) = \operatorname{Arg} \max_{V \geq 0} Pr^a(p, V, t_e) = S^a(p - t_e).$$

Таким образом, график функции предложения смещается вправо на t_e единиц.

Налог на прибыль

Ставка налога на прибыль $t_{pr} \in [0, 1]$ показывает, какая часть прибыли должна поступить в бюджет. Функция прибыли меняется следующим

образом:

$$Pr^a(p, V, t_{pr}) = (1 - t_{pr})(pV - C(V)) = (1 - t_{pr})Pr^a(p, V),$$

а функция предложения останется неизменной:

$$S^a(p, t_{pr}) = \operatorname{Arg} \max_{V \geq 0} (1 - t_{pr})Pr^a(p, V) = S^a(p).$$

Это относится к краткосрочному анализу, в то же время в долгосрочном плане налог на прибыль может оказать существенное влияние на равновесие в отрасли. Этот налог делает менее выгодными инвестиции в строительство новых мощностей и поддержание старых мощностей. С течением времени функция предложения может начать уменьшаться, так как старое оборудование будет выходить из строя, а новое покупать будет невыгодно. Введение высокого налога на прибыль ведет к тому, что из отраслей, где легко взимать налог на прибыль, капитал перетекает в отрасли, где легче скрывать прибыль от налогов. Итак, введение высокого налога на прибыль способствует развитию теневой экономики.

Таким образом, в долгосрочном плане налог на прибыль оказывает влияние на функцию предложения, и даже в краткосрочном плане он ведет к перетеканию капитала в теневой сектор.

Налог на добавленную стоимость (НДС)

Когда рассчитывается налог на прибыль, то из выручки от продажи вычитаются все издержки. НДС отличается тем, что при расчете базы налогообложения вычитаются не все издержки. Рассмотрим подробнее структуру издержек предприятия. Их можно представить в виде $C(V) = C_1(V) + C_2(V)$, где $C_1(V)$ — это расходы на приобретения сырья и прочих необходимых для производства товаров, выпущенных другими производителями, а $C_2(V)$ — это внутренние затраты на данном предприятии, прежде всего — заработная плата (а также некоторые другие виды издержек, в частности, расходы на рекламу).

Когда рассчитывается база НДС, из *выручки* pV вычитаются издержки первого типа $C_1(V)$. Это гарантирует, что каждый произведенный в экономике товар облагается НДС только один раз. Величина НДС равна $t_{VAT}(pV - C_1(V))$, где $t_{VAT} \in [0, 1]$ — ставка НДС. При этом прибыль предприятия составляет

$$Pr^a(p, V, t_{VAT}) = pV - C(V) - t_{VAT}(pV - C_1(V)) =$$

$$= (1 - t_{VAT})(pV - C_1(V)) - C_2(V).$$

НДС занимает промежуточное положение между налогом с продаж и налогом на прибыль. Он оказывает определенное влияние на функцию предложения, снижая ее, но какое именно — зависит от соотношения $C_1(V)$ и $C_2(V)$.

Подходный налог

Этот налог в отличие от всех предыдущих относится не к производителям, а к потребителям. *Предельная ставка* подоходного налога $t_i(I) \in [0, 1]$ показывает, какая часть дохода I должна быть уплачена в виде налога. Типичный вид налога соответствует кусочно-постоянной неубывающей предельной ставке налога (см. рис. 20.2).




Рис. 20.2




Рис. 20.3

Здесь I_1 — налогонеоблагаемый минимум. Сейчас в России действует более простая схема налогообложения: весь доход свыше I_1 облагается по ставке 13% (см. рис. 20.3).

В бюджете России, в отличие от США, подоходный налог дает небольшую долю (10%), а наиболее важными являются НДС, акцизы и налог на прибыль.

Расчет ставки налога

В настоящее время развитие рыночных отношений в России происходит в условиях резкого сокращения реальной заработной платы в важнейших бюджетных отраслях. В результате значительная часть наиболее энергичных и способных работников уходят из государственных систем образования, здравоохранения, науки и культуры. Этот процесс представляет серьезную угрозу для будущего России. Таким образом, повышение реальной заработной платы работников бюджетной сферы является весьма актуальной задачей. Источником для покрытия расходов бюджета могут служить налоговые поступления. Рассмотрим соответствующую задачу расчета ставки налога с продаж для модели однопродуктовой экономики. Пусть $S(p)$ — функция предложения товара, $D_1(p)$

— функция спроса части населения, относящейся к рыночному сектору, $Q_2(p)$ — доходы населения, относящегося к бюджетному сектору, из внебюджетных источников, $\bar{D}_2$ — желательный объем потребления для этой части населения. Предположим, что функции $S(p)$ и $D_1(p)$ — однозначные. Тогда в отсутствие налога равновесная цена определяется из условия $S(\tilde{p}) = D_1(\tilde{p}) + Q_2(\tilde{p})/\tilde{p}$.

Необходимость введения налога возникает в случае, если $Q_2(\tilde{p}) < \tilde{p}\bar{D}_2$. Пусть $\tilde{p}(t_s)$ — равновесная цена при ставке налога с продаж t_s . Для расчета необходимой ставки получаем следующую систему уравнений:

$$\begin{aligned} S(\tilde{p}(t_s)(1 - t_s)) &= D_1(\tilde{p}(t_s)) + \bar{D}_2, \\ \tilde{p}(t_s)\bar{D}_2 &= Q_2(\tilde{p}(t_s)) + t_s S(\tilde{p}(t_s)(1 - t_s))\tilde{p}(t_s). \end{aligned}$$

Эта система позволяет определить нужное значение ставки t_s и соответствующую цену $\tilde{p}(t_s)$ в общих предположениях относительно параметров модели. В частности, если спрос рыночного сектора является неэластичным ($D_1(p) \equiv \bar{D}_1$), а внебюджетный доход бюджетников пропорционален цене ($Q_2(p) = Kp$), то

$$t_s = (\bar{D}_2 - K)/(\bar{D}_1 + \bar{D}_2), \quad \tilde{p}(t_s) = S^{-1}(\bar{D}_1 + \bar{D}_2)/(1 - t_s).$$

Упражнение 20.1. Построить и исследовать аналогичные модели для расчета ставок акцизного налога и налога на прибыль.

Однако на практике налоговых поступлений часто оказывается недостаточно. В этом случае традиционные методы регулирования рыночной экономики, разработанные Кейнсом и его последователями (см.[2]), предусматривают единственный способ решения: увеличение номинальной зарплаты. Связанный с этим рост бюджетных расходов ведет к усилению инфляции, спекулятивному характеру экономической активности.

Альтернативой является рост предложения дешевых потребительских товаров и снижение рыночных цен. Одна из возможностей регулирования предложения — это товарные интервенции. Государственные и региональные органы управления осуществляют их путем закупки товаров на внешнем рынке (либо по специальным договорам с местными предприятиями) и перепродажи потребителям по сниженным ценам. Другой путь — выделение предприятиям субсидий или льготных кредитов для внедрения технологий с низкими себестоимостями. Следующая модель посвящена поиску оптимальной стратегии, позволяющей обеспечить некоторый фиксированный уровень потребления для людей, основной доход

которых представляют выплаты из бюджета (зарплаты, стипендии, пенсии и т.п.). Оптимальное определение этого уровня представляет самостоятельную проблему, которая здесь не обсуждается. Мы рассматриваем стратегии, сочетающие оба указанных подхода: повышение номинальных доходов и дотирование производства более дешевых товаров — и определяем оптимальное их сочетание. При этом решается задача минимизации общих расходов бюджета. Такая постановка наиболее оправдана на региональном уровне, на который падает большая часть расходов по финансированию бюджетных отраслей. Именно для этого уровня формулируется и изучается описанная задача.

Рассмотрим следующий рынок с одним товаром. Пусть A — конечное множество фирм, поставляющих товар. Каждая фирма a располагает набором производственных мощностей I^a . Мощность $i \in I^a$ характеризуется максимальным объемом V_i и постоянной удельной себестоимостью c_i единицы продукции. Каждая фирма стремится к максимальной прибыли. Все доступные мощности могут использоваться одновременно.

Функция предложения $S_i(p)$ указывает количество товара, выпускаемого на мощности типа i в зависимости от цены p , и имеет вид

$$S_i(p) = \begin{cases} 0, & p < c_i, \\ [0, V_i], & p = c_i, \\ V_i, & p > c_i. \end{cases}$$

Общий объем поставок товара на рынок задается функцией

$$S(p) = \sum_{a \in A} \sum_{i \in I^a} S_i(p).$$

Население региона делится на две группы — *независимую* и *зависимую* — следующим образом. Индивидуумы первой группы относятся к частной сфере экономики и самостоятельно обеспечивают себя товаром. Для зависимых жителей региона основным источником дохода является бюджет, и задача администрации — обеспечить определенный уровень потребления этих жителей. Для упрощения модели зависимая группа предполагается однородной.

Пусть функция $D_1(p)$ определяет спрос на товар со стороны первой (независимой) группы. Доход зависимой группы из прочих источников, кроме регионального бюджета, задается функцией $pD_2(p)$. Весь этот доход вместе с выплатами из бюджета, или *субсидиями*, расходуется на приобретение товара. Таким образом, спрос на товар со стороны зависимой группы составляет $D_2(K, p) = D_2(p) + K/p$, где K — объем субсидий. Цена $\tilde{p}(K)$ на рынке определяется из условия баланса спроса и предло-

жения:

$$D_1(p) + D_2(K, p) \in S(p). \quad (20.1)$$

Функции спроса $D_1(p)$ и $D_2(p)$ предполагаются дифференцируемыми и невозрастающими.

Пусть $\bar{D}_2$ — желательный уровень потребления зависимой группы. В отсутствие субсидий, т. е. при $K = 0$, равновесная цена $\tilde{p}(0)$ удовлетворяют условию $D_2(\tilde{p}(0)) < \bar{D}_2$ (в противном случае указанный уровень потребления достигается без вмешательства администрации).

Обозначим через $Q_l(p) = pD_l(p)$ спрос в денежном выражении по цене p для l -ой группы населения, $l = 1, 2$, а через $K_D(p)$ объем субсидий, необходимых для того, чтобы зависимая группа могла приобрести товар в количестве $\bar{D}_2$ по цене p . Тогда

$$K_D(p) = (\bar{D}_2 - D_2(p))p = \bar{D}_2 p - Q_2(p). \quad (20.2)$$

Пусть p_s — цена, для которой $D_1(p_s) + \bar{D}_2 \in S(p_s)$ (рис. 20.4).




Рис. 20.4

Для того, чтобы обеспечить за счет субсидий желательный уровень потребления зависимой группы, следует выделить их в объеме

$$K_D(p_s) = (\bar{D}_2 - D_2(p_s))p_s.$$

Другой путь повышения уровня потребления зависимой группы связан с изменением предложения товара на рынке.

Рассмотрим некоторую цену $p < p_s$. Если администрация обеспечит дополнительное предложение товара в объеме $D_1(p) + \bar{D}_2 - S(p)$ по этой цене и одновременно выделит субсидии зависимой группе в размере $K_D(p)$, то p окажется новой равновесной ценой. Общее значение спроса и предложения составит $D_1(p) + \bar{D}_2$ и будет достигнут желаемый уровень потребления зависимой группы. Дополнительное предложение

можно обеспечить, заключая с предприятиями договоры, предусматривающие выпуск продукции на мощностях, для которых себестоимость $c_i > p$. При этом оплата осуществляется по себестоимости. (Она фактически и определена выше как минимальная цена, обеспечивающая прибыльность использования данной мощности). Практически, договор может предусматривать, например, доплату за работу в вечерние и ночные часы или выходные. Отметим, что при реализации такого договора необходим контроль, исключающий возможность фактического выпуска поставляемого товара на мощностях с низкими себестоимостями.

Возможный вариант — закупка администрацией товара на внешнем рынке. В этом случае себестоимость включает расходы на доставку. Предполагается, что функция предложения $S(p)$ отражает все указанные возможности.

Определим, какова минимальная величина $K_s(p)$ расходов администрации на дополнительное предложение товара по цене p в количестве $D_1(p) + \bar{D}_2 - S(p)$. Пусть технологии перенумерованы в порядке возрастания себестоимости: $c_1 \leq c_2 \leq \dots \leq c_m$, а мощности $i(p), j(p)$ определяются из условий

$$i(p) = \max\{i \mid c_i \leq p\}, \quad \sum_{i < j(p)} V_i < \bar{D}_1(p) + \bar{D}_2 \leq \sum_{i \leq j(p)} V_i.$$

Тогда следует заключить договоры на полную загрузку мощностей $i(p) + 1, \dots, j(p) - 1$, а на мощности $j(p)$ — обеспечить выпуск в количестве

$$\bar{V}_{j(p)}(p) = D_1(p) + \bar{D}_2 - \sum_{i < j(p)} V_i$$

(см. рис. 20.4). Размер необходимых дотаций составит

$$K_s(p) = \sum_{i=i(p)+1}^{j(p)} \bar{V}_i(p)(c_i - p),$$

где $\bar{V}_i(p) = V_i$, $i = i(p) + 1, \dots, j(p) - 1$.

Введя обозначение $q(p) = c_{j(p)}$, можно переписать это выражение в интегральной форме

$$K_s(p) = \int_p^{q(p)} (D_1(p) + \bar{D}_2 - S(\bar{p})) d\bar{p} =$$

$$= (D_1(p) + \bar{D}_2)(q(p) - p) - \int_p^{q(p)} S(\bar{p}) d\bar{p}. \quad (20.3)$$

Отметим, что $q(p)$ — кусочно-постоянная невозрастающая функция, имеющая разрывы в точках p_k , получаемых из уравнений

$$D_1(p) + \bar{D}_2 = \sum_{i=1}^k V_i, \quad k = 1, \dots, m.$$

Далее, $D_1(p) + \bar{D}_2 - S(\bar{p}) > 0$ при $\bar{p} \in [p, q(p))$. Отсюда следует, что функция $K_s(p)$ непрерывная и убывающая.

Обозначим через p_D цену, по которой зависимая группа в состоянии без субсидий приобрести товар в количестве $\bar{D}_2$, т.е. $D_2(p_D) = \bar{D}_2$. Администрации, очевидно, нет смысла поддерживать новую равновесную цену ниже p_D . Таким образом, любая рациональная стратегия финансирования зависимой группы полностью определяется выбором цены $p \in [p_D, p_s]$, которую администрация региона поддерживает как равновесную. Задача выбора оптимальной стратегии сводится к поиску

$$p^* \in \text{Arg} \min_{p \in [p_D, p_s]} K(p), \quad (20.4)$$

где $K(p) = K_D(p) + K_s(p)$, а $K_D(p)$ и $K_s(p)$ определяются согласно (20.2) и (20.3).

Отметим, что функция $K(p)$ имеет производную

$$\dot{K}(p) = S(p) + \dot{D}_1(p)(q(p) - p) - D_1(p) - \dot{Q}_2(p) \quad (20.5)$$

всюду, за исключением точек $p = c_i$, $i = 1, \dots, m$, и точек скачков функции $q(p)$. В этих точках p производная имеет разрывы первого рода, причем $\dot{K}_+(p) > \dot{K}_-(p)$. В дальнейшем будем более коротко говорить, что функция $\dot{K}(p)$ определена почти всюду.

Упражнение 20.2. Покажите, что если для суммарного спроса $D(p) = D_1(p) + D_2(p) + K/p$ эластичность $e(D(p)) = |p\dot{D}(p)/D(p)| < 1$, то $\dot{Q}_1(p) + \dot{Q}_2(p) > 0$ при всех $p \in [p_D, p_s]$.

Упражнение 20.3. Покажите, что если $\ddot{D}_1(p) \geq 0$, а $\dot{Q}_2(p) \leq 0$, то функция $K(p)$ выпукла, и необходимое условие ее минимума $\dot{K}_-(p^*) \leq 0$, $\dot{K}_+(p^*) \geq 0$ является также и достаточным условием.

Теорема 20.1. Любое решение p^* задачи (20.4) удовлетворяет неравенству $p^* \leq p_s$. В зависимости от функций спроса $D_1(p)$, $D_2(p)$ оптимальная цена p^* обладает следующими свойствами.

1) Пусть спрос $D_1(p)$ на отрезке $[p_D, p_s]$ постоянен. Если денежный спрос $Q_2(p)$ на этом отрезке также постоянен, то оптимальная цена p^* совпадает с ценой равновесия $\tilde{p}$ для рынка с одной (независимой) группой потребителей и определяется из условия $D_1 \in S(\tilde{p})$. Если функция $Q_2(p)$ возрастает на отрезке $[p_D, p_s]$, то $p^* > \tilde{p}$, а если убывает, то $p^* < \tilde{p}$.

2) Пусть спрос каждой группы складывается из постоянной и убывающей составляющих: $D_l(p) = A_l + B_l/p$, $l = 1, 2$, $p \in [p_D, p_s]$. Тогда оптимальная цена определяется из условия

$$A_1 + A_2 + q(p^*)B_1/(p^*)^2 \in S(p^*).$$

Доказательство. Поскольку $S^+(p_s) \geq D_1(p_s) + \bar{D}_2 > D_1(p_s) + D_2(p_s)$, $q(p_s) = p_s$, то из соотношения (20.5) следует, что $\dot{K}(p) > 0$ в правой полуокрестности точки p_s , откуда $p^* \leq p_s$. Если $D_1(p) \equiv D_1$, то из (20.5) следует равенство $\dot{K}(p) = S(p) - D_1 - Q_2(p)$ почти всюду, откуда вытекает утверждение 1). В условиях 2) функция $\dot{K}(p) = S(p) - A_1 - A_2 - q(p)B_1/p^2$ определена почти всюду и монотонно возрастает на области определения. Рассмотрим соответствующее ей отображение $\dot{K}(p)$, $p \in [p_D, p_s]$, определяя его значение в каждой точке разрыва как отрезок от левого до правого предела. В силу монотонности функции $K(p)$ найдется единственная точка p^* , для которой $0 \in \dot{K}(p^*)$. Эта точка и будет решением задачи (20.4). ■

Отметим, что оптимальное сочетание субсидий населению и дотаций промышленности может существенно сократить общие расходы бюджета по сравнению с ситуацией, когда из бюджета финансируется только спрос зависимой группы. В примере, изображенном на рис. 20.5, предполагается, что $D_1(p) \equiv D_1$, $D_2(p) \equiv 0$.




Рис. 20.5

Площади заштрихованных областей на графиках а) и б) показывают затраты бюджета при оптимальной стратегии $p^* = \tilde{p}$ и при $p^* = p_s$ соответственно.

Рассмотрим теперь другую возможность изменения предложения — предоставление дотаций для создания новых мощностей. Каждая потенциальная мощность i характеризуется следующими параметрами: максимальным объемом производства V_i , удельной себестоимостью производства $\hat{c}_i$ и капиталоемкостью k_i . Для простоты мы предполагаем, что необходимые капиталовложения пропорциональны вводимому в действие объему $\bar{V}_i \leq V_i$ и составляют $\bar{V}_i k_i$.

Поскольку целью администрации является минимизация текущих расходов бюджета, то оптимальным является смешанное финансирование новой мощности. Определим необходимый размер дотации, обеспечивающий "рыночную" норму η прибыли на вложение частного капитала. Пусть $\tilde{k}_i$ — объем дотаций на единицу вводимой мощности, p — цена на товар. Тогда минимальный размер дотации определяется из соотношения $(p - \hat{c}_i + \tilde{k}_i)/k_i = \eta$, откуда $\tilde{k}_i = \hat{c}_i + k_i \eta - p$.

Таким образом, полагая для потенциальных мощностей $c_i = \hat{c}_i + k_i \eta$, мы формально сводим задачу выбора оптимальной стратегии к рассмотренной выше задаче (20.4). Исходя из этого, ниже мы рассматриваем в моделях только реальные мощности. Следует, однако иметь в виду, что на практике при конкуренции реальных и потенциальных мощностей существенными могут оказаться и другие критерии, помимо минимизации бюджетных расходов.

§ 21. Модели организации налоговой инспекции

В этом параграфе изложено несколько теоретико-игровых моделей, построенных для изучения проблем уклонения от уплаты налогов и коррупции в налоговой инспекции. Рассматривается взаимодействие налогоплательщиков, имеющих случайный доход, и центра. Считается, что в конце каждого отчетного периода налогоплательщик подает налоговую декларацию. Декларированный доход облагается налогом в соответствии с действующей системой налогообложения. При этом налогоплательщик может попробовать уклониться от уплаты налога, декларировав меньшую сумму, чем его реальный доход. В случае проверки налоговой декларации факт попытки уклонения всегда определяется инспектором. Пойманный нарушитель оплачивает недостающую часть налоговой суммы и наказы-

вается штрафом.

Предполагается, что налоговая проверка требует определенных издержек и что центр заинтересован в максимизации чистого налогового сбора (т.е. средств, полученных за счет сбора налогов и штрафов за вычетом издержек на проверки). Для однородной группы налогоплательщиков центр располагает лишь информацией, полученной из налоговых деклараций, и в зависимости от нее определяет оптимальную вероятность проверок налоговых деклараций. Задачей является нахождение оптимального правила проверки.

Модель налогообложения с двумя уровнями дохода

Рассмотрим модель с двумя возможными уровнями дохода I_L и I_H , где $I_L < I_H$. Налогоплательщики получают низкий и высокий доходы I_L и I_H с вероятностями q и $1 - q$ соответственно. Низкий доход не облагается, а с высокого берется налог T . Таким образом, налогоплательщик с высоким доходом имеет стимул декларировать низкий доход. Чтобы предотвратить такие действия налогоплательщика, налоговая инспекция с вероятностью p проверяет налогоплательщиков, декларирующих низкий доход. Если налогоплательщик с высоким доходом декларирует низкий доход I_L и его декларация проверяется, то факт уклонения от уплаты налога всегда обнаруживается, и налогоплательщик должен выплатить штраф F , включающий неуплаченный налог. Стоимость проверки равна c . Задача руководства налоговой инспекции состоит в том, чтобы найти оптимальную вероятность p проверки деклараций, указывающих низкий доход I_L . При этом максимизируется чистый налоговый сбор R , т.е. все поступления от налогов и штрафов за вычетом затрат на проверки.

Опишем поведение налогоплательщика. Он выбирает свою стратегию из множества $\{I_L, I_H\}$ при получении высокого дохода. Предполагается, что налогоплательщику известна стратегия p налоговой инспекции, и он максимизирует свой ожидаемый доход, сравнивая доход при честном поведении $I_H - T$ и уклонении от налога $I_H - pF$. Таким образом, если вероятность проверки удовлетворяет неравенству $p < \hat{p} \stackrel{def}{=} T/F$, то все налогоплательщики с высоким доходом уклоняются, и чистый налоговый доход государства в расчете на одного налогоплательщика равен $R(p) = p(qF - c)$. Если $p > \hat{p}$, уклонения не происходит, и доход имеет вид $R(p) = qT - p(1 - q)c$ (рис. 21.1).




Рис. 21.1

При вероятности проверки $p = \hat{p}$ налогоплательщику безразлично — уклоняться или нет. В этом случае считается, что он не уклоняется. Таким образом, $\hat{p}$ — *пороговая вероятность*, т.е. минимальная вероятность проверки, обеспечивающая честное поведение налогоплательщиков. Отметим, что данная модель является примером иерархической игры Γ_1 , определенной в § 11.

Утверждение 21.1. Оптимальная вероятность проверки $p^* = \hat{p}$, если $qF > (1 - q)c$. При этом максимальный чистый налоговый доход государства R^* положителен и равен $qT - \hat{p}(1 - q)c$. В противном случае $p^* = 0$, $R^* = 0$, т.е. эту группу налогоплательщиков нет смысла проверять.

Упражнение 21.1. Докажите утверждение 21.1.

Модель, учитывающая случайные ошибки

Теперь предположим, что налогоплательщики с высоким доходом могут непреднамеренно ошибаться и определяют свой доход как низкий с вероятностью m . Такие ошибки не меняют пороговую вероятность проверки, которая поощряет честное поведение налогоплательщиков, оценивших свой доход как высокий: они декларируют высокий доход при $p \geq \hat{p} = T/F$.

Обозначим средний доход налогоплательщика с учетом ошибки через I_{cp} , а чистый налоговый доход государства через $R(p)$. Тогда

$$I_{cp} = \begin{cases} (1 - q)I_L + q(I_H - pF), & p < \hat{p}, \\ (1 - q)I_L + q(I_H - (1 - m)T - mpF), & p \geq \hat{p}, \end{cases}$$

$$R(p) = \begin{cases} p(qF - c), & p < \hat{p}, \\ q[(1 - m)T + pm(F - c)] - (1 - q)pc, & p \geq \hat{p}. \end{cases}$$

Следующее утверждение определяет оптимальную стратегию государства.

Утверждение 21.2. 1) Пусть $qF - c > 0$. Тогда если штраф за уклонение $F > \overline{F} \stackrel{\text{def}}{=} (qm + 1 - q)c/(qm)$, то оптимальная стратегия государства $p^* = 1$. Если $F < \overline{F}$, то оптимальная стратегия государства $p^* = \hat{p}$.

2) Пусть $qF - c < 0$. Тогда оптимальная стратегия государства

$$p^* = \begin{cases} 0, & Fq \leq c(qm + 1 - q), \\ \hat{p}, & Fq \geq c(qm + 1 - q). \end{cases}$$

Доказательство. Вначале заметим, что в точке $\hat{p}$ значение $R(\hat{p}) = qT - \hat{p}c(mq + 1 - q)$ больше левого предельного значения $R_-(\hat{p}) = qT - \hat{p}c$. При $F > \overline{F}$ доход $R(p)$ возрастает по p как на полуинтервале $[0, \hat{p})$, так и на отрезке $[\hat{p}, 1]$. Таким образом, функция $R(p)$ возрастает на отрезке $[0, 1]$ и $p^* = 1$. При $F \in (c/q, \overline{F})$ разница состоит лишь в том, что $R(p)$ убывает на отрезке $[\hat{p}, 1]$ и поэтому $p^* = \hat{p}$. Наконец при $0 < F < c/q$ доход убывает на обоих интервалах, так что максимум достигается на одном из левых концов: при $F > m\overline{F}$ $p^* = \hat{p}$, $R^* = R(\hat{p}) > 0$, при $F < m\overline{F}$ $p^* = 0$, $R^* = 0$. Наконец, при $F = m\overline{F}$ $p^* \in \{\hat{p}, 1\}$, $R^* = 0$. ■

Упражнение 21.2. Найдите оптимальную стратегию государства в следующих случаях: 1) $F = \overline{F}$; 2) $F = c/q$.

Модели с учетом коррупции

Рассмотрим модели, в которых принимается во внимание возможность подкупа инспектора пойманным плательщиком. Исследуем случай двух возможных доходов I_L и I_H ($I_L < I_H$), получаемых с вероятностями $1 - q$ и q соответственно. Как и в предыдущей модели, предполагается, что низкий доход не облагается налогом, а высокий доход облагается налогом T . Таким образом, у налогоплательщиков с доходом I_H есть стимул декларировать доход I_L . Декларация, содержащая низкий доход, может быть проверена налоговой инспекцией. Проверка всегда выявляет реальный доход, ее стоимость равна c . Штраф за уклонение F включает неуплаченную сумму налога. Инспектор, обнаруживший уклонение, может быть подкуплен пойманным плательщиком, в этом случае он скрывает результат проверки. Центр проверяет иногда инспекторов, подтверждающих низкие доходы, и наказывает их, если выясняется, что факт уклонения от уплаты налога был скрыт. (Инспекторов наказывают за плохую работу, а не за взятку, так как ее сложно доказать.) Вероятности p и p_c проверки и перепроверки, проводимой центром, являются его

стратегией. Некачественная проверка наказывается денежным штрафом $\tilde{F}$. Повторная проверка стоит $\tilde{c}$. Центр максимизирует чистый доход в бюджет, состоящий из налогов и штрафов за вычетом издержек на все проверки. Найдем оптимальные значения вероятностей p и p_c и проведем сравнительный анализ дохода в зависимости от размеров штрафов. Сначала рассмотрим, как определяется размер взятки b в случае, когда неплательщик пойман инспектором. Подкуп выгоден налогоплательщику и инспектору, если $b + p_c F < F$ и $b > p_c \tilde{F}$ соответственно. Таким образом, подкуп возможен, если $F(1 - p_c) > p_c \tilde{F}$ или

$$p_c < \hat{p}_c \stackrel{\text{def}}{=} F/(F + \tilde{F}). \quad (21.1)$$

Допустим, что в этом случае $b = \gamma F(1 - p_c) + (1 - \gamma)p_c \tilde{F}$, $\gamma \in (0, 1)$, где параметр γ характеризует близость взятки b к максимуму. В частности, $\gamma \approx 1$ означает, что размер взятки диктует инспектор, $\gamma \approx 0$ показывает, что он довольствуется малым. Налогоплательщик с высоким доходом уклоняется, если $p(b + p_c F) < T$. Если соотношение (21.1) не выполняется, а $p < \hat{p}$, то налогоплательщик уклоняется, но не дает взятки в случае поимки. Среди возможных значений пар (p, p_c) рассмотрим следующие области (рис. 21.2).




Рис. 21.2

a) $p_c < \hat{p}_c$, $p(b + p_c F) = p(\gamma F + p_c(1 - \gamma)(F + \tilde{F})) < T$.

В этом случае налогоплательщик уклоняется, инспекторы берут взятки, и чистый налоговый сбор в расчете на одного налогоплательщика составляет $R(p, p_c) = p[p_c(q(F + \tilde{F}) - \tilde{c}) - c]$.

b) $p_c > \hat{p}_c$, $p < \hat{p}$.

В этом случае налогоплательщики уклоняются, но инспекторы не берут взятки и $R(p, p_c) = p[qF - c - p_c(1 - q)\tilde{c}]$.

c1) $p_c > \hat{p}_c$, $p > \hat{p}$.

c2) $p_c < \hat{p}_c$, $p(b + p_c F) = p(\gamma F + p_c(1 - \gamma)(\tilde{F} + F)) > T$.

В условиях $c1)$ и $c2)$ налогоплательщик не уклоняется и

$$R(p, p_c) = qT - (1 - q)p(c + p_c\tilde{c}).$$

Справедливо следующее утверждение.

Утверждение 21.3. Пусть штрафы F и $\tilde{F}$ подобраны таким образом, что выполнено неравенство

$$\hat{p}_c(q(F + \tilde{F}) - \tilde{c}) - c > 0. \quad (21.2)$$

Тогда в области а) доход в бюджет $R(p, p_c)$ стремится к верхней грани R_a при $p_c \rightarrow \hat{p}_c$ и $p \rightarrow \hat{p}$. Верхние грани R_b и R_{c1} в областях $b)$ и $c1)$ реализуются на тех же последовательностях вероятностей, более того, $R_a < R_b < R_{c1}$. В области $c2)$ те же последовательности вероятностей реализуют верхнюю грань дохода в бюджет

$$R_{c2} = R_{c1} = qT - \hat{p}(c + (1 - q)\hat{p}_c\tilde{c})^a, \text{ если}$$

$$\hat{p}_c < c(1 - \gamma)/(\tilde{c}\gamma), \quad (21.3)$$

в противном случае при $p \rightarrow T/(\gamma F)$ и $p_c = 0$ доход стремится к верхней грани $R_{c2} = qT - (1 - q)cT/(\gamma F)$.

Замечание 1. При оптимальных вероятностях налогоплательщики выплачивают одну и ту же сумму в виде налога в случаях $a)$, $b)$ и $c1)$. Однако издержки на проверки и перепроверки сокращаются при переходе системы из области равновесия $a)$ в $b)$ и из $b)$ в $c1)$.

Замечание 2. Неравенство (21.3) выполняется, в частности, при $\gamma \rightarrow 0$, т.е. в случае когда налогоплательщик диктует размер взятки. При $\gamma \rightarrow 1$, т.е. в случае когда инспектор диктует размер взятки, оптимально не проверять инспекторов и увеличить в $1/\gamma$ вероятность аудиторской проверки. Таким образом, чистый налоговый сбор при оптимальной стратегии аудита составляет

$$R^* = T \left[q - (1 - q) \min \left[\frac{c}{F} + \frac{\tilde{c}}{F + \tilde{F}}, \frac{c}{\gamma F} \right] \right].$$

С учетом этого соотношения сравнительный анализ чистого налогового сбора в зависимости от размера штрафов и налогов дает ясные результаты: R возрастает по T и F , а также по $\tilde{F}$, если выполняется соотношение

$$\frac{\tilde{F}}{F} \geq \frac{\tilde{c}}{c(1/\gamma - 1)^{-1} - 1},$$

и не зависит от $\tilde{F}$, если это соотношение не выполняется.

Если вероятности p и p_c фиксированы, то сравнительный анализ усложняется. Хотя в каждой из областей а), б), с1) и с2) налоговый сбор R монотонен по штрафам и налогу (что соответствует здравому смыслу), переходы из одной области в другую могут внести неожиданные изменения. Рассмотрим два примера.

1) Пусть $p < \hat{p}$, $p_c = \hat{p}_c$. Увеличим слегка штраф $F : F' = F + dF$. В результате система переходит из области б) в область а) и налоговый сбор R падает.

2) Пусть $p_c = \hat{p}_c$, $p = \hat{p}$. В этом случае небольшое увеличение налога влечет переход системы из области с1) в область б) и, как следствие, сокращение налогового сбора R .

Комментарий и библиография к главе IV

§ 16. Концепция конкурентного равновесия лежит в основе современной экономической теории. Согласно известным "теоремам о благосостоянии", конкурентное равновесие является оптимальным состоянием экономики, и отклонение от него связано со снижением ее эффективности. Однако, известное качественное описание условий совершенной конкуренции (см. Л. Вальрас [19], Д. Гейл [35]) не является конструктивным в том смысле, что не позволяет определить для конкретного рынка, выполнены ли эти условия, и если нет, то на сколько могут отклоняться цены от равновесных по Вальрасу. Значительная доля реальных рынков относится к олигополиям: в то время, как любой отдельный потребитель, по-видимому, не обладает рыночной властью и его доля в общем объеме продаж составляет доли процента, наиболее крупный производитель на таких рынках обеспечивает не менее 10% от общего потребления. Поэтому исследования математических моделей и оценки ожидаемого отклонения от состояния конкурентного равновесия для различных типов олигополии представляют большой интерес.

§ 18. Утверждение 18.1 показывает, что в состоянии конкурентного равновесия достигает максимума национальный доход (суммарная прибыль экономики). Состояние конкурентного равновесия является также оптимальным по Парето и, более того, соответствует ядру кооперативной игры (см. [85]). Подробнее о трудностях плановой экономики СССР см. [80].

§ 19. Типичным подходом к оценке ожидаемого отклонения от равно-

весия по Вальрасу является сравнение конкурентного равновесия с решением игры, описывающей олигополистическую конкуренцию. Обычной концепцией решения в этом случае является равновесие по Нэшу в чистых стратегиях. Вопросы существования такого равновесия и его свойств в модели олигополии по Курно рассматривались во работах В. Новчека [77], Н.С. Кукушкина [56], Р. Амира [3] и др. Показано, что при довольно общих условиях существует единственное равновесие по Нэшу. Для симметричной олигополии отклонение равновесного по Нэшу исхода от исхода по Вальрасу убывает и стремится к нулю, когда число производителей возрастает и стремится к бесконечности. Таким образом, модель хорошо соответствует концепции конкурентной экономики по Вальрасу. Она также может являться теоретическим обоснованием антитрестовских законов, ограничивающих максимальную долю продаж на рынке для каждого производителя (см. [64]).

Проблема заключается в том, что в модели Курно на поведение производителей накладываются крайне строгие ограничения. Предполагается, что каждый производитель товара всегда предлагает фиксированный объем товара независимо от сложившейся цены. На практике у каждого производителя имеется больше возможностей влиять на цену. Либо производитель прямо устанавливает цену своей продукции (как на аукционе первой цены), либо стратегиями являются функции предложения, которые определяют цену отсечения (как в случае аукциона заявок). Тем не менее, упомянутые результаты, касающиеся модели Курно, являются важными. Для нескольких типов рынков с ценовой конкуренцией или с конкуренцией функций предложения доказано, что исходы, соответствующие совершенному подыгровому равновесию, совпадают с исходом по Курно. Д. Крепс и Дж. Шейнкман [54] показали это для двухэтапной модели, в которой сначала устанавливаются объемы выпуска, а затем производители действуют в рамках модели ценовой конкуренции. Д. Морено и Л. Убеда [69] получили аналогичный результат для отрасли, где фирмы с идентичной технологией сначала выбирают производственные мощности, а затем конкурируют, устанавливая резервные цены, которые определяют простейшие функции предложения.

Следует отметить, что на большей части реальных рынков каждый производитель может назначить как цену, так и объем выпуска товара. Первая модель такого типа предложена Ж. Бертраном [10] и рассматривает фирмы-производители с одинаковыми и постоянными удельными себестоимостями и неограниченными производственными мощностями.

Предполагается, что продавцы одновременно и независимо назначают цены на предлагаемый товар, а покупатели раскупают его в порядке возрастания цен: сначала продукцию фирм, назначивших минимальную цену, затем, если спрос еще не удовлетворен, продукцию фирм, назначивших следующую по возрастанию цену, и т.д. Выпуск товара производится в соответствии с поступившими заявками. В модели Бертрана равновесные цены по Вальрасу и по Нэшу совпадают между собой и с предельными издержками. Фирмы получают нулевую прибыль. На этом основании модель критиковалась как не соответствующая реальному поведению игроков (см. Б. Ален и М. Хельвиг [2]). Действительно, она не учитывает много важных аспектов, в частности динамического характера торгов, возможности сговора агентов и т.д. Заметим, однако, что эти аргументы никак не могут служить основанием в пользу выбора модели Курно.

Э. Эджворт [110], Ален и Хельвиг [2], а также Х. Вивс [32] рассматривали модель, отличающуюся от предыдущей лишь тем, что каждая фирма характеризуется ограниченной производственной мощностью. Эджворт получил следующее достаточное условие существования равновесия по Нэшу: если суммарная мощность всех производителей за исключением продавца с максимальной производственной мощностью превышает объем спроса по цене, равной удельной себестоимости, то равновесная по Нэшу цена совпадает с ценой конкурентного равновесия и равна удельной себестоимости. В противном случае свойства модели существенно зависят от порядка, в котором потребители получают доступ к предлагаемому товару. Каждый потребитель характеризуется резервной ценой: пока доступная цена на товар не превышает резервную, его спрос постоянен, а по более высоким ценам он не хочет приобретать товар. Исход обмена существенно зависит от того, какие потребители (с более высокими или с более низкими резервными ценами) имеют приоритет при покупке товара. Порядок потребителей определяет функцию остаточного спроса, указывающую спрос на товар в зависимости от цены и от фактического предложения товара по меньшим ценам.

В литературе порядок потребителей часто задается в виде "правила рационирования". Ален и Хельвиг [2] рассматривают "пропорциональное правило рационирования", согласно которому товар по очередной цене предлагается случайной выборке потребителей, и их распределение по резервным ценам совпадает с распределением во всем множестве потребителей. Если в этом случае общая мощность производителей, действующая

щих на рынке, ниже, чем спрос по цене, равной удельной себестоимости, то равновесия по Нэшу в чистых стратегиях в общих предположениях не существует. Аллен и Хельвиг [2] также рассматривают равновесие по Нэшу в смешанных стратегиях. Они характеризуют спектр этого равновесия и показывают, что монопольная цена входит в него с положительной вероятностью. Этот результат подтверждает, что продажные цены в данном случае могут существенно отклоняться как от равновесия Вальраса, так и от равновесия Курно. Отметим, однако, что применение смещенных стратегий на товарных рынках представляется маловероятным. Развернутую критику по этому поводу можно найти в работе Дж. Фридмана [90]. В работе [32] Вивс рассматривал "правило максимизации прибыли потребителя", согласно которому покупатели обслуживаются в порядке убывания резервной цены. В этом случае равновесие по Нэшу, соответствующее конкурентному равновесию, существует при достаточно эластичном спросе.

Указанные результаты показывают, что в довольно общих предположениях в моделях ценовой конкуренции не существует равновесий по Нэшу в чистых стратегиях. А.А. Васин [23] и Т. Борджес [14] рассматривали другой подход к оценке ожидаемого состояния рынка и отклонения от конкурентного равновесия. Он связан с последовательным исключением доминируемых стратегий и исследованием адаптивной динамики цен, в частности, динамики наилучших ответов. Полученные результаты означают, что традиционный подход к оценке степени конкурентности рынка (имеется в виду антимонопольное законодательство — оно гласит, что рынок является конкурентным, если отдельный производитель контролирует небольшую долю продаж) далеко не всегда является адекватным с точки зрения потенциального отклонения рынка от состояния конкурентного равновесия. Во многих случаях на самом деле важно то, насколько быстро растет функция предложения после прохождения цены конкурентного равновесия. Один из результатов заключается в том, что рынок, в котором равновесие устанавливается при максимальной загрузке производственных мощностей, обладает тенденцией к существенному отклонению от состояния конкурентного равновесия, даже если каждый отдельный производитель контролирует небольшую долю рынка. Для некоторых товаров более адекватным описанием рыночной конкуренции считаются модели с последовательным выбором цен и объемов выпуска [90].

Утверждение 19.6 дополняет результат Д. Крепса и Дж. Шейнкмана

[54] о соответствии совершенного подыгрового равновесия исходу Курно в случае приоритета потребителей с большими резервными ценами.

§ 20. Модели оптимального выбора налоговых ставок рассматриваются экономикой общественного сектора (см. А. Аткинсон и Дж. Стиглиц [4], Г. Майлс [62], С.М. Мовшович и др. [66]) В работах А.А. Васина и Е.И. Пановой [24], А.А. Васина и П.А. Васиной [26], А.А. Васина и др. [27] показано, что уклонение от налогов существенно влияет на оптимальный выбор налогов и налоговых ставок.

§ 21. Основной результат, относящийся к оптимальному аудиту прямых налогов, принадлежит И. Санчес и Дж. Собелю [86]. Они рассмотрели группу налогоплательщиков со случайным распределением дохода, заданным положительной плотностью в интервале $[l, h]$. Для любого дохода I налог определяется зависимостью $T(I)$, устанавливаемой правительством. Налог строго возрастает по I . Руководство инспекции устанавливает вероятность проверки $p(I)$ в зависимости от продекларированного дохода I . В случае обнаружения непродекларированного дохода штраф пропорционален недоплаченному налогу с коэффициентом $1 + \pi > 1$ (так как штраф включает недоплаченный налог). Для задачи максимизации чистого налогового дохода работа [86] показывает, что оптимальная стратегия проверок всегда относится к классу "пороговых правил":

$$p^*(I) = \begin{cases} 1/(1 + \pi), & I < \bar{I}, \\ 0, & I \geq \bar{I}. \end{cases}$$

для некоторого $\bar{I} \in [l, h]$. Итак, каждый продекларированный доход $I < \bar{I}$ проверяется с вероятностью $1/(1 + \pi)$ — минимальной вероятностью, при которой невыгодно декларировать I для любого реального дохода $I' > I$.

Ф. Коуэлл и Г. Гордон [51] сравнивают различные доступные стратегии проверок при сборе косвенного налога. Авторы моделируют уклонение от уплаты налогов следующим образом. Фирма-налогоплательщик делает выбор между налогооблагаемой деятельностью и деятельностью в теневом секторе экономики. Если фирма подвергается проверке и выявляется ее деятельность в теневом секторе, то ее обязывают выплатить недостающий налог и наказывают штрафом. Вероятность проверки зависит от декларации по правилу "отсечения", т.е. фирмы, декларирующие доход меньше, чем определенная величина, всегда проверяются. Устанавливаются условия, при которых оптимальный случайный аудит более эффективен, чем оптимальное правило отсечения, и наоборот.

Связь между уклонением от уплаты налогов и коррупцией исследовалась во многих работах (см., например, П. Чандлер и Л. Уайльд [108], А.А. Васин и О.Б. Агапова [25], Л.Е. Соколовский [87]).

Чандлер и Уайльд [108] описывают взаимодействие налоговых инспекторов (аудиторов) и налогоплательщиков так, как это сделано в последнем § 21. Отличие от нашего подхода состоит в том, что вероятность аудиторской проверки определяется равновесными по Нэшу стратегиями игроков, в то время, как вероятность повторной проверки предполагается фиксированной. В нашем подходе (называемом в западной литературе "principal-agent") вероятности проверок (т.е. стратегия центра) не фиксированы и определяются в результате решения иерархической игры Γ_1 .

§ 22. Решение упражнений

2.1. Не может, поскольку число 7 не представимо в виде произведения $k \cdot l$ двух натуральных чисел $k, l \leq 3$.

2.2. При фиксированном x график функции $F(x, y)$ представляет собой параболу ветвями вниз. Поэтому функция минимума

$$W(x) = \min_{-1 \leq y \leq 2} F(x, y) = F(x, y(x)) = \min[F(x, -1), F(x, 2)].$$

Функция наилучшего ответа второго игрока

$$y(x) = \begin{cases} 2, & F(x, -1) \geq F(x, 2) \\ -1, & F(x, -1) < F(x, 2) \end{cases} = \begin{cases} 2, & -1 \leq x \leq 7/4, \\ -1, & 7/4 < x \leq 3. \end{cases}$$

Функция минимума

$$W(x) = \begin{cases} F(x, 2) = -x^2 + 11x - 24, & -1 \leq x \leq 7/4, \\ F(x, -1) = -x^2 - x - 3, & 7/4 < x \leq 3. \end{cases}$$

Отсюда $x^0 = 7/4$ и $\underline{v} = W(x^0) = -125/16$.

Далее, функция максимума $M(y) = \max_{-2 \leq x \leq 3} F(x, y) = F(x(y), y)$. Функция наилучшего ответа первого игрока

$$x(y) = \begin{cases} \bar{x} = (4y + 3)/2, & -1 \leq y \leq 3/4, \\ 3, & 3/4 < y \leq 2, \end{cases}$$

Следовательно,

$$M(y) = \begin{cases} F(\bar{x}, y), & -1 \leq y \leq 3/4, \\ F(3, y), & 3/4 < y \leq 2. \end{cases}$$

Отсюда

$$\bar{v} = \min_{-1 \leq y \leq 2} M(y) = \min[F(\bar{x}|_{y=-1}, -1), F(3, 2)] = -11/4, \quad y^0 = -1.$$

2.3. Докажем, что (x^0, y^0) — ε -седловая точка функции $F(x, y)$. Для любого $y \in Y$ имеем

$$\begin{aligned} F(x^0, y) &\geq \underline{v} = \\ &= \inf_{y \in Y} F(x^0, y) = \bar{v} - \varepsilon = \sup_{x \in X} F(x, y^0) - \varepsilon \geq F(x^0, y^0) - \varepsilon. \end{aligned}$$

Отсюда $F(x^0, y^0) \leq F(x^0, y) + \varepsilon \quad \forall y \in Y$. Второе неравенство из определения ε -седловой точки доказывается аналогично.

2.4. Пусть выполнено равенство (2.4). Положим $v = \bar{v} = \underline{v}$. Для любого $\varepsilon > 0$ возьмем $x^\varepsilon, y^\varepsilon$ — ε -максиминную и ε -минимаксную стратегии, т.е.

$$v - \varepsilon \leq \inf_{y \in Y} F(x^\varepsilon, y), \quad \sup_{x \in X} F(x, y^\varepsilon) \leq v + \varepsilon.$$

Отсюда $v - \varepsilon \leq F(x^\varepsilon, y^\varepsilon) \leq v + \varepsilon$ и при любом $x \in X$

$$F(x, y^\varepsilon) \leq v + \varepsilon \leq F(x^\varepsilon, y^\varepsilon) + 2\varepsilon \Rightarrow F(x, y^\varepsilon) - 2\varepsilon \leq F(x^\varepsilon, y^\varepsilon).$$

Аналогично доказывается неравенство

$$F(x^\varepsilon, y^\varepsilon) \leq F(x^\varepsilon, y) + 2\varepsilon \quad \forall y \in Y.$$

Таким образом, пара $(x^\varepsilon, y^\varepsilon)$ — 2ε -седловая точка функции $F(x, y)$.

Обратно, пусть пара $(x^\varepsilon, y^\varepsilon)$ — ε -седловая точка функции $F(x, y)$. Тогда

$$F(x, y^\varepsilon) - \varepsilon \leq F(x^\varepsilon, y^\varepsilon) \leq F(x^\varepsilon, y) + \varepsilon \quad \forall x \in X, \quad \forall y \in Y.$$

Отсюда следуют неравенства

$$\underline{v} - \varepsilon \leq \bar{v} - \varepsilon \leq \sup_{x \in X} F(x, y^\varepsilon) - \varepsilon \leq \inf_{y \in Y} F(x^\varepsilon, y) + \varepsilon \leq \underline{v} + \varepsilon \leq \bar{v} + \varepsilon$$

и $x^\varepsilon, y^\varepsilon$ — 2ε -максиминная и 2ε -минимаксная стратегии. Кроме того, $\underline{v} \leq \bar{v} \leq \underline{v} + 2\varepsilon$. Поскольку $\varepsilon > 0$ произвольно, получаем, что $\underline{v} = \bar{v}$.

2.5. Возьмем любые две точки $z^{(1)} \neq z^{(2)} \in E^m$ и любое число $\lambda \in (0, 1)$. Тогда неравенство

$$\left(\lambda z_i^{(1)} + (1 - \lambda)z_i^{(2)}\right)^2 \leq \lambda \left(z_i^{(1)}\right)^2 + (1 - \lambda) \left(z_i^{(2)}\right)^2 \quad (22.1)$$

эквивалентно неравенству

$$0 \leq \lambda(1 - \lambda) \left(z_i^{(1)} - z_i^{(2)}\right)^2.$$

Последнее выполняется как строгое, если $z_i^{(1)} \neq z_i^{(2)}$. Суммируя по i неравенства (22.1), получим

$$\sum_{i=1}^m \left(\lambda z_i^{(1)} + (1 - \lambda)z_i^{(2)}\right)^2 < \lambda \sum_{i=1}^m \left(z_i^{(1)}\right)^2 + (1 - \lambda) \sum_{i=1}^m \left(z_i^{(2)}\right)^2,$$

что и означает строгую выпуклость функции $\sum_{i=1}^m z_i^2$.

2.6. Пусть строго выпуклая функция $h(z)$ достигает минимума в точках $z^{(1)} \neq z^{(2)}$ выпуклого компакта $Z \subset E^m$. Тогда $(z^{(1)} + z^{(2)})/2 \in Z$ и из строгой выпуклости функции $h(z)$

$$h((z^{(1)} + z^{(2)})/2) < (h(z^{(1)}) + h(z^{(2)}))/2 = \min_{z \in Z} h(z),$$

что противоречит определению минимума.

3.1. Докажем, что $p^0 = q^0 = (1/2, 1/2)$ — оптимальные смешанные стратегии игроков, а $v = 0$ — значение игры. Действительно, для любых $p \in P$, $q \in Q$

$$A(p, q^0) = \sum_{i=1}^2 \left(\sum_{j=1}^2 a_{ij} q_j^0 \right) p_i \equiv 0 = A(p^0, q^0) \equiv A(p^0, q)$$

и тройка $(p^0, q^0, 0)$ — решение в смешанных стратегиях.

3.2. $L = (a_{11}, \dots, a_{mn}; p_1 q_1, \dots, p_m p_n)$.

3.3. Заметим, что для любой лотереи L $u(L) \in [0, 1]$, а из аксиом VIII и V вытекает, что $L \sim (A_1, A_k; u(L), 1 - u(L))$.

Возьмем две произвольные лотереи L_1 и L_2 . Имеем $L_i \sim (A_1, A_k; u(L_i), 1 - u(L_i))$, $i = 1, 2$. Если $u(L_1) = u(L_2)$, то $L_1 \sim L_2$, а если $u(L_1) > u(L_2)$, то по лемме 3.3 $L_1 \succ L_2$.

Пусть $v(L)$ – другая функция, удовлетворяющая свойствам 1)–3), сформулированным в теореме 3.4. Подберем константы c, b , исходя из равенств $v(A_1) = cu(A_1) + b$, $v(A_k) = cu(A_k) + b$. Отсюда, используя равенства $u(A_1) = 1$, $u(A_k) = 0$, находим, что $c = v(A_1) - v(A_k) > 0$, $b = v(A_k)$.

Для любого $l = 2, \dots, k-1$ имеем $A_l \sim r_l A_1 + (1 - r_l) A_k$. Следовательно, для произвольной лотереи $L = (A_1, \dots, A_k; x_1, \dots, x_k)$

$$\begin{aligned} v(L) &= \sum_{l=1}^k x_l v(A_l) = \sum_{l=1}^k x_l (r_l v(A_1) + (1 - r_l) v(A_k)) = \\ &= \sum_{l=1}^k x_l (r_l (c + b) + (1 - r_l) b) = \sum_{l=1}^k c x_l r_l + b = cu(L) + b. \end{aligned}$$

4.1. Необходимость. Пусть (p^0, q^0, v) – решение в смешанных стратегиях игры с матрицей A . Тогда выполнены неравенства

$$A(p, q^0) \leq A(p^0, q^0) = v \leq A(p^0, q) \quad \forall p \in P, \quad \forall q \in Q.$$

В частности, они справедливы для любых чистых стратегий игроков

$$A(i, q^0) \leq v \leq A(p^0, j), \quad i = 1, \dots, m, \quad j = 1, \dots, n. \quad (*)$$

Достаточность. Пусть для тройки (p^0, q^0, v) выполнено условие (*). Возьмем любую смешанную стратегию p первого игрока, домножим неравенства $A(i, q^0) \leq v$ на p_i и сложим их. В результате получим

$$A(p, q^0) \leq v \sum_{i=1}^m p_i = v. \text{ Аналогично, для любой смешанной стратегии } q \text{ второго игрока выполнено неравенство } v \leq A(p^0, q). \text{ Итак, } A(p, q^0) \leq v \leq A(p^0, q) \quad \forall p \in P, \quad \forall q \in Q.$$

Полагая здесь $p = p^0, q = q^0$, получим $A(p^0, q^0) = v$ и (p^0, q^0, v) – решение в смешанных стратегиях.

4.2. Пусть (p^0, q^0, v) – решение в смешанных стратегиях игры с матрицей A . Тогда по условию (*)

$$A(i, q^0) \leq v \leq A(p^0, j), \quad i = 1, \dots, m, \quad j = 1, \dots, n.$$

Далее, $B(i, q^0) = A(i, q^0) + c$, $B(p^0, j) = A(p^0, j) + c$. Отсюда

$$B(i, q^0) \leq v + c \leq B(p^0, j), \quad i = 1, \dots, m, \quad j = 1, \dots, n$$

и $(p^0, q^0, v + c)$ – решение игры с матрицей B .

4.3. По определению выравнивающей стратегии ψ^0

$$F(x, \psi^0) \equiv v \Rightarrow F(\varphi, \psi^0) \equiv v = F(\varphi^0, \psi^0) \leq F(\varphi^0, \psi) \quad \forall \psi \in \{\psi\}.$$

Отсюда тройка (φ^0, ψ^0, v) – решение в смешанных стратегиях.

4.4. В игре с матрицей $\begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}$ смешанная стратегия второго игрока $q^0 = (1/2, 0, 1/2)$ является выравнивающей, но не оптимальной.

4.5. Найдем выравнивающую смешанную стратегию q^0 второго игрока. Из соображений симметрии положим $q_1^0 = q_4^0$, $q_2^0 = q_3^0$. Тогда получим систему уравнений

$$q_1^0 + aq_2^0 = aq_1^0 + q_2^0 + aq_2^0 = v, \quad q_1^0 + q_2^0 = 1/2.$$

Отсюда $q_1^0 = 0.5(2 - a)^{-1}$, $q_2^0 = (1 - a)q_1^0$, $v = (1 + a - a^2)q_1^0$. Поскольку матрица A – симметричная, смешанная стратегия $p^0 = q^0$ первого игрока также является выравнивающей. Следовательно, стратегии p^0 и q^0 оптимальны, а v – значение игры.

4.6. Поскольку $X \subset \{\varphi\}$ и $Y \subset \{\psi\}$,

$$\begin{aligned} \underline{v} &= \max_{x \in X} \min_{y \in Y} F(x, y) \leq \max_{\varphi \in \{\varphi\}} \min_{y \in Y} F(\varphi, y) = v = \\ &= \min_{\psi \in \{\psi\}} \max_{x \in X} F(x, \psi) \leq \min_{y \in Y} \max_{x \in X} F(x, y) = \bar{v}. \end{aligned}$$

4.7. Возьмем любое $\varepsilon > 0$ и отрезок $[a', b']$ длины, меньшей ε , и содержащий внутри себя точку x^0 . Пусть x^0 – точка, в которой функция $\varphi(x)$ имеет скачок величины $\delta > 0$. Тогда в силу ее монотонности справедливо неравенство $\varphi(b') - \varphi(a') \geq \delta > 0$.

Пусть в точке x^0 функция $\varphi(x)$ дифференцируема и $\varphi'(x^0) > 0$. Тогда $\varphi(b') - \varphi(a') > 0$. Действительно, функция $\varphi(x)$ не убывает и по определению производной найдется такая точка $x' > x^0$, близкая к x^0 , что $\varphi(x') > \varphi(x^0)$.

4.8. Пусть тройка (p^0, q^0, v) – решение в смешанных стратегиях игры с матрицей A . Докажем утверждение 1). По условию (*)

$$A(i, q^0) \leq v, \quad i = 1, \dots, m. \quad (22.2)$$

Предположим противное. Тогда найдется такая чистая стратегия i_1 первого игрока, что $p_{i_1}^0 > 0$ и $A(i_1, q^0) < v$. Домножим обе части i -го неравенства (22.2) на p_i^0 и сложим неравенства. Поскольку неравенство с номером i_1 после домножения на $p_{i_1}^0$ останется строгим, получим $A(p^0, q^0) < v = A(p^0, q^0)$ (противоречие).

Утверждение 2) доказывается аналогично.

5.1. Пусть строка i_1 матрицы A слабо доминирует строку i_2 . Если стратегия i_2 — максиминная, то стратегия i_1 также является максиминной как для матрицы A , так и для редуцированной матрицы с вычеркнутой i_2 -ой строкой. При этом нижнее значение игры после исключения строки не меняется.

Аналогичное замечание справедливо и для случая, когда столбец j_1 слабо доминируется столбцом j_2 , а стратегия j_2 является минимаксной.

После исключения слабо доминируемых строк и слабо доминирующих столбцов в распоряжении игроков остаются максиминная и минимаксная стратегии игроков исходной (и редуцированной) игры, образующие седловую точку.

5.2. Выпишем матрицу игры

$$A = \begin{matrix} & \begin{matrix} (2, 0) & (1, 1) & (0, 2) \end{matrix} \\ \begin{matrix} (3, 0) \\ (2, 1) \\ (1, 2) \\ (0, 3) \end{matrix} & \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 1 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

Строка 2 слабо доминируется строкой 1, а строка 3 — строкой 4. После вычеркивания слабо доминируемых строк, замечаем, что столбец 2 равен полусумме столбцов 1 и 3 и поэтому его можно вычеркнуть. В результате

получается матрица $B = \begin{matrix} & \begin{matrix} (2, 0) & (0, 2) \end{matrix} \\ \begin{matrix} (3, 0) \\ (0, 3) \end{matrix} & \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} \end{matrix}$. Отсюда находим решение исходной игры: $p^0 = (1/2, 0, 0, 1/2)$, $q^0 = (1/2, 0, 1/2)$, $v = 2$. Отметим, что чистая стратегия 2 второго игрока также оптимальна.

5.3. Здесь $l_1(p_1) = 3p_1$, $l_2(p_1) \equiv 1$ и $l_3(p_1) = 3(1 - p_1)$. Функция $\min_{1 \leq j \leq 3} l_j(p_1)$ достигает максимума в точках отрезка $[1/3, 2/3]$. Поэтому множество всех оптимальных смешанных стратегий первого игрока имеет вид $P^0 = \{p^0 \in P \mid 1/3 \leq p_1^0 \leq 2/3\}$. Второй игрок имеет единственную оптимальную чистую стратегию 2.

5.4. Предположим, что точка z^0 не является крайней точкой множества Z и представима в виде $z^0 = \lambda z' + (1 - \lambda)z''$, $z' \neq z'' \in Z$, $0 < \lambda < 1$. Поскольку функция $|z|^2$ строго выпукла на множестве Z (см. упражнение 2.4),

$$|z^0|^2 = |\lambda z' + (1 - \lambda)z''|^2 < \lambda |z'|^2 + (1 - \lambda)|z''|^2 \leq \max_{z \in Z} |z|^2,$$

что противоречит определению точки z^0 .

5.5. Множество $Z^* = \text{Arg max}_{z \in Z} h(z)$ — выпуклый компакт. Пусть z^0 — его крайняя точка. Покажем, что z^0 — крайняя точка множества Z . Пусть, напротив, найдутся такие точки $z' \neq z''$ множества Z и такое число $0 < \lambda < 1$, что $z^0 = \lambda z' + (1 - \lambda)z''$. Тогда по крайней мере одна из точек z' или z'' не принадлежат множеству Z^* . Поэтому $h(z^0) = \lambda h(z') + (1 - \lambda)h(z'') < \max_{z \in Z} h(z)$ (противоречие с определением z^0).

5.6. Пусть оптимальная стратегия p^0 первого игрока удовлетворяет системе уравнений (5.3), где v — значение игры, а матрица $B = (a_{ij})_{k \times k}$ — невырожденная. Покажем, что p^0 — крайняя оптимальная смешанная стратегия. Предположим противное, т.е. p^0 представимо в виде $p^0 = \lambda p' + (1 - \lambda)p''$, где $p' \neq p'' \in P^0$, $0 < \lambda < 1$. Из равенств

$$p_i^0 = 0 = \lambda p'_i + (1 - \lambda)p''_i \quad \forall i \neq i_l, \quad l = 1, \dots, k,$$

следует, что $p'_i = p''_i = 0 \quad \forall i \neq i_l, \quad l = 1, \dots, k$. Поскольку p', p'' — оптимальные смешанные стратегии,

$$A(p', j_t) \geq v, \quad A(p'', j_t) \geq v, \quad t = 1, \dots, k. \quad (22.3)$$

Покажем, что неравенства (22.3) могут выполняться только как равенства. Предположим, что найдется такой номер t_1 ,

что $A(p', j_{t_1}) > v$, $A(p'', j_{t_1}) \geq v$. Умножая первое неравенство на λ , а второе на $1 - \lambda$ и складывая их, получим $A(p^0, j_{t_1}) > v$ (противоречие).

Итак,

$$A(p', j_t) = A(p'', j_t) \Rightarrow \sum_{l=1}^k (p'_{i_l} - p''_{i_l}) a_{i_l j_t} = 0, \quad t = 1, \dots, k.$$

Из невырожденности матрицы B получим, что $p'_{i_l} = p''_{i_l}$, $l = 1, \dots, k \Rightarrow p' = p''$ (противоречие).

5.7. Пусть $B = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. Тогда матрица системы (5.3) и ее расширенная матрица

$$\left(\begin{array}{ccc|c} -1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

имеют ранги 2 и 3 соответственно. Следовательно, по теореме Кронекера-Капелли система (5.3) не имеет решения.

5.8. Прделаем 8 шагов по алгоритму Брауна.

Продолжение таблицы 5.1.

k	i_k	$c_1()$	$c_2()$	$c_3()$	$v_1()$	j_k	$d_1()$	$d_2()$	$d_3()$	$v_2()$
11	3	10	8	<u>17</u>	17/11	2	13	11	<u>9</u>	9/11
12	3	10	11	<u>14</u>	7/6	3	12	14	<u>6</u>	1/2
13	3	10	<u>14</u>	11	14/13	3	11	17	<u>3</u>	3/13
14	2	10	<u>17</u>	8	17/14	3	13	17	<u>6</u>	3/7
15	2	10	<u>20</u>	5	4/3	3	15	17	<u>9</u>	3/5
16	2	10	<u>23</u>	2	23/16	3	17	17	<u>12</u>	3/4
17	2	10	<u>26</u>	-1	26/17	3	19	17	<u>15</u>	15/17
18	2	10	<u>29</u>	-4	29/18	3	21	<u>17</u>	18	17/18

Отсюда $v_1^*(18) = 1$, $v_2^*(18) = 17/18 \Rightarrow \varepsilon = 1/18$. Далее, $t_1 = 8$, $t_2 = 18$, $p(18) = (1/9, 11/18, 5/18)$, $q(8) = (1/8, 5/8, 1/4)$.

6.1. Пусть $D_\alpha = [a_\alpha, b_\alpha]$, $\alpha \in \mathcal{L}$ — семейство отрезков, любые два из которых имеют непустое пересечение. Докажем, что найдется точка $x^0 \in D_\alpha \forall \alpha \in \mathcal{L}$. Заметим, что из условия теоремы $a_\alpha \leq b_\beta \forall \alpha, \beta \in \mathcal{L}$. Следовательно, $a \stackrel{\text{def}}{=} \sup_{\alpha \in \mathcal{L}} a_\alpha \leq b \stackrel{\text{def}}{=} \inf_{\beta \in \mathcal{L}} b_\beta$. Любая точка $x^0 \in [a, b]$ является искомой.

6.2. Положим $y^1 = (0, 0)$, $y^2 = (0, 1)$, $y^3 = (1, 0)$, $y^4 = (1, 1)$. По аналогии с примером 6.1 покажем, что

$(x^0, \psi^0, v) = ((1/2, 1/2), \sum_{j=1}^4 I_{y^j}/4, 1/2)$ — решение в смешанных стратегиях. Проверим условие (*). Функция

$$F(x, \psi^0) = \sum_{j=1}^4 \frac{1}{4} [1 - (x_1 - y_1^j)^2 - (x_2 - y_2^j)^2]$$

строго вогнута по $x = (x_1, x_2)$. Имеем

$$F'_{x_1} = - \sum_{j=1}^4 (x_1 - y_1^j) = 0, \quad F'_{x_2} = - \sum_{j=1}^4 (x_2 - y_2^j) = 0.$$

Отсюда следует, что $\max_{x \in X} F(x, \psi^0)$ достигается в точке $x^0 = (1/2, 1/2)$ и равен $1/2$. Далее,

$$\min_{y \in Y} F(x^0, y) = F(x^0, y^1) = 1/2 = \max_{x \in X} F(x, \psi^0)$$

и условие $(*)$ выполнено.

6.3. Для нормального распределения

$$F(x, c) = \sigma^2 c_1^2 / n + (c_1 - 1)^2 x^2 + 2c_2(c_1 - 1)x + c_2^2.$$

Стратегия статистика $y^0(z) = c_1^0 \bar{z} + c_2^0$ будет выравнивающей, если $c_1^0 = 1$. При этом значение функции риска будет минимальным, если $c_2^0 = 0$. Если $c_1 \neq 1$, то $\sup_{x \geq 0} F(x, c) = +\infty$. Следовательно, найденная решающая функция $y^0(z) = \bar{z}$ — минимаксная стратегия статистика.

7.1. Заметим, что $\sup_{0 \leq x \leq d_0} F(x, d_0) = \sup_{0 \leq x \leq d_0} p_1(x) = 1$ и стратегия $y = d_0$ не может быть минимаксной. Пусть $0 \leq y < d_0$. Тогда

$$\begin{aligned} \sup_{0 \leq x \leq d_0} F(x, y) &= \\ &= \max \left[\sup_{0 \leq x \leq y} (1 - p_2(y))p_1(x), \sup_{y < x \leq d_0} p_1(x) \right] = \max[1 - p_2(y), p_1(y)]. \end{aligned}$$

Функция $1 - p_2(y)$ возрастает, а функция $p_1(y)$ убывает по y . Следовательно, функция $\max[1 - p_2(y), p_1(y)]$ достигает минимума в точке $y = d^*$. Итак, $\bar{v} = p_1(d^*)$.

8.1. Положим

$$w = \max_{x_1 \in U_1} \min_{y_1 \in V_1} \max_{x_2 \in U_2(x_1, y_1)} \min_{y_2 \in V_2(x_1, y_1)} \cdots \max_{x_T \in U_T(\alpha_T)} \min_{y_T \in V_T(\beta_T)} F(\bar{x}_T, \bar{y}_T).$$

Определим стратегию $\tilde{x}^0 = (\tilde{x}_t^0, t = 1, \dots, T)$ первого игрока: при любых $t = 1, \dots, T$ и $\alpha_t = (\bar{x}_{t-1}, \bar{y}_{t-1})$

$$\tilde{x}_t^0(\alpha_t) \in \text{Arg} \max_{x_t \in U_t(\alpha_t)} \min_{y_t \in V_t(\beta_t)} \cdots \max_{x_T \in U_T(\alpha_T)} \min_{y_T \in V_T(\beta_T)} F(\bar{x}_T, \bar{y}_T).$$

Тогда для любой стратегии $\tilde{y}$ второго игрока

$$\begin{aligned} F(\tilde{x}^0, \tilde{y}) &\geq \min_{y_T \in V_T(\beta_T)} F(\tilde{x}^0, \bar{y}_{T-1}, y_T) \stackrel{\text{def } \tilde{x}_T^0}{=} \\ &= \max_{x_T \in U_T(\alpha_T)} \min_{\tilde{y}_T \in V_T(\beta_T)} F(\tilde{x}_1^0, \dots, \tilde{x}_{T-1}^0, x_T, \tilde{y}_1, \dots, \tilde{y}_{T-1}, y_T) \geq \dots \geq w. \end{aligned}$$

Следовательно,

$$\min_{\tilde{y} \in \tilde{Y}} F(\tilde{x}^0, \tilde{y}) \geq w.$$

С другой стороны для стратегии $\tilde{y}^* = (\tilde{y}_t^*, t = 1, \dots, T)$ второго игрока, определяемой условиями: при любых $t = 1, \dots, T$ и $\beta_t = (\bar{x}_{t-1}, \bar{y}_{t-1})$ $\tilde{y}_t^*(\beta_t) \in$

$$\in \text{Arg} \min_{y_t \in V_t(\beta_t)} \max_{x_{t+1} \in U_{t+1}(\alpha_{t+1})} \dots \min_{y_T \in V_T(\beta_T)} F(\tilde{x}_1^0, \dots, \tilde{x}_t^0, x_{t+1}, \dots, x_T, \bar{y}_T),$$

выполнено равенство $F(\tilde{x}^0, \tilde{y}^*) = w$. Отсюда $w = \underline{v}$.

Формула для $\bar{v}$ выводится аналогично.

8.2. Положим

$$F_1^1(\alpha, \beta) = \max_{i \in M_\alpha} \min_{j \in N_\beta} a_{ij}, \quad F_1^2(\alpha, \beta) = \min_{j \in N_\beta} \max_{i \in M_\alpha} a_{ij}, \quad \alpha, \beta = 1, 2.$$

При этом

$$(F_1^1(\alpha, \beta))_{2 \times 2} = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}, \quad (F_1^2(\alpha, \beta))_{2 \times 2} = \begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$$

и

$$\underline{v} = \max_{\alpha=1,2} \min_{\beta=1,2} F_1^1(\alpha, \beta) = 2, \quad \bar{v} = \min_{\beta=1,2} \max_{\alpha=1,2} F_1^2(\alpha, \beta) = 3.$$

9.1. Определение седловой точки (x^0, y^0) функции $F(x, y)$ на $X \times Y$ можно записать следующим образом:

$$F(x^0, y^0) = \max_{x \in X} F(x, y^0), \quad -F(x^0, y^0) = \max_{y \in Y} (-F(x^0, y)),$$

что совпадает с определением ситуации равновесия.

9.2. Пусть в игре возникла ситуация (1,1). Тогда выгодно отклониться первому игроку и возникнет ситуация (2,1). Теперь выгодно отклониться второму игроку, возникнет ситуация (2,1) и т.д. по схеме $(1, 1) \rightarrow (2, 1) \rightarrow (2, 2) \rightarrow (1, 2) \rightarrow (1, 1)$.

9.3. Если игроки одновременно применяют правило правой руки (левой руки), то первый (второй) игрок проедет и "получит" 1, а второй (первый) его пропустит и получит 0. Если первый применяет правило правой руки, а второй — левой, то произойдет столкновения и оба проиграют по 10. Если — наоборот, то оба будут стоять и проиграют по 1.

9.4. В игре Γ два равновесия по Нэшу: (1,1) и (2,2).

9.5. В игре Γ единственное равновесие по Нэшу: (1,1).

9.6. Пусть (x^0, y^0) — произвольная ситуация в антагонистической игре. Предположим, что ситуация (x^0, y^0) не является оптимальной по Парето. Тогда найдется ситуация (x', y') , для которой выполнены неравенства $F(x', y') \geq F(x^0, y^0)$, $-F(x', y') \geq -F(x^0, y^0)$ и при этом хотя бы одно из них выполнено как строгое. Складывая эти неравенства, получим $0 > 0$ (противоречие).

9.7. Пусть функция $f : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ непрерывна. Тогда для функции $g(x) = f(x) - x$ $g(0) \geq 0$ и $g(1) \leq 0$. По теореме математического анализа о промежуточных значениях найдется точка x^0 , для которой $g(x^0) = 0$.

9.8. 1) $f(x) = x + 1$, $x \in [0, +\infty)$;

2) $f(x) = x/2$, $x \in (0, 1]$;

3) $f(x) = \begin{cases} x + 1/2, & x \in [0, 1/2), \\ x - 1/2, & x \in [1/2, 1]. \end{cases}$

10.1. Пусть (p^0, q^0) — ситуация равновесия и стратегия q^0 при некотором v_1 удовлетворяет системе (см. (10.1))

$$2q_1^0 + q_3^0 = q_1^0 + 2q_2^0 = q_2^0 + 2q_3^0 = v_1, \quad q_1^0 + q_2^0 + q_3^0 = 1.$$

Отсюда $q^0 = (1/3, 1/3, 1/3)$.

Предположим, что q^0 удовлетворяет системе

$$2q_1^0 + q_3^0 < q_1^0 + 2q_2^0 = q_2^0 + 2q_3^0 = v_1, \quad q_1^0 + q_2^0 + q_3^0 = 1.$$

Тогда $q_3^0 = 1/3$, а $q_2^0 > 1/3$. По свойству дополняющей нежесткости $p_1^0 = 0$, $p_2^0 + 2p_3^0 = p_3^0 = v_2$. Отсюда $p_1^0 = p_2^0 = p_3^0 = 0$ (противоречие).

Наконец, разберем случай, когда

$$2q_1^0 + q_3^0, \quad q_1^0 + 2q_2^0 < q_2^0 + 2q_3^0 = v_1, \quad q_1^0 + q_2^0 + q_3^0 = 1.$$

Тогда $q_3^0 > 1/3$, а по свойству дополняющей нежесткости $p_1^0 = p_2^0 = 0 \Rightarrow p_3^0 = 1$. Из системы (10.2) следует, что $v_2 = B(p^0, 3) \geq B(p^0, 2)$ или $1 \geq 2$ (противоречие).

Другие случаи реализации системы (10.1) получаются из разобранных перестановкой координат, поскольку матрицы A и B — циклические.

Аналогично доказывается, что $p^0 = (1/3, 1/3, 1/3)$.

10.2. Доказательство теоремы 10.4. 1) Пусть множества

$$\bar{Z} = Z_k \subset Z_{k-1} \subset \dots \subset Z_1 = Z, \quad Z_l = X_l \times Y_l, \quad l = 1, \dots, k,$$

отвечают определению строгого доминирования $\bar{Z} \succ Z$.

Возьмем $i \in X_1 \setminus X_2$. Тогда найдется такая стратегия $p \in P$, что $p \succ i$ на $Y_1 = Y$. Отсюда $A(p, j) > a_{ij}$, $j = 1, \dots, n$. Умножая j -е неравенство на q_j^0 и складывая все неравенства, получим $A(p, q^0) > A(i, q^0)$. Если $p_i^0 > 0$, то из системы (10.1) вытекают неравенства $A(i, q^0) = v_1 \geq A(i_1, q^0)$, $i_1 = 1, \dots, m$. Умножая эти неравенства на величины p_{i_1} и складывая их, получим $A(i, q^0) \geq A(p, q^0)$ (противоречие). Отсюда $p_i^0 = 0 \quad \forall i \in X_1 \setminus X_2$. Аналогично доказывается, что $q_j^0 = 0 \quad \forall j \in Y_1 \setminus Y_2$.

Пусть векторы p^2 и q^2 получены из p^0 и q^0 отбрасыванием нулевых компонент с номерами из множеств $X_1 \setminus X_2$ и $Y_1 \setminus Y_2$ соответственно. Нетрудно показать, что (p^2, q^2) — ситуация равновесия в редуцированной игре с матрицами A^2 и B^2 , полученными из матриц A и B вычеркиванием строк с номерами из $X_1 \setminus X_2$ и столбцов с номерами из $Y_1 \setminus Y_2$. Поэтому рассуждения можно повторить для редуцированной игры и получить, что $p_i^0 = 0 \quad \forall i \in X_2 \setminus X_3$, $q_j^0 = 0 \quad \forall j \in Y_2 \setminus Y_3$ и т.д.

2) Пусть множества

$$\bar{Z} = Z_k \subset Z_{k-1} \subset \dots \subset Z_1 = Z, \quad Z_l = X_l \times Y_l, \quad l = 1, \dots, k,$$

отвечают определению слабого доминирования $\bar{Z} \succeq Z$.

Пусть A^{k-1} и B^{k-1} — подматрицы матриц A и B с номерами строк из X^{k-1} и номерами столбцов из Y^{k-1} . Рассмотрим вектор p^{k-1} , полученный из вектора $\bar{p}$ добавлением нулевых компонент с номерами из $X^{k-1} \setminus \bar{X}$. Аналогично, вектор q^{k-1} получается из вектора $\bar{q}$ добавлением нулевых компонент с номерами из $Y^{k-1} \setminus \bar{Y}$. Докажем, что (p^{k-1}, q^{k-1}) — ситуация равновесия в игре с матрицами A^{k-1} и B^{k-1} . Для этого проверим условие (*) для ситуации (p^{k-1}, q^{k-1}) . Имеем

$$A^{k-1}(i, q^{k-1}) = \bar{A}(i, \bar{q}) \leq \bar{A}(\bar{p}, \bar{q}) = A^{k-1}(p^{k-1}, q^{k-1}) \quad \forall i \in \bar{X}.$$

Пусть $i \in X^{k-1} \setminus \bar{X}$. Тогда найдется такая стратегия p , что $p \succeq i$ на Y^{k-1} и $p_{i_1} = 0 \quad \forall i_1 \notin \bar{X}$. Определим вектор $p' = (p_{i_1}, i_1 \in \bar{X})$. Тогда

$$\begin{aligned} A^{k-1}(i, q^{k-1}) &= \sum_{j \in Y^{k-1}} a_{ij} q_j^{k-1} \leq \\ &\leq \sum_{j \in \bar{Y}} \left(\sum_{i_1 \in \bar{X}} a_{i_1 j} p_{i_1} \right) \bar{q}_j = \bar{A}(p', \bar{q}) \leq \bar{A}(\bar{p}, \bar{q}) = A^{k-1}(p^{k-1}, q^{k-1}). \end{aligned}$$

В результате доказали неравенства

$$A^{k-1}(i, q^{k-1}) \leq A^{k-1}(p^{k-1}, q^{k-1}) \quad \forall i \in X^{k-1}.$$

Аналогично доказывается вторая группа неравенств из условия (*)

$$B^{k-1}(p^{k-1}, j) \leq B^{k-1}(p^{k-1}, q^{k-1}) \quad \forall j \in Y^{k-1}.$$

Итак, (p^{k-1}, q^{k-1}) – ситуация равновесия игры с матрицами A^{k-1} и B^{k-1} .

Рассуждения можно продолжить, аналогичным образом ввести ситуацию (p^{k-2}, q^{k-2}) и доказать, что она является равновесием по Нэшу игры с матрицами A^{k-2} и B^{k-2} и т.д.

10.3. Пусть C – сумма матриц A и B . Как отмечалось, $C = (c_{ij})_{m \times n} = (f_j + g_i)_{m \times n}$. Поскольку $f_1 = 0$, разность j -го и 1-го столбцов матрицы C можно записать в виде $f_j e$, где $e = (1, \dots, 1) \in E^m$. Отсюда $f_j = c_{1j} - c_{11}$, $j = 1, \dots, n$ и $a'_{ij} = a_{ij} - f_j = a_{ij} - a_{1j} - b_{1j} + a_{11} + b_{11} \quad \forall i, j$.

10.4. Заметим, что для любой смешанной стратегии q второго игрока

$$A(i, q) = A'(i, q) + \sum_{j=1}^n f_j q_j, \quad i = 1, \dots, m. \quad (22.4)$$

Поэтому неравенства $A(i, q^0) \leq A(p^0, q^0)$ равносильны неравенствам $A'(i, q^0) \leq A'(p^0, q^0)$, $i = 1, \dots, m$. Аналогично показывается, что для любой смешанной стратегии p первого игрока

$$B(p, j) = -A'(p, j) + \sum_{i=1}^m g_i p_i, \quad j = 1, \dots, n, \quad (22.5)$$

и что неравенства $B(p^0, j) \leq B(p^0, q^0)$ равносильны неравенствам $A'(p^0, j) \geq A'(p^0, q^0)$, $j = 1, \dots, n$. Отсюда вытекает, что для ситуации (p^0, q^0) условие (*) в игре с матрицей A' (теорема 4.1') эквивалентно условию (*) в игре Γ (лемма 10.1).

10.5. Из формул (22.4) и (22.5) следует, что

$$\text{Arg} \max_{1 \leq i \leq m} A(i, q(k)) = \text{Arg} \max_{1 \leq i \leq m} A'(i, q(k)),$$

$$\text{Arg} \max_{1 \leq j \leq n} B(p(k), j) = \text{Arg} \min_{1 \leq j \leq n} A'(p(k), j).$$

Поэтому последовательности стратегий игроков $\{i_k\}, \{j_k\}$ в процессе Брауна для игры с матрицей A' и в аналогичном процессе для игры Γ можно взять совпадающими. По теореме 5.3 любая предельная точка (p^0, q^0) последовательности $\{(p(k), q(k))\}$ является седловой точкой в смешанных стратегиях и, следовательно, смешанным равновесием по Нэшу игры Γ .

11.1. Заметим, что $Y_1^*(f_1^\varepsilon) = \{g \mid g(x^\varepsilon) = y^\varepsilon\}$. Следовательно,

$$W(f_1^\varepsilon) = \inf_{g \in Y_1^*(f_1^\varepsilon)} F(f_1^\varepsilon(g), g) = F(x^\varepsilon, y^\varepsilon) \geq K' - \varepsilon.$$

11.2. Возьмем произвольную стратегию $f_1 \in \{f_1\}$ и докажем, что $W(f_1) \leq \max[K', F_1]$. Пусть $\{g^*\}$ – множество всех функций наилучшего ответа второго игрока. Имеем

$$\begin{aligned} \sup_{g \in \{g\}} G(f_1(g), g) &\geq \sup_{g \in \{g\}} \inf_{x \in X} G(x, g) \geq \\ &\geq \sup_{g^* \in \{g^*\}} \inf_{x \in X} G(x, g^*) = \min_{x \in X} \max_{y \in Y} G(x, y) = G_3. \end{aligned}$$

Рассмотрим два случая.

1) $\sup_{g \in \{g\}} G(f_1(g), g) > G_3$. Тогда найдется такая функция $g^\varepsilon \in Y_1^*(f_1)$, что пара $(x', y') = (f_1(g^\varepsilon), g^\varepsilon(x'))$ принадлежит множеству D' . В этом случае

$$W(f_1) = \inf_{g \in Y_1^*(f_1)} F(f_1(g), g) \leq F(f_1(g^\varepsilon), g^\varepsilon) = F(x', y') \leq K'.$$

2) $\sup_{g \in \{g\}} G(f_1(g), g) = G_3$. Покажем, что $\{g^*\} \subseteq Y_1^*(f_1)$.

Действительно, для всякой функции наилучшего ответа g^*

$$\begin{aligned} G_3 &= \min_{x \in X} \max_{y \in Y} G(x, y) = \min_{x \in X} G(x, g^*) \leq \\ &\leq G(f_1(g^*), g^*) \leq \sup_{g \in \{g\}} G(f_1(g), g) = G_3. \end{aligned}$$

В последних неравенствах крайние члены совпадают. Следовательно, все неравенства выполнены как равенства и $\{g^*\} \subseteq Y_1^*(f_1)$. Определим $g^0 \in \{g^*\}$:

$$g^0(x) \in \text{Arg} \min_{y \in Y(x)} F(x, y) \quad \forall x \in X$$

– функцию наилучшего ответа второго игрока, наименее благожелательного по отношению к первому. Тогда

$$\begin{aligned} W(f_1) &= \inf_{g \in Y_1^*(f_1)} F(f_1(g), g) \leq F(f_1(g^0), g^0) \leq \\ &\leq \sup_{x \in X} F(x, g^0(x)) = \sup_{x \in X} \min_{y \in Y(x)} F(x, y) = F_1. \end{aligned}$$

11.3. Зададим стратегию g^* второго игрока условием

$$g^*(x) \in \text{Arg} \max_{y \in Y(x)} F(x, y) \quad \forall x \in X.$$

Она аналогична стратегии первого игрока f^* , определенной перед леммой 11.1. Из этой леммы следует, что функция $F(x, g^*(x))$ полунепрерывна сверху на X . Возьмем $x^* \in \text{Arg} \max_{x \in X} F(x, g^*(x))$. Тогда (x^*, g^*) — ситуация равновесия игры Γ_1 .

11.4. Если первый игрок в игре Γ_3 использует стратегии-константы $f_1(g) \equiv x$, то он может обеспечить себе такой же результат, как и в игре Γ_1 . Следовательно, $F_1 \leq F_3$. Аналогично показывается, что $F_1 \leq F_2$. Далее, $K' \leq K$, поскольку $D' \subseteq D$. Поэтому $F_3 = \max[K', F_1] \leq F_2 = \max[K, M]$.

11.5. При $\alpha = 1$ функция наилучших ответов второго игрока имеет вид

$$y(x) = \begin{cases} \sqrt{Kx/c_2} - x, & 0 \leq x \leq K/c_2, \\ 0, & K/c_2 \leq x \leq K/c_1. \end{cases}$$

Оценка эффективности $W(x)$ стратегии x равна

$$W(x) = F(x, y(x)) = \begin{cases} \sqrt{Kc_2x} - c_1x, & 0 \leq x \leq K/c_2, \\ K - c_1x, & K/c_2 \leq x \leq K/c_1, \end{cases}$$

оптимальная стратегия

$$x^* = \begin{cases} Kc_2/(4Kc_1^2), & c_2 \leq 2c_1, \\ K/c_2, & c_2 > 2c_1 \end{cases}$$

и наилучший гарантированный результат для первого игрока

$$F_1 = \max_{0 \leq x \leq K/c_1} W(x) = W(x^*) = \begin{cases} Kc_2/(4c_1), & c_2 \leq 2c_1, \\ (c_2 - c_1)K/c_2, & c_2 > 2c_1. \end{cases}$$

Во втором случае $y(x^*) = 0$ и первая фирма вытесняет вторую с рынка. В обоих случаях $F_1 \geq F(x^0, y^0) = Kc_1c_2/(c_1 + c_2)^{-2}$, где $(x^0, y^0) = (Kc_2(c_1 + c_2)^{-2}, Kc_1(c_1 + c_2)^{-2})$ — ситуация равновесия в игре Γ при $k = 1$.

11.6. Равновесие по Штакельбергу в примере 11.1 $(i^0, j^0) = (2, 1)$, а в примере 11.2 $(x^0, y^0) = (1/2, 1)$.

12.1. Необходимость. Пусть функция $h(z)$ квазивогнута. Докажем, что множество Лебега $Z^+(z^0)$ выпукло для произвольного $z^0 \in Z$. Возьмем любые две точки $z', z'' \in Z^+(z^0)$ и любое число $0 < \lambda < 1$. Тогда $h(\lambda z' + (1 - \lambda)z'') \geq \min[h(z'), h(z'')] \geq h(z^0)$.

Достаточность. Пусть множества Лебега $Z^+(z^0)$ выпуклы при всех $z^0 \in Z$. Возьмем любые две точки $z', z'' \in Z$ и любое число $0 < \lambda < 1$. Без потери общности можно считать, что $h(z') \leq h(z'')$. Тогда $z', z'' \in Z^+(z')$ и в силу выпуклости множества $Z^+(z')$ точка $\lambda z' + (1 - \lambda)z''$ также принадлежит $Z^+(z')$, т.е. $h(\lambda z' + (1 - \lambda)z'') \geq h(z') = \min[h(z'), h(z'')]$. Следовательно, функция $h(z)$ квазивогнута на Z .

13.1. $p(i, \bar{\mu}) = 0$, $i = 1, 2, 4, 6$, $p(3, \bar{\mu}) = 1/4$, $p(5, \bar{\mu}) = 3/4$.

13.2. Игрок 1 имеет стратегии $\mu^1 = (k, l) \in \{(1, 1), (1, 2), (2, 1), (2, 2)\}$, где k и l – номера альтернатив его левой и правой личной позиции (см. рис. 13.4). Аналогичный вид имеют стратегии второго игрока. Нормальная форма игры G задается матрицами

$$A = \begin{pmatrix} 1/2 & 2 & 1 & 5/2 \\ 1/2 & -1 & 1 & -1/2 \\ 1/4 & 7/4 & 1/4 & 7/4 \\ 1/4 & -5/4 & 1/4 & -5/4 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} -2 & -1/2 & -11/4 & -1/4 \\ -2 & 7/4 & -11/4 & 2 \\ -7/4 & -1/4 & -7/4 & -1/4 \\ -7/4 & 2 & -7/4 & 2 \end{pmatrix},$$

а нормальная форма подигры G_z – матрицами

$$A_z = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad B_z = \begin{pmatrix} -3 & -1 \\ -3 & 2 \end{pmatrix}.$$

13.3. $\bar{\mu} = ((1, 1), (1, 2))$.

14.1. Пусть $x \in \text{Poss } \mu^a$. Если в некоторой позиции $x' \in [x_0, x] \cap X^a$, $x' \neq x$ стратегия μ^a выбирает альтернативу, не принадлежащую пути $[x_0, x]$, то вероятность попасть в вершину x равна нулю (противоречие).

Обратно, пусть в каждой вершине $x' \in [x_0, x] \cap X^a$, $x' \neq x$, стратегия μ^a выбирает альтернативу, принадлежащую пути $[x_0, x]$. Покажем, что в этом случае $x \in \text{Poss } \mu^a$. Действительно, определим стратегии μ^b , $b \in A \setminus \{a\}$, других игроков таким образом, чтобы эти стратегии выбирали в каждой вершине $x' \in [x_0, x] \cap X^b$, $x' \neq x$, альтернативы принадлежащие пути $[x_0, x]$. Если $x' \in [x_0, x] \cap X^0$, $x' \neq x$, то вероятность выбора такой альтернативы положительна. Следовательно, $p(x|\mu) > 0$.

14.2. На рис. 22.1 изображено дерево игры. Игрок 1 имеет полную память, поскольку Партнер наблюдает за действиями Игроющего. Игрок

2 ходит только один раз и поэтому также имеет полную память. Запишем стратегию поведения игрока 1 в виде $\beta^1 = (h, r, t)$, где $0 \leq h, r, t \leq 1$ — вероятности выбора первой альтернативы в множествах Z^{11}, Z^{12} и Z^{13} соответственно. Игрок 2 имеет две чистые стратегии: (1) и (2).




Рис. 22.1

Ожидаемый выигрыш игрока 1 равен

$$\begin{cases} hr - 2h(1-r) - 2(1-h)t + 4(1-h)(1-t), & \text{если } \mu^2 = (1), \\ -hr + 3h(1-r) + 3(1-h)t - 3(1-h)(1-t), & \text{если } \mu^2 = (2), \end{cases}$$

или

$$\begin{cases} h(3r - 2) + (1-h)(2 - 6t), & \text{если } \mu^2 = (1), \\ h(3 - 4r) + (1-h)(6t - 3), & \text{если } \mu^2 = (2). \end{cases}$$

Поэтому максимальный гарантированный выигрыш игрока 1 равен

$$v = \max_{0 \leq h, r, t \leq 1} \min[h(3r - 2) + (1-h)(2 - 6t), h(3 - 4r) + (1-h)(6t - 3)].$$

Его можно записать как $\max_{0 \leq r, t \leq 1} v(r, t)$, где $v(r, t)$ — значение игры Γ_{rt} с матрицей

$$\begin{pmatrix} 3r - 2 & 3 - 4r \\ 4 - 6t & 6t - 3 \end{pmatrix}.$$

Игрок 2, применяя смешанную стратегию $1/2(1) + 1/2(2)$ не позволит игроку 1 выиграть в игре Γ_{rt} больше, чем $1/2$ при любых r, t . Но игрок 1, используя стратегию $\bar{\beta} = (7/12, 0, 0)$, обеспечивает себе выигрыш $1/2$. Следовательно, указанные стратегии оптимальны и значение игры $v = 1/2$.

14.3. В процессе Брауна $h^t = ((i_k, j_k), k = 1, \dots, t)$ и $p^1(j|h^t) = |\{k|j_k = j, 1 \leq k \leq t\}|/t \rightarrow 0$ при $t \rightarrow \infty$, если стратегия j игрока 2 в траектории $((i_t, j_t), t = 1, 2, \dots)$ применялась конечное число раз.

15.1. Возьмем две непересекающиеся коалиции K и T . Пусть P^K — множество смешанных стратегий p^K коалиции K . Нетрудно видеть, что $P^{K \cup T} \supset P^K \times P^T$. Отсюда

$$\begin{aligned} v(K \cup T) &= \max_{p^{K \cup T} \in P^{K \cup T}} \min_{s^{A \setminus (K \cup T)} \in S^{A \setminus (K \cup T)}} u^{K \cup T}(p^{K \cup T}, s^{A \setminus (K \cup T)}) \geq \\ &\geq \max_{p^K \in P^K} \max_{p^T \in P^T} \min_{s^{A \setminus (K \cup T)} \in S^{A \setminus (K \cup T)}} [u^K(p^K, p^T, s^{A \setminus (K \cup T)}) + \\ &+ u^T(p^T, p^K, s^{A \setminus (K \cup T)})] \geq \max_{p^K \in P^K} \max_{p^T \in P^T} \left[\min_{s^{A \setminus K} \in S^{A \setminus K}} u^K(p^K, s^{A \setminus K}) + \right. \\ &\quad \left. + \min_{s^{A \setminus T} \in S^{A \setminus T}} u^T(p^T, s^{A \setminus T}) \right] = v(K) + v(T). \end{aligned}$$

Докажем равенство (15.1).

$$\begin{aligned} v(K) &= \max_{p^K \in P^K} \min_{s^{A \setminus K} \in S^{A \setminus K}} u^K(p^K, s^{A \setminus K}) = \\ &= \max_{p^K \in P^K} \min_{s^{A \setminus K} \in S^{A \setminus K}} [v(A) - u^{A \setminus K}(p^K, s^{A \setminus K})] = \\ &= v(A) - \min_{p^K \in P^K} \max_{s^{A \setminus K} \in S^{A \setminus K}} u^{A \setminus K}(p^K, s^{A \setminus K}) = \\ &= v(A) - \max_{p^{A \setminus K} \in P^{A \setminus K}} \min_{s^K \in S^K} u^{A \setminus K}(p^{A \setminus K}, s^K) = v(A) - v(A \setminus K). \end{aligned}$$

$$15.2. v(2) = 1, v(13) = 9, v(3) = 4, v(12) = 6.$$

$$15.3. c = 1/500, b^1 = -2/5, b^2 = -3/5, b^3 = 0, v'(12) = v'(13) = 3/5, v'(23) = 7/10.$$

15.4. Заметим, что множество C' не пусто, а функция $\sum_{a \in A} y^a$ ограничена на нем снизу величиной $\sum_{a \in A} v(a)$. Отсюда следует, что задача линейного программирования в (15.2) имеет оптимальное решение z . Пусть $\sum_{a \in A} z^a \leq v(A)$. Возьмем такой вектор $h \in C'$, что $\sum_{a \in A} h^a > v(A)$. Тогда выпуклая комбинация $\lambda z + (1 - \lambda)h$, где $\lambda \in (0, 1]$ определяется из уравнения

$$\lambda \sum_{a \in A} z^a + (1 - \lambda) \sum_{a \in A} h^a = v(A),$$

принадлежит ядру C . Обратно, допустим, что ядро C не пусто. Тогда (15.2) следует из включения множеств $C \subset C'$.

15.5. Пусть λ – заданное в условии приведенное сбалансированное покрытие. Тогда $\lambda_{T \cup L} = 0$, поскольку в противном случае векторы $\chi(T), \chi(L)$ и $\chi(T \cup L)$ были бы линейно зависимыми. Имеем

$$\begin{aligned}\lambda^T \chi(T) + \lambda^L \chi(L) &= (\lambda^T - \lambda^L) \chi(T) + \lambda^L (\chi(T) + \chi(L)) = \\ &= \mu^T \chi(T) + \mu^{T \cup L} \chi(T \cup L).\end{aligned}$$

Поэтому

$$\sum_{K \neq A} \mu^K \chi(K) = \sum_{K \neq A} \lambda^K \chi(K) = \chi(A),$$

а система векторов

$$\{\chi(K) \mid \mu^K > 0\} = \{\chi(K) \mid \lambda^K > 0\} \cup \{\chi(T \cup L)\} \setminus \{\chi(L)\}$$

линейно независима. Таким образом, вектор μ – приведенное сбалансированное покрытие. Далее,

$$\begin{aligned}\lambda^T v(T) + \lambda^L v(L) &= (\lambda^T - \lambda^L) v(T) + \lambda^L (v(T) + v(L)) \leq \\ &\leq (\lambda^T - \lambda^L) v(T) + \lambda^L v(T \cup L) = \mu^T v(T) + \mu^{T \cup L} v(T \cup L).\end{aligned}$$

Отсюда вытекает неравенство (15.4).

15.6. Проекция ядра C на плоскость (y^1, y^2) имеет вид

$$\begin{aligned}&\{(y^1, y^2) \mid v(12) \leq y^1 + y^2 \leq v(123) - v(3), \\ &v(1) \leq y^1 \leq v(123) - v(23), \quad v(2) \leq y^2 \leq v(123) - v(13)\} = \\ &= \{(y^1, y^2) \mid 800 \leq y^1 + y^2 \leq 1000, \quad 200 \leq y^1 \leq 350, \quad 300 \leq y^2 \leq 500\}.\end{aligned}$$

Вершины множества C :

$$y(1) = (300, 500, 200), \quad y(2) = (350, 450, 200), \quad y(3) = (350, 500, 150).$$

15.7. Необходимость. Возьмем дележ $y(0)$ из ядра C . Обозначим через $y(k)$, $k = 1, \dots, |A| - 1$, дележи, полученные из $y(0)$ циклическим сдвигом на k компонент вправо. Тогда дележ

$$z = \sum_{k=0}^{|A|-1} y(k)/|A| = (v_{|A|}/|A|, \dots, v_{|A|}/|A|)$$

принадлежит ядру и, следовательно,

$$\sum_{a \in K} z^a = \frac{|K|v_{|A|}}{|A|} \geq v_{|K|} \quad \forall K \subset A \Rightarrow (15.5).$$

Достаточность. Пусть выполнены неравенства (15.5). Тогда указанный вектор z принадлежит ядру C .

15.8. Проверим равенство $\sum_{a \in A} \varphi^a =$

$$= \sum_{a \in A} \sum_{K: a \in K} \frac{(|K| - 1)! (|A| - |K|)!}{|A|!} (v(K) - v(K \setminus \{a\})) = v(A). \quad (22.6)$$

Возьмем коалицию $K \neq A$ и подсчитаем в последней двойной сумме коэффициент $c^K = c_+^K + c_-^K$ при $v(K)$. Он включает сумму c_+^K положительных слагаемых, встречающихся при вкладах в коалицию K и сумму c_-^K отрицательных слагаемых, встречающихся при вкладах в коалицию $K \cup \{a\}$, где $a \notin K$. Поскольку каждый из игроков коалиции K имеет свой вклад в K ,

$$c_+^K = |K| \frac{(|K| - 1)! (|A| - |K|)!}{|A|!} = C_{|A|}^{|K|}.$$

Аналогично,

$$c_-^K = -(|A| - |K|) \frac{|K|! (|A| - |K| - 1)!}{|A|!} = -C_{|A|}^{|K|}.$$

Отсюда $c^K = 0$. Если $K = A$, то $c_+^A = C_{|A|}^{|A|} = 1$ и равенство (22.6) доказано.

Осталось проверить условие $\varphi^a \geq v(a)$, $\forall a \in A$. Действительно, из свойства супераддитивности характеристической функции и равенства (15.6)

$$\begin{aligned} \varphi^a &= \sum_{K: a \in K} \frac{(|K| - 1)! (|A| - |K|)!}{|A|!} (v(K) - v(K \setminus \{a\})) \geq \\ &\geq \sum_{K: a \in K} \frac{(|K| - 1)! (|A| - |K|)!}{|A|!} v(a) = v(a). \end{aligned}$$

15.9.

$$\varphi^1 = \frac{1}{3}(v(123) - v(23)) + \frac{1}{6}(v(12) - v(2)) + \frac{1}{6}(v(13) - v(3)) + \frac{1}{3}v(1),$$

$$\varphi^2 = \frac{1}{3}(v(123) - v(13)) + \frac{1}{6}(v(12) - v(1)) + \frac{1}{6}(v(23) - v(3)) + \frac{1}{3}v(2),$$

$$\varphi^3 = \frac{1}{3}(v(123) - v(12)) + \frac{1}{6}(v(13) - v(1)) + \frac{1}{6}(v(23) - v(2)) + \frac{1}{3}v(3).$$

В игре "джаз-оркестр" вектор Шепли $\varphi = (350, 475, 175)$. Если $v(123) = 997$, то $\varphi = (349, 474, 174)$ и $\varphi^2 + \varphi^3 < v(23) = 650$.

15.10. В симметричной игре все компоненты вектора Шепли равны между собой.

16.1. Не учтены затраты на хранение продукции. Пусть, например, предприятие должно поставлять ежедневно 5 изделий. Затраты на хранение возникают, если через день используется технология, дающая 10 изделий.

$$16.2. S^a(p) = \begin{cases} 0, & 0 \leq p < 1, \\ [0, 1], & p = 1, \\ 1, & 1 < p \leq 2, \\ p/2, & p > 2. \end{cases}$$

17.1. Функция спроса $D(p) = 3/p^2$ и функция предложения $S^a(p)$ (рис. 16.5) пересекаются в точке $\tilde{p} = 1$. Поэтому функция прибыли имеет вид

$$W(p) = pD(p) - C(D(p)) = \begin{cases} 3/p - (3/p^2 - 1), & 1 \leq p \leq \sqrt{3/2}, \\ 3/p - 3/(2p^2), & p > \sqrt{3/2}. \end{cases}$$

Ее максимум на полуинтервале $[1, \infty)$ достигается при $p^* = 1$.

17.2. Функция $pD(p)$ является неубывающей на отрезке $[p_1, p_2]$, поскольку ее производная $D(p) + p\dot{D}(p) = D(p)(1 - e(D(p))) \geq 0$. Поэтому функция спроса $D(p)$ — медленно убывающая. Функция прибыли $W(p) = pD(p) - C(D(p))$ возрастает и оптимальная стратегия монополии на отрезке $[p_1, p_2]$ равна $p^* = p_2$.

19.1. Имеем

$D(p) = K/p^\alpha$, $D^{-1}(V) = K^{1/\alpha}/V^{1/\alpha}$, $\dot{D}(D^{-1}(V)) = -\alpha V^{1+1/\alpha}/K^{1/\alpha}$. Пусть $\bar{v}$ — ситуация равновесия. По утверждению 19.1 $\bar{v}^a > 0 \quad \forall a \in A$. Отсюда по лемме 19.1 выполнены неравенства $u'_{v^a}(\bar{v}) \geq 0 \quad \forall a \in A$ или (см. формулу 19.5)

$$K^{1/\alpha} / \left(\sum_{b \in A} \bar{v}^b \right)^{1/\alpha} - c - K^{1/\alpha} \bar{v}^a / \left(\alpha \left(\sum_{b \in A} \bar{v}^b \right)^{1+1/\alpha} \right) \geq 0 \quad \forall a \in A.$$

Складывая эти неравенства, получим

$$K^{1/\alpha}(m\alpha - 1) / \left(\alpha \left(\sum_{b \in A} \bar{v}^b \right)^{1/\alpha} \right) - cm \geq 0,$$

что невозможно при $0 < \alpha \leq 1/m$.

19.2. Выпишем вторую частную производную функции выигрыша $u^a(v)$ по переменной v^a :

$$u''_{v^a v^a}(v) = K^{1/\alpha} \left(-2 \left(\sum_{b \in A} v^b \right) + (1 + 1/\alpha) v^a \right) / \left(\alpha \left(\sum_{b \in A} v^b \right)^{2+1/\alpha} \right).$$

Отсюда видно, что при $\alpha \geq 1$ функция $u^a(v)$ вогнута, а при $1/m < \alpha < 1$ она имеет единственную точку максимума по переменной v^a на полупрямой $[0, +\infty)$ (при фиксированных переменных v^b , $b \in A \setminus \{a\}$). Отсюда следует, что необходимые условия для ситуации равновесия $\bar{v}$, сформулированные в лемме 19.1, являются также и достаточными условиями.

1. Если $V \geq K/(c^\alpha m)$, то

$$\tilde{p} = c, \quad \tilde{v}^a = K/(c^\alpha m), \quad p^* = \alpha c m / (m\alpha - 1), \quad \bar{v}^a \equiv v^* \stackrel{\text{def}}{=} K/(m(p^*)^\alpha).$$

Если $K/(c^\alpha m) > V > v^*$, то

$$\tilde{p} = K/(mV^\alpha), \quad \tilde{v}^a \equiv V, \quad p^* = \alpha c m / (m\alpha - 1), \quad \bar{v}^a \equiv v^*.$$

Если $V \leq v^*$, то $\tilde{p} = p^* = K/(mV^\alpha)$, $\tilde{v}^a = \bar{v}^a \equiv V$.

2. Положим $\tilde{c} = c/K$, $t_l = \sum_{a=l+1}^m V^a$, $l = 0, 1, \dots, m-1$, $t_m = 0$.

Пусть найдется целое $k \in \{1, \dots, m\}$, удовлетворяющее условию $t_k < 1/\tilde{c} \leq t_{k-1}$. Тогда из уравнения 19.6'' находим

$$v^*(k) = (k-1 - 2\tilde{c}kt_k + \sqrt{(k-1)^2 + 4\tilde{c}kt_k}) / (2\tilde{c}k^2).$$

Поскольку $\tilde{c}t_k < 1 \leq \tilde{c}t_{k-1}$, то $v^*(k) < (k-1 - 2\tilde{c}kt_k + k+1) / (2\tilde{c}k^2) \leq V^k$.

Поэтому $\bar{v} : \bar{v}^a = \begin{cases} V^a, & a > k, \\ v^*(k), & a \leq k. \end{cases}$ — ситуация равновесия. Соответствующая ей цена равна

$$p^* = K/(t_k + kv^*(k)) = 2\tilde{c}kK/(k-1 + \sqrt{(k-1)^2 + 4\tilde{c}kt_k}) > c = \tilde{p}.$$

Пусть $1/\tilde{c} \geq t_0$. Тогда $\bar{v}^a = V^a \quad \forall a \in A$ и $p^* = \tilde{p} = K/t_0$.

3. Положим $\eta = K(k-1) / \sum_{b=1}^k c^b$. Тогда ситуация равновесия $\bar{v}$ имеет вид

$$\bar{v}^a = \begin{cases} \eta - \eta^2 c^a / K, & a = 1, \dots, k, \\ 0, & a = k+1, \dots, m, \end{cases}$$

где $k = \max\{l \mid \sum_{b=1}^l c^b > (l-1)c^l\}$. Соответствующая ей цена равна

$$p^* = \sum_{b=1}^k c^b / (k-1) > \tilde{p} = c^1.$$

19.3. 1. Объемы $\tilde{V}_{p'}$, где $p' < p$, приобретают сначала потребители с резервной ценой $r \geq p$. Для покупки товара по цене p число таких потребителей станет равным $\max\left[0, D(p) - \max_{p' < p} V_{p'}\right]$.

2. Пусть $P(s) = \{p_i\}$ — упорядоченное множество цен $p_1 < p_2 < \dots < p_k < p \leq p_{k+1} < \dots$. Поскольку $D(p_1)$ покупателей товара по цене p_1 равномерно распределены в очереди, число покупателей по цене p_1 , имеющих резервную цену $r \geq p$, составит величину $\tilde{V}_{p_1} D(p) / D(p_1)$, а аналогичное их число с $r \in [p_1, p)$ равно $\tilde{V}_{p_1} (D(p_1) - D(p)) / D(p_1)$. Поэтому после продажи товара по цене p_1 число покупателей по цене p_2 , имеющих резервную цену $r \geq p$, станет равным $D(p)(1 - \tilde{V}_{p_1} / D(p_1))$, т.е. оно уменьшится пропорционально коэффициенту $1 - \tilde{V}_{p_1} / D(p_1)$. Аналогичное уменьшение произойдет и с покупателями, имеющими резервную цену $r \geq p_2$. Продолжая рассуждения, придем к выводу, что после покупки товара по цене p_2 число покупателей по цене p_3 , имеющих резервную цену $r \geq p$, составит величину

$$D(p) \left(1 - \frac{\tilde{V}_{p_1}}{D(p_1)}\right) \left(1 - \frac{\tilde{V}_{p_2}}{D(p_2)(1 - \frac{\tilde{V}_{p_1}}{D(p_1)})}\right) = D(p) \left(1 - \frac{\tilde{V}_{p_1}}{D(p_1)} - \frac{\tilde{V}_{p_2}}{D(p_2)}\right)$$

и т.д.

3. Пусть $P(s) = \{p_i\}$ — упорядоченное множество цен $p_1 < p_2 < \dots < p_k < p \leq p_{k+1} < \dots$. Тогда нетрудно видеть, что

$$D(p_1, \tilde{V}) = D(p_1), \quad D(p_2, \tilde{V}) = \max[\min[D(p_2), D(p_1) - \tilde{V}_{p_1}], 0],$$

$$D(p_3, \tilde{V}) = \max[\min[D(p_3), D(p_2) - \tilde{V}_{p_2}, D(p_1) - \tilde{V}_{p_1} - \tilde{V}_{p_2}], 0]$$

и т.д.

19.4. В силу следствия к утверждению 19.3 для равновесия по Нэшу $\bar{s}$ выполнено $p(\bar{s}) = \tilde{p}$. Пусть найдется производитель b , для которого $V^b > S^+(\tilde{p}) - D(\tilde{p}) = \sum_{a: c^a \leq \tilde{p}} V^a - D(\tilde{p})$ и $c^b = \tilde{p}$. Тогда при малом $\varepsilon > 0$ выполнено $D(\tilde{p} + \varepsilon) - \sum_{a: c^a \leq \tilde{p}, a \neq b} V^a > 0$ и по (19.13) остаточный спрос по цене $\tilde{p} + \varepsilon$ будет положительным. Следовательно, производителю b выгодно отклониться и выбрать цену $s^b = \tilde{p} + \varepsilon$ (противоречие).

20.1. Для акцизного налога

$$t_e = S^{-1}(\overline{D}_1 + \overline{D}_2)(\overline{D}_2 - K)/(\overline{D}_1 + K), \quad \tilde{p}(t_e) = t_e + S^{-1}(\overline{D}_1 + \overline{D}_2),$$

для налога на прибыль

$$\tilde{p}(t_{pr}) = S^{-1}(\overline{D}_1 + \overline{D}_2), \quad t_{pr} = \tilde{p}(t_{pr})(\overline{D}_2 - K)/Pr,$$

где величина прибыли равна

$$Pr = \int_0^{\tilde{p}(t_{pr})} (\overline{D}_1 + \overline{D}_2 - S(\bar{p}))d\bar{p}.$$

20.2. По условию

$$e(D(p)) = -p(\dot{D}_1(p) + \dot{D}_2(p) - K/p^2)/(D_1(p) + D_2(p) + K/p) < 1.$$

Отсюда

$$\dot{Q}_1(p) + \dot{Q}_2(p) = D_1(p) + D_2(p) + p(\dot{D}_1(p) + \dot{D}_2(p)) > 0.$$

20.3. Функция $K(p)$ непрерывна и на отрезках, где она дифференцируема, ее вторая производная $\ddot{K}(p) = \ddot{D}_1(p)(q(p) - p) - 2\dot{D}_1(p) - \dot{Q}_2(p)$ неотрицательна. Функция $\dot{K}(p)$ в точках своего разрыва имеет положительные скачки. Следовательно, функция $K(p)$ выпукла на всем отрезке $[p_D, p_s]$.

21.1. Заметим, что

$$\lim_{p \rightarrow \hat{p}^-} R(p) = T(qF - c)/F = qT - Tc/F < R(\hat{p}) = qT - T(1 - q)c/F.$$

Если $qF > (1 - q)c$, то $R(\hat{p}) > 0$, $R^* = \max_{0 \leq p \leq 1} R(p) = R(\hat{p})$, $p^* = \hat{p}$.

Если $qF \leq (1 - q)c$, то $R(\hat{p}) \leq 0$, $R^* = p^* = 0$.

21.2. 1) Из условия следует, что $Fq > c$. Поэтому функция $R(p)$ возрастает на полуинтервале $[0, \hat{p})$ и постоянна на отрезке $[\hat{p}, 1]$. Из $R(\hat{p}) > 0$ получаем $p^* \in [\hat{p}, 1]$.

2) Имеем $F = c/q < \overline{F} = (qm + 1 - q)c/(qm)$. Поэтому функция $R(p)$ равна нулю на полуинтервале $[0, \hat{p})$ и убывает на отрезке $[\hat{p}, 1]$. Из $R(\hat{p}) > 0$ получаем $p^* = \hat{p}$.

Приложение

П1. Теорема об отделяющей гиперплоскости

Теорема П.1. Пусть A и B — два выпуклых непересекающихся компакта в E^m . Тогда найдется гиперплоскость $\langle a, x \rangle = b$, строго отделяющая множества A и B , т.е.

$$\langle a, x \rangle < b < \langle a, y \rangle \quad \forall x \in A, \quad \forall y \in B.$$

Доказательство. Рассмотрим на $A \times B$ функцию $|x - y|^2$, где $x \in A$, $y \in B$, и пусть пара (x^0, y^0) — точка ее минимума. Тогда $|x^0 - y^0| > 0$. Покажем, что гиперплоскость $\langle a, x \rangle = b$ при $a = y^0 - x^0$, $b = \frac{1}{2}(|y^0|^2 - |x^0|^2)$ является искомой.

Докажем, что $\langle a, x \rangle < b \quad \forall x \in A$. Предположим противное. Тогда найдется такая точка $x' \in A$, что $\langle a, x' \rangle \geq b$. Рассмотрим функцию $g(t) = |y^0 - (1 - t)x^0 - tx'|^2$, $t \in [0, 1]$. Имеем

$$\begin{aligned} g'(0) &= 2\langle y^0 - x^0, x^0 - x' \rangle = 2\langle y^0 - x^0, x^0 \rangle - 2\langle a, x' \rangle \leq \\ &\leq 2\langle y^0, x^0 \rangle - 2|x^0|^2 - 2b = 2\langle y^0, x^0 \rangle - |x^0|^2 - |y^0|^2 = -|x^0 - y^0|^2 < 0. \end{aligned}$$

Следовательно, при положительных и близких к нулю t $g(t) < g(0)$, что противоречит определению пары (x^0, y^0) . Второе неравенство $b < \langle a, y \rangle \quad \forall y \in B$ доказывается аналогично. ■

П2. Доказательство теоремы 6.1

Теорема очевидна для E^0 . Пусть она верна для E^{m-1} . Рассмотрим семейство выпуклых компактов D_α , $\alpha \in \mathcal{L}$ из E^m , каждые $m+1$ из которых имеют непустое пересечение.

Докажем сначала, что любое конечное подсемейство семейства D_α , $\alpha \in \mathcal{L}$ имеет непустое пересечение. Предположим противное. Тогда найдется минимальное целое $k > m + 1$, для которого найдется такое подсемейство D_{α_i} , $i = 1, \dots, k$, что $\bigcap_{i=1}^k D_{\alpha_i} = \emptyset$, $\bigcap_{i=1}^{k-1} D_{\alpha_i} \neq \emptyset$. Положим

$A = D_{\alpha_k}$, $B = \bigcap_{i=1}^{k-1} D_{\alpha_i}$. Выпуклые компакты A и B не пересекаются и найдется строго отделяющая их гиперплоскость H (см. П1.) Пусть C — пересечение каких-либо m множеств из $D_{\alpha_1}, \dots, D_{\alpha_{k-1}}$. Тогда $B \subseteq C$ и по условию $C \cap A \neq \emptyset$. Возьмем $x^0 \in C \cap A$ и $y^0 \in B$. Тогда отрезок

$[x^0, y^0]$ принадлежит C и пересекается с H . Следовательно, $C \cap H \neq \emptyset$. Итак, любые m множеств из $D_{\alpha_1} \cap H, \dots, D_{\alpha_{k-1}} \cap H$ имеют непустое пересечение. По индуктивному предположению $\bigcap_{i=1}^{k-1} D_{\alpha_i} \cap H = B \cap H \neq \emptyset$, что противоречит построению гиперплоскости H .

Завершим доказательство теоремы. Предположим, что $\bigcap_{\alpha \in \mathcal{L}} D_\alpha = \emptyset$. Пусть $X = D_{\alpha'}$ — некоторый компакт из семейства D_α , $\alpha \in \mathcal{L}$. Определим новое семейство $D'_\alpha = D_\alpha \cap X$, $\alpha \in \mathcal{L}$. Тогда $\bigcap_{\alpha \in \mathcal{L}} D'_\alpha = \emptyset$ и множества $\overline{D}'_\alpha = E^m \setminus D'_\alpha$ образуют открытое покрытие компакта X , из которого можно выделить конечное подпокрытие $\overline{D}'_{\alpha_1}, \dots, \overline{D}'_{\alpha_p}$. Отсюда вытекает, что $\bigcap_{i=1}^p D'_{\alpha_i} = \bigcap_{i=1}^p D_{\alpha_i} \cap D_{\alpha'} = \emptyset$. По доказанному любое конечное подсемейство семейства D_α , $\alpha \in \mathcal{L}$ имеет непустое пересечение (противоречие). ■

П3. Функция Минковского и гомеоморфизм выпуклых компактов

Пусть A — выпуклый компакт в E^m , содержащий внутри себя нуль вместе с ε_0 -окрестностью нуля O_{ε_0} . Определим на E^m функцию Минковского множества A

$$p_A(x) = \inf \left\{ t > 0 \mid \frac{x}{t} \in A \right\}.$$

Рассмотрим ее свойства. Очевидно, что $p_A(0) = 0$, а при $x \neq 0$ $p_A(x) > 0$ и нижняя грань достигается, поскольку множество A ограничено и замкнуто. Кроме того, $p_A(x) \leq 1 \Leftrightarrow x \in A$. Функция $p_A(x)$ положительно однородна, т.е. для любого $\lambda > 0$

$$p_A(\lambda x) = \lambda \inf \left\{ \frac{t}{\lambda} > 0 \mid \frac{\lambda x}{t} \in A \right\} = \lambda p_A(x) \quad \forall x \in E^m.$$

Докажем, что функция $p_A(x)$ субаддитивна, т.е.

$$p_A(x + y) \leq p_A(x) + p_A(y) \quad \forall x, y \in E^m. \quad (\text{П.1})$$

Действительно, возьмем $x, y \neq 0$. Вектор

$$\frac{x + y}{p_A(x) + p_A(y)} = \frac{p_A(x)}{p_A(x) + p_A(y)} \cdot \frac{x}{p_A(x)} + \frac{p_A(y)}{p_A(x) + p_A(y)} \cdot \frac{y}{p_A(y)}$$

принадлежит множеству A , поскольку является выпуклой комбинацией векторов $\frac{x}{p_A(x)}, \frac{y}{p_A(y)}$ из A . Отсюда получаем неравенство (П.1).

Докажем, что функция Минковского непрерывна. Действительно, для любого $x \in O_{\varepsilon_0}$

$$\frac{x}{p_A(x)} \notin O_{\varepsilon_0} \Rightarrow \frac{|x|}{p_A(x)} \geq \varepsilon_0 \Rightarrow p_A(x) \leq \frac{|x|}{\varepsilon_0}.$$

Отсюда следует, что $p_A(x)$ непрерывна в нуле. Непрерывность функции $p_A(x)$ в любой точке x^0 вытекает из неравенства (субаддитивность) $|p_A(x) - p_A(x^0)| \leq \max[p_A(x - x^0), p_A(x^0 - x)]$ и ее непрерывности в нуле.

Теорема П.2. Пусть выпуклые компакты A и B в E^m содержат внутренние точки. Тогда найдется взаимно однозначное и непрерывное отображение (гомеоморфизм) A на B .

Доказательство. Без потери общности будем считать, что нуль содержится в $A \cap B$ вместе со своей окрестностью O_{ε_0} . Определим отображение

$$\tau : A \rightarrow B, \tau(0) = 0, \tau(x) = \frac{p_A(x)}{p_B(x)}x, \quad x \neq 0,$$

где $p_A(x), p_B(x)$ — функции Минковского множеств A и B . Нетрудно проверить, что

$$\tau^{-1}(y) = \frac{p_B(y)}{p_A(y)}y$$

— отображение, обратное к τ . Поскольку функции $p_A(x), p_B(x)$ непрерывны, отображение $\tau(x)$ непрерывно при $x \neq 0$. Проверим непрерывность $\tau(x)$ в нуле. Множество B ограничено и поэтому найдется такое число α , что для всех $x \in B$ $|x| \leq \alpha$. Поскольку $\frac{x}{p_B(x)} \in B$, $\frac{|x|}{p_B(x)} \leq \alpha$. Для любого вектора $x \in O_{\varepsilon_0}$ выполнено неравенство $p_A(x) \leq \frac{|x|}{\varepsilon_0}$ (см. выше доказательство непрерывности функции $p_A(x)$). Следовательно, для всякого $x \in O_{\varepsilon_0}$

$$|\tau(x)| = \frac{p_A(x)}{p_B(x)}|x| \leq \frac{\alpha|x|}{\varepsilon_0}.$$

■

П4. Симплексы и теорема о неподвижной точке

Пусть $\{x^1, \dots, x^{n+1}\}$ — множество векторов из E^m ($n \leq m$), выпуклая

оболочка которого

$$K = \{x \in E^m \mid x = \sum_{i=1}^{n+1} \lambda_i x^i, \sum_{i=1}^{n+1} \lambda_i = 1, \lambda_i \geq 0, i = 1, \dots, n+1\}$$

имеет размерность n . Тогда множество K называется *симплексом*, порожденным вершинами $x^1, \dots, x^{n+1}$. Для симплекса K будем также использовать обозначение $K = \overline{x^1 \dots x^{n+1}}$. Размерность n означает линейную независимость векторов $x^{n+1} - x^1, \dots, x^{n+1} - x^n$. Отсюда вытекает, что для всякого $x \in K$ коэффициенты $\lambda_i(x)$, $i = 1, \dots, n+1$, в разложении x по x^i определены однозначно и являются непрерывными функциями на K .

Всякое множество, содержащее $r \leq n+1$ вершин, порождает $(r-1)$ -мерный симплекс, называемый гранью симплекса K . Вершины $x^1, \dots, x^{n+1}$ являются нульмерными гранями. n -мерная грань совпадает с K . Одномерные грани $\overline{x^i x^j}$, $i \neq j$, называются *ребрами* симплекса K . *Диаметр* симплекса K определяется как максимальная длина его ребер. Подмножество K^0 симплекса K вида

$$K^0 = \{x \in E^m \mid x = \sum_{i=1}^{n+1} \lambda_i x^i, \sum_{i=1}^{n+1} \lambda_i = 1, \lambda_i > 0, i = 1, \dots, n+1\}$$

называется *открытым симплексом*, порожденным вершинами $x^1, \dots, x^{n+1}$. Для открытого симплекса будем также использовать обозначение $K^0 = x^1 \dots x^{n+1}$. Нульмерные симплексы являются открытыми. Открытые ребра будем обозначать через $x^i x^j$.

Пусть симплекс K таким образом разбит на открытые попарно непесекающиеся симплексы $K_1, \dots, K_p$, что любая открытая грань каждого симплекса K_j принадлежит разбиению. Такое разбиение называется *симплициальным*. Симплексы K_j , принадлежащие K^0 , образуют разбиение открытого симплекса.

На рис. П.1 приведен пример симплициального разбиения двумерного симплекса K на два двумерных, пять одномерных и четыре нульмерных открытых симплекса.




Рис. П.1

Соответствующий открытый симплекс K^0 разбит на два двумерных и один одномерный открытых симплекса. Если удалить из разбиения нульмерный симплекс y , а ребра x^2y и yx^3 заменить на ребро x^2x^3 , то получим пример несимплициального разбиения. Для симплициального разбиения π через $\delta(\pi)$ обозначим максимальный диаметр симплексов, входящих в π .

Точка $\frac{1}{n+1} \sum_{i=1}^{n+1} x^i$ называется *барицентром* симплекса K . Определим симплициальное разбиение, называемое *барицентрическим*, каждое ребро которого соединяет барицентры грани и некоторой ее подграни симплекса K . Для симплекса $\overline{x^1x^2}$ оно состоит из вершин x^1, x^2 , его барицентра $b = \frac{1}{2}(x^1 + x^2)$ и двух открытых ребер x^1b и bx^2 . Предположим, что барицентрическое разбиение определено для любого симплекса размерности $k \leq n - 1$.

Определим его для симплекса K размерности n с барицентром b . Пусть π' — семейство открытых симплексов, входящих в барицентрические разбиения всех $(n - 1)$ -мерных граней симплекса K . Возьмем произвольный симплекс $K' = \overline{y^1 \cdots y^l}$, $l \leq n$ из π' . Предположим по индукции, что каждое его ребро $\overline{y^i y^j}$ соединяет барицентры некоторой грани и ее подграни симплекса K . Нетрудно видеть, что аналогичным свойством обладает и симплекс $\overline{y^1 \cdots y^l b}$. Совокупность всех таких симплексов $\overline{y^1 \cdots y^l b}$ и барицентр b добавим к семейству π' . В результате получим барицентрическое разбиение π_1 симплекса K .

Покажем, что $\delta(\pi_1) \leq \frac{n}{n+1}d$, где d — диаметр симплекса K . Действительно, возьмем любое ребро $\overline{b'b''}$ разбиения π_1 , где без потери общности

$$b' = \frac{1}{s+1} \sum_{i=1}^{s+1} x^i, \quad b'' = \frac{1}{r+1} \sum_{j=1}^{r+1} x^j, \quad r < s \leq n.$$

Тогда

$$\begin{aligned} |b' - b''| &= \left| \frac{1}{s+1} \sum_{i=1}^{s+1} (x^i - b'') \right| = \\ &= \left| \frac{1}{s+1} \frac{1}{r+1} \sum_{i=1}^{s+1} \sum_{j=1}^{r+1} (x^i - x^j) \right| \leq \frac{s(r+1)d}{(s+1)(r+1)} \leq \frac{nd}{n+1}. \end{aligned}$$

Итак, $\delta(\pi_1) \leq \frac{n}{n+1}d$. Если каждый симплекс, принадлежащий разбиению π_1 , подвергнуть барицентрическому разбиению, получим симплицеальное разбиение π_2 , для которого $\delta(\pi_2) \leq (\frac{n}{n+1})^2 d$. Повторяя аналогичную процедуру k раз, получим симплицеальное разбиение π_k с $\delta(\pi_k) \leq (\frac{n}{n+1})^k d$.

Теорема П.3 (лемма Шпернера). Пусть π — симплицеальное разбиение n -мерного симплекса $K = \overline{x^1 \dots x^{n+1}}$, а функция $\nu : K \rightarrow \{x^1, \dots, x^{n+1}\}$ удовлетворяет условию

$$\nu(x) \in \{x^i \mid \lambda_i(x) > 0\} \quad \forall x \in K.$$

Тогда найдется такой n -мерный симплекс $y^1 \dots y^{n+1}$ разбиения π , что $\nu(y^i) = x^i$, $i = 1, \dots, n+1$. Число таких симплексов нечетно.

Доказательство. Для $n = 0$ утверждение теоремы очевидно. Предположим, что она справедлива для $(n-1)$ -мерных симплексов. Пусть $K_1, \dots, K_p$ — n -мерные открытые симплексы, входящие в разбиение π . Будем говорить, что $(n-1)$ -мерная грань $y^1 \dots y^n$ симплекса $K_j = y^1 \dots y^{n+1}$ отмечена, если $\nu(y^i) = x^i$, $i = 1, \dots, n$.

Если симплекс K_j удовлетворяет утверждению теоремы, то, ввиду равенств $\nu(y^i) = x^i$, $i = 1, \dots, n+1$, он имеет ровно одну отмеченную грань. Действительно, любая другая $(n-1)$ -мерная грань симплекса K_j содержит вершину y^{n+1} . Но $\nu(y^{n+1}) = x^{n+1}$ и эта грань не является отмеченной. Пусть симплекс K_j не удовлетворяет утверждению теоремы и имеет отмеченную грань $y^1 \dots y^n$. Тогда он имеет ровно две отмеченные грани. Действительно, по предположению $\nu(y^i) = x^i$, $i = 1, \dots, n$ и без потери общности $\nu(y^{n+1}) = x^1$. Тогда $(n-1)$ -мерные грани $y^1 \dots y^n$ и $y^2 \dots y^{n+1}$ являются отмеченными.

Пусть σ_j — число отмеченных граней симплекса K_j . По доказанному $\sigma_j \in \{0, 1, 2\}$ и $\sigma_j = 1$ только в том случае, когда симплекс K_j удовлетворяет утверждению теоремы. Поэтому осталось доказать, что общее число отмеченных граней $\chi = \sum_{j=1}^p \sigma_j$ нечетно. В этом случае обязательно найдется симплекс K_j , удовлетворяющий утверждению теоремы.

Пусть $V = y^1 \cdots y^n$ — какая-либо $(n-1)$ -мерная отмеченная открытая грань симплекса K_j . Если $V \subset K \setminus K^0$, то V принадлежит некоторой $(n-1)$ -мерной грани симплекса K и является гранью единственного n -мерного симплекса разбиения π . При этом из равенств $\nu(y^i) = x^i$, $i = 1, \dots, n$, следует, что $V \subset W \stackrel{\text{def}}{=} \overline{x^1 \cdots x^n}$. Действительно, если бы грань V принадлежала другой грани симплекса K , скажем, $\overline{x^2 \cdots x^{n+1}}$, то по определению функции ν равенство $\nu(y^1) = x^1$ было бы невозможно. Пусть $V \not\subset K \setminus K^0$. Тогда V является общей гранью ровно двух n -мерных симплексов, входящих в разбиение π и в сумме χ она учитывается дважды. Следовательно, число χ сравнимо по модулю 2 с числом $(n-1)$ -мерных симплексов $V = y^1 \cdots y^n \subset W$, для которых $\nu(y^i) = x^i$, $i = 1, \dots, n$. По индуктивному предположению, примененному к $(n-1)$ -мерному симплексу W , это число нечетно. Поэтому число χ также нечетно. ■

Теорема П.4 (Кнастер, Куратовский, Мазуркевич). Пусть замкнутые подмножества $C_1, \dots, C_{n+1}$ симплекса $K = \overline{x^1 \cdots x^{n+1}}$ удовлетворяют условию

$$\overline{x^{j_1} \cdots x^{j_s}} \subseteq \cup_{r=1}^s C_{j_r} \quad \forall \quad 1 \leq j_1 < j_2 < \dots < j_s \leq n+1.$$

Тогда множества $C_1, \dots, C_{n+1}$ имеют непустое пересечение.

Доказательство. Рассмотрим последовательность $\{\pi_k\}$ построенных ранее симплициальных разбиений симплекса K , для которой $\lim_{k \rightarrow \infty} \delta(\pi_k) = 0$. Определим отображение $\nu : K \rightarrow \{x^1, \dots, x^{n+1}\}$ следующим образом. Для любого $x \in K$ пусть

$$\{x^j \mid \lambda_j(x) > 0\} = \{x^{j_1}, \dots, x^{j_s}\}, \quad j_1 < j_2 < \dots < j_s.$$

Тогда по условию $x \in \cup_{r=1}^s C_{j_r}$. Положим $\nu(x) = x^{j_t}$, где t — минимальное число, для которого $x \in \cup_{r=1}^t C_{j_r}$. Отметим, что $x \notin \cup_{r=1}^{t-1} C_{j_r}$ и, следовательно, $x \in C_{j_t}$. По предыдущей теореме существует симплекс $y^1(k) \cdots y^{n+1}(k)$ разбиения π_k , для которого $\nu(y^i(k)) = x^i$, $i = 1, \dots, n+1$. Заметим, что для каждого вектора $y^i(k)$ по определению отображения ν $j_t = i$ и поэтому $y^i(k) \in C_i$, $i = 1, \dots, n+1$. Поскольку K — компакт, без потери общности можно считать, что последовательности $\{y^i(k)\}$ сходятся. Но $\lim_{k \rightarrow \infty} \delta(\pi_k) = 0$. Поэтому при $k \rightarrow \infty$ диаметр симплекса $y^1(k) \cdots y^{n+1}(k)$ стремится к нулю. Следовательно, $\lim_{k \rightarrow \infty} y^i(k) = y^*$, $i = 1, \dots, n+1$. Поскольку при всех i $y^i(k) \in C_i$, а множества C_i замкнуты, имеем $y^* \in \bigcap_{i=1}^{n+1} C_i$. ■

Уточним формулировку теоремы 9.1. Пусть Z — выпуклый компакт в E^m и $\overline{y^1 \dots y^{n+1}}$ — содержащийся в нем симплекс максимальной размерности. Тогда число $n \leq m$ называется *размерностью* множества Z . Выпуклый компакт Z максимальной размерности m имеет внутреннюю точку (например, барицентр симплекса $\overline{y^1 \dots y^{m+1}}$). Обратно, если Z имеет внутреннюю точку, то его размерность максимальна. Предположим, что Z имеет размерность $n < m$ и содержит нуль. Тогда можно считать, что $y^{n+1} = \mathbf{0}$. При этом Z является подмножеством евклидова пространства E^n с базисом $y^1, \dots, y^n$.

Из сказанного вытекает, что в теореме 9.1 без потери общности можно предположить, что выпуклый компакт Z имеет максимальную размерность m .

Доказательство теоремы 9.1 (Брауэра). Пусть $K = \overline{x^1 \dots x^{m+1}}$ — m -мерный симплекс в E^m . По теореме П.2 (см. ПЗ) найдется гомеоморфизм $\tau : Z \rightarrow K$. Отображение $\tau \circ f \circ \tau^{-1}$ переводит точку $y \in K$ в точку $\tau(f(\tau^{-1}(y))) \in K$ и является непрерывным. Если $y^0 \in K$ — неподвижная точка отображения $\tau \circ f \circ \tau^{-1}$, то $x^0 = \tau^{-1}(y^0)$ — неподвижная точка отображения $f : Z \rightarrow Z$. Поэтому без потери общности можно считать, что $Z = K$.

Положим

$$C_i = \{x \in K \mid \lambda_i(f(x)) \leq \lambda_i(x)\}, \quad i = 1, \dots, m+1.$$

Поскольку отображение f и функции $\lambda_i(x)$ непрерывны на K , множества C_i замкнуты. Покажем, что множества C_i удовлетворяют условию предыдущей теоремы. Пусть $x \in \overline{x^{j_1} \dots x^{j_s}}$. Тогда

$$\lambda_j(x) = 0 \quad \forall j \notin \{x^{j_1}, \dots, x^{j_s}\} \Rightarrow \sum_{r=1}^s \lambda_{j_r}(x) = 1 \geq \sum_{r=1}^s \lambda_{j_r}(f(x)).$$

Следовательно, найдется номер r , при котором $\lambda_{j_r}(x) \geq \lambda_{j_r}(f(x))$ и $x \in C_{j_r}$. По предыдущей теореме найдется

$$x^* \in \bigcap_{i=1}^{m+1} C_i \Rightarrow \lambda_i(x^*) \geq \lambda_i(f(x^*)), \quad i = 1, \dots, m+1.$$

Но

$$\sum_{i=1}^{m+1} \lambda_i(x^*) = \sum_{i=1}^{m+1} \lambda_i(f(x^*)) = 1.$$

Поэтому

$$\lambda_i(x^*) = \lambda_i(f(x^*)), \quad i = 1, \dots, m+1 \Rightarrow x^* = f(x^*). \quad \blacksquare$$

Доказательство теоремы 12.1 (Какутани). Как и при доказательстве теоремы Брауэра, без потери общности можно считать, что выпуклый компакт Z имеет максимальную размерность m .

Пусть $K = \overline{x^1 \dots x^{m+1}}$ — m -мерный симплекс в E^m . По теореме П.2 (см. П3) найдется гомеоморфизм $\varphi : K \rightarrow Z$. Рассмотрим последовательность $\{\pi_k\}$ симплициальных разбиений симплекса K , для которой $\lim_{k \rightarrow \infty} \delta(\pi_k) = 0$. Для произвольного k определим следующее непрерывное отображение $\Phi^k : K \rightarrow Z$. Для любой вершины x из $\{\pi_k\}$ выберем точку $\Phi^k(x) \in \Phi(\varphi(x))$ и затем продолжим отображение линейно на каждый из симплексов, входящих в $\{\pi_k\}$, т.е. если

$$x = \sum_{j=1}^{m+1} \lambda_j x^j, \quad \sum_{j=1}^{m+1} \lambda_j = 1, \quad \lambda_j \geq 0, \quad j = 1, \dots, m+1,$$

— точка симплекса $x^1 \dots x^{m+1} \in \{\pi_k\}$, то полагаем

$$\Phi^k(x) = \sum_{j=1}^{m+1} \Phi^k(x^j).$$

Очевидно, что последнее равенство определяет непрерывное отображение $\Phi^k : K \rightarrow Z$. Тогда $f^k = \varphi^{-1} \Phi^k : K \rightarrow K$ является непрерывным отображением и имеет неподвижную точку $\bar{x}^k$. Пусть $\bar{x}^k$ принадлежит симплексу $x^{1k} \dots x^{m+1k} \in \{\pi_k\}$, т.е.

$$\bar{x}^k = \sum_{j=1}^{m+1} \lambda_j^k x^{jk}, \quad \sum_{j=1}^{m+1} \lambda_j^k = 1, \quad \lambda_j^k \geq 0, \quad j = 1, \dots, m+1.$$

Не умаляя общности, можно считать, что последовательности $\{\bar{x}^k\}$, $\{\bar{x}^{jk}\}$, $\{\lambda_j^k\}$, $\{\Phi^k(x^{jk})\}$, $j = 1, \dots, m+1$, сходятся при $k \rightarrow \infty$. Поскольку диаметры симплексов $x^{1k} \dots x^{m+1k}$ стремятся к нулю, последовательности $\{\bar{x}^k\}$ и $\{\bar{x}^{jk}\}$ должны иметь общий предел $x^* \in K$. Пусть

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \lambda_j^k = \lambda_j^*, \quad \lim_{k \rightarrow \infty} \Phi^k(x^{jk}) = \eta^j, \quad j = 1, \dots, m+1.$$

Имеем

$$\varphi(\bar{x}^k) = \Phi^k(\bar{x}^k) = \sum_{j=1}^{m+1} \lambda_j^k \Phi^k(x^{jk}) \quad (\text{П.2})$$

и $\lim_{k \rightarrow \infty} \varphi(x^{jk}) = \varphi(x^*)$, $\lim_{k \rightarrow \infty} \varphi(\bar{x}^k) = \varphi(x^*)$ в силу непрерывности отображения φ . Переходя в равенстве (П.2) к пределу при $k \rightarrow \infty$, получим

$$\varphi(x^*) = \sum_{j=1}^{m+1} \lambda_j^* \eta^j, \quad \sum_{j=1}^{m+1} \lambda_j^* = 1, \quad \lambda_j^* \geq 0, \quad j = 1, \dots, m+1.$$

Из замкнутости отображения Φ вытекает, что

$\eta^j \in \Phi(\varphi(x^*))$, $j = 1, \dots, m+1$. Поскольку множество $\Phi(\varphi(x^*))$ выпукло, точка $\varphi(x^*)$ ему принадлежит и является искомой. ■

Список литературы

- [1] Activity analysis of production and allocation (Cowles Commission Monograph № 13, ed. Koopmans T.C.). — N.Y.: J.Wiley, 1951.
- [2] Allen B., Hellwig M. Bertrand-Edgeworth oligopoly in large markets. Review of Economic Studies, 1986, v. 53, p. 175-204.
- [3] Amir R. Cournot oligopoly and the theory of supermodular games. Games and Economic Behavior, 1996, v. 15, p. 132-148.
- [4] Atkinson A.B., Stiglitz J.E. Lectures on public economics. — London: McGraw-Hill, 1980.
- [5] Ашманов С.А. Линейное программирование. — М.: Наука, 1981.
- [6] Ашманов С.А., Тимохов А.В. Теория оптимизации в задачах и упражнениях. — М.: Наука, 1991.
- [7] Aumann R.J. The core of a cooperative game without side payments. Trans. Amer. Math. Soc., 1961, v.98, № 3, p. 539-552.

- [8] Беленький В.З., Волконский В.А., Иванков С.А., Поманский А.Б., Шапиро А.Д. Итеративные методы в теории игр и программировании. — М.: Наука, 1974.
- [9] Бесконечные антагонистические игры. Сб. статей под ред. Н.Н.Воробьева. — М.: Физматгиз, 1963.
- [10] Bertrand J. Review de théorie mathématique de la richesse sociale. Recherches sur les principes mathématique de la théorie des richesses. Journal des Savants, 1883, p. 499-508.
- [11] Блекуэл Д., Гиршик М. Теория игр и статистических решений. — М.: Иностранная литература, 1958.
- [12] Боненбласт Х.Ф., Карлин С., Шепли Л.С. Игры с непрерывной функцией выигрыша. В сб. [9], с. 337-352.
- [13] Бондарева О.Н. Некоторые применения методов линейного программирования к теории кооперативных игр. Проблемы кибернетики. 1963, вып.10, с. 119-140.
- [14] Borges T. Iterated elimination of dominated strategies in a Bertrand-Edgeworth model. Review of Economic Studies, 1992, v. 59, p. 163-176.
- [15] Borel E. 1) The theory of play and integral equations with skew symmetric kernels. 2) On games that involve chance and skill of the players. 3) On system of linear forms of skew symmetric determinants and the general theory of play. Econometrica, 1953, v. 21, № 1, p. 97-117.
- [16] Borel E. Application aux jeux de hasard. Traité du calcul des probabilités et des ses applications, Applications des jeux hasard, E.Borel et collab. — Paris: Gauthier — Villars, 1938, v. IV, fasc. 2, p. 122.
- [17] Brown G.W. Iterative solutions of games by fictitious play. In collected book [1], p. 374-376.
- [18] Brouwer L.E.J. On continuous vector disributions of surfaces. Amsterdam Proc., 1909, v. 11, continued in 1910, v. 12,13.

- [19] Walras L. *Éléments d'économie politique pure*. — Lausanne, 1874.
- [20] Wald A. Contributions to the theory of statistical estimation and testing hypotheses. *Ann. Math. Stat.*, 1939, v. 10, № 4, p. 299-326.
- [21] Вальд А. Статистические решающие функции. В сб. [65], с. 300-522.
- [22] Васин А.А. Модели процессов с несколькими участниками. — М.: Изд-во Моск. ун-та, 1983.
- [23] Васин А.А. Модели динамики коллективного поведения. — М.: Изд-во Моск. ун-та, 1989.
- [24] Васин А.А., Панова Е.И. Собираемость налогов и коррупция в налоговых органах. — М.: Российская программа экономических исследований, 2000, Сер. "научные доклады", № 99/10.
- [25] Васин А.А., Агапова О.Б. Математическая модель оптимальной организации налоговой инспекции. В сб. "Программно-аппаратные средства и математическое обеспечение вычислительных систем". — М.: Изд-во Моск. ун-та, 1993, с. 167-186.
- [26] Васин А.А. , Васина П.А. Оптимизация налоговой системы в условиях уклонения от налогов. Роль ограничений на штраф. — М.: Российская программа экономических исследований, 2002, Сер. "научные доклады", № 01/09.
- [27] Васин А.А. , Васина П.А., Мархуэнда Ф.Х. Налоговое принуждение для неоднородных фирм./ Препринт № 2001/025. — М.: Российская экономическая школа, 2001.
- [28] Ватель И.А., Ерешко Ф.И. Математика конфликта и сотрудничества. — М.: Знание, 1974.
- [29] Вентцель Е.С. Исследование операций. — М.: Советское радио, 1981.
- [30] Ville J. Sur la théorie générale des jeux où intervient l'abileté des joueurs, *Traité du calcul des probabilités et des ses applications, Applications des jeux hasard*, E.Borel et collab. — Paris: Gauthier — Villars, 1938, v. IV, fasc. 2, p. 105-113.

- [31] Вилкас Э.Й. Оптимальность в играх и решениях. — М.: Наука, 1990.
- [32] Vives X. Rationing rules and Bertrand-Edgeworth equilibria in large markets. *Economic Letters*. 1986, v. 21, p. 113-116.
- [33] Wolfowitz J. Minimax estimates of the mean of normal distribution with known variance. *Ann. Math. Stat.*, 1950, v. 21, № 2, p. 218-230.
- [34] Воробьев Н.Н. Основы теории игр. Бескоалиционные игры. — М.: Наука, 1984.
- [35] Гейл Д. Теория линейных экономических моделей. — М.: ИЛ, 1963.
- [36] Гермейер Ю.Б. Введение в теорию исследования операций. — М.: Наука, 1971.
- [37] Гермейер Ю.Б. Игры с противоположными интересами. — М.: Наука, 1976.
- [38] Гермейер Ю.Б. Об играх двух лиц с фиксированной последовательностью ходов. *ДАН*, 1971, v. 198, № 5, с. 1001-1004.
- [39] Горелик В.А. Теория игр и исследование операций. — М: Изд-во МИНГП, 1978.
- [40] Грень Е. Статистические игры и их применение. — М.: Статистика, 1975.
- [41] Давыдов Э.Г. Исследование операций. — М.: Высшая школа, 1990.
- [42] Данцер Л., Грюнбаум Б., Кли В. Теорема Хелли. — М.: Мир, 1968.
- [43] Dantzig G.B. A proof of the equivalence of the programming problem and the problem. In collected book [1], p. 330-335.
- [44] Gilles D.B. Solutions to general non-zero-sum games. Contributions to the theory of games. IV (Kuhn H.W., Tucker A.W. eds.). *Ann. Math. Studies*, № 40, — Princeton: Princeton Univ. Press, 1959, p. 47-86.

- [45] Дрешер М. Стратегические игры. Теория и приложения. — М.: Советское радио, 1964.
- [46] Дюбин Г.Н., Суздаль В.Г. Введение в прикладную теорию игр. — М.: Наука, 1981.
- [47] Kakutani S. A generalisation of Brower's fixed point theorem. Duke Math. J., 1941, v. 8, № 3, p. 457-459.
- [48] Карлин С. Математические методы в теории игр, программировании и экономике. — М.: Мир, 1964.
- [49] Кини Р.Л., Райфа Х. Принятие решений при многих критериях. Предпочтения и замещения. — М.: Радио и связь, 1981.
- [50] Колмогоров А.Н., Фомин С.В. Элементы теории функций и функционального анализа. — М.: Наука, 1972.
- [51] Cowell F., Gordon G.F. Auditing with "ghosts". In book "The Economics of Organized Crime". 1995, p. 184-198.
- [52] Кононенко А.Ф., Новикова Н.М. Обзор развития игр Гермейера. В сб. "Программное оборудование и вопросы принятия решений". — М.: Изд-во Моск. ун-та, 1989, с. 201-210.
- [53] Knaster B., Kuratowski C., Masurkiewicz S. Ein Beweis des Fixpunktsatzes für n-dimensionale Simplexe. Fund. Math., 1929, B. 14, S. 132-137.
- [54] Kreps D., Scheinkman J. Quantity precommitment and Bertrand competition yield Cournot outcomes. The Bell J. of Economics, 1983, v. 14, p. 326-337.
- [55] Кукушкин Н.С., Морозов В.В. Теория неантагонистических игр. — М.: Изд-во Моск. ун-та, 1984.
- [56] Kukushkin N. A fixed point theorem for decreasing mappings. Economic Letters, 1999, v. 46, p. 23-26.
- [57] Кукушкин Н.С. Роль взаимной информированности сторон в играх двух лиц с противоположными интересами. — ЖВМ и МФ, 1972, т. 12, № 4, с. 1029-1034.

- [58] Кун Г.У. Позиционные игры и проблема информации. В сб. [82], с. 13-40.
- [59] Cournot A.A. Recherches sur les principes mathematic de la théorie des riches. — Paris, 1838.
- [60] Lemke C.E., Howson J.J., Jr. Equilibrium points of bimatrix games. Proc. Nat. Acad. Sci. U.S.A., 1961, v. 47, p. 1657-1662.
- [61] Льюс Р. и Райфа Х. Игры и решения. Введение и критический обзор. — М.: Иностранная литература, 1961.
- [62] Myles G. Public economics. Cambridge, 1996.
- [63] Мак-Кинси Дж. Введение в теорию игр. — М.: Физматгиз, 1960.
- [64] МакКоннелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс. — М.: ИНФРА-М, 2003.
- [65] Матричные игры. Сб. статей под ред. Н.Н.Воробьева. — М.: Физматгиз, 1961.
- [66] Мовшович С.М., Богданова М.С., Крупенина Г.А. Рационализация структуры налогов в переходной экономике России. — М.: Российская экономическая школа, 1997.
- [67] Морозов В.В., Сухарев А.Г., Федоров В.В. Исследование операций в задачах и упражнениях. — М.: Высшая школа, 1986.
- [68] Морозов В.В., Аъзамхужаев М.Х. О поиске дележей дискретной кооперативной игры. В сб. "Применение вычислительных средств в научных исследованиях и учебном процессе." — М.: Изд-во Моск. ун-та, 1992, с. 49-62.
- [69] Moreno D., Ubeda L. Capacity precommitment and price competition yield Cournot outcomes. Universidad Carlos 3 de Madrid, Economic Series, 2001, 08 WP 01-44.
- [70] Моцкин Т.С., Райфа Х., Томпсон Дж.Л., Тролл Р.М. Метод двойного описания. В сб. [65], с. 81-109.
- [71] Мулен Э. Теория игр. С примерами из математической экономики. — М.: Мир, 1985.

- [72] Нейман Дж. фон. , Моргенштерн О. Теория игр и экономическое поведение. — М.: Наука, 1970.
- [73] Нейман Дж. фон. К теории стратегических игр. В сб. [65], с. 174-204.
- [74] Neumann J. von. Über ein ökonomisches Gleichungssystem und eine Verallgemeinerung des Browserschen Fixpunktsatzes. Erg. Math. Kolloqu., 1937, B. 8, S. 73-83.
- [75] Никайдо Х., Исода К. Заметка о бескоалиционных выпуклых играх, В сб. [9], с. 449-458.
- [76] Нэш Дж. Бескоалиционные игры. В сб. [65] , с. 205-221.
- [77] Novchek W. On the existence of Cournot equilibrium. Review of Economic Studies, 1985, v. 52, p. 85-98.
- [78] Оуэн Г. Теория игр. — М.: Мир, 1971.
- [79] Партхасаратхи Т., Рагхаван Т. Некоторые вопросы теории игр двух лиц. — М.: Мир, 1974.
- [80] Петров А.А.Б, Поспелов И.Г., Шананин А.А. Опыт математического моделирования экономики. — М.: Энергоатомиздат, 1996.
- [81] Петросян Л.А., Зенкевич Н.А., Семина Е.А. Теория игр. — М.: Высшая школа, 1998.
- [82] Позиционные игры. Сб. статей под ред. Н.Н.Воробьева. — М.: Наука, 1967.
- [83] Radon J. Mengen konvexer Körper, die einen gemeinsam Punkt enthalten. Math. Ann., 1921, B. 83, S. 113-115.
- [84] Робинсон Дж. Итеративный метод решения игр. В сб. [65], с. 110-118.
- [85] Розенмюллер Н. Кооперативные игры и рынки. — М.: Мир, 1974.
- [86] Sanchez I., Sobel J. Hierarchical design and enforcement of income tax polices. J. of Public Economics, 1985, v. 26, p. 1-18.

- [87] Соколовский Л.Е. Подходный налог и экономическое поведение. Экономика и математические методы, 1989, т. 25, вып. 4.
- [88] Теория игр. Аннотированный указатель публикаций по 1968 г. — Л.: Наука, 1976.
- [89] Теория игр. Аннотированный указатель публикаций отечественной и зарубежной литературы за 1969 — 1974 гг. — Л.: Наука, 1980.
- [90] Friedman J. On the strategic importance of prices versus quantities. Rand J. of Economics, 1986, № 4, p. 607-622.
- [91] Fudenberg D., Tirole J. Game Theory. — Cambridge, Mass.: The MIT Press, 1996.
- [92] Harsanyi J.C. Games with incomplete information played by Bayesian players. Management Science, 1968-69, v.14, p. 159-182, 320-334, 486-502.
- [93] Handbook of Game Theory with economic applications, Vol. I and II. (R.J. Aumann and S. Hart eds.).— Amsterdam — Lausanne — New York — Oxford — Shannon — Tokyo: Elsevier, 1994.
- [94] Хелли Э. О совокупности выпуклых тел с общими точками. УМН, 1936, вып. 2, с. 80-81.
- [95] Ho Y., Luh P., Muralindharan R. Information structure. Stackelberg games and incentive controllability. — IEEE Trans. Aut. Contr., 1981, v.26, № 2, p. 454-460.
- [96] Hodges J.L., Lehmanm E.L. Some problems in Minimax Point Estimation. Ann. Math. Stat., 1950, v. 21, № 2, p. 182-192.
- [97] Цермело Э. О применении теории множеств к теории шахматной игры. В сб. [65], с. 167-172.
- [98] Selten R. Spieltheoretische Behandlung eines Oligopolmodells mit Nachfrageträgheit. Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft, 1965, № 12, s. 301-324.

- [99] Selten R. Reexamination of the perfectness concept for equilibrium points in extensive games. International J. of the Game Theory, 1975, № 4, p. 25-55.
- [100] Шапиро Г.Н. Замечание о вычислительном методе в теории игр. В сб. [65], с. 118-127.
- [101] Shapley L.S., Snow R.N. Basic solutions of discrete games. Contributions to the theory of games. I (Kuhn H.W., Tucker A.W. eds.). Ann. Math. Studies, № 24, — Princeton: Princeton Univ. Press, 1953, p. 51-73.
- [102] Shapley L.S. A value for n-person games. Contributions to the theory of games. II (Kuhn H.W., Tucker A.W. eds.). Ann. Math. Studies, № 28, — Princeton: Princeton Univ. Press, 1953, p. 307-317.
- [103] Shapley L.S. Some topics in two-person games. Advances in game theory (Dresher M., Shapley L.S., Tucker A.W. eds.). Ann. Math. Studies, № 52, Princeton, 1964.
- [104] Shiffman M. On the equality of minmax=maxmin, and the theory of games, the RAND Corporation, RM-243, 1949.
- [105] Шикин Е.В. От игр к играм. — М.: Эдиториал, 1997.
- [106] Шнирельман Л.Г. О равномерных приближениях. Изв. АН СССР, сер. матем., 1938, № 1, с. 53-60.
- [107] Sperner E. Neuer Beweis für die Invarianz der Dimensionzahl und Gebietes. Abh. Math. Sem. Univ. Hamburg, 1928, B. 6, № 3/4, S. 265-272.
- [108] Chandler P., Wilde L. A general charachterization of optimal income ta[enforcement. Rewiew of Economics Studies, 1987, v. 65, p. 165-189.
- [109] Charnes A., Kortanek K. On balanced sets, cores and programming. — Cah. Centre etudes rech. operat., 1967, v. 9, № 1, p. 32-43.
- [110] Edgeworth E.Y. The pure theory of monopoly. In Edgeworth Papers Ralating to Political Economy.-N.Y.: Brut Franklin, 1925, v. 1, p. 111-142.

Указатель обозначений

E^m — m -мерное евклидово пространство векторов $x = (x_1, \dots, x_m)$ со скалярным произведением $\langle x, y \rangle = \sum_{i=1}^m x_i y_i$ и нормой $|x| = \sqrt{\langle x, x \rangle}$;

$\operatorname{Argmax}_{x \in X} f(x) = \{x' \in X \mid f(x') = \max_{x \in X} f(x)\}$ — множество точек максимума функции f , определенной на множестве X ;

$\operatorname{Argmin}_{x \in X} f(x) = \{x' \in X \mid f(x') = \min_{x \in X} f(x)\}$;

$\{a_k\}$ — последовательность элементов a_k , $k = 1, 2, \dots$;

$E\mathbf{X}$, $\operatorname{Var}\mathbf{X}$ — математическое ожидание и дисперсия случайной величины $\mathbf{X}$;

e — вектор, все компоненты которого равны 1;

e^l — вектор, l -ая компонента которого равна 1, а остальные компоненты — нулевые;

2^S — множество всех подмножеств множества S ;

$|S|$ — число элементов конечного множества S ;

C_m^n — число сочетаний из m по n ;

$\stackrel{\text{def}}{=}$ — "равно по определению";

$\forall \quad \exists \quad \Rightarrow \quad \Leftrightarrow$ — кванторы "для всякого", "найдется", логические связки "следует" и "тогда и только тогда, когда";

$\emptyset$ — пустое множество;

■ — конец доказательства.